







DN. PAULI HERMANNI

Medicinæ Doctoris & Professoris

Lugduno Batavi

CYNOSURA

MATERIÆ MEDICÆ,

ANTE SEDECIM ANNOS IN LUCEM
EMISSA, BREVIBUSQUE ANNOTATIS
EXORNATA

DN. JOH. SIGISMUNDO
HENNINGERO,

Med. Doct. & Prof. Publ. Ord. in Universitate
Argentoratensi,

NUNC

DIFFUSIUS EXPLANATA,
ET COMPOSITORUM MEDICAMENTORUM
RECENSIONE AUCTA,
CURANTE

JOHANNNE BOECLERO

Philos. & Medic. Doct. Botan. atque Chym. apud
Argentinos Prof. Publ. Ord. Capit. Thom. Canon.

ARGENTORATI,

Sumptibus JOHANNIS BECKII.

M. DCC. XXVI.

224.

VIRO
PERILLUSTRI,
GENEROSISSIMO ATQUE EXCEL-
LENTISSIMO,
DOMINO,
DN. FRANCISCO JOSEPHO
DE
KLINGLIN,
GALLIARUM REGI A
CONSILIIS, SUPREMI, QUOD
COLMARIAE EST, DICASTE-
RII REGII CONSILIARIO,
ET
EQUITI HONORARIO,
CIVITATIS REGIAE
ARGENTINENSIS
PRÆTORI REGIO,
UT TOTIUS MAGISTRATUS AR-
GENTORATENSIS, ITA ET ILLUSTRIS COLLE-
GII QUINDECIMVIRALIS
PRÆSIDI GRAVISSIMO,

UT ET
RELIQUIS
LAUDATISSIMI MODO COLLEGII
DOMINIS ASSESSORIBUS,
VIRIS GENEROSISSIMIS MAXIMEQUE
STRENUIS, MAGNIFICIS PRUDENTISSIMIS, CON-
SULTISSIMIS ATQUE AMPLISSIMIS
MECÆNATIBUS GRATIOSISSIMIS

OPUSCULUM HOCCE
SACRUM ESTO.

VIRI, PERILLUSTRIS,

*Generosissimi maximeque strenui, Magnifici, Prudentissimi, Consultissimi atque Amplissimi,
Domini Gratosissimi.*



Uod VOBIS hoc, quicquid est exigui operis, consecrare sustineam, non è longinquo allegandæ mihi veniunt rationes. Materia, quam continet liber, suppeditat arma, quibus morborum corpora mortalium infestans Lerna arceri atque debellari queat. Horum notitia destituti Medici cæcutiunt; his non ritè & dextrè fabrefactis in vanum abeunt & labores consulentium, & miseri ægro- tantes de spe sua concepta depelluntur. Sicut autem summa PATRIÆ PATRUM autoritate cautum est, ne in Apollineorum Virorum ordinem indigna reciperentur membra, ita prudentissimis COLLEGII præsertim VESTRI consiliis & indefessa opera in tam optatum res Pharmaceutica perducta fuit statum, ut & Argentoratum suis superbire officinis, & incolæ æque ac advenæ salutaria nullo non tempore miseriarum haurire queant levamina. Cum autem ad mandata VESTRA facilius in actum deducenda, Medicorum hac de

de re percipere mentem VOBIS placuerit, ad me quoque, cui ante plures annos Botanicae reliquaeque Materiae Medicae Doctoris publici munus concreditum fuit, immerentem licet, benignissimus sese extendit favor VESTER, ut haud indignum judicaveritis, qui sua manifestaret animi sensa. Obedivi, ut par erat, GRATIOSISSIMORUM PRO-CERUM iussibus, & in re charitatem proximi, imprimis ægrorum, suis ærumnis jam satis deplorandorum, concernente, juramenti, quo Regi, quo Magistratui, quo concivibus obstringor haud oblitus, absque ullo personarum (absit jactantia dicto) respectu libere, quicquid mysterii hic latebat, adaperui, nullatenus ringentes & nescio quo pruritu in vera revelantem debacchantes curans. Felix satis, quod VOBIS, MECÆNATES, ardor & labores mei qualescunque non displicuerint. Id quod summa, qua me prosequuti estis, magnificentia VESTRA abundantissime contestata est. Tanto itaque beneficio mactatus ingratae mentis scelus utique committerem, imo ingratis animis annuerandus forem, nisi beneficae Liberalitatis VESTRAE monumentum ponerem, gratitudinisque meae testimonium ederem. Devotas itaque, quas possum, VOBIS, PERILLUSTRIS DN. PRÆTOR REGIE, GENEROSISSIMI MAXIMEQUE STRENUI, atque

atque **MAGNIFICI VIRI**, rependens grates, sub-
 misso animi cultu à **VOBIS** efflagito, levidense hoc-
 ce grati animi symbolum ne aspernemini. Suscipite
 quæso tenuem qualiscunque ingenii mei foetum se-
 rena fronte, & hæc pagellas summæ benevolentia
 radiis collustrare haud gravamini. Ego ea semper
 veneratione atque obedientia incedam, ut collatis in
 me beneficiis non omnimodo indignus compaream,
 & ad ultimum usque halitum admirabor magnas
 virtutes **VESTRAS**, in quarum laudes, **PATRONI**
MAXIMI & hac eundum fuisset occasione: verum
 cum & mea in dicendo tenuitas obstet, & **VOBIS**
 bene potius mereri, quam illustrium factorum **VE-**
STRORUM encomia audire, innatum sit; ideoque
 laudibus in vota converfis **DOMINUM DOMINAN-**
TIUM ardentissimis suspiriis adoro; **VOS OMNES &**
SINGULOS, MECÆNATES OPTIMI, terque
 quaterque, & ex omni parte beatos, ad feros usque
 conservet annos. Conservet quoque **ILLUSTRE**
VESTRUM COLLEGIUM, dum **ARGENTINA**
 florebit, & curas, quas pro salute publica impendi-
 tis, consiliaque **VESTRA** saluberrima, faustissimo
 semper coronet successu. Tu imprimis, **PERIL-**
LUSTRIS PRÆSES, virtutum magni, heu quon-
 dam, **PARENTIS TUI** ex asse hæres, qui meritis
TUIS MAXIMI REGIS TIBI conciliasti favorem,
 qui

qui humanitate, affabilitate, iustitia atque benignitate, omnium allicis animos, prosperitate TUA in Nestoreos usque annos frueri, indiesque nova gloria incrementa capeffe, quo ARGENTINA TE florente, TE auspice, TE dirigente exoptatissima omni tempore experiatur fata. DEUS vota rata habeat. Vos autem, PERILLUSTRIS, GENEROSISSIMI atque MAGNIFICI VIRI cum, quem summo VESTRO haftenus patrocinio complexi estis, in posterum quoque eodem fovere haud dedignamini, qui tum demum felicitati meae complementum accessisse arbitrabor, si & hocce obsequii & reverentiae specimine litatum VOBIS fuisse intellexero.

MAXIMORUM NOMINUM VESTRORUM,
PERILLUSTRIS DN. PRÆTOR REGIE,
VIRIQUE GENEROSISSIMI, MA-
XIME STRENUI, MAGNIFICI
atque PRUDENTISSIMI,

Cultor devotissimus atque
perpetuus

Johannes Bœclerus.



PRÆFATIO
DN. HENNINGERI b. m.
AD LECTOREM.



Quam vastus sit Materix Medicæ ambitus, & quanta cum difficultate notitia ejus acquiratur, quivis in hac re vel leviter versatus perspicit, & querelæ eorum hujus cognitionem sibi comparare al-
laborantium satis testantur. Tam late enim patet ac ipsa natura patet, & qua tota fere Physicæ pars specialis continetur.

Uti vero in vasto Oceano navigantibus contingit, ut navigationis viam ductu & indicio cynosuræ dirigant, quo iter feliciter perficiant, ita si præ-
sens hoc opus sub titulo Cynosuræ Materix Medi-

)

cæ

cæ emisero, non peccabo, quam facile enim viam monstret, in hoc longo alias & anfractuoso Materiæ Medicæ itinere, plures jam insigni cum emolumento experti fuere.


Optavi propterea serio, jam à pluribus annis, ut hoc laudatissimum & cedris dignum opus, à quodam aliquando luci publicæ committeretur, cum Studiosa Juventus maximam inde utilitatem sit perceptura. Sed cum hætenus nil tale videre contigerit, nam opusculum sub nomine Lapis Lydius Materiæ Medicæ emissum, non nisi descriptum obtinere potui, imo potius conspexerim plures hinc inde in libris emissis Beati Autoris opera pro sua uti, interim tamen apud plurimos magnificis elogiis hoc opus exornari, non inconsultum fore duxi, ut hunc laborem in me susceperem.

Cum enim in Collegiis & Prælectionibus de Materia Medica à me habitis, Auditoribus meis hunc Authorem de meliore nota commendassem, atque ex hac causa sæpius describeretur, insuper in posterum, DEO vitam concedente juxta Autoris ductum Materiam Medicam tradere constitutum atque propositum sit, ut & mihi hac ratione in-

instar Cynosuræ inserviret & describendi onere Auditores meos sublevarem, atque præterea Bibliopola promte operam suam promiserit, denique hoc institutum ab Experientissimis quibusdam hujus Civitatis Medicis non inutile æstimatum fuerit, eo promptius hoc ipsum in me suscepi.

Confirmarunt ulterius me in hoc proposito nonnulli ex Cl. Dn. Auditoribus, qui egregios ut in hoc studio profectus publice ostenderent, in Solenni Auditorio per pensa hoc opus pertractandum & defendendum non sine sui laude & fructu in se susceperunt.

Certo igitur Tibi persuasum habeas, me nec lucri captandi, nec gloriæ aucupandæ gratia hoc suscepisse, sed solum commodum & utilitatem Studioſæ Juventutis, unicum mihi fuisse scopum præfixum. Id quod si hoc ipso obtinuero est de quo mihi summopere gratulabor. Vale.



PRÆFATIO BOECLERI.

Rodit iterum in lucem *Cynosura Materiae Medicæ Hermannianæ, seu brevis ac succincta Methodus notitiam simplicium Medicamentorum comparandi, desumpta ab interiore partium, prouti Titulus præcedentis editionis tradit, constitutione, ubi simplicia, juxta partes suas constitutivas in certas classes distribuuntur, post denominationem succincta descriptio traditur, vires atque virtutes enarrantur, & modus dextre usurpandi monstratur. Reiteratæ autem impressionis causa priorum exemplarium defectus extitit, ut hoc suis meritis utique æstimandus Bibliopola, cujus sumptibus nunc rursus, Artis Apollinææ cultoribus tantopere hætenus adamatus & æstimatus, tractatus typis mandatur, contestatus fuit; qui illud insuper a me efflagitavit, ut commentatione quoque quadam Authoris illustrarem pronunciata. Annuendo honesto petito, non potui non declarare, opus succinctum*

cinctum in usum publicum non melius posse expoliri, quam si prolixior simplicium traderetur historia atque expositio, remediumque ex simplicibus in officinis Pharmaceuticis prostantium maximeque usualium conjungeretur enumeratio. Facile hinc ex ipso proposito, ni fallor, patere æquo judici poterit, me manum calamo minime admovisse eum in finem, ut novi authoris gloriam aucuparer. Nam cum plures hominum ætates non sufficiant ad intimius investigandas res naturales, in usum Medicum cedentes, utique aliorum autopsia, experientia, atque doctrina in iis tradendis acquiescendum est. Quare nemo quoque vitio vertere poterit, meos qualescunque in illustrando authore labores, dum ex fide maxime dignis Authoribus, Medicis æque ac Naturalis Historiæ, ut & Peregrinationum Scriptoribus ea, præsertim quoad exotica, excerpta atque collecta, quæ veritati quam maxime conformia comparuerunt, insuperque, quæ autor vel studio vel forsitan ob temporis angustiam, tum nominis, tum originis, tum virtutis, tum etiam remedium & inde præparatorum ratione, omisit, suppleta fuerunt. Conspicientur hinc varia Græco, Latino, Gallico atque Germanico idiomate expressa nomina. Cernentur etiam rebus, imprimis plantis sui assignati characteres. In quibus describendis il-

lustris Botanici Gallici magni scilicet **TOURNE-
FORTII**, quem olim docentem audire contigit,
quemque etiam post fata in aureis suis scriptis vel
ipsa invidia admirari cogitur, adhæsi doctrinæ.
Quamvis enim & ipsum hominem, per consequens
& in re Botanica quandoque hallucinatum fuisse ne-
gari non possit, in eo tamen quam maxime excelluit,
quod ipso *Rajanae* Methodi propugnatore acerrimo
DILLENIO teste, circa specialia & inferiora
plantarum genera, notasque characteristicas valde
accurata sit & curiosa **METHODUS TOUR-
NEFORTIANA**. Additæ insuper sunt ex eodem
denominationes specierum hujus vel illius plantæ, quæ
maxime in usum trabuntur, locorumque, ubi prove-
niunt colligique possunt, mentio injecta, tempore flo-
rendi non omnimodo insuper habito. Quæ porro ex
singulis tum plantis, tum animalibus, tum minerali-
bus usurpentur partes, recensitæ fuerunt. In enar-
randis virtutibus paulo prolixior videri possem &
quandoque nimium tribuens. Ast cum ad complen-
dam materiam Medicam virium notitia quam ma-
xime necessaria sit, vix non omnia fuerunt alleganda
attributa: & licet, hæc vel illa facultas, suspecta &
in quibusdam subjectis fallax deprehendatur, non ta-
men exinde sequitur, hoc remedium in subjecto cho-
lerico

lerico speratum non habuit successum, sed potius no-
xium extitit, ergo in temperamento phlegmatico aut
sanguineo prodesse quoque non potest. Quam ob rem
virtutes quoque quadantenus dubias allegare non du-
bitavi, refutatis & rejectis opinionibus superstitiosis
& ridiculis. Adjectus etiam legitimus, quantum
per experientiam tum propriam tum alienam con-
stitit, simplicibus utendi modus. Tandem præpa-
ratorum & compositorum ex simplicibus Medicami-
num, nominibus Latinis, Germanicis, atque
Gallicis insignitorum, factus fuit sermo. Plu-
rimorum elaboratio in nuper edita PHAR-
MACOPOEA ARGENTORATENSI
evolvi poterit, interim ex eadem virtutes atque do-
ses propriis verbis hic repetere consultum judicatum
fuit, ne imprimis, ubi elaborationis Methodo super-
sedere possumus, laborem duplicare cogeremur. Ne-
mo etiam inique, ut spero, interpretabitur, quod au-
thorum, vix non semper allegatorum, verbis ipsissi-
mis usus fuerim. In notis Henningerianis, quas can-
cellis inclusas deprehendes, nihil immutavi. Adin-
venies etiam hinc inde intermixta tum curiosa, tum
etiam non omnibus nota remedia, quæ forsitan & ju-
cunda & utilia esse poterunt. Cæterum B. L. Tibi
persuadeas me eum semper præfixum habuisse scopum,
ut

ut conatus mei æque in ægrotorum, ac in artis filiorum commodum cederent. Humani autem à me nihil esse alienum bene gnarus, me, si lapsus fuero erra veroque, amice præsertim monitus, quantum in viribus erit, corrigere allaborabo. Quod si autem labores mei non plane displicuerint, & ab iis quoque in posterum aliqualis redundare possit utilitas, suo tempore supplementum omissorum ab authore simplicium & compositorum, in lucem, eadem, qua nunc usus fui, methodo incessurus, emittam. Deus largiatur divinam suam gratiam.



PROOEMIUM.



Ateria Medica dicitur nobis omne id, quod corpus nostrum alterare & immutare potest, seu alimentosum seu medicamentosum, ex qua Medici selectiora eligunt.

Quatuor inprimis adminicula hic consideranda veniunt. Primum suppeditabit ipsa simplicium Etymologia, ex qua sæpe latens vis erui potest, v. c. in consolida, tussilagine, hepatica, pulmonaria. Alterum petemus ex frequentissima simplicium inspectione & usu. Tertium desumemus ab exploratione saporis & odoris; sic odor fragrans calorem & vim aperiendi notat, consistit enim hic in particulis subtilissimis, quæ celeriores Sanguinis motum, & per consequens calorem producere aptæ sunt natæ. Hic odor fragrans, si suavis fuerit, denotat vim cardiacam, sin vero fragrantiam odoris

gravitas simul comitetur vis Uterina significabitur, constant enim similia particulis quidem spirituosis, minus tamen volatilibus sed fixioribus. Quoad saporem, quæcunque habent acrem, calida sunt, & aperientia; quæ amarum, calida quidem sunt, fixiori tamen sale constabunt; quæ dulcem, sunt temperata sed viscedine donata; quæ acidum & austerum refrigerant & adstringunt. (Novem species saporum recensentur; Acerbum, austerum, acidum, dulce, unctuosum seu pingue, falsum, amarum, acre, insipidum. Qua de re conferri meretur Davidis Abercrombii Nova Medicinæ tum Practicæ tum speculativæ clavis, sive ars explorandi Medicas plantarum ac corporum quorumcunque facultates ex solo sapore, Londini 1685. edit.) Quartum denique à cujusque plantæ nota essentiali & charactere desumitur, unde etiam omnes plantæ, quæ eandem habent notam essentialem, ejusdem sunt facultatis: sic omnes herbæ bacciferæ sunt diureticæ, sic omnes herbæ umbellatæ sunt sale volatili oleoso præditæ.

Cognoscuntur itaque virtutes plantarum omnium maxime Ratione, Experientia, & Analogismo.

Materia medica alias definitur per seriem medicamentorum e triplici regno, minerali, vegetabili atque animali petitorum, quæ debito modo adhibita vitam atque sanitatem vel conservare, vel morbis labefactatam refocillare atque restaurare possunt.

Discrepant itaque medicamenta ab alimentis. Hæc namque in similem corpori nostro substantiam converti apta nata, illa vero tali mutationi inepta sunt corpusque nostrum alterant & quidem in melius, quo ipso medicamina distinguuntur a venenis, quæ in pejus mutant, corrumpunt atque destruunt. Accidit autem quandoque ut alimenta æque ac medicamenta in venena degenerent, hæc vero salubrem nanciscantur effectum præsertim si consuetudo accedat, cujus rei plura possent allegari exempla. Sufficiat nunc Metallifossor iste septuagenarius Tyrolensis, qui, observante b. m. Parente meo, singulis diebus frustulum arsenici devoravit, hoc remedio se vitam prolongare sibi aliisque persuadens. Ex his facile patet dari alimenta medicamentosa & vice versa medicamenta alimentosa, quæ quatenus corpus alunt & augent alimenta, quatenus vero insigni aliqua qualitate afficiunt, medicamenta vocantur. Nec desunt alimenta venenosa & venena alimentosa, rarissime imo nunquam in

A 2
usum

usum trabenda, sicuti quoque cautissime mercari debemus cum medicamentis venenosis, & venenis medicamentosis, id quod vel unius arsenici, quo scelesti quidam Empyrici in viscera humana grassantes interne in febribus aliisque morbis, externe vero in ulceribus, cancro, &c. nefario ausu usi fuere, exemplo edocemur.

Quod ad primum adminiculorum ab authore recensitorum attinet, optandum fuisset, ut omnibus remediis adeo convenientia fuissent imposita nomina, ut virtutes illorum manifeste ex etymologia paterent: ast quot magnificis superbiunt titulis, quæ insignita tamen per nomen vi vel plane destituuntur, vel non nisi in exiguo gradu eandem possident. Cujus rei causa non parum quoque in neglecto, quod secundo loco annotatur, adminiculo quærenda, dum observato vel unico remedii cujusdam, forsitan per accidens tantummodo agentis, effectu, statim ei nescio quæ virtus specifica assignatur, cum tamen illam demum exosculari debeamus experientiam, qua sæpissime & constanter posito eodem subjecto, iisdemque circumstantiis, eodem quoque modo medicamentum vires suas exseruisse constat. Cui experientiæ deinde merito jungenda venit ratio, ut omnia rite dijudicentur.

Tertium adminiculum si consideretur, odori atque
saporis

Sapori merito juxta WEDELII amœnit: Mat. Med. connectitur Color, quippe qui in particularum potissimum sulphurearum, a quibus colores quoad magnam partem ex mente Chymicorum dependent, plus minus latentium majorem minoremve præsentiam & exinde dependentem agendi facultatem nos deducit.

Circa odorem id paucis notandum, quod non tantummodo per se, sed & a posteriori innotescat, quando corpora vel accenduntur, vel teruntur vel dissolvuntur, cum partes odorem constituentes haud raro ab aliis ita sint irretitæ, ut extricationem summopere postulent.

De sapore non solum dictus ABERCROMB consulatur, sed & curiosi adeant celeberrimum WILLISIUM, atque WEDELIUM in amœn. Mat. Med. aliosque plures tum Medicos tum etiam Physicos.

Quartum adminiculum a charactere plantarum desumptum adeo non firmo stat talo, ut sæpissime exceptionem patiatur maximam: sic Grossularia est bac-cifera sed tamen adeo non diuretica, ut potius in diabetese sive nimio urinæ fluxu commendetur. Sic Ligustri baccae magis adstringunt quam ut laticem urinarium pellant.

Hisce quatuor detegendi remediorum virtutes
fonti-

fontibus merito jungitur ista methodus, qua ex varia cum aliis corporibus combinatione natura alcalina, acida atque salsa patefit, quæ Medico vel eam solummodo ob causam, ne in præscribendis formulis offendat, summopere necessaria videtur. Erudite hac de re magnus iste Botanicus Gallus **TOURNEFORTIUS**, in præfatione Historiæ plantarum circa Lutetiam Parisiorum nascentium disseruit.

Et certe quid gratius conspici poterit? quam syrupi Violarum color cæruleus in momento in rubicundum rubinumque æmulantem ab affuso aut commixto acido conversus; succus Ricinoidis seu Heliotropii triccoci itidem cæruleus mox rubescens; charta etiam cærulea rubedine infecta, quamprimum corpus naturæ acidæ affricatur. Quibus ex experimentis de prædominante in corporibus acido iudicium ferri potest. Quid porro jucundius exhibebitur? quam ejusdem cærulei syrupi, ut ☿ vini rubri in virorem a commixto corpore alcalino immutati spectaculum; unde de urinosa constitutione judicare est, quæ porro ulterius confirmatur, dum cum acidis effervescent mixta. Quid tandem nigredine in infusione Gallarum ab injecto Vitriolico corpore producta curiosum oculum magis recreabit? ut plura alia silentio nunc præteream.

Quod attinet ad analogismum quem rationi ☿
expe-

experientiae jungit author, quamvis minime negari possit, quod signaturis rerum quæ interius latentem virtutem extrinsecus quasi signatam exhibent, nimium a multis & vix non ad superstitionem usque fuerit attributum, interim tamen ex comparatione plantarum cum partibus corporis humani, vel cum morbo aut etiam ex alia analogia occasionem suppeditari ad eruendam virtutem Medicam WEDÉLIUS alique satis demonstrarunt. Valet autem & hic quam maxime, ne quid nimis.

Tandem nec analysis Chymico-Physica spernenda, quippe quæ ad interiora Naturæ adyta deducit, & causas virium quibus medicamina gaudent ob oculos ponit.

Illud hac occasione silentio præterire nequeo, quod celeberrimus Academiæ Regiæ Scientiarum socius Dn. GÉOFROY omnes plantas ferreis patriculis, a quibus vis vel aperitiva vel adstringens dependeat, scatere asserat, id quod altiore adhuc investigationem mereri videtur.

PARS PRIMA.

REGNUM VEGETA-
BILE EXHIBENS.

CAPUT PRIMUM.

DE RADICIBUS.

RADICES SALE VOLATILI
OLEOSO CONSTANTES.

Acori vulgaris.

Indici.

Zedoariæ.

Galangæ majoris.
minoris.

Zinziberis.

Conveniunt in cruditate acida, Colica, obstructionibus
menſium, ſcorbuto, hydrope, vertigine, ſingultu, cordis
palpitatione.

ACORI RADIX.

ACori veri [SEU CALAMI AROMATICI OFFICINARUM] C.B.P. radix eſt, oblonga, paululum com-
preſſa, in ſuperficie quaſi geniculata, foris ex flavo
rubefcens, intus alba, fungoſa, ſaporis acris ſuaviter
amari-

amaricantis & aromatici, odoris fragrantis. [Refertur ad herbas aquaticas graminifolias non culmiferas flore stamineo, foliis iridis modo sitis, hoc est acie folii cauli obversa, aromaticis, odoratis, spica simplici eleganti juli specie, seminibus in julum seu nucamentum coactis.]

Ob Θ volatile [acre] oleosum [aromaticum] penetrantissimum succurrit acidæ cruditati Ventriculi, in torminibus abdominis inde ortis, obstructione Mensium è vitio Ventriculi, in scorbuto & hydrope pro confortante.

Primo vere effossa radix diutius fert ætatem ac aliàs.

Acorus in substantia rarius exhibetur, conditus vero frequentius, si vero datur crudus, datur à gr. v. ad xv. conditus vero à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} j.

Ubi destillatur radix hæc cum ∇ , si degustaveris aquam ingratissima est, si oleum, nauseosum, semper ingratissimum, contra fixum radicis in fundo remanens optime sapit. Infusum acori fit in ω Juniperino qui optimus, vel in Spiritu vini, ad pint. j. additur acori \mathfrak{z} j. Admiscetur quoque morfulis.

Stimulatur acorus granis paradisi. Temperatur partim dulcibus, partim minus acribus. Convenit in torminibus colicis ortis à cruditatibus acidis, item in ructibus molestis e. c. \mathfrak{R} . acor. condit. \mathfrak{z} j. Castor. gr. ix. l. x. Laud. opiat. gr. ij. flaved. Cort. aurant. cond. \mathfrak{z} j. add. Syr. Cortic. aurant. q. s.

Etiam in morbis soporosis acorus externe exhibetur. e. c. \mathfrak{R} . rad. pyretr. saxifrag. acori ana \mathfrak{z} j. summitat. organ. Mj. sem. cardamom. min. \mathfrak{z} ss coq. in s. q. ∇ æ, colatur. cap. \mathfrak{z} viii add. Θ gemm. \mathfrak{z} ij f. Clyster. Si non sat acris, potest stimulari pulpa colocynth. \mathfrak{z} j. linteolo involuta.

In Epithematibus contra Paralyfin sive resolutionem nervorum: \mathfrak{R} . acor. \mathfrak{z} j rad. pyretr. \mathfrak{z} ss helen. Zedoar. Zinzib.

ana ꝑ. summit. hyperic. fol. majoran. spicæ. ā. p. ij affund. spir. Vin. vel. — C. C. succinat. vel — Terbinth. ad emin. 3. vel 4. digitor. fiat infusum Paralyticum externum. Hoc enim spirituum influxu cessante vellicantur nervi, ut rursus spiritus influant.

ACO.

ACORUS, *Kalmus/ Alferwurk/ Julus*, uti notat RAJUS, rarissime geminus, flosculis dum se explicat pallidis muscosis inodoris quadrifoliis plenus: is paulatim deinde incrementum sumit; donec humani fere digiti longitudinem crassitudinemque acquirat, frequentibus tuberculis virentibus tam eleganti serie dispositis ut recentem Pinastrum conum æmulari videatur.

Gaudet locis humidis, & juxta fluentia longe felicius provenit.

Radices siccatae ut bene monet idem RAJUS gratiorem spirant odorem, nam (ut recte PLINIUS) recentium virus majus.

Non solum in cruditate acida sed & in omnibus affectibus ventriculi a causa, ut loquuntur, frigida, pituita viscida, flatibus &c. oriundis prodest. Hinc non inepte SIMON PAULI pronunciat, quod omnibus Electuariis Stomachicis & intemperiem ventriculi frigidam corrigentibus addi deberet, dummodo palato arrideret.

Remedium uterinum constituit, in passione hysterica, dolore colico a passione hysterica oriundo, obstructione mensium ab humorum cruditate dependente conveniens.

Acorus quoniam in anorexia & dyspepsia conducit vocatur Germanicè *Behrmurzel*. Vim habet quoque acorus alexipharmacam curandi & præservandi a morbis contagiosis. CLUSIO teste incolæ in extrema Lithuania a Tartaris edocti radicem acori plerumque circumferunt & aquam non prius bibunt, quam in ea acori radix fuit macerata, suadet hinc SIMON PAULI viris castra sequentibus, qui sæpe corruptissimas aquas bibere coguntur, ut Tartaros imitentur. Quum etiam ex hac causa nautis jamdudum innotuerit, ut sibi ea vel nauseam arceant, vel præaveant ne aquæ putridæ imo jam verminantes exitio sint, appellari consuevit Radix Nautica.

FALLOPIUS multos lotii suppressione laborantes acori decocto ex vino tenui sanitati se restituisse gloriatur. Cerebrum confortat & vertigini medetur fere tanquam secretum, ut docet de MAYERNE. Virtus aphrodisiaca quoque fuit adscripta, quare a quibusdam Radix Venerea fuit nominata. Masticata halitum oris emendat. In morbis soporosis non externe tantum sed & interne conducit. In vino cocta radix hæc testibus tumentibus imponitur. Succum expressum oculis instillatum oculorum caligini mederi asserit Dioscorides.

PROSTANT.

Acorus conditus eingelegter Calmus / Calamus aromaticus condit.

Confectio Calami aromatici, überzuckerter Calmus / confectio de Calamus Aromaticus, ou Calamus aromaticus confit.

Electuarium diacorum Calmus oder Uckermans-Latwerg / Electuaire diacorus. Nervorum ægitudinibus confert, acuit sensus & memoriam, sedat dolores capitis, peculiare est remedium frigidarum, uti loquuntur ægitudinum, maxime catarrhalium, senibus admodum conveniens. Hydropicos quoque juvat. Electuarium hoc ex aromatibus quam maxime constans datur ad drachmas duas ad unciam unam usque & ultra.

Sunt qui extractum inde parant & ad scrupulum ad drachmam semis & ultra commendant, alii oleum destillatum tanquam carminativum, anodynum, uterinum atque nervinum usurpant. Alii essentiam extrahunt. Qui autem Sali per incinerationem ex acoro parato peculiare tribuunt vires, non adeo exacte sapiunt.

ACORUS INDICUS.

[Acorus Asiaticus radice tenuiore. Herm. Catal. de quo ibi ita: acorus hic omnibus partibus convenit cum Europæo, excepta sola radice, quæ tenuior est, & compactior, superficie crebrius geniculata, odore & sapore gratiori. Sponte sua luxuriat in Malabara & insula Zeylan, Incolis Vazabu & Vazumbo audit.

Cum priore viribus convenit. vid. Garz. ab Horto aromat. hist. lib. 1. cap. 32.]

(CALAMUS AROMATICUS.

De quo ex prælectionibus MStis Hermannii Samuel Dale Pharmacolog. p. m. 337. ita loquitur: Calamus Aromaticus veterum est plantæ Ægyptiacæ (Alpin. Exotic. Cassabel Dar-rira dictæ; quæ tetrapetala est, filiculis oblongis, acuminatis, in basi cauliculatis, seminibus nigris minutissimis refertis) cauliculi tenues, geniculati, foris pallide flavescentes, intus candidi, includentes medullam fungosam, levem, similem telis aranearum in se collapsis, saporis acris, suaviter amarican-tis, odoris aromatici & fragrantissimi. Itaque non est radix sed arundo aut cauliculi odorati.

Describit hanc plantam Prosper. Alpin. de plant. Exotic. l. 2. c. 7. p. m. 195. & de usu Medico agit idem Alpin. de Me-dicina Ægyptiorum libro quinto. Aliàs de calamo odorato Diosc. l. 1. c. 17. ingreditur compositionem theriacæ, sed ho-die nostris officinis est incognitus, & loco ejus recipitur acorus verus.)

De hac & præcedente planta, cum rara in nostris terris sit avis, adeoque non multum imo plane non in usum veniat, multos mis-cere sermones opus non est.

ZEDOARIA.

Est Zedoariæ Chinensis radix, tuberosa, brevis, com-pressa, foris cinerea, intus candida, quando cortex exterior est detractus, paucis fibris intertexta, saporis amaricantis aromatici, odoris fragrantis ad camphoram aliquantum ac-cedens. Folia ad curcumæ folia accedunt, suntque palmæ magni-

magnitudine, fert florem in peculiari spica ut galanga, quos flores sequuntur loculamenta terna.

Constat Θ e volatili oleoso acriore penetrantiore & spirituosiore acoro, propterea se altius extendit, ut simul sudorem moveat, phlegma contumax Pulmonum potenter discutiat, & colicæ convulsivæ hystericæ medeatur. Nauseam tollit vel odor solus, vel si sub Lingua teneatur, vel si externe Ventriculo applicetur vel sola vel cum fermento. In vindicando sanguine à malignitate tanquam panacæa habetur, aliis loco stimuli additur, est alexipharmacum egregium. In asthmate etiam convenit, in nausea post crapulam.

Sal volatile à curiosis destillatur, aqua ingrata quidem, sed maxime sudorifera, unde pro ∇ alexipharmaca usurpo. [Conf. Hermann. Hort. Lug. Bat. sub titul. Zinziber latifolium sylvestre. Zerumbet Garz. ab Hort. l. i. c. 47. ubi hanc plantam prolixè describit, & inter alia hæc de destillatione habet: Sale volatili oleoso aromatico abundare hujus aromatis radicem, probat inter alia ejus destillatio. Transmittit enim per alembicum ∇ fragrantem, cum sufficiente oleo, cui, si recens fuerit destillata, innatat sal volatilis paucus forma nivis aut Camphoræ.]

Dos. gr. vij ad $\mathfrak{z}\beta$ in substantia, condita vero $\mathfrak{z}\jmath$. in infuso ad $\mathfrak{z}\jmath$, edulcoratur vel saccharo vel melle.

Zedoariæ optimus stimulus est camphora, quod quasi à priori illis notum, qui recentem effossam examinarunt, qui dicunt, quod omnino spiret camphoram.

Specificatur in colica cum Castoreo, ut & in affectibus Uterinis.

\mathfrak{R} . Zedoariæ $\mathfrak{z}\jmath$ Camph. $\mathfrak{z}\jmath$ sacch. cand. $\mathfrak{z}\jmath$ vel \mathfrak{ij} . M. f. pulv. pro novem dosibus, singulis diebus una, contra omnes malignitates.

\mathfrak{R} . Zedoar. $\mathfrak{z}\beta$. sacchar. $\mathfrak{z}\beta$. M. f. pulv. sumendus ex aceto
contra nauseam.

R. Zedoar. ʒʒ. ꝑo serpill. gt. j. Laud. opiat. gr. j. Conserv. rofar. ʒlat. ʒj Syr. acetos. Citri q. s. M. f. bolus in quavis nausea & vomitu.

ZEDUAR, ZADURA, *Ξαδέρα*, Zittwer / Zittwer-Wurk / Zedoar / ZEDOIRE.

De hac radice non adeo omnes authores inter se conveniunt, quidam Zedoariam longam inter & rotundam distinguunt, alii adhuc addunt tuberosam. Plurimi in eo consentiunt, quod longa & rotunda ex una eademque proveniant planta: Longa inferior radicis pars est, superiore locum occupante rotunda & magis tumente, quæ deinde in frusta scissa ad nos adfertur. Meretur hac de re conferri Samuel Gotthilff MANITIUS in libello de ætatibus Zedoariæ. Radix hæc hoc habet vitii quod cariei imprimis sit obnoxia, affertur ex India Orientali præsertim China, Bengala &c.

Virtus hujus radicis stomachica insignis est atque carminativa, vermibus insuper quam maxime adversatur, præsertim si cum ꝑrio dulci maritetur.

Sunt qui ad contagium arcendum Zedoariam sub lingua detinent, alii vestibis apponunt ad profligandas tineas.

OFFICINÆ NOBIS DE ZEDOARIA EXHIBENT.

Aquam Zedoariæ, Zittwer-Wasser / Eau de Zedoire, & quidem vel cum aqua, vel ut plurimum cum vino destillatam, quæ usibus allegatis inservit.

Extractum Zedoariæ, Zittwer-Extract / Extraict de Zedoire, cum Spiritu Vini paratum, cujus dosis ad ʒj. ʒʒ & ultra.

Oleum Zedoariæ, per destillationem paratum, *Zittwer-Del / Huile de Zedoire*, quod ad aliquot guttas assumptum ad supra notatos scopos deprædicatur: Sunt qui radices hæc saccharo condiunt & Zingiberi condito præferunt. Ingreditur Zedoaria Acetum Bezoardicum & varias alias compositiones.

GALANGA MAJOR ET MINOR.

Galanga duplex est, major & minor. Major est planta Indica Banchabe dicta, radix tuberosa, pollicem [& amplius, imo

imo duos interdum] crassa, nodosa, inæqualis, in superficie circularibus geniculis donata, [cortex] flavescent, [aut fuscus] intus pallescens, saporis acris aromatici, [aliquantum ingrati] odoris, [quodammodo] fragrantis.

Minor est plantæ indicæ Lagondi dictæ radix tuberosa, nodosa, majora similis, sed tenuior, digiti crassitiem adæquans, odoris fragrantioris & jucundioris quam in galanga majore.

Galanga minor quæ efficacior est majori, relinquit post acredinem, intensiorem stypticitatem, unde temperatior est, & in vertigine à vitio Ventriculi, in torminibus abdominis & doloribus post partum specifica est, cæterum nervis & spiritibus commendatissima est, in singultu quoque & cordis palpitatione. [Ad classem iridum à nonnullis utraque planta refertur, quod ex foliorum similitudine & zonis in radice circulariter cinctis probant.]

Minor nonnihil viscidum habet in recessu seu adstringentiæ nonnihil, cerebro gratior est quam acorus, ad septimum vel duodecimum annum potest conservari. Frustula seu gemmæ radices solent decerpi à Chinenfibus, iterumque plantari, etiam feminibus multiplicantur. In india orientali galangam conditam habent. Cum bucella panis & butyri capiunt pulverem galangæ mulieres indicæ in doloribus post partum.

Datur à ℥ss ad ℥j in substantia. in infuso velut acorus. juvatur zedoaria, helenio.

Specificatur in vertigine Doronico, cumino. Stimulatur Castoreo, sale succini, laudano opiato in doloribus post partum.

Pro juvene scotomia jejuno Ventriculo surripiente & exinde in vertiginem incidente.

℞. Galang. Zedor. ana ℥j castorei gr. viij ∅ chamom. dest. gt. ij f. pulv. exhibendus ad ℥β singulis mane.

℞. Galang. q. v. M. cum ▽ plantag. fac epithema, impone regioni cordis, ad cordis palpitationem tollendam.

℞. Galang. ʒj sem. aneth. ʒβ f. infusum ex vino ad singulum, cochleatim exhibendum.

℞. Galang. ℥j. croc. orient. gr. v. exhibe in vino vel ▽ cinamom. in doloribus post partum.

℞. Rad. doronic. sem. cumin. galang. min. ana gr. xv. add. pro stimulo gt. j. ∅ d. cinam. dari potest in vertigine. vel.

℞. Galang. ʒβ. doron. ʒj zinzib. chin. cond. ʒij sem. cumin. ℥j ∅ d. cumin gt. iiij conserv. flor. anthos ʒβ. syr. flor. tunic. q. f. f. Elect.

ZINZI-

Galgant/ du GALANGA.

Sicuti de Zedoaria ita & de Galanga nondum inter authores convenit, quibusdam utramque speciem ad Iridum genus ob radicis præsertim convenientiam referentibus, aliis vero majorem iridibus accensendam esse censentibus, minorem frutici folia myrtum æmulantia gerenti annumerandam pronunciantibus. Major in Java & Malabar, minor vero in Chinorum præsertim regione provenire fertur.

In minori Galanga, quam majori præferunt, jubent imprimis respicere ad colorem qui foris rufus & subfuscus, intus vero ex flavo rufescens esse debet. In eligenda Galanga præsertim minori respici debet, præter dicta, ad gravitatem densitatem atque colorem.

Cum galanga adeo roboret ventriculum, ejusque affectibus medeatur, Paracelso alter sive externus fuit appellatus ventriculus. Nautis ad nauseam & vomitum reprimendum conducit, nec destituitur virtute emmenagoga & instar aliorum aromatum virtute quoque

quoque aphrodisiaca. In ore detenta & masticata non solum ejus anhelitum emendat, sed & salivam fortiter movet, adeoque tanquam apophlegmatizans in morbis serosis catarrhalibusque usui venire potest, sicuti quoque in remediis errhinis atque sternutatoriis galanga uti licet. Sacculis porro cordialibus stomachicisque immiscere galangam nefas minime erit.

Parabantur olim ex Galanga species diagalangæ, quæ ad dictos similesque affectus multum celebrabantur, sed hodie exoluerunt. De Galangæ in indiis conditæ speciebus non licet quoque facere plura verba, quia iisdem quoque destituimur. Indi tanquam condimentum in variis ferculis ut & in acetariis adhibent.

ZINZIBER.

Est radix tuberosa, nodosa, ramosa, brevis, & paululum compressa, pallida, fibris crebrioribus dotata, saporis aromatici acerrimi fervidi, instar piperis, odoris [aliquantum] fragrantis.

Variæ sunt species Zinziberis, quæ tantum differunt ratione fibrarum, quo vero plures fibræ, eo ignobilius, quo pauciores eo præstantius, sed hæc ultima species rarius in officinis prostat, radix enim multas habet fibras & est lignosior. [Planta similis est iridi, unde à nonnullis appellatur Iris latifolia tuberosa, Zinziber dicta, flore albo.]

Cum Zedoaria convenit, excepto camphorato odore, hinc tanta vis alexipharmaca ipsi non inest. Gratius quidem est, sed acrius & calidius & magis desiccativum. Corrigit purgantium vehementiam præcipue agarici. Melancholicis & Cholericis largior usus Zinziberis non conducit, quia humores nimis exsiccat, & ad motum ineptiores reddit.

Corrigitur acidis blandis, quia habet Naturam alcalinam, nempe rob ribium, berber. succo limon.

In morborum declinatione mire appetitum restaurat.

Recens effossa vim habet laxandi alvum, præcipue ejus

succus expressus, sed sicut in semine coriandri recens malignitas tractu temporis evanescit.

Zinziber in substantia datur à gr. v. ad xv. conditum vero ad ʒj. vel ʒʒ [& ultra] de cætero usurpatur ut Zedoaria.

Feliciter quoque datur decoctum Zinziberis conditi ex aqua, in tussi ex materia viscosa in Pulmonibus hærente.

℞. Zinz. cond. ʒʒ. conserv. absynth. ʒiiij — Oli vel Ais per campan. q. s. ad gratum acorem M. f. conditum, sumendum in languido appetitu in declinatione Morbi.

℞. Agaric. ʒj. troch. alhand. gr. v. Zinz. gr. x. f. pulv. purgans pro j dosi. [Agaricus non facile in forma pulveris ob levitatem exhibetur, melius in infuso vel vino medicato.]

℞. Gran. Till. gr. iiij Zinzib. gr. vij. M. f. pulv. pro una dosi. Robustis exhibetur specificè contra hydropem. Indi pilulas parant cum mucagine tragacanthi.

RADI-

Ειγγίβερ, Εινγγίβερ, Γινγγίβερ, ZINGIBER, GINGIBER, Zmber/
Zngfwer/ Zngber/ GINGEMBRE.

Zingiber C. B. Pin. ad Irides à MORISONO refertur sub sequente nomine. Iris latifolia tuberosa Zingiber dicta flore albo Moris. Ab aliis vero Arundo humilis clavata vocatur.

In india Orientali, China, Malabar, Ceylon aliisque locis provenit, & delatum in Indiam Occidentalem, novam Hispaniam, Mexicanum regnum, Insulam Cubam, Insulas Philippinas Brasiliam & præsertim Insulas Antillinas, feliciter ibidem quoque hodie succrescit, & exinde ad nos devehitur, sunt tamen qui Orientalem præferunt.

Radix, quæ solum in usum venit, colligitur foliis plantæ arecentibus, & postmodum ad solis ardorem aut in fornacibus exsiccatur. A quibusdam luto, creta aut rubrica obducitur, ut eo melius à corruptione

ptione præservetur, hinc prostabat Zingiber album & rubrum ita dictum, non quod sint duæ distinctæ species, sed tantum coloris externi ab aspersa creta vel rubrica convenientis ratione. Eligi autem debet Zingiber recens, siccum quidem sed non extreme aridum, carie vermibusque minime corrosum.

Duplex ab authoribus recensetur *Zingiber Mas & femina* sed ad nos unica tantum defertur species.

Recens effossum non adeo acris esse dicitur, adeo ut cum aliis herbis minutim concisum ex oleo sale & aceto acetarii loco usurpentur Indi.

Tanquam condimentum aromaticum multis admiscetur ferculis, sed multi non delectantur Zingibere.

Ventriculi affectibus, imprimis à frigida, uti loquuntur, causa pituitosisque crassisque humoribus, & laxitate fibrarum atque flatibus adversatur. Sunt qui in affectibus uteri variis commendant. Hinc Colicæ hystericaeque passionis sedandarum ergo fumus Zingiberis fistula instar Tabaci ter vel quater de die hauriendus à Boyleo commendatur. Ob vim resolventem in affectibus serosis cachecticis catarrhalibus &c. prodest. In oculorum etiam morbis præsertim suffusione profliganda & acie visus roboranda multum commendatur externe si usurpetur. Zingiber masticatum salivam copiose ciet, Scorbuticis quoque insigni est auxilio & variis medetur symptomatibus, unde nautis commendabile.

IN OFFICINIS EX ZINGIBERE PROSTAT.

Zingiber conditum eingelegter Zimber / condit de Gingembre. Conditur autem vel in India ipsa vel apud nos more consueto, ad usus prædictos, ut & ad Venerem stimulamendam sterilitatemque arcendam: ad præcavendum quoque contagium assumitur. Præterea occurrit *Zingiber coctum, gebachener Zimber / Gingembre cuit*, cujus descriptionem videre est in Pharmac. Argent. clas 4. p. 36. quod cum aromatibus & Saccharo in morsulos redactum stomacho præsertim firmando dicatum est. Oleum destillatum, extractum, essentia & imprimis Sal Zingiberis vix amplius parantur.

Hoc tandem notandum quod plurimas hoc aroma ingrediatur compositiones Theriacam Mithridatium, Diaiscordium & plures, alias Formulæ purgantes ex agarico granis Tilli & Zingibere hic allegatæ nostris in regionibus non videntur adeo appropriatæ.

RADICES SALE VOLATILI
DULCEDINE JUNCTA
CONSTANTES.

Imperatoria.

Angelica.

Mei.

Levistici.

Nizin vel Nisi.

Locum habent in ophthalmia, colica, passione hysterica, cardialgia, lypothymia, confortanda memoria, lochiisque promovendis.

IMPERATORIA SEU
OSTRUTUM.

Est imperatoria majoris C. B. P. radix oblonga, pollicem crassa, scirrhusa [rugosa] & geniculata, foris fusca, intus alba [fibris lateralibus exornata] spirituosior penetrantior & amarior superioribus, unde & salibus fixis constat. [Refertur ad plantas umbellatas seminibus nudis binis sequentibus singulos flores.]

Radix de cætero coincidit cum angelica, stimulus est cæteris radicibus aromaticis. [Sapor acris aromaticus calefaciens & vellicans linguam, odor fragrans.]

In Colica hysterica convulsiva, tympanitide, tanta sæpe agit cum violentia, ut freno opus habeat, nempe Levistico, Meo, alterave dulci & viscosa radice, in febribus intermittentibus præcipue tertiana & quartana specificum est, ut & in morbis soporosis.

Datur

Datur à gr. xv. ad ʒj. in substantia. à ʒj ad ʒij in infuso.

Modus coniungendi, stimulandi, specificandi videatur ex formulis.

℞. Imperat. ʒß. angelic. ʒj. Mei gr. vij. M. f. pulv. in colica passione, addi potest ʒo d. mac. gt. j. vel ij. Laud. op. gr. ij. possunt & addi Castorei gr. v.

℞. Imperat. angelic. ana ʒiiij Zinzib. Zedoar. ana ʒj bacc. laur. exc. ʒij l. iiij flor. chamom. ʒj f. infus.

℞. Imperat. gentian. Chin. Chin. ana ʒß ʒ prunell. absynth. Cent. min. ana gr. j. M. f. pulv. pro una dosi contra quartanam & omnes febres intermittentes.

C 3

ANGE-

Ita potissimum dicta a viribus, vocatur etiam ASTRANTIA atque MAGISTRANTIA quod quasi magistra sit reliquorum alexipharmacorum Meisterwurß / Reyserswurß / Magistrans / Ostrix. IMPERATOIRE, OTRUCHE.

Est plantæ genus flore rosaceo & umbellato, pluribus scilicet petalis constante nunc cordiformibus nunc integris calyci insidentibus; calix florum abit in duo semina plana, fere ovata leviter striata & marginata involucrum plerumque deponentia, candida & plena.

Intelligitur hic Imperatoria major C. B. Pin. 156. Imperatoria Joh. Bauh. 3. part. 2. 137. Astrantia Dod. Pempt. 320.

In locis montosis sponte provenit. In Gallia pluribus in montibus præsertim Aureis Averniæ reperitur, frequentissima est in montibus Annaniensibus supra Tridentum. Occurrit in Alpibus Stiriacis atque Carinthiacis aliisque locis. Colitur in plurimis hortis, præfertur tamen à multis ea quæ crescit in montibus. Floret Junio. Radix quæ potissimum in usu colligenda Vere.

Vires ejus deprædicantur alexipharmacæ insignes, in febribus & morbis malignis; sed respiciendum utique & hic ad clima, vitæ rationem morbi naturam & constitutionem ægri.

In cruditatibus ventriculi acidis & pituitosis locum utique habere potest, ut & in affectibus pectoris, asthmate similibusque à pituitosa tenacique materia ortis. Nec destituitur virtute cephalica in affecti-

affectibus præsertim phlegmaticis : Medetur spasmo aliisque nervosi generis morbis. Renes à crassis humoribus liberat, urinam ciet, negotiumque mensium promovet. A quibusdam tum interne adhibita, tum externe recens dissecta & pollicibus tam manuum quam pedum alligata in epilepsia præsertim infantum commendatur, uti videre est in Eph. NAT. CUR. Dec. I. ao 4. & 5. obs. 42. Res autem sufficienti experientia nondum comprobata. Decoctum radices imperatoriae præsertim cum vino austero paratum doloribus dentium medetur. Masticata radix anhelitum emendat & remedium apophlegmatizans sat præstans præbet. In vulgus notum & apud mulierculas decantatissimum pro arcendis catarrhis oculos, aures, petusque infestantibus, profliganda itidem ophthalmia, amuletum dum radicem recentem in taleolos frustave dissecant, atque filo mediante de collo in regione dorsi suspendunt, & quando frusta exsiccata sunt, renovant appensionem. Hoc certum est quod quo calidioris naturæ sit subjectum eo citius radices exsiccentur frustula. Amuletum quoque hoc collo circumdatum in angina aliisque faucium inflammationibus non absque successu usurpari docet HOFFMANUS IN SCHROEDERUM, qui insuper vaporem imperatoriae masticatione & anhelitu oculis inspiratum ophthalmiam mitigare, & frustulum hujus radices circa aures impositum catarrhis ex quibus visus debilitas & aurium tinnitus oritur, mederi asserit.

Imperatoriam recentem cum cepis aut allio contusam cum sale commixtam & cataplasmati instar vertici raso impositam, inflando insimul naribus pulverem radices siccata, in morbis soporosis apoplexia v. gr. aliisque laudat ZUINGERUS. Tandem silentio quoque non prætereundum quod pro arcendo contagio in ore detineatur imperatoria.

Sunt qui contendunt serpigines tolli etiam inveteratas, si ex pulvere astrantiæ & tantillo adipe suillo concinnetur linimentum ut eo inungantur, quem in finem utiliter quoque remiscetur aceto afferente SIMONE PAULI, IN QUADRIPART. BOT.

In officinis nostratibus neque aqua, neque oleum, quod ex imperatore elici potest, neque aliud præparatum prostat.

ANGELICA.

Est Angelicæ fativæ C. B. P. radix oblonga, aliquantum resinosa, ex capite crassiori in fibras sæpe pollicares, vel tenuiores divisa, foris ex flavo rubescens, medulla interior alba, saporis acris suaviter amaricantis, cum quadam blanda dulcedine, odoris fragrantis aromatici & specifici. Constat Thevolatili ooso, adjuncta dulcedine quadam, quibus inclusæ particulae anodynæ. [Jungitur plantis Gymnodispermis umbellatis.] Symbolizat cum Zedoaria & imperatoria, at temperatior est, & ob sui blanditiem ad dulce vergentem, opus suum cum quadam vi anodyna absolvit; eandem ob causam singulare quid efficit in vitiis Pulmonum, [unde & Germ. Brustwurk dicitur] & omnibus Uteri affectibus, ut & in Colica hysterica, cordis & spirituum vitiis.

Zedoariæ, Zinziberi, Imperatoriæ si jungitur, gratiam peculiarem conciliat easque temperat.

Jungitur superioribus radicibus frequenter, stimulatur Camphora.

Datur ut superiores radices in substantia, frequentius tamen in infuso, non raro etiam in extracto feliciter datur.

Potest dari in Colica à vitio Ventriculi ab acido acri humore orta seq. m.

℞. Extr. angelic. ʒʒ. ∇ flor. chamom. ʒij [vel ∇ Carm. Schroed.] Syr. ē Cortic. aurant. ʒij l. ʒʒ. si Dolores urgeant, non sufficit, sed stimulo opus habet Laud. op. gr. j. l. ij. Si Colica hysterica simul, add. Tinctur. Castor. ʒj. Idem etiam in Colica convulsiva convenit, additur Clysteribus contra Colicam vel simplicem vel compositam.

INFUSUM ANGELICÆ.

℞. Angelic. Zedoar. galang. ana ʒij Castor. ʒj Camph. gr. xv.

gr. xv. add. liq. Corn. Cerv. succinat. ad eminent. 3. vel 4. digitorum. f. Essent. vel Tinctur. dos. gt. XX. XXX. ad 50. si magis anodyn. expetas add. Laud. Op. ʒj.

Oleum Angelicæ egregie inservit loco balsami Uterini, aqua destillata non adeo est ingrata, nec oleum.

MEUM.

Angelick / Engelmurk / ita dicta vel à suavissimo radicis odore vel à mira & angelica quasi contra venena & morbos venenatos atque pestilenciales facultate. Ob modo dictas virtutes vocatur quoque Radix Spiritus Sancti, heiligen Geist Wurk. Appellatur quoque germanice ob vim becchicam Brust-Wurk / Lufft-Wurk. A quibusdam Costus niger ab aliis Smyrnium nominatur. Gallis ANGELIC & ANGELIQUE audit.

Angelica sativa à Tournefortio ad Imperatoriam refertur. Est itaque Imperatoria sativa Tourn. J. R. H. cl. 7. S. 4. gen. 1. Angelica sativa C. B. Pin. 155. & J. B. 3. p. 2. 140. Angelica major Dod. pempt. 318. Dantur quidem & aliæ species Angelicæ sylvestris, montana & aquatica, quæ licet non spernendæ sint tamen non æque in usum ac sativa trahuntur. Interim ad usus Medicinales sativa æque ac montana ex Bohemia affertur. Floret Junio, radix colligenda antequam stolones producat, & quidem ex mente HOFFMANNI IN SCHROED. Sole in Geminis & Luna in cancro existente. Bene autem siccari debet, quoniam alias facile corrumpitur. Ingreditur officinam radix Angelicæ, rarius semen, quod odoris fragrantis & saporis acris deprehenditur.

De Angelicæ virtutibus audiri meretur H. GRUBE DE MED. SIMPL. COGNOSC. S. 7. Art. 2. ita differens. In Angelica se manifestè prodit sub lingua gustantis triplex sapor, acris, dulcis, amarus, ex quo sapore triplici, quid in angelica sit tota agere sive temperie seu substantia, innotescere quodammodo potest; hoc est vis quæ huic inest radici & cordialis sic dicta & alexipharmaca ex modo recensito sapore triplici sat commode ac facili negotio potest explicari. Angelica enim qua acris crassum sanguinem attenuat, incidit, eumque reddit mobiliorem, vique adeo diaphoretica ad ambitum corporis prolicit, quicquid datur in sanguine vitiosi vel maligni; suppetias tamen

tamen ferunt eandemque actionem insigniter nobilitant, quæ huic itidem insunt amarities pariter & dulcedo, hæc quidem acrimoniam temperando, & convenientem sanguini consistentiam, si deest, largiendo, illa vero cum partibus suis tenuibus, tum terrestribus virtutem diaphoreticam juvando, adeoque partes ad expellendum seu per sudorem seu per urinam irritando, illis vero crassum humorem incidendo & ad excernendum aptiorem reddendo. Hoc est quod Galenus appellat, agere tota substantia, non aliis enim agit angelica qualitatibus nisi tenuitate substantiæ. Sed eadem quo actio evadat nobilior à dulcedine perficitur ac amaritie.

Ad pestis contagia vix alia dicitur præstantior tum in curatione tum in præservatione. Assumitur pulvis ad drachmam usque in convenienti vehiculo vel etiam butyro inspergitur. Masticator in ore & subinde deglutitur, vino infunditur vel aceto maceratur, quin & trita vestibis inspergitur aut iisdem insuitur ne facile contagio inquinentur. Medici & Sacerdotes cum infectis conversantes ad præcavendum contagium eam sub lingua gestant, sæpissime trochiscos ingreditur ad modo dictum scopum paratos sublinguales. Vis contra animalium rabidorum morsum nondum exasse comprobata est. Ad morbos à veneficiis & fascino ortos laudatur quidem à quibusdam imprimis à **TABERNÆ MONTANO**, qui prolixè hac de re describit medicamentaque ad hunc finem facientia, quæ angelica ingreditur, tradit, tum interna tum etiam externa, imprimis emplastrum ad incantationes & tumores à veneficiis ortos, quod emplastrum de Angelica nominat. Consentit **FUCHSIUS** qui hanc radicem tanquam Amuletum infantibus contra fascinationem appendere jubet. Sed sicuti ejusmodi morbi eruditis haud pauca dubia pariunt, ita & remedium contra eosdem commendatorum decantata virtus sufficienti experientia destituitur & multum in imaginatione consistit. Magis certa angelicæ in respiratione difficili, tussi & asthmate à pituitosis, viscidis lentisque humoribus imprimis ortis, facultas existit, ubi notandum monitum **CASPARI HOFFMANNI DE MEDIC. OFFIC. l. 2. c. 15.** quod in affectibus pectoris conducat radix quæ adhuc humidiuscula est, quæ enim nimis sicca est & acris officit expectorationi crassorum & lentorum humorum; contra in discutendis flatibus validior est, modo alvus non sit strictior. Ab eodem Hoffmanno in discutiendis thrombis sanguineis, vulneribus inter-

nis & tumoribus obscuris laudatur. Menses præterea movet, foetum pellit & in doloribus post partum conducit, præsertim eo in casu, ex consilio Camerarii, ubi mulieres à suaveolentibus non læduntur. Sunt qui angelicam ad scorbutum commendant. Ad vermes serpentes aliaque animalia ex corpore expellenda deprædicat supracitatus TABERNÆ MONTANUS, qui se pulvere ex partibus æqualibus radicis angelicæ & raphani rusticani parato, quem per 4. dies dosi unius cochlearis in vino dissolutum exhibuit, se talem effectum præstitisse asserit. Foetorem oris corrigit, & ipsum quoque allium reprimat, Odontalgia medetur, & ebrietatem si particula fabæ magnitudine comedatur arcere fertur. Externe ulceribus sordidis inspergitur & balnea uterina ingreditur.

OFFICINÆ EX ANGELICA NOBIS EXHIBENT HÆCCE PRÆPARATA.

AQUAM *Angelicæ* destillatam ex integra planta *Angelice Wasser* EAU D'ANGELIQUE 2. *Oleum Angelicæ* destillatum *Angelice Dehl / Huile d'Angelique*, quod ex tota planta vel etiam ex solo semine vel radice, quæ cariosa etiam oleum suppeditat, obtinetur & in affectibus mulierum, colica, cardialgia, inflatione ventriculi aliisque abdominis passionibus interne & externe usurpatur. Balsama stomachica cordialia æque ac hysterica frequentissime ingreditur. Ex eodem facili quoque negotio cum saccharo parantur Elæosacchara & rotulæ sublinguales.

Extracti *Angelicæ*, quod cum spiritu vini paratur dosis est ad ℥ss ad ʒss.

Sunt qui conservam *Angelicæ* conficiunt, radices condiunt aut saccharo incrustant: alii vinum aut mulsam ea inficiunt, qui omnes melius incedunt, quam ii qui radicem aceto præparant, aut sal *Angelicæ* per incinerationem paratum peculiariter atque specificè laudant.

BALSAMUM ANGELICÆ SENERTI R. Extract. Angel. ʒij Mann. sel: ʒij. Mis. super igne lento, adde ʒss Angelic. dest. ʒss Msc. pro balsamo.

TROCHISCI SUBLINGUALES IN CONTAGIO.

R. Rad. Angel. pulv. ʒss Zedoar. ʒij Cort. Citr. ʒss macis ʒss sacchar. optim. ʒvj. ʒss dest. rut. gtt. viij. Angel. Junip. aa. gtt. v. cum Gumm. Tragacanth. in ∇ angel. solut. formentur Trochisci.

MEUM.

MEUM,

Est Meum foliis anethi C. B. P. radix oblonga, digiti crassitie, foris ferruginosa, intus pallida, & aliquantum resinosa, saporis & odoris ad angelicam & levisticum accedentis. Ob vim anodynam superior est, quam angelica, sed ob acredinem remissior quam angelica, hinc ab angelica non nisi remissiori gradu differt. Ob sui nimiam fragrantiam nonnullis molesta est & odiosa, pectoris angustias & gravedinem capitis augens, hinc in dosi consideratione exhibenda. In pectoris Pituita acriori temperanda & evacuanda admodum conducibilis est. [Itidem annumeratur plantis umbellatis seminibus nudis binis sequentibus singulos flores.]

Datur ut angelica, ast in dosi parciore, juncta cum imperatoria.

Detenta sub Lingua, arcet in multis paroxysmum hystericum, nempe.

℞. Mei ʒj. imperat. ʒß. f. l. a. pasta cum ∇ appropriata. Clysteribus in Urinæ suppressione cum congeneribus feliciter jungitur. v. c.

℞. Mei. Levistic. Angelic. ana ʒß. Chærefol. Mj. coque in ∇. Colatur. ʒviii. add. ʒo chamomill. vel amygd. dulc. ʒj. Θ ʒj f. Clyster.

LEVIS-

Μήον, μέιον, à tenuitate foliorum, MEU, MEUM ATHAMANTICUM, quod ab Athamante Rege inventum sit, aut quod in Athamante crescat. Vocatur quoque RADIX URSINA, ANETHUM URSINUM, FOENICULUM URSINUM, FOENICULUM PORCINUM Wilder Sau. Fenchel/ Beeren. Fenchel / Mutter. Wurk / Herk. Wurk / imprimis autem Beer. Wurk / Bär. Wurk / Gebeer. Wurk / appellatur, vel quod capillata sit, aut quia matricis dolor, à mulieribus detenta in ore hac radice, sedari credatur, Aliis dicitur Tordylium Sefeli Creticum,

Daucus Creticus sed non admodum bene. Est planta flore rosaceo & umbellato plurimis scilicet petalis constante in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum oblongis hinc gibbis & striatis inde vero planis. Adde folia tenuissima laciniata costæ innascentia.

Meum foliis anethi C. B. Pin. 148. *Meum vulgare* sive radix *ursina* I. B. 3 part. 2. 11. *Meum* Dod. Pempt. 30. *Fœniculum Alpinum*, perenne capillaceo folio odore Medicatò Tourn. I. R. H. cl. 8. f. 2. gen. 2.

Crescit in multis Italiæ Hispaniæ Galliæ & Germaniæ locis montanis & quidem campestribus & apricis, in montibus Languedociæ, Provinciæ, Delphinatus, Averniæ, Burgundiæ, in alpibus item & montibus Pyrenæis. Copiose reperitur in Sylva Hercynia. Floret Junio & Julio. Radix, quæ sola in usu est, sub finem Julii aut Augusto colligi debet.

Radix *Meu* tanquam resolvens & roborans & attenuans in affectibus serosis præsertim à causa uti loquuntur frigida ortis conducit, flatus insigniter pellit unde & in suffocatione Hystrica & doloribus post partum conducit: Menses lochia & urinam movet. Specificè laudatur à quibusdam in fluore albo, præsertim aqua exinde destillata, si quotidie mane & vespere aliquot hauriantur cochlearia, quam vim etiam tribuunt oleo destillato, cui & lac adaugendi virtutem adscribunt ordinario autem neque oleum neque aqua in officinis reperiuntur. Externe partes roborat tumoresque resolvit & discutit, ingreditur sacculos cataplasmata & balnea. Ob vim, quæ ei tribuitur, alexipharmacam plures in compositiones recipitur, Theriacam, auream Alexandrinam &c.

LE V I S T I C U M.

Est *Ligustici vulgaris* C. B. P. radix oblonga, pollicari crassitie, in fibras crassiores divisa, foris fusca, intus pallida, saporis acris aromatici subdulcis, odoris jucundi & fragrantis, nonnullis gravis & molesti. [Semina oblonga, compressa, striata, saporis acris aromatici subdulcis, odoris fragrantis. Est similiter planta umbellata seminibus nudis binis flores sequentibus.]

Differt

Differt à Meo acredine remissiore, dulcedine vero visco-
fiore & pertinacior. Cæterum specificè in ictero laudatur,
dum vel sua dulcedine acriorem Bilem mitigat, aut Bilem in
intestinis cunctantem incidit & promovet, ob eandem ra-
tionem diureticum audit & antihystericum.

Cunctantibus à partu lochiis medetur, & olim à muliere
quadam Anglicana pro secreto habitum.

Exhibetur velut Meum & angelica \mathcal{R} . Levistic. $\mathfrak{z}\beta$ exhibe
ex succ. Levistici recenter expressi cochl. j. ad retenta lochia,
tali modo exhibuit foemina illa Anglicana. Raius in hist.
plant.

\mathcal{R} . Levistic. $\mathfrak{z}\beta$ Mei. Zedoar. Zinzib. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$ Cinam. $\mathfrak{z}\text{iss}$ vel
 ij . herb. absynth. Meliss. ana Mj . Cort. aurant. Citr. ana $\mathfrak{z}\beta$ af-
fund. vin. s. q. fiat infusum antictericum, præprimis quando à
Bile viscidior ortum habet.

NINZIN

$\Delta\iota\beta\upsilon\varsigma\iota\kappa\acute{o}\nu$, $\lambda\iota\gamma\upsilon\varsigma\iota\kappa\acute{o}\nu$ LIBYSTICUM, LIGUSTICUM, LASER-
PITUM. GERMANICUM Liebstöckel / Badkraut / quod in balneis
multum usurpetur. LEVECHE, ACHEDÉ MONTAGNE: à Tour-
nefortio ad Angelicam refertur: est itaque planta flore rosaceo um-
bellato plurimis scilicet petalis constante in orbem positis & calyci
insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus
compositum oblongis crassiusculis apii semine majoribus hinc
gibbis & striatis inde vero planis. addantur folia alata in partes sat
amplas divisa. Angelica montana perennis paludapii folio Tourn.
J. R. H. cl. 7. S. 2. g. 4. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis
Theophrasti C.B. Pin. 157. Ligusticum vulgare foliis apii J.B. 3. p. 2.
121. Levisticum vulgare Dod. pempt. 311. Lasep pitium Ang.

Colitur in hortis, floret Junio & Julio, semen Augusto ma-
turefcit. In usum veniunt folia radix & semen. Radix Majo, folia
æstate & semina Augusto colliguntur. Incidit, aperit, Stomachica
est planta, vulneraria, alexipharmaca, & uterina. Obstructioni-

bus hepatis atque Lienis medetur, in astmate tussi aliisque affectibus catarrhalibus conducit. Flatus dissipat colicamque curat. Cum Lochiis medeatur non mirum quod & mensespellat. Ad morsus venenatorum animalium à Macro commendatur, sed ista virtus nondum extra controversiam posita. Plebs per caulem trahit potum in asthmate tussi &c. sicque asthma, tussim & anginam arceri & præcaveri putat. Externe in infestationibus & balneis utiliter adhibetur ad ciendam urinam calculos & menses, nec non excalescenda membra. Ad tumores, luxationes sugillationes & relaxationes conducit. FELIX WÜRTZ radicem sole cancrum ingrediente lectam tanquam amuletum ad ariduras partium commendat. Usurpatur porro hæc planta in variis cataplasmatibus Emplastris & unguentis. In erysipelate nihil probatur suffitu ex radice Levistici & folio Sabinæ melius.

Semen, quod vermibus imprimis adversari asseritur, nigro urinam colore inficere fertur, quod alii de radice quoque pronunciant.

Tussi pecorum mederi herbam recentem pabulo commixtam refert SCHWENCKFELT.

IN PHARMACOPOLIIS PROSTAT *aqua* destillata ex herba cum radice & floribus *Liebstockel-Wasser Eau de Leveche*, quæ supra allegatis virtutibus gaudet insuperque insigniter cosmetica censetur. Qui oleum & extractum desiderant haud difficili negotio ea obtinere poterunt, sal per incinerationem velle parare supervacaneus labor est.

NINZIN.

Est plantæ Japonensis & Chinensis dictæ Gin-Sen, vel Gensing, radix oblonga, digiti minimi crassitie, ut plurimum bifida, aliquando multifida, circa finem filamentosa, intus & extus flavescens, quæ species inter cæteras in M. N. C. contentas optima, saporis subdulcis, subacris, subamaricantis & aromatici gratissimi, odoris suavis.

[De hac radice Gensingh. vid. Andr. Cleyerus M. N. C. Dec. II. Ann. 4. obs. 2. p. 3. ad 6. it. Christian. Menzelius M. N. C. Dec. II. Ann. 5. obs. 39. p. 73. ad 79. ubi etiam figuras ex herbariis Sinicis & aliis authoribus producit. D. Mich.

Bernh. Valentini in Mus. Museor. l. 2. f. 2. c. 9. p. 163. allegat Nostri D. Hermannii Colleg. Mat. Med. ubi putat esse speciem Sisari Montani, quia ex semine ex Japonia accepto similis planta excrevit, licet viribus radicem Ninseng non æquaverit, id quod tamen diversitati telluris adscribit. Interim hoc certum, figuram in M. N. C. à Menzelio exhibitam à Sisaro montano non adeo abludere.]

Plukenetius Phythograph. Londini Fol. 1691 edita optimam habet figuram. Bontius vero valde erroneam.

Sua sponte nascitur in Japan & China, provenit etiam in regno Siam, nascitur in declivioribus non in montanis, ut quidam volunt. Autumnò [& hyeme] collecta planta longe est præstantior, quam si vere colligas. Diu potest conservari, carissima etiam est in India Orientali lbj. 50. Imperial. Utuntur veluti Théè in India.

Temperatissima est & gratissima, inter angelicam, meum & levisticum, & propter hujus temperiem convenientissimam, habet analogiam cum sanguine humano, proinde polychresta habetur, in specie tamen commendatur in colica, Lypothymia, convulsione, confortanda memoria. In vertigine laudatur, quia motum inordinatum spirituum restituit, & ratione suavitatis compescit, unde horis matutinis masticatur.

Datur ex infuso ∇ æ ferventis, ut & in pulvere à ʒj. ad ʒij.

℞. Rad. Ninzin. ʒj infund. ∇ fervent. ʒv. infusum cape ad colicam Nephriticam, Ventriculi debilitatem & roborandam Naturam.

℞. Rad. Ninzin. ʒj angel. ʒß santal. Citr. ʒj f. infus. ∇ ferventiss.

℞. Rad. Ninzin. ʒij vel ʒß flaved. Cort. aurant. Citr. ana gr. vij. Laud. op. gr. j. Castor. gr. v. M. f. pulv. add. conserv. chamom. f. bolus, in colica passione egregius.

℞. Rad.

℞. Rad. Ninzin. ʒʒ conf. alkerm ʒʒ ambr. gryf. — aurant.
solut. gr. v. M. f. Elect. polychrestum in capitis affectibus.
Hoc utebatur Generalis Indiæ singulis mane.

RADI-

Quum radix hæcce ob maximum pretium rara pro usu sit in hisce terris avis, non opus erit pluribus de ea differere & quæ vel in EPHEM. N.C. vel in BREYNI differtatione de hac planta, vel in DECKERI Exerc. pract. annotantur, recensere. Interim non nauseam movebit, si pauca de iis, quæ ENGELBERTUS KEMPFFERUS IN AMOENITATIBUS EXOTICIS FASCIC. 5. class. 3. de illa habet, delibemus.

Ob polychrestam radicem omnium Orientis, si Theam excipimus, celebratissima planta est, Siu Siin vulgo Nissi, Nindsin & Dsin, Dsom, Sinice Som, Tartarice Soasai, Sifarum montanum Coræense radice non tuberosa in Katajæ (provincia Siamfai) Coræque montibus nata. Hujus plantæ umbellifera flosculis albis præditæ & recens natæ radícula est unica simplex pastinacæ similis triuncialis, auricularis digiti crassitie fibris paucis capillata, carnosa, albida ambientibus rimulis subtilissimis intercepta inferne nonnunquam in duo crura divisa, ex quo caractere ei nomen natum est Nindsin i. e. homini similis, ac fiducia credulis, quod radicale manducantis humidum (ita loquuntur) augere ac vitam prolongare valeat; unde hæc bifurca radix magni constat & in usum Medicum præ cæteris eligitur. Odorem præbet pastinacæ luteæ, saporem, sifarum nostratis, minori tamen & gratiori cum dulcedine, quam ipsam exigua quædam ac fere imaginaria amaritudo temperat. Facultates harum radicum à Japonibus & Sinensibus recitantur variæ, ex quibus palmaria sunt quod roborent, pinguefaciant, renibus conducant adeoque & pulmonibus ex eorundem viscerum quod docent consensu. (Hisce virtutibus vis aphrodisiaca ex Deckero addi potest.) In pulverem reductis paucis medicamentis, nullis omnino cordialibus non admiscantur. Collectio radice fit ineunte bruma, qua appetente in Siamfai aditus omnes excubiæ occupant, quæ fures à collectione arceant. Ad usum ut fiant idoneæ, præparatione opus habent, quæ hæc est. Recens effossæ triduum macerantur in aqua

aqua dulci vel melius in aqua cocta oryzæ secundaria frigida, macerata in ahenio operculato suspenduntur in vapore super igne; Tum exsiccata ab ima parte usque ad medium duram rufam resinofam ac quasi translucidam acquirunt faciem quæ ipsa bonitatis nota est. Fibras majores eodem modo præparant. Dosis est Maas unum sive drachma nna cum dimidia vel pro re nata major. Venditur optimæ radicis unum Catti (i. e. quinque quadrantes libræ Belgicæ) Teilis sive Joachimicis plus minus centum.

Hancce radicem qua Oriens superbit, hodie etiam in America reperiri recentiores ostendunt.

RADICES CONSTANTES SALE VOLATILI OLEOSO AROMATICO, MIXTIS PARTICULIS TERREIS ET SALINIS FIXIS.

Radix Valerianæ.

Serpentariæ Virginianæ.

Costi albi.

Cyperi longi & rotundi.

Spicæ nardi & Celticæ.

Vincetoxici.

Helenii.

Ireos Florentinæ.

Curcumæ.

Petasitidis.

Carlinæ.

Conveniunt in Hysterica passione, Epilepsia, Ophthalmia, Apoplexia, Lethargo, Scorbuto, febribus intermittentibus, tussi, Urinæ suppressione, Mensibus, foetu mortuo

E

lochiisque

lochiisque pellendis, nec non strumis tollendis. dos. ʒβ. in infuso vel decocto à ʒij ad ʒβ.

VALERIANA.

Est radix Valerianæ hortensis, phu folio Olufatri Diosc. C. B. P. oblonga, rugosa, superficie geniculata, digitum crassa, foris ex cinericio fusca, intus palida, numerosis fibris dotata, saporis acris, aromatici, odoris fragrantis & gravis, ad Nardum accedens. [Usurpatur etiam in officinis Valeriana sylvestris major. C. B. P. n. IV. it. Valeriana palustris minor. C. B. P. n. VIII.] [Refertur ad gymnomonospermas, seminibus pappo cristatis, floribus monopetalis in muscariis umbellam mentientibus dispositis, foliis conjugatis.]

Radix hæc effodienda, quando folia incipiunt prodire: feles maxime delectantur hac radice.

Acredine superioribus radicibus est remissior, sed amarior, odoreque gravior, & nonnihil adversa, hinc tanquam antepileptica & Uterina celebratur, in imbecillitate visus singulare quid obtinet.

Datur in substantia à ʒj ad ʒβ in infuso a ʒj ad ʒij. ob sua fixa commodius in decocto exhibetur, ob sui adversitatem in nonnullis movet Vomitus & sedes. In Epilepsia datur cum ▽ flor. tilia, in Uteri vitiis cum ▽ Matricariae: cum succo limonum data ante paroxysmum, sæpe tollit febres intermittentes.

℞. Rad. Valerian. ʒij. sem foenicul. ʒiβ Camph. gr. x. M. f. infus. in debilitate visus, & nebulis ante oculos, ex vino exhiberi potest tam interne, quam externe applicatum.

℞. Rad. Valerian. Serpent. Virginian. ana ʒj Camphor. ʒj Spir. vin. ʒssat. q. s. f. Ess. f. Tinctur. Bezoardica, contra Epilepsiam

pilepsiam ex obstructione Uteri, addita Castorei ziss fit Tinctura Uterina.

℞. Rad. Valerian. 3℔ ⊖ Volat. C. C. gr. xv. Camph. g. ij. M. f. pulv. exhibetur ex ∇ Cerasor. nigr. contra Epilepsiam. [Duobus potissimum in casibus radix Valerianæ laudatur, 1. in visus debilitate, qua de re legi merentur ea quæ habet Tabernæmont. in suo herbario. 2. in Epilepsia. vid. præter plures alios Panarol. Pentec. 1. obs. 33. qui Epilepticorum optimum remedium nominat. Et Dan. Crüger C. N. C. Dec. 11. ann. 7. obs. 78. p. 140.

SER-

A Valerio quodam seu potius à Latina voce valeo, quod viribus eximiis valere existimetur vocatur *Nardus agrestis* & *Theriaca* quodque dicitur *Baldrian Valeriane*, est planta flore monopetalo infundibuli formi multifido & calyci insidente, qui abit in semen ut plurimum oblongum fere planum, pappis instructum. Ex superioribus patet tres potissimum Valerianæ species esse usuales.

Valeriana hortensis Phu folio Olusatris Dioscoridis C. B. Pin. 164. Valeriana major odorata radice J. B. 3. p. 2. 200. Valeriana hortensis Dod. Pempt. 349. Vocatur alias Phu magnum, Phu verum, Phu Ponticum, *Großer Baldrian* / *Groß-Garten Baldrian* / *Grande Valeriane*.

Valeriana Sylvestris major C. B. Pin. 164. Valeriana Sylvestris magna aquatica J. B. 3. p. 2. 210. Valeriana Sylvestris Dod. Pempt. 349. Appellatur etiam Phu Germanicum. Phu Officinarum, *Baldrian* / *großer Wilder Baldrian* / *Gemeiner Baldrian* / *Raßen-Kraut* / *Raßen-Wurzel* / *Mugen-Wurzel* / *Valeriane*.

Valeriana palustris minor C. B. Pin. 164. Valeriana minor pratensis vel aquatica J. B. 3. p. 2. 211. Valeriana minima Dod. Pempt. 350. *kleiner Baldrian* / *kleiner Wilder Baldrian* / *Petite Valeriane*.

Prima Species reperitur in altis sylvestris montibus sed raro, in sylvis rarissime occurrit, colitur ut plurimum in hortis, reliquæ duæ specis in pratis aliisque locis humidis conspiciendas se præbent. Florent Majo, Junio & Julio. Præfertur Valeriana hortensis, in.

terim & sylvestris major & sylvestris minor cum successu usurpari possunt. In usum autem præcipue venit radix, quandoque herba. Calefacit, attenuat, aperit, diaphoretica, diuretica atque alexipharmaca est, in obstructionibus viscerum quoque commendatur, vim præterea obtinet vulnerariam in ulceribus internis & externis. In scabie præsertim retropulsa & in Lepra laudatur. In asthmatis paroxysmis ferocibus ut & in passionibus Hystericis mirum exinde vidit effectum **TOURNEFORTIUS IN MAT. MED. l. 3. de plant. usual.** ubi jubet ut uncia uni radicis Valerianæ affundatur libra aquæ ferventis, quæ post extractionem factam successive hauriri debet.

Ridiculum est putare feles deperire hanc radicem quod acumen visus roborandi facultate polleat. Hoc non negatur, quod feles, circa suspensum ex filo valerianæ frustum ita ut non plane illud attingere queant, miris saltibus jucundum præbeant spectalum, sed hoc provenit ab effluviis odoriferis; qua de causa etiam Maro vero tam avide inhiant. Contra epilepsiam ubi dosis ejus ad ʒß ad ʒiß si exhibere vis, opus est, ut ejus continuetur per tempus usus præmissis & interpolatis purgantibus. An ejus vis Ophtalmica tanta sit ut particula radicis in ore detenta acutius videre faciat penes experientiam relinquitur, sicuti etiam nondum comprobatum est Valerianæ vulgaris radicem vel collo suspensam vel in media vola compressam insigniter corroborare congregientem cum muliere. Adhibetur alias pro amuleto & contra incantationes, contra quas quoque interne usurpatur.

Fabula est araneas majores subducta radice Valerianæ lapides emittere conf. **SIM PAULI IN QUADRIPART. BOT. sub Valeriana.**

**IN NOSTRATIBUS OFFICINIS NON PROSTAT nisi aqua Valerianæ Bal-
drian-Wasser / eau de Valeriane.** destillata ex integra planta, quæ imprimis virtute ophtalmica superbit. Alias ingreditur Theriacam pluresque alias compositiones.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

Est aristolochiæ violæ fruticosæ foliis, cujus radix serpentaria dicitur [it. Aristolochia, Pistolochia, seu Serpentaria

taria Virginiana caule nodoso] radix tenuis, fibrosa, vince-
toxico vulgari candidior, plures fibræ ex uno capite prodeun-
tes, saporis acris incidentis & amaricantis, odoris & saporis
vincetoxico & valeriana fragrantioris & gravioris. [Figuras
exhibet Plukenet. Phytogr. Tab. 15. 78. 148. conf. etiam Her-
mannus noster Paradis. Batav. p. 260.]

Subtilior & gravior valeriana & penetrantior est, hinc
in febribus intermittentibus & quartana hodie celebratur,
jungitur Chinæ Chinæ, gentianæ, aliisve, stimulat Θ ab-
synth. ammoniac. additis etiam si opus sit purgantibus.

Sociatur quoque tanquam singulare medicamentum con-
tra Apoplexiam & Lethargum, ut & scorbutum, si adsint fe-
bres intermittentes.

\mathcal{R} . Rad. Serpent. Virg. \mathfrak{z} j Cort. Chin. Chin. 3^{ss} Macer. in
vino absynth. ad eminent. iij. digitorum, capiatur totum an-
te paroxysmum, præmissis tamen vel purgantibus, vel Vomi-
toriis.

\mathcal{R} Rad. Serpent. Virg. Gentian. ana \mathfrak{z} j Θ absynth.
ngr. xv. ad febrem tertianam, si Vomitus conjunctus exhiberi
potest cum succo limonum vel cum gr. j. Laud. op. vel pil.
de cynoglossa, de nocte vero cum Nuce Moschata tosta.
seu ex conserv. abs.

\mathcal{R} . Rad. Serpent. Virginian. Gentian. Θ absynth. ana \mathfrak{z}^{ss}
jalap. \mathfrak{z}^{ss} troch. alhand. gr. v. Diagryd. gr. iij. cape ex vin.
absynth.

\mathcal{R} , Serpent. Virgin. \mathfrak{z} j. Cort. Ch. Chin. \mathfrak{z} ij fol. senn. \mathfrak{z} j.
affund. vin. pint. \mathfrak{s} vel. Cerevis q. s. quando ægri capiunt de
senna \mathfrak{z}^{ss} non purgat, ideoque ad \mathfrak{z} j vel \mathfrak{z} i \mathfrak{s} . radix enim serp.
virg. aufert vim purgantem sennæ. [Alexipharmaca est,
morsum canis rabidi sanat, ab Hydrophobia defendit. Cer-
tissimo & præsentaneo remedio est adversus lethiferos mor-
sus Boicininga dicti. Unde & forte serpentaria dicta.]

VIPERINA VIRGINIANA COLUBRINA, CONTRAYERVA VIR-
GINIANA, Virginische Schlangen-Wurzel / oder Schlangen-
Mord VIPERINE VIRGINIENNE

Radiciſ hujus quamvis rarius uſurpetur vires in iſſis quoque febris continuis & malignis, variolis & morbillis celebrantur. Adeo dicto ſerpenti adverſa eſſe fertur ut ejus rictui oblata iſſum in fugam ſtatim conjiciat, ſi non plane enecet. Doſis ejus eſt in ſubſtantia ad gr. x. ad ℥j. in infuſo vero ad ℥ij. 3j.

Ingrediens eſt decantati hodie lapidis de Goa quem Chriſtoph. Ludov. GÖEKELIUS in diſſertatione inaug. de radice hac ſequentibus deſcribit verbis R. Rad. Contray. 3ij. ſerpent. Virgin. ℥iv. margar. orient. pp. ocul. 69. pp. corall. rubr. pp. ſuccin. alb. pp. Corn. Cerv. ſin. Δ lap. bezoar. orient. ana 3ij. Chel. 69. ad pondus omnium. Cum ſufficienti quantitate gelatinæ viperarum vel unicornu marini impaſtatus pulvis & aliquot auri foliis immixtis maſſam præbet globulis inde parari conſuetis ex brunno ſubvirideſcentibus & micul aureis conſpicuis 3vij. vel unciam unam ordinarie pendentibus & hodie communiter lapidum Bezoar de Goa nomine venientibus. Datur ad gr. xij & ultra in morbis prædictis ſimilibuſque.

COSTUS.

Eſt radix oblonga, craſſitie pollicari, dura lignoſa, cortice craſſo, pallido, medulla denſa, buxei coloris, ſaporis acris, amari aromatici, odoris fragrantis accedentis ad iridem florentinam.

Tres ejus dantur ſpecies, arabicus, niger & buxeus, inter quas tantum vulgaris albus officinalis eſt, violaceo odore inficiens urinam. [Nonnulli Canellam albam, pro vero Coſto arabico habent, quem propterea Coſtum corticoſum, vel ventricoſum nominant. Sed ſpeciem Coſti non eſſe Paul. Hermann. in Colleg. MSt. oſtendit, allegante ita Mich. Bernh. Valentin. Muſ. Muſeor. l. i. ſ. 2. c. 17. p. 175.]

Dulcis

Dulcis speciebus cæteris usitator, Salia sua utraq̃e fovet in blanda quadam glutinositate, à quâ temperatur, & proinde inter expectorantia refertur, suumque opus tam per diaphoresin, quam per diuresin absolvit.

Ob odorem cerebro haud molestus Cephalicis ac Uterinis incidentibus adnumeratur. Externe vero ☉ Costinum Paralyfi medetur.

Datur in pulvere ā ʒj ad ʒʒ in infus. ad ʒij. pro ʒviij vini,

In difficili expectoratione cum tussi & dolore capitis.

℞. Rad. Cost. helen. ir. florent. ana ʒij imperat. ʒj passul. min ʒj. f. infus. ex vino, vel bland. decoct. ex ∇ Malsa.

℞. Ras. lign. sassaf. ʒj Cort tamarisc. ʒij rad. ir. florent. cost. helen. ana ʒvj bacc. junip. ʒj f. decoctum ad aquas hydropicas per diuresin evacuandas.

CYPE-

Κόστος Cost = Wurzel.

Triplex præsertim in officinis prostat COSTUS ARABICUS SIVE VERUS DULCIS atque AMARUS, de quibus admodum inter se dissentiunt Authores, quibusdam tanquam species inter se distinctas, & quemlibet costum ex peculiari planta prognatum esse censentibus, aliis tantummodo costum pro ratione regionum, in quibus provenit, differre opinantibus. His autem haud pauci refragantur, non nisi unicam costi speciem reperiri eamque solummodo ratione ætatis discrepare asserentes. Hoc certum est quod sicuti de aliis exoticis ita de costo nihil adhuc indubitanter differi possit. Stomachicum quoque atque carminativum remedium est, ut & alexipharmacum, unde Theriacam ingreditur. In viscerum quoque obstructionibus, & febribus in usum trahitur. Ex costo varia prostabant præparata, oleum videlicet costinum destillatum, & electuarium Caryocostinum, quæ tamen in usum amplius non veniunt. Viget solum adhuc EXTRACTUM MAROCOSTINUM, EXTRAIT MAROCOSTIN, ex

ex quo facile parare licet Pilulas multum decantatas ab authore suo Minderero, ad plures humani corporis morbos tum curandos tum præservandos. Agunt evacuando & alterando. Dosis est ad ℥j ad drachmam.

CYPERUS LONGUS ET ROTUNDUS

Cyperus longus, est Cyperi odorati radice longa, five Cyperi officinarum C. B. P. radix oblonga, tenuis, nodosa & geniculata, contorta, fractu contumax, foris subnigra, intus albicans, saporis suavis subacris & aromatici paululum exsiccantis, odoris fragrantis, ad nardum accedentis..

Cyperus rotundus, est Cyperi rotundi orientalis majoris C. B. P. radix rotunda, olivæ magnitudine & figura, foris rufa, scabra, intus alba, pluribus ex uno capite tenuibus quasi filis dependentibus, saporis & odoris ejusdem cum Cypero longo.

In Germania etiam reperitur Cyperus rotundus [Cyperus rotundus vulgaris C. B. P. n. iij.] sed nullarum est virium. Cyperus longus præstantior est rotundo, congruit cum galanga, sed non tam acris est & plus habet adstringentiæ, hinc Venter à relaxatis fibris debilitatum mire confortat, & eandem ob causam ingreditur gargarismata ad mobiles dentes firmandos.

[Est planta graminei folia, flores staminei dispositi in juba, caule triangulo]

Datur in substantia ad ʒʒ in decocto & infuso velut aliæ radices.

℞. Rad. Cyper. galang. cubeb. summit. absynth. ana ʒʒ. santal. r. ʒʒ ʒʒ cinanom, gt. iij. irroretur in Oli, extrahitur ad debilem Venter cum Vomitu à relaxatis fibris.

℞. Rad. Cyper ir. florent. ana ʒij Nuc. cupress. ʒʒ gland. quern

quern 3j flor. balauft. Mj malicor. 3iij alum 3j coq. ex ∇ ferrariorum q. s. add. syr. myrtin. q. s. f. gargarisma ad firmandos mobiles dentes in causa scorbutica, & uvulam relaxatam confirmandam.

SPICA

Κύπερος, κύπερος, quod radices quædam vasculum pusillum representent, *Cyper-Wurzel / wilder Galgant / wohlriechende Bingen / Souchet*. Cyperus constat flore apetalò, plurimis scilicet staminibus constante in capitulum squammosum collecto; in squamarum autem alis oritur pistillum quod deinde abit in semen plerumque triangulare. Respiciantur quoque caules triangulares. Cyperus odoratus radice longa sive Cyperus officinarum C. B. Pin. 13. Cyperus longus odoratior habitior Lob. Icon. 75. Cyperus panicula sparsa speciosa I. B. 2. 501. *κύπερος μακρός* lange *Cyper-Wurzel / langer wilder Galgant Souchet* long.

Cyperus rotundus Orientalis major C. B. Pin. 13. Cyperus Syriaca & Cretica rotundave Ioh. Bauh. 2. 502. Cyperus rotundus Hodveg. *Ægyptiorum* Alp. de pl. *Æg.* c. 37. *κύπερος στρογγυλός*, *runde Cyper Wurzel / Souchet* rond.

Sicut prima species in Gallia, præsertim Provincia, Italia & Germania etiam, quamvis paulo rarius in locis palustribus reperitur, ita altera ex India Orientali, imprimis *Ægypto* accersitur.

Ab Authore præfertur Cyperus longus, alii è contra rotundum meliorem esse autumant. Optime faciunt ii, qui radices sive longas sive rotundas eligunt densas plenas graves odoratas minimeque cariosas.

Calefaciunt siccant roborantque, menses & urinam pellunt, in hydrope commendantur. Vim obtinent carminativam, in difficili respiratione tussi atque orthopnoea conducunt. Apud *Ægyptios* juxta Alpinum maximos ad Medicinam usus habent radices Cyperi rotundæ: præcipue ad ulcera oris & pudendorum sananda familiarissimum tum pulvis tum combustarum cinis est remedium. Masticatæ emendant oris halitum.

Ingrediuntur varias compositiones cordiales, stomachicas, alexipharmacas.

Dosis in substantia ad drachmam semis, in infuso ad drachmas duas.

SPICA NARDI.

Est vel Indica vel Celtica. Spica Nardi Celtica est species Valerianæ, vid. Clus. [rarior. plantar. histor. l. 4. c. 39. p. 57.]

Spica Nardi Indica seu potius Gangetica; [Nardus Indica, quæ Spica Nardi & Spica Indica officinis C. B. P.] est radix oblonga, digiti crassitie & longitudine, comosa, quasi ex marcidis foliorum nervis vel nervosis filamentis convolutis congesta, colore ex fusco rubescente, saporis amari, acris aromatici, odoris Spica Celtica gratioris ad Cyperum accedentis.

Spica Celtica sunt Nardi Celticæ vel rectius Valerianæ Celticæ [Nardi spuria Narbonensis C. B. P.] radices fibrosæ, capillares, nigricantes, cum foliis parvis ex viridi flavescentibus, saporis acris amaricantis, odoris fragrantis graviusculi.

Nobilior est Spica Indica ac Celtica, virtute superans Cyperum & Valerianam, ob odorem penetrantiorum & graviorem & Æia penetrantiora. Utero & capiti est dicata.

Exaltatur ejus vis Castoreo & Camphora, asarum specificè corrigitur Spica Nardi.

Datur in infuso & decocto velut aliæ radices.

℞. Spic. utriusque ana ʒiβ. asari ʒij in robustis ʒiij vel iiij coquatur in vino vel Cerevisia leviter, ad Menses, foetum mortuum & lochia pellenda.

℞. Spicæ utriusque Valerian. ana ʒj Camphor. gr. v. Castor. gr. viij. f. pulv. antihystericus cum vino enulato, cum ▽ chærefol. matricariæ in obstructionibus Mensenterii; ubi est Cachexia cum tabescentia Corporis una cum Curcumæ ʒj præscribitur.

Indi habent o Nardinum egregium Nervinum.

VIN.

Nárdos κελίκη SPICA ROMANA, NARDUS CELTICA, NARDUS GALICA, NARDUM CELTICUM, NARDUS ALPINA Celtischer Nardus / langer spick / Magdalenen Kraut / Magdalenen Blumen NARD CELIQUE. Refertur à Tournefortio inter Valerianæ Species.

Valeriana Celtica Tourn. I. R. H. cl. 2. f. 3. g. 4. Nardus Celtica Dioscoridis C. B. Pin. 165. Nardus Celtica I. B. 3. part. 2. 205. Nardus Alpina Clus. Hist. lviij Non itaque est Nardus spuria Narbonensis C. B. P. In alpihus Germaniam ab Italia separantibus, montibus Genuensibus, Tyrolensibus itidem Carinthiacis & Stiriaticis provenit. Floret Augusto; in usum suppeditat præsertim radicem cum foliis. Radix juxta Schræderum colligenda Julio & Augusto recens, jucundi odoris radiculis numerosis cohærens non fragilis & plena. Sicca omnino non potest bene repurgari præ friabilitate.

SPICA NARDI INDICA Indianische Spicanarden / NARDUS INDICA VULGARIS, SPICA INDICA. Spica vocatur quod spicæ similitudinem habeat. SPICA NARD. Ex India Orientali advehitur. Utraque Nardus præter virtutes allegatas calefacit, attenuat, aperit, unde stomachica, nephritica & alexipharmaca est, quapropter in Ventriculi morbis, renum affectibus, urinaque pellenda & mensibus ciendis proficua est, nec destituitur virtute anthelmintica. Exterius quoque adhiberi potest in fomentis balneis atque lixiviiis. Rarius autem in usum trahitur nisi quod & Spica Celtica & Indica quæ ultima, non nisi exclusa, uti monet Charas, parte media, & excusso pulvere, partibusque excrementitiis omnino emotis, adhiberi debet, in Theriacam recipiatur.

IN OFFICINIS PROSTAT

Ex Spica Nardi per infusionem paratum OLEUM NARDINUM Narden, Dehl Huile de Nard, quod calefacit, digerit, resolvit humores crassos, membris tremulis paralyticisque succurrit, & in passione hysterica quoque conducit.

VINCETOXICUM.

Sunt Asclepiadis flore albo C. B. P. radices albicantes, tenues, fibrosæ, plures ex uno capite prodeuntes, saporis

acris, amaricantis, nonnihil nauseosi, odoris graviusculi. Una tantum species est officinalis. [Refertur ad plantas siliquosas unicapculares polyspermas, siliquis post singulos flores monopetalos quinquevariam divisos, singulis univalvibus superiore parte hiantibus, unico alveolo semina plura papposa lanugine cristata & multiplici serie imbricatim invicem incumbentia continente, instructis.]

Valerianæ & Nardo accedit, ast viribus longe est remissius, fovet quoque aliquid nauseosi, hinc Vomitus levem nonnullis movet, præcipue si sit recentius.

In incidendo Pulmonum mucos, in tollendis strumis cæterisque tumoribus per Urinam educendis virtutem habet. [Vincetoxicum scrophularum esse remedium appropriatum, dum maxima vi penetrandi præditum, suaque subtilitate lympham incrassatam attenuat, ut per glandulas commode transcolari denuo possit, prolixè probat Joachim. Georg. Elsner. C. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 57. p. m. 153. hanc ob causam etiam in hydropè curanda laudatur, videri meretur Georg. Tob. Dürr. C. N. C. Dec. II. ann. 7. obs. 58 p. 105. & Casp. Hoffmann. ap. Laurent. Scholz. consil. 337. p. m. 951.]

Datur in substantia ad ʒj. decocto & infuso ab ʒβ ad ʒj. R. Vincetoxic. ʒj ∇ Muls. ʒiij vel iiij coquatur ad formam syrupi, potest exhiberi infanti in tussi stomachali, ubi evacuatio per vomitus locum habet.

R. Vincetoxic. serpent. virgin. Valerian. ana ʒj ras. lign. saffras. bacc. Junip. ana ʒβ. Macera in vino, post leniter coquatur. ad strumas & Urinas promovendas.

Contra costarum dolorem Poterius [Cent. I. cap. 83.] sequenti modo usus fuit vincetoxico.

R. Rad. vincetoxic. ʒiβ folior myrti Mj. sem. hyperic. rhabarb. elect. ana ʒiβ f. decoct. in f. q. ∇æ communis, in cujus colaturæ ʒvj. dissolv. syr. capill. ʒis ʒiβ.

HELE-

Ita dictum quod toxica seu venena vincere soleat. *Ἀσκληπίας*, *ASCLEPIAS* vocatur ab *Æsculapio*. Herbariis audit *HIRUNDINARIA*, quod ex mente *I. B.* acutæ & apertæ ejus filiquæ cum candida lanugine volanti hirundini ferme similes sint. *Schwalben Wurk* / *DOMPTE VENIN*.

Juxta *Tournefortium* ex floris monopetali cum pani formi & multifici calyce surgit pistillum postica floris parti cui respondet capitulum quinquefidum quod abit in fructum ex duabus vaginis plerumque constantem membranaceis à basi ad apicem dehiscentibus multo semine foetis Pappis instructo ac placentæ squammatim affixo. Istud bene notandum quod *Asclepias* lacte careat. Species, quæ in usum venit, est

Asclepias albo flore *C. B. Pin.* 303. *Asclepias* sive *Vincetoxicum* multis floribus albicantibus *I. B.* 2, 138. *Vincetoxicum* *Dod. Pempt.* 407.

Crescit in sylvis, locis itidem altis arenosisque montibus, floret Junio Julio & Augusto. In usu præsertim radix rarius semen, & folia.

Vincetoxici virtutes alexipharmacæ in peste, febribus malignis, venenis moribus animalium rabidorum adeo celebrantur, ut etiam ejus decoctum à quibusdam præferatur decocto *Scorzonoræ*.

In affectibus Chronicis præsertim à colluvie serosa ortis, de prædicatur. Mensium promovet negotium & palpitatione cordis atque *Lipothymia* laborantibus auxilio est. *TRAGUS* decoctum radicis hujus in vino hydropicis maximopere commendat. Semina ad calculum laudantur: externe in ulceribus sordidis & malignis purificandis, in ulceribus mammarum & ictibus animalium venenatorum curandis, discutiendis tumoribus & infarctibus aliisque stasibus ut & roborandis partibus tota planta juvamen præstare asseritur. In officinis nullum exinde occurrit præparatum.

HELENIUM.

Est *Helenium* vulgare *C. B. P.* radix oblonga, crassa, foris fusca, intus pallida, pinguis, saporis acris amaricantis, aromatici, odoris fragrantis.

[Annumeratur plantis floribus compositis discoideis, pap-

pappescentibus non lactescentibus]

Helenii Θ ia pinguendi & resinæ inclusa sunt, hinc in Colica, Paralyfi, paresi, scabie, tussi, tremore membrorum, præcipue à Mercurialibus orto, conducit, relinquit ob pinguedinem lubricantam vim anodynā & apertam alvum.

Ob analogiam quam habet cum Bile, supplet ejus defectum, & vitia emendat

Datur commode cum ∇ propria destillata, quæ teste Febure [Chim. part. 2 sect. 1. pag. m. 290.] Θ e volatili copioso est imprægnata & liquorem s. Θ C. C. æmulatur: seu vino enulato.

N. sat fragrans ∇ ex helenio destillatur, si non ∇ in superflua quantitate addatur.

In Chlorosi specificum medicamentum audit, condita radix vel per se, vel in tabulis vel in morsulis, vel in decocto pro expectorante. In scorbuto stimulat Cortice Winterano. In Colica ab acido præsertim & flatibus orta flavedine corticum aurantiorum. Externe tam ejus decoctum, quam unguentum laudatur in scabie. Vis plurima concentrata in ejus resina videtur, quæ & in Uteri ruptura ex partu difficili specifica audit.

℞. Rad. helen. flaved. Cort. aurant & Citri ana \mathfrak{zj} coq. in vino, decocto add. Cort. Winteran. $\mathfrak{z}\text{ss}$, datur in scorbuto, cum dolore colico & Paralyfi.

℞. Helen. condit. Zinz. Chin. cond. ana $\mathfrak{z}\text{iiij}$ passul. Corinth. $\mathfrak{z}\text{ij}$ f. decoctum ex ∇ , in tussi chronica commendatur.

℞. Rad. helen. bardan. foenicul. ana $\mathfrak{z}\text{iiij}$ f. ex ∇ decoct. contra tremores artuum ex mercurialium medicamentorum sumptione.

℞. Gumm. helen. $\mathfrak{z}\text{ij}$ thereb. $\mathfrak{z}\text{iiij}$ \circ hyperic. $\mathfrak{z}\text{ii}\beta$. Myrrh. sang. Dracon. ana $\mathfrak{z}\text{j}$ M. f. Bals. quo inungantur pudendorum rupturæ post partum.

IRIS

CAPUT PRIMUM.

47

ΕΛΕΝΙΟΝ ita vocatum vel quod ex Helenæ à Paride abreptæ lachrymis natum, vel quod Helena contra serpentes remedium prima ostenderit, vel ab insula Helena, uti apud L. Bauhinum videre est, appellatur: alias, PANAX CHIRONIUM ENULA ET INULA, Officinis, ENULA CAMPANA, audit, Allant-Wurzel/Allant/Aunee, ENULE CAMPANE.

A TOURNEFORTIO inter species asteris recensetur, est enim planta flore radiato embryonibus in semina papposa abeuntibus, & thalamo affixis insidente & calyce squammoso comprehenso. Vocatur

Aster omnium maximus, Helenium dictus Tourn. I. R. H. Clas. xiv. f. i. gen. i. Helenium vulgare C. B. Pin. 276. Helenium sive Enula campana L. B. 3. 108. Helenium. Dod. Pempt. 344. Loca uliginosa amat, floret Julio præsertim. In usum venit radix quæ vere & autumnò effoditur & in taleolos secta siccatur.

Præterquam quod Helenium attenuet, aperiat, abstergat, discutiat & calefaciat, vires insuper diaphoreticas & alexipharmacas possideat, speciatim in multis ventriculi & pectoris affectibus prodest, & tussientibus asthmaticis valde proficuum existit, quo in casu vel ejus pulvis cum saccharo canto miscetur, vel in infusis atque decoctis adhibetur.

Aurifabri vasorum Argenteorum deurationibus vacantes hacce radice tremorem & curant & præcavent. Non dicam multa de virtute, qua juxta Rondeletium gaudet, exhilarandi, illud tantum monendum, quod adversus contagium adhibeatur & etiam cruda masticeatur. PLATERUS helenium tanti fecit ut Aroma Germanorum appellarit. In raucedine vel simplici vel etiam cum aliquâ tussi conjuncta decoctum helenii cum vino addito melle calidissime potum conducit.

OFFICINÆ PHARMACEUTICÆ ASSERVANT AQUAM ex radice destillatam Allant-Wurzel-Wasser / Eau d'Aunee,

RADICIS ENULÆ CONDITAS, eingelegte Allant-Wurzel / CONDIT DE RACINE D'AUNEE,

Essentiam Enulæ Allant-Wurzel Essenz Essence de Racine d'Aunee, quæ ad guttas viginti triginta & ultra adhibetur, &

Extractum Enulæ Allant-Wurzel Extract/ Extrait d'Aunee.

Multum quoque in usum trahitur Vinum Enulatum Allant-Wein/ Vin d'Aunee per infusionem in vino cum uvis vel etiam musto

multo paratum, quod præter supra dictas vires sic dictis frigidis humidisque pectoris vitiis medetur, unde Salernitani canunt.

Enula campana reddit præcordia sana,

Tandem quoque notandum quod sequens Unguentum enulatum multum laudetur in scabie. \mathcal{R} . Radicis Enulæ campanæ lb ss. Argenti vivi, Terebinth. claræ, Olei absinthii coct. ana ℥iij Axungiaë suillæ lbij Msc. pro lubitu Mercurius poterit omitti.

IRIS FLORENTINA.

Est Iridis albæ Florentinæ C. B. P. radix oblonga, tuberosa, digitum crassa, paululum compressa, saporis amarificantis, acris, subpinguis, odoris fragrantis violacei.

[Annumeratur plantis enneapetalis tricapsularibus, foliis ensiformibus cauli obversis, radice tuberosa]

Iris Florentina Enula mitior est & jucundior, sed pinguior, gustu tamen in recessu nonnihil fastidiosa, præcipue si recens sit, hinc alvum puerorum magis lubricat, & certis in conditionibus Vomitus movet. In tussi quoque convenientior & moderatior est, movens simul Urinam, eamque violaceo odore inficiens, passiones torminosas & pavorosas infantum compescere & ad somnum disponere dicitur, si cum Croco exhibeatur.

Ob substantiam levem, farinaceam & porosam absorbet, abstergit, hinc ossibus denudatis & capillis humentibus inspergitur.

\mathcal{R} . Ireos florent. ʒj. Croc. or. gr. v. sem. foen. ʒss M. f. pulv. pro 2. dos. exhibetur cum ∇ Mulla vel cæteris paribus etiam cum oxymell.

Exhiberi potest infantibus in torminibus abdominis cum alvo adstricta & noctes simul inquietas habentibus.

\mathcal{R} . Rad. ir. flor. gr. xv. oxymell. ʒiij datur infanti pro leni purgante.

\mathcal{R} . Rad.

℞ Rad. ir. flor. ʒss exhibe ex syr. violar. ʒss sacch. alb. ʒj. ▽
Borragin. ʒiij. dari posset in raucedine.

℞ Rad. ir. florent. aristoloch. rotund. ana, in ossibus
denudatis, si caries simul adsit. ℞ Rad. ir. florent. ʒj. Eu-
phorb. ʒj [addi poss. ʒo d. caryoph. gt. iij.]

Florentinische Beil- oder Viole, Wurzel / IRIS DE FLORENCE.
Confunditur quandoque cum Iride Illyrica, sed rectius ab aliis di-
stinguitur.

Novem petala non obtinet sed gaudet flore Liliaceo monope-
talo in sex partes secto, cujus pistillum tribus insuper petalis est in-
structum, uti ex TOURNEFORTIO infra de iride nostrate demonstrabi-
tur. Est itaque

Iris alba florentina C. B. Pin. 31. Iris flore albo I. B. 2. 719. Majo-
r florere dicitur. Sola radix in usu

In asthma & tartaro pulmonum & obstructionibus viscerum
prodest. Pulveribus cypriis & cephalicis immiscetur ut & pulveribus
dentifriciis atque sternutatoriis. Masticata halitum oris emendat, ad
condituras cadaverum adhibetur, vestibisque inspergitur ad tineas
arcendas. Sunt qui ad delendas cutis maculas commendant. Ob-
fragrantiam aromataris & unguentariis multum in usum venit.

IN OFFICINIS PROSTANT

Sic dictæ species seu pulvis *diatreos* Beiel, Wurzel Species *pon-
dre de l'Iris de Florence composée*: ex iride, speciebus diatragacathi frigidi
& saccharo paratæ. Adhibetur hoc remedium ad tenaces in pulmo-
nibus humores incidendos, & ad facilitandam expectorationem, dif-
ficilemque respirationem tacere fertur. Exhibetur ad ʒi ad ʒij.
cum tempore autem rancorem contrahit: cum saccharo facile in
tabulas diatreos Treos, Tasselein / tablettes diatreos redigitur, quæ
& ex simplici pulvere Ireos parari possunt.

CURCUMA.

Vocatur & Crocus terrestris. (Indicus) Est radix oblon-
ga, parva tuberosa, nodosa, intus & extus crocei coloris
G saporis

saporis subacris, subamaricantis, pinguis, odoris ad Zinziber accedentis, ast debilioris. [Quibusdam dicitur radix Zinziberis facie intus flava.]

[In horto Acad Lugd. Batav. radicem ita describit: constat radice tuberosa, tereti, in transversum acta, Zinziberis facie, crassitie digiti, ex multis propaginibus, cum circularibus in superficie Zonis geniculatim conflata, aliquot crassiusculas fibras ex geniculis demittente, ponderosa, foris pallida & modice scabra, intus crocea, ac temporis decursu in puniceum inclinante, solidam quasi ex condensato croceo succo pressius compacta, gustus acris amaricantis aromatici pinguis, odoris fragrantis.]

Duæ sunt species, prima radix longa, altera radix tuberosa (& rotunda) illa maxime in usum venit.

Figura, quæ extat in Bontio, nihil valet, est enim Cannæ Indicæ, in iis etiam locis nascentis, ubi Curcuma provenit, quæ forsan causa erroris fuit. (in Hort. Lugd. Batav. ita noster: folia curcumæ, foliis cannæ indicæ junioris adeo similia, ut à rudioribus non facile ab invicem discerni queant. Hoc errore ductum video Bontium, qui Hist. Nat. & Med. l. 7. c. 30. loco curcumæ delineavit cannam indicam in India frequentem, hortis nostris satis familiarem.)

(Sub eodem genere summo merentur reponi, & simili omnino fructificatione gaudent, Bangala Indorum, cardamomum majus & minus, Costus Arabicus, utraque Galanga, Zedoaria, Zerumbeth Garcie, Zinziber: Hermann. ibid. Notæ sunt radix tuberosa, folia lata oblonga, alternatim posita flores tetrapetali diffformes, vascula feminalia tricapsularia.)

Maturescit foditurque radix postquam flores exaruerunt.

Curcuma pinguior est, quam iris florentina, ast virtute

tute aromatica gratior & penetrantior. [Donatur sale oleoso volatili, partibus blandis viscosis immerso, id. ib.] Hinc tanquam polychresta ab Indis inter ciborum aromata est recensita seu recepta.

In ictero & vitiis Bilis scilicet defectu & inertia ejus, felicius datur quam helenium.

Ex nostris observationibus in facilitando partu singularis est.

Datur ut iris florentina & helenium, frequentius in substantia, quam infuso. Extra sub forma unguenti applicata medetur nervorum doloribus. Sternutatoriis quoque admiscetur.

℞. Curcum 3℔. Croc. or. gr. v. Θ volat. C. C. gr. vij M. f. pulv. exhiberi potest in ictero, orto à Bile viscosiore & minus acri. vel

℞. Curcum 3℔ Θ absynth. ʒj M. f. pulv. contra icterum, exhibendus in ∇ Chelidonii majoris.

℞. Curcum. 3j. Croc. or. ʒ℔. Laud. op. gr. j. M. f. pulv. ad part. facilitandum, cui addi poterunt Castorei gr. v. & radix Costi nigri ad 3℔.

PETA-

Arabibus CURCUM, TERRA MERITA, quoniam terræ induratae similis magnas possidet virtutes, *Gilb. Wurk / Gelbsucht Wurk* / ab effectu, Gallis *Curcume* dicitur

Ad Cannacori species à Tournefortio refertur & vocatur

Cannacorus radice crocea sive Curcuma Officinarum Tournef. I. R. H. cl. 9. S. 2. Gen. 8. Crocus Indicus Arabibus Curcum Officinis nostris radix Curcumæ dicta Bont. 116. Curcuma sive Terra merita Officinarum radice crocea I. B. 2. p. 2. 746. Florem inquit TOURNEFORTIUS ex quatuor petalis constare affirmat HERMANNUS, at flos ille ex Indiis allatus & ficcus monopetalos & multifariam

scissus mihi visus est. Ex India Orientali, in qua frequentissime occurrit, ad nos advehitur.

Præter vires allegatas pollet quoque virtute attenuandi, detergendi, urinam calculum & menses pellendi, conducit in Hydrope & cachexia. Calculos quoque vesicæ felleæ evacuare fertur. Quum tingat instar croci non tantummodo ab Indis ad tingenda fercula adhibetur, sed & Tinctoribus atque æris fusilis opificibus inservit. Curiosum est quando Mercurium per Viride æris coagulatum aureo colore mediante hac radice inficiunt.

Olim in Officinis prostabant species diacurcumæ, quæ tamen rectius appellari debebant species diacrocu, cum nihil de Curcuma ingrederetur, ast hodie exoluerunt. Datur in substantia ad drachmam semis, in infuso ad ʒj & ultra.

PETASITES

Est Petasitidis vulgaris & majoris C. B. P. radix oblonga, digitum crassa, ramosa, resinosa, foris fusca, intus albicans, saporis acris aromatici, amaricantis, odoris fragrantis.

(Refertur ad gymnospermas, floribus compositis, pap-pescentes & lactescentes.)

Salia sua penetrantia & spirituosam in resina fovet, quare asthmaticis & hystericis convenit.

In Morbis malignis & peste excellens est alexipharmacum, (unde & Pestilenz-Burzel appellatur) & propterea Theriacalia, Tincturas Bezoardicas ut & aquas & aceta prophylactica ingreditur.

Stimulatur Zedoaria, Imperatoria, maxime vero Camphora, vis consistit in resina, vel cortice resinoso, qui ad ʒj ex vino vel aceto exhibetur, datur etiam in extracto per Spir. Vin. facto.

℞. Petasit. angel. Zedoar. Valerian. ana ʒj affund. Spir. Vin. Camphorat. vel acet. dest. ad eminent. ij. vel iij. digitorum, f. Essent. vel tinct. alexipharmaca, cochleatim, singu-

lis diebus capienda , contra pestem.

℞. Petasit. helen. ana ʒij liquirit. ʒj ficuum n. viij f. cum aqua & vino decoct. pectorale , ubi metus malignitatis simul subest.

Πετασίτης ab amplitudine folii *πέλασος* sive galerum referente Germanice Pestilenk = Wurk à virtute vocatur , appellatur etiam Regen-Krafft / Neun-Krafft Wurzel / Schweiß-Wurzel. HERBE AUX TEIGNEUX, PETASITE. Ad herbas flore flosculoso & semine pappis instructo pertinet.

Petasites major & vulgaris C. B. Pin. 197. Petasites vulgaris rubens rotundiori folio I. B. 3. 566 Petasites Dod. Pempt. 597. In Alpibus Pannonia item Austria & Stiria locis humidis reperitur, floret veris initio, & quidem flores prius nascuntur quam folia.

In usum subministrat radicem.

Vires quoque possidet diaphoreticas, unde in decocto adhibetur in variolis & morbillis. Menses præterea & urinam movet, vermibusque adversatur. Externe ad bubones & ulcera maligna vel contusa radix viridis, vel unguenta & emplastra exinde parata commendantur. Verrucis quoque venereis medetur inspersus hujus radices pulvis.

A quibusdam Costo substituitur.

CARLINA.

In Sylvis Misniæ & Hercyniæ provenit. Est Carlina acaulos magno flore C. B. P. radix oblonga, digiti crassitie, ut plurimum in superficie cariiosa & foraminulenta, colore foris rufo, intus albido, saporis acris, odoris gravis & fragrantis.

(Refertur ad herbas papposas non lactescentes, flores perfecti compositi discoidei)

Raro præscribitur à Medicis, forsitan ob ignorantiam ejus usus.

Carlina Meo, Levistico & Pyrethro quodammodo re-

spendet, sed ingrator est & penetrantior. Ob nimiam fragrantiam multis molestum Capitis dolorem vertiginem & nauseam infert. Helmontius etiam vult somnum impedire. [De ea agit Helm. in tumul. pestis sub finem: cuius verba hæc sunt: quicquid in peste agendum est, id festinanter curandum est. Ideoque ne tenax intus hospitium Pestis sibi sumat, procurandum, ut imago non dudum intus fluctuet pestilens, sed tota supellex foras per sudorem proliciatur & excidat. Carlina enim Imperatori (Carolo Magno, unde & Carolina seu Carlina dicta) ab Angelo ostensa dicitur pro peste exercitus, forte ideo dicitur Carduus angelicus, quod primus ortus imaginis pestilentis circa stomachum sopores, nauseas febrem vomitum & cephalalgias suscitet. Ixia (ita vocatur succus Carlinæ vel viscum radici illius herbæ adhærens,) vero somnum arceat, multoque magis sopores contra naturam. Ideoque extractum Carlinæ recentis non fore infœcundum recenti pesti sperant.

Interim Hysterics quibus odor non insensus est mire conducit, ut & in peste præservanda. Potentissime movet sudorem, eoque nomine Herpetem cutaneosque affectus ex fundamento curat, per ipsum enim sudorem expellit acidum illud corrosivum herpetis.

Jungitur Pyrethro in infusis & decoctis ad Paralyfin, præcipue Linguae.

Decoctum etiam commendatur ad dolores Hypochondriacos. Vomitus quoque quibusdam movisse testis est Hoffmann. in Clave, (inquit: Carlinæ decoctum quibusdam etiam Vomitus movet in brodio carnis factum, ut non raro observavi in praxi.) In decocto datur dosi pariori, in infuso largiori.

℞. Carlin. ʒj angelic. ʒij Castor. ʒss. Camphor. ʒss. M. f. pulv.

pulv. pro vj. dosibus ad passionem hystericam.

℞. Carlin pulveris. ʒss ad ʒj singulis diebus contra herpe-
tem, seu cape ejus decoctum. vel

℞. Carlin. ʒij. Cort. lign. sassafr. ʒiiij. f. pulv. ad vj. doses.

In Cachexia icteritia. ℞. Carlin. ʒj ⊖ vol. C. C. gr. ix.
f. pulv. exhibendus in ∇ destil. Chelid. Maj. (De radicis Car-
linæ vi defatigante conferri meretur Eman. König. C. N. C.
Dec. II. ann. I. obs. 196. p. m. 401.)

Χαμαιλέον, eo quod folia pro diverso radiorum illapsu varium
quoque exhibeant colorem, dicitur; an autem sit χαμαιλέον λευκός
an μέλας, CHAMÆLEON albus vel niger inter authores non omnimo-
do convenit. Vocatur quoque CARDOPATIUM Ebers. Wurf. / apri
Radix. CARLINE, CHAMELEON BLANC, CHARDONERETTE.

Pertinet ad herbas flore radiato, cujus discus expetalis planis
componitur, gaudentes. Usualis autem est.

Carlina acaulos, magno flore albo C. B. Pin. 380. Carlina acau-
los I. B. 3. 64. Carlina altera Dod. Pempt. 2. 727. In locis monto-
sis asperis & incultis provenit, floret Julio & Augusto. Radix colli-
genda est tempore verno. Carlina vi quoque diuretica gaudet menses
& urinam movet, vermes necat, obstructions hepatis & lienis rese-
rat, unde in ictero & hydrope celebratur. Laudatur quoque in dy-
senteria epidemica intestinorumque torminibus

Quoad usum externum, verba sunt ERTMÜLLERI, subtilioris &
sublimioris Philosophiæ scrutatores Magica mediante hac radice
præstare tentant dum Carlinæ, imprimis nigræ, vim quasi magne-
ticam tribuunt, quod nempe si debito tempore, (inter bina sci-
licet Mariæ festa inter 15. Augusti & 8. Septembris) collecta, poste-
aquam effusa magneti imposita fuit, gestetur ab aliquo cum altero
conversante, ille alterius robur ac vires acquirat, socius defatigetur
in itinere suscepto, item quando in collo geritur ab altero conjuge,
invita una parte, faciat ut hæc valde debilitetur, inque hoc fere om-
nes authores conveniunt, imo nonnulli dicunt illam radicem ejus-
modi vires quoque obtinere in brutis, adeo ut in equili, si appen-
datur

datur equo vel in os immittatur, derivet in se omnes reliquorum vires, ut valdopere fortis & generosus evadat, reliquis delassatis: Sunt qui cum hac radice transplantationis modo volunt derivare vires & robur ex equo in hominem; quin & vim genitalem alterius roborari alterius minui posse. Quidam etiam dicunt, quod eadem radix secum gestata aliquem Veneri indulgentem non defatigari in actu Venereo exercendo sinat, sed alacriorem potius exinde reddat. Usurpatur quoque pro arcenda sterilitate.

RADICES CONSTANTES SALE AROMATICO BLANDO SEU MITIORI, CONSTANTES VIRTUTE DIURETICA APERIENTE, ET BLANDE SUDORIFERA.

Fœniculum.

Apium palustre.

Petroselinum.

Hæ radices rarissime sudorem movent, ut plurimum
Urinas.

FOENICULUM.

Est fœniculi vulgaris Germanici C. B. P. radix oblonga, recta, digitum crassa, pallida, saporis subdulcis, seu cortices hujus radice, subacris, aromatici & tenuis, odoris fragrantis.

(Pertinet ad umbellatas seminibus nudis binis sequentibus singulos flores, ut & sequens apium palustre, & petroselinum.)

Fœniculum ob salia dulci viscositate temperata, Urinam movet & nonnunquam sudores, specificum est contra Variolas & Morbillos. Confert quoque ad promovendam Chylificationem, & lactis generationem, nempe incidendo,
&

& per Urinam educendo acida viscida, à quibus generatio lactis impeditur. N. Cave ne ad lactis generationem medicamenta adhibeas nimis Urinam pellentia, tum enim materiam lacti dicatam ad renes & per Urinam protrudunt.

Tollit quoque tremores membrorum à Mercurio ortos, velut helenium & bardana.

In usum trahendus potius cortex radice quam interior substantia, datur potius in decocto quam in substantia.

In Variolis & Morbillis juvatur scordio, stimulatur & C. C. in diuresi vero ligno & baccis juniperi.

℞. Rad. fœnicul. ℥iiij. sem. fœnic. ℥j. f. decoct. ad lactis generationem in mammis. vel

℞. Rad fœnicul. ℥ij vel saxifrag. ℥β. flor. sambuc. Mj summitat. anis. vel fœnicul. p. j.

℞. Rad fœniculi vel potius Cort. ℥ii. scord Mβ vel j. lent. excort. ℥β caric. ping. n. v. M. f. decoct. ex quo exhib. Θ C. C. Δβ. contra Variolas & Morbillos, potest addi Castor. ad gr. vij. quod in Morbillis singularissimum.

℞. Cort. fœnicul. ℥iβ vel ij. bacc. junip. ℥iiij lign. junip. rasp. ℥ij macera, & coque leni Δe, cui adde syr. radic. 5. aperient. ad gratiam, ℞us Θis dulc. quantum videtur.

APIUM

Μάραθρον Græcis dicitur παρὰ τὸ μαρᾶναι αἰ à marcescendo, quod ubi inaruit ad plurima condimenta aptissimum sit. Fœniculum vocatur, quod satum magno cum fœnore semen reddat, vel quod quasi fœnum in hyemes arefactum & marcidum reponatur, Fenchel/ Germanice, Gallis FENOUIL audit.

Fœniculum est planta flore rosaceo umbellato, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante & calyci insidentibus, qui ab ipso in fructum ex duobus seminibus compositum oblongis crassiusculis, hinc gibbis & striatis, inde vero planis. Addantur folia in lacinias capillaceas divisa costæ innascentia.

Ex variis Fœniculi speciebus in usum in nostris regionibus præsertim

veniunt Fœniculum vulgare Germanicum C. B. Pin. 147. fœniculum Dod. Pempt. 297. &

Fœniculum vulgare minus acriori & nigriori semine I. B. 3. part. 2. 2. Fœniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto C. B. Pin. 142. Fœniculum sive Marathrum vulgatus Adv. 347.

Crescit locis aridis, vere erumpunt folia floret Julio & Augusto. Semen Autumno perficit.

In usum venit tota planta, Radix, caulis, herba cum floribus & semen de quo infra suo loco

Radix est una ex QUINQUE RADICIBUS APERIENTIBUS MAJORIBUS quæ sunt Radix APII, ASPARAGI, FOENICULI, PETROSELINI, RUSCI. Commendatur hinc in obstructionibus viscerum, cachexia, ictero Hydrope &c.

Caules fœniculi replentur Saccharo Cando trito, & postmodum orificiis cera clausis suspenduntur in cella, sic extillat aqua ophthalmica haud spernenda vel per se vel cum aqua rosarum aut euphrasie guttatim oculis instillanda.

Folia quoque quæ iisdem ac radix gaudent virtutibus, oleum suppeditant, ex quo egregium deinde paratur ad roborandum visum & varios oculorum affectus remedium. Fit sequentem in modum.

℞. Folia fœniculi recentia cum caulibus tenerioribus q. s. antequam semen compareat, incide minutissime, immitte in doliolum cum aliquot manipulis salis communis & fermento panis, affunde aquam calidam & fermentescere permitte, qua vigente fermentatione destilla per vesicam aut M B. sic cum aqua ascendet oleum summe volatile & æthereum. Hujus jam olei ℞. guttas viginti circiter, tere cum saccharo cando, & postmodum in aqua Rosarum albarum dissolve; sic habebis aquam ophthalmicam insignem in nubecula, incipiente cataracta, similibusque affectibus ut & in visu debili confortando, à qua tamen debemus abstinere in inflammationibus & aliis oculorum affectibus à sanguine acri provenienti. Sunt qui ex planta incinerata parant Sal quod tamen præ reliquis salibus plantarum fixis peculiare nil obtinet.

APIUM PALUSTRE.

[Est apii palustris & apii Officinarum C. B. P. radix pollicem
cem

cem crassa, albicans, à crassiori capite in numerosas fibras divaricata, saporis subacris, odoris fragrantis.]

Apium fovet aliquod volatile fumosum, capiti adversum, veluti Sium aquaticum quod Epilepsiæ obnoxiiis aliquando nocet, diuresin potentius excitat quam fœniculum, & propterea pellendo materiam lactis ad renes, ejus redundantiam minuit & coagulum resolvit.

Datur in decocto cum congeneribus, & applicatur quoque externe sub forma Cataplasmati.

Semper debet esse recens, aliàs nihil valet.

℞. Rad. apij ℥ij petrosel. ℥j sem. apii petrosel ana ℥j fol. apij Mij sem. cumin. ℥i℥ coque in vino & aceto in formam cataplasmati, quod applica mammis ad lactis redundantiam, add. sperma ceti, si lac sit coagulatum.

PETRO-

Apium dicitur ab apice, quia olim apices id est capita victorum in certaminibus eo coronabantur, alii ab apibus dictum volunt, eo quod apes apio & petroselino delectentur. Σέλινον à Lunæ dominio vocatur, ELEOSELINUM ab ἑλος palus & σέλινον apium. PALUDARIUM, HYDROSELINUM, APIUM RUSTICUM Eps/Eppich/Gemeiner Eppich/Wasser Peterlein/Brauner Peterlein/Merck/Wasser Merck/Jungfrau Merck ACHE

Pertinet ad plantas umbelliferas cujus calyx abit in duo semina exigua & striata, cujusque folia in alas sunt divisa seu costæ ramosæ innascentia: est autem

Apium palustre & apium officinarum C.B.Pin. 154. Apium vulgare ingratus I.B. 3. part. 2. 100. Eleoselinum Dod. Pempt. 695.

Humentibus locis apium provenit. Floret Julio.

In usu ex hac planta sunt semen de quo suo loco, & radix, petroselini radici non admodum absimilis, quæ refertur inter 5. radices aperientes majores, attenuat, abstergit, resolvit, convenit in morbis chronicis & obstructionibus. Menses movet & calculum pellit, Ictero medetur & vim habet ulcera oris & gingivarum aliarumque partium cum hordei decocto addito melle rosato egregie detergendi

Quidam ex hac planta destillant aquam quam contra hydropem singulariter laudant.

PETROSELINUM.

[Est Apii hortensis seu Petroselini vulgo C. B. P. radix oblonga, recta, crassa albida, fibris lateralibus donata, saporis subacris & aromatici, odoris fragrantis.]

Recentissimum debet esse. Multi Epileptici non ferunt ejus odorem. [Hinc etiam Tabernæmontanus mulieribus gravidis, puerperis & lactantibus Petroselini usum prohibet, ne infantes Epilepsia, vel motibus convulsivis corripiantur. vid. l. i. sect. 3. c. 25. p. m. 266.]

Petroselini radix validior est Apio, de cætero cum hoc convenit.

Datur ut apium.

℞. Rad. Petrosel. ℥iij sem. petrosel. ʒβ. fol. petrosel. Mj. rad. utric. min. ʒi f. ex ∇ decoct. diureticum, quod si nimis & cum dolore pellat urinam, add. rad. fymph. & althææ ana ʒij vel iij.

RADI-

Πετροσέλινον dictum quod in locis præruptis petrosis & Montanis petroselinum Macedonicum crescat. Nostrum enim in hortis provenit: σελινόν dicitur à Luna, sunt enim qui morbum epilepticum seu lunaticum producere putant, sed hoc non perpetuæ veritatis est, & contra experientiam pugnat. Pluries enim, ubi Sebizius in tract. de alimentis loquitur, apud nos & herba & radix petroselini cum brodiis atque carnibus sine ulla noxa manducatur. Ideoque effectum istum, si qui est, Paludapio rectius adscribere possumus. Vocatur alias APIUM HORTENSE, APIUM VERUM, APIUM DOMESTICUM, Petersilgen/ Peterlein / Garten-Eppich. PERSIL. Genus Petroselini vide sub Apio: in usu Sunt

Apium hortense seu Petroselinum vulgo C. B. Pin. 153. Apium hortense multis quod vulgo petroselinum, palato gratum planum

I. B.

I. B. 3. part. 2. 97. Apium hortense Dod. Pempt. 694. &

Apium vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153. Apium hortense multis quod vulgo Petroselinum palato gratum crispum I. B. 3. part. 2. 97. Apium crispum, Apium multifolium, Tab. Icon. 90. Colitur in hortis floret Junio & Julio.

In usum suppeditat radicem, folia, & semen quo de inferius.

Radice, quæ est ex numero radicum aperientium majorum, æque ac herba seu condimento in culinis utimur; variis autem ferculorum generibus, juribus & brodiis carniū, piscibus, pulticulis pisorum oryzæ hordei &c. admiscuntur tum radices tum imprimis folia. Hinc Salernitani canunt

Salvia, Sal, Vinum, Piper, Allia, Petroselinum

Ex his fit Salsa, nec erit commixtio falsa.

Præter virtutes internas cum apio communes externe quoque dysuriæ medetur. Euporiston quarundam muliercularum est, quando ablactare infantes volunt, folia petroselini vel in butyro frixa vel cum aceto mammis, postmodum fortiter constringendis, ad lac supprimendum applicare.

IN OFFICINIS PROSTAT *aqua Petroselini Petersilgen • Wasser / Eau de Persil*, ex integra planta destillata, ut & Sal per incinerationem paratum *Petersilgen • Salt / Sel de Persil*.

RADICES SALE VOLATILI AROMATICO SPIRITUOSO ET PENETRANTE ET PAUCO ACIDO VOLATILI CONSTANTES.

Et proinde tam sudoriferæ, quam diureticæ, acidum rancidum scorbuticum corrigentes.

Armoracia seu raphanus rusticanus.

Arum.

Scylla.

Pyrethrum Italicum & Germanicum.

ARMORACIA SEU RAPHANUS RUSTICANUS.

[Est raphani rusticani C. B. P. radix oblonga, pollicis crassitudine ac etiam crassior, colore albo, gustu acerrimo, sinapi haud absimili, odoris nullius.

Pertinet ad plantas siliquosas bicapsulares cum septo intermedio, flore tetrapetalo.)

Armoracia ratione sui salis penetrantis & spirituosius, juncto pauco acido volatili, Oia sylvestria quævis, acido viscido putridove muco immersa tam per diuresin quam per diaphoresin educit, & proinde in scorbuto ab acido rancido oriundo, it. in Paralyfi & morbis soporosis specifica est: & in appetitu tam prostrato quam aucto singularissima est.

In soporosis affectibus plantis pedum sub Cataplasmatibus forma applicatur. Additur quoque diureticis loco stimuli. Juvatur in scorbuto cochlearia, trifolio fibrino, nasturtio, cortice Winterano.

Stimulatur aro, sem. sinapi, erucæ, aliisque acris.

Temperatur sero lactis, Cichoreo succo aurantior. Citri, passulis &c.

Nunquam datur in decocto, aliàs salia volatilia evanescent. Datur ejus rasura in Electuariis & in infuso, cum sero lactis vel vino. Vel datur ejus succus. ad ʒj.

℞. Rad. armorac. rasp. M^{ss}. fol. cochlear. Mj. Cort. Winter. ʒij Vin. alb. q. s. vel ℥ij. f. infusum, potest exhiberi in casu scorbutico cum dolore artuum à frigore orto: dos. ʒv. l. vj bis de die.

Raphanus rusticanus si mensæ apponitur, tum corrigitur rasura amygdalarum dulcium, & saccharum superinspergitur.

℞. Rad. armorac. trifol. fibr. Nasturt. rec. ana Mj. Cort. Winteran. ʒij f. infusum ex Vino vel sero lactis.

℞. Rad.

℞. Raf. rad armorac p. ij. flaved. Cort. Citr. ʒij. succ. cochlear. ʒʒ fyr. aurant. q. f. f. Elect.

RADI-

Græce *ραφανὶς ἄγρια* dicitur. vocatur RAPHANUS RUSTICUS, RAPHANUS MAJOR, RAPHANIS seu RADICULA MAGNA, RAPHANUS MARINUS Meer = Kettich / *Grand raifort, raifort sauvage.*

A TOURNEFORTIO ad cochleariam refertur & vocatur

Cochlearia folio cubitali Tourn. I. R. H. cl. 5. f. 2. g. 4. Raphanus rusticanus C. B. Pin. 96. Raphanus Sylvestris sive armoracia multis I. B. 2. 351. Raphanus Rusticanus crassa radice Lapathi folio Lob. Icon. 320.

Calculosis prodest, menses pellit, vermes & educit & necat in vino infusus velejus succus, conducit hydropicis ἀνακαταβάλλω evacuando. Jejuno ventriculo sumptus adversus venena laudatur; crudus ejus succus cum Spiritu vini à nonnullis pro singulari antipestifero extollitur. Succus cum aceto & melle vomitum ciet. Conducit in Lienteria & fluxu caliaco. Sæpissime decoquitur cum carnibus, Gallinis atque piscibus, utque saporem obtineat mitiorem panis filigineus cui ovi vitellum permixtum tritus ein Eyer-Wecken / Gatteau, additur: externe in febribus inungitur succus spinæ, vel pulsibus aut plantis pedum radix cum sale applicatur.

Nocet cholericis calidiorisque constitutionis hominibus, oculis quoque obest.

RADICES SALE VOLATILI ACERRIMO ABSQUE OLEO GAUDENTES.

ARUM.

Est Ari vulgaris C. B. P. radix rotunda, tota alba, nucis avellanæ magnitudine. Aron ab sal acre valde subtile volatile, cruditates acidas, austeras & terrestres viscidasve, & ex his natos Morbos potenter dissolvit, & per diuresin educit. Hinc stomachicum & thoracicum excellentissimum est, junctum

Etum acidis volatilibus seu spirituosus fit antiscorbuticum & sanguinem congruatum feliciter dissolvit.

Quando acetum affundimus, radix effervesceat, ad alcalicum igitur magis accedit, quam cæteræ plantæ.

Ejus extractum [seu potius radix cum Spir. Vin. camphorato subacta] extra membris applicatur Paralyticis.

Datur ob nimiam sui acredinem nunquam recens sed ficatum, donec ejus acredo sit temperata. Præparatur etiam aceto, quod tamen nimis partes acres invertit. Omnium optima præparatio est cum vino, quod ratione blandæ aciditatis non adeo castrat particulas salinas.

Additur tanquam stimulus medicamentis terreis, acida absorbentibus. Datur præparata à ʒß ad ʒj.

℞. Rad. ari præpar. ʒß f. pulv. sumendus ex vino rhenano in anorexia.

℞. Rad. ari præpar. C. C. p. p. ana ʒj M. f. pulv. ad tollenda tormina ventris ab acido orta, addi potest Laud. op. gr. j.

℞. Rad. ari ʒß acet. destil. ʒj datur in casu ab alto ad sanguinem coagulatum, addi potest sperma Ceti & oculi 69. Pulveres ad casum ingreditur loco stimuli.

℞. Rad. ari p. p. ʒj ireos flor ʒß. flor. Δ. benz. antihect. Pot. à ʒß- Mf. pulv. contra vitia pulmonum dos. ʒj.

℞. Rad. ari p. p. ʒß ▽ destil. ari cochl. j. exhibe ad excitandos ægros in Morbis soporosis.

Diuretica sit maxime, si ipsis conjungitur.

SCILLA

Αἶον, dicitur & JARUS, PES VITULI, BARBA ARONIS, SACERDOTIS VIRILE, SERPENTARIA MINOR, DRACONTIA MINOR, ALIMUM, LUPHA, Aron / Aron = Wurk / Pfaffenpint / Teuscher Imber / ab acrimonia saporis, Fieber-Wurzel / Zehr-Wurzel / Freß-Wurzel / Magen-Wurzel / ob vim stomachicam, Germanice appellatur, Gallis audit PIED DE VEAU, VIT DE CHIEN.

Pertinet ad Plantas flore monopetalo auris Asininae vel Leporinae forma.

In usum promiscue veniunt sequentes species

Arum vulgare non maculatum C. B. Pin. 195. Arum Tabern Icon. 746. &

Arum maculatum maculis candidis C. B. Pin. 195. Arum I. B. 23 783. Dod. Pempt. 328. &

Arum maculatum maculis nigris C. B. Pin. 195. Crescit locis pinguibus & campestribus, folia erumpunt Martio, flores Majo & Junio. Radix quae unice officinalis est colligi debet Martio, Aprili & Majo.

Recens radix adeo acris est & caustica, ut masticata fauces magis quam piper adurat, sitimque vix debilem excitet. Eundem fere effectum praestant folia, semen autem nulla plane acrimonia pollere fertur.

Exsiccata radice hac nulla magis reperitur alba & farinacea, ita ut farinam æmuletur non tam colore quam affectionibus aliis.

Communis olim authorum sententia fuit, arum sal habere volatile acerrimum & penetrantissimum, & juxta authorem nostrum ad alcalicum accedens, at juxta cel. WEDELIUM, qui peculiarem de hac radice exaravit dissertationem, ex huj. radicis medica arte Chymica prodire spiritus aciduli cum sale tartari effervescentis instar spiritus tartari minimum 3vj. Olei partim limpidi partim fundum petentis spissi nigri empyreumatici 3ij 3ß. capitis mortui seu carbonum 3iijß. 3ß. è quibus salis alcalici 3ß præter spissi butyrosi olei reliquias in vase recipiente inhaerentes cui & retortæ partim reliquæ adhæserè pondere non assequendæ particulae partim filtro & in auras evanuerè nec tam accurate mensurari vel obtineri potuerè. Audiamus etiam SOCIETATEM REGIAM PARISIENSEM cui Arum continere videtur sal simile spiritui armoniacali artificiali, resultanti ex combinatione spiritus salis armoniaci & nitri ad punctum saturationis; ceu & succus igne exhalatus spiritum urinosum exhibet, si sali tartari admisceatur & analysi chymica liquorem acidissimum & sal volatile concretum copiosum stillat una cum oleo phlegmate & terra copiosis, ex quorum alias unione succus ejus viscosus resultat. Videmus hinc quam contrarii inter se sint authores, Saniores facile litem diriment

Arum, verba sunt laudatissimi superius allegati WEDELII, emol-
lit, lubricat, aperit, incidit, attenuat, resolvit, abstergit, penetrat, sum-

num remedium est ad viscedinem crassitiem & quietem humorum pituitæ bilis tartarique ipsius tollendam, corrigendam, subigendam, remedium obstructionum summum & tantum non earumdem velut panacea. Cum hepaticum atque spleneicum sit medicamentum, succurrit cachexiæ, ictero, Hydropi, febribus quotidianis, tertianis & imprimis quartanis. Conducit in Malo Hypochondriaco Chlorosi & pallidis virginum coloribus mensium & hæmorrhoidum suppressione. Mulieribus insuper hystericeis epilepticis peculiariter convenire dicitur. Vi becchica in asthma orthopnoea tussi infarctuque pulmonum prodest. In raucedine & interceptione vocis à catarrhis præprimis oriunda multum præstat: in casu magno ab Helmontio magnum vocatur remedium. In calculo valde laudatur renes mundificando & confortando. Virtus præterea alexipharmaca Aro adscribitur ut & cordialis atque aphrodisiaca. Nec desunt qui hujus radiceis usum in herniis curandis singulariter laudant. Virtute sua stimulant alvum quoque segnem corrigit relaxat atque expurgat leniter, quam vim Ursus nosse authores scribunt: cum enim ipsi ex ipsorum mente tota dormiatur hyems simulac speluncis prodit aro vescitur, cujus acrimonia intestinum illi aperitur. Sunt qui pro usu alimentario quoque commendant arum, dum vel panes eodem condiunt, vel etiam folia ari acetariis permiscent, alii nemo facile ejusmodi consultores imitabitur. MATTHIOLUS parasitos hac radice à mensis arcere jubet, cum tanto fauces afficiat ardore, ut amplius vorare nequeant. Extinguitur autem producta hoc modo oris gulæque molestissima sensatio lacte multo, aut etiam recenti butyro successive deglutito.

Externe commendatur ad ulcera varii generis, maligna etiam phagædenica & carcinomatosa imò ad ipsum cancrum. Ad bubones pestilenciales & carbunculos quoque laudatur à TRAGO, imprimis ejus folia. Cum oleo tumentibus applicatur hæmorrhoidibus. Strumas quoque discutit. Cum fimo bubulo ad dolores podagricos à DIOSCORIDE deprædicatur. Celebratur quoque ejus usus cosmeticus, cutem enim abstergit unde & saponibus additur. Pulvis hinc ari cum saliva subactus ad serpigines & herpes facere afferitur. Aqua ari destillata ad faciem erugandam illustrandamque multis effertur laudibus. Sunt etiam qui ad pessos & suppositoria paranda hanc radicem adhibent.

IN PHARMACOPOLIIS PROSTAT *Radix ari* cum vino per macerationem preparata. Hanc preparationem alii cum aceto instituunt. WEDELIUS pro obtundenda acrimonia tanquam genuinum corrigens Spiritum vini suadet, hujus enim, uti loquitur, accessione, vim corrosivorum Spirituum acidorum & urinosorum fortiorum conticescere, vel Spiritus Nitri dulcis, & salis dulcis exemplo notum, sed quid opus ejusmodi preparatione: qui ari vires non retusas expetit, is radices à sordibus, fibris & pellicula exteriori liberatas rite exsiccat & asservet. Et certe radix pulverisata merito quoque præferenda sic dictæ feculæ ari seu pulveri farinaceo ex radice cum aqua contusa collecto, & nativo suo succo orbatò, licet & hanc feculam non omni plane virtute orbatam esse constet.

Basin porro constituit arum decantati *Pulveris Stomachici Birckmanni*, qui in cruditatibus ventriculi anorexia & dyspepsia conducit & in affectibus quoque pectoris incidendi gratia convenit. Datur vel per se ad drachmam usque vel communiter instar trageæ post pastum assumi potest. Ingreditur etiam hæc radix pulveres cachecticos Quercetani aliorumque ut & varia unguenta Citrinum Agrippæ &c. Spiritum Ari acidulum ob vires antiscorbuticas diaphoreticas, diureticas, stomachicas valde deprædicat WEDELIUS.

℞. Pulv. Rad. Ari ꝑ℥ foliorum menthæ ꝑij. absynth. ʒj. Mellis, Succicydoniorum ana q. s. f. electuarium pro laxandis cachecticis admodum proficuum.

℞ Rad. Ari, Sacchar. Cand. ana qu. pl. Syrup. violar. q. S. fiat linctus conducens in raucedine.

℞ Arsenici cum Spirit. Vin. infusione vel combustionem correcti ʒj. radicis dracunculi majoris seu revera Ari ʒij. fuliginis Camini splendentis ʒij. Msc. f. pulvis subtilissimus in vase bene clauso servandus. Arcanum hic pulvis benedictus alias vocatus, fuit remedium ad cancos etiam exulceratos curandos. Caute mihi videtur mercandum esse ut cum omnibus arsenicalibus ita & cum hoc pulvere benedicto.

SCILLA

[Est Scillæ vulgaris radice rubra C. B. P. radix bulbosa magna, pugnum crassa, cœpacea ex pluribus tunicis seu lamellis compacta, inferius multis crassis fibris prædita, saporis acris amari, odoris nullius.

Refertur ad plantas tricapculares hexapetalas, floribus in spicis longa serie dispositis]

Scilla præter acredinem cum aro communem possidet amaritiem ingratam, & nonnihil nauseosam, hinc præter virtutes aro communes movet Vomitus & alvum. Velut arum in pituitosis affectibus opportune exhibetur.

Cruda est valde acris, exurens fauces, hinc ficcatur in Sole & clibano, præparatur ut arum, in substantia nunquam datur.

Datur in infuso cum melle, ▽ Mulsa, item ex aceto. Hinc prostat acetum, mel. & oxymell. scillitic. loch de scilla, in quibus omnibus exhibetur. [vid. Gesnerus in epistolis suis hinc inde.]

Pro vomitu citando, acuitur ꝑ iatis, a sarò, temperatur ꝑ amygd. dulc. [in asthmate acetum scyllitic. optime jungitur cum syrupo violarum.]

℞. Oxym. scill. ʒij Vin. scill. ʒij M. f. vomitorium blandum, addi potest ꝑ amygd. dulc. ʒß.

℞. Oxym. scill. ʒij M. f. vomit. cui correctorii loco additur ▽ Cinamom. ʒß

RADI-

Σκίλλα velὰ σκέλλω arefacio quoniam locis aridis provenit velὰ σκύλλω molestus sum, ob acrimoniam. SCYLLA, SQUILLA, Mauf. Zwiebel / Meer-Zwiebel / SCILLE OIGNON MARIN: à TOURNEFORTIO inter Ornithogali recensetur species

Ornithogalum maritimum seu Scilla radice rubra Tourn. I. R. H. class. 9. f. 4. g. 9. Scilla vulgaris radice rubra C. B. Pin. 73. Scilla rufa magna vulgaris I. B. 2. 615. Pancratium Dod. pempt. 691. Scille rouge &

Ornithogalum maritimum seu Scilla radice alba Tourn. I. c. Scilla radice alba C. B. Pin. 73. Scilla Dod. Pempt. 690. Scillæ magnæ albæ I. B. 2. 618. differt hæc à priori foliis minoribus & radice minore sed albicante.

Scillæ

Scillæ reperiuntur in Hispania Lusitania Insulis Balearibus Sicilia, Apuleia & maxime ad loca maritima. In usum autem utraque scilla suam suppeditat radicem mense Julio colligendam succi plenam. Multi autem præferunt scillam albam sed rarior est. Sunt qui dicunt meliorem esse illam radicem, quæ alteri connexa eruitur. Solam enim & singularem perhibent esse venenatam sicuti quoque cultrum ferreum si eo diffecetur veneno inficidicunt. hinc suadent ut dividatur ligno vel ebore. Scillæ præparationem, qua massæ panis involuta in clibano coquitur, haud immerito rejicit Zwelfferus. *Acetum squilliticum Meer-Zwiebel-Eßig / Vinaigre de Scille* astmaticis & in obstructione bronchiorum conducit. Dosis est ad unciam semis ad uncias duas. Purgantium quoque vim refrænât. Veteres acetum Scilliticum vix non pro panacea habuerunt. *Oxymel Scylliticum Sauer-Honig mit Meer-Zwiebel / Oxymel, de Scille composé* datur ad drachmam, unciam unam & ultra. Scylla ingreditur Theriacam.

RADICES SALE ACRI FIXO ABSQUE OLEO CONSTANTES.

PYRETHRUM.

Pyrethri duæ sunt species, Italicum & Gallicum. Est Pyrethri flore bellidis C. B. P. radix tenuis, oblonga, foris fusca, intus pallida, [saporis acris fervidi, odoris nullius.]

Utrumque pyrethrum ob acredinem suam Linguae pertinacissime inhærentem & fontes salivales aperientem, Salivam copiose educit, hinc in odontalgia ab obstructione & Catarrhis orta specificum. Ob eandem penetrantem acridinem nervos vellicantem, eorumque obstructiones aperientem, in Morbis soporosis & aphonia efficacissimum est.

Datur ejus substantia ad ʒʒ additur quoque decoctis, infusis clysteribus: jungitur saxifrag. aro, scillæ. Carlin. Colocynth. ciclam. &c.

& Rad. pyrethr. ʒʒ succ. absynth q. s. f. turunda intrudenda

da cavo dentis, contra dolores ortos vel à Catarrhis, vel vermi-
bus. vel

℞. Pyrethr. ʒj ὄο origan. gt. v. Camph. gr. x. mucilag.
tragacanth. q. s. f. turunda cavo dentis intrudenda.

℞. Rad. Pyrethr. utriusque saxifrag. rec ana ʒj coq. in ∇
seu vino, affunde ∇æ destill. ari & scillæ q. s. vel infunde ari
& scillæ, ana ʒj f. apozema, detinendum in ore, in loquela
amissa.

℞. Rad. Pyrethr. utriusque ʒj summit. orig. Mj. pulp. colo-
cynth. in pet. lig. ʒj. coq. in ∇ add. colatur. Hier. pier. ʒβ Tinct.
Castor ʒij ⊖ vol. succin. ʒj vel ⊖ gemm. ʒij f. Clyster acris ad
excitandos Apoplecticos.

RADI-

Πύρεθρον ita dictum à fervido sapore & ignea vi urente. Her-
ba salivaris, Dentaria Bertram / Zahn-Wurk / Speichel-Wurk /
Geisser-Wurk / Pyrethre ou racine Salivaire

Ex agro Tunetano per Italiam ad nos advehebatur unde Itali-
cum appellatur.

Unica tantummodo in usu est species nempe dicta. Interne vix
usurpatur nisi quod pro venere stimulanda à quibusdam celebratur.

Laudatur in Gargarismate in batracho seu tumore collecto sub lin-
gua infantum. ETTMÜLLERUS refert, quod, si pulvis radicis pyrethri cum
pinguedine coturnicis permisceatur, & hoc inungatur membrum vi-
rile, quando quis vult coire cum foemina, hinc fiat ut membrum
appareat solito majus, & mulier denuo videatur esse virgo. fides sit
penes authorem

℞. Ligni Sanct. ʒβ. Rad. pyrethr. semin. Staphisagria ana ʒij.
incid. pro decocto odontalgico.

RADICES SALE ACRI ABSQUE OLEO TAM FIXO
QUAM VOLATILI CONSTANTES.

Pimpinella Saxifraga.

Est Pimpinellæ saxifragæ majoris umbella candida C. B. P.
radix

radix candicans tenuis, emittens ex capite crassiori nonnullas fibras, saporis acris, odoris nullius. Sponte proveniens, habet majorem acrimoniam præ illa, quæ in hortis colitur.

Saxifraga pyrethro cui propemodum accedit remissior est, at ob acredinem quodammodo piperatam salubre ciborum aroma.

Præterquam quod in Morbis soporosis cum pyrethro convenit, diureticum insigne est, & juncta Uterinis anodyna, dolores post partum tollit, eorumque materiam peccantem educit per Urinam.

Contra tremores artuum a ȝialibus ortos laudatur una cum Foeniculo. Datur in decoct infus. & Clyster. in substantia ad ʒj

Schenkius observat quod mammis applicata copiose lac generarit, sed non multum fidei adhibetur huic observationi. Hujus ∇ destillata conveniens vehiculum medicamentorum diureticorum.

Radix saxifragiæ exhibetur cum extracto Castorei in sanguine congrumato & viscido ex lochiis retentis.

In Hydrope & difficultate Urinæ sequens convenit remedium: ℞. Rad. ʒ. aperient. ʒiij saxifrag. ʒij cort. fraxin. rec. ʒj. bacc. junip. ʒβ. f. decoct. ex vino.

Radix

PIMPINELLÆ VEL BIMPINELLÆ nomen sortita est à foliorum binis ordinibus pinnatim sive plumatim digestis. Vocatur etiam BIPENNULA, PAMPINULA, PAMPINELLA. PETRIFINDULA porro atque SAXIFRAGA audit, quoniam petras findere fertur, potius autem exinde nomen habet, quoniam calculum frangere creditur. Appellatur denique TRAGOSELINUM à Τράγος Hircus & σέλινον Selinum, quasi diceret SELINUM HIRCINUM, APIUM HIRCINUM, non tam à viroso hircumque olente odore, quam quod hirci ea delectentur, aut quod hac planta nutriti hirci sanguis & carnes eximium sint calculosis

calculosis iſtericis & hydropicis præſidium, *Groſſe Pimpernell / Stein-Peterlein / Bocks-Peterlein / Pfeffer-Wurz /* ob acredinem. *BOUCAGE. PERSIL DE BOUC.*

Pertinet ad plantas umbelliferas floribusgaudentes roſaceis petala inæqualia & cordiformia habentibus ſeminaque exigua & ſtriata relinquentibus. Plures ejus ſunt ſpecies, in uſu tamen potiffimum eſt

Tragofelinum majus umbella candida Tourn. I. R. H. Claſſ. 7, ſ. 1 g. 10. Pimpinella ſaxifraga major umbella candida C. B. Pin. 159. Saxifraga Hircina major I. B. 3. part. 2. 109. Tragofelinum majus, Pimpinella major. Tabern. Icon. 88.

Gaudet locis arenolis apricis & incultis ſed pinguibus, floret Julio & Auguſto. In uſum ex hac planta veniunt potiffimum radix quandoque folia & ſemen de quo infra

Pimpinella hæc alba attenuat, aperit, abſtergit, ſudorifera & alexipharmaca inſignis ut & ſanguinem depurans atque vulneraria. In affectibus Chronicis & acutis, morbis catarrhalibus & ſeroſis, febribus itidem quibusvis nec non in ulceribus internis & externis prodeſt. In dyſenteria decoctum ejus laudatur. Virtute Lithon- triptica, ſi quæ eſt, gaudere fertur, obſtructiones tollit menſesque ciet. Externe reſolvit atque diſcutit, abſtergit quoque maculas cutis, in mundificandis vulneribus conducit, ſunt etiam qui laudant ad extrahendos è corpore globulos aliasque res extraneas. Decoctis vulnerariis merito immiſcetur. TABERNÆMONTANUS reſert Pimpinellam hanc equis datam vel cum avena vel etiam in infuſo cancrum equorum certo ſanare.

Dubitatur quadantenus author de virtute lac provocandi. Notandum autem merito, quod SEBIZIUS IN TRAGUM aſſerit, *Pimpinellam Saxifragam majorem*, alteram ſive *Tragofelinum minus* ea facultate eſſe præditum, ut ſi ſolum ejus herba ex nutricum collo ſuſpendatur, aut inter mammas dependeat eis ſpatio ſex horarum tanto impetu ad mammas propellatur lac, ut opus ſit herbam remove- re.

Folia annotante HOFEMANNO IN SCHROEDERUM incifa & in vino infuſa epota vini acidum corrigunt.

Ad hujus radicem, verba ſunt CASPARI BAUHINI, in quibusdam locis grana reperiuntur, quorum medulla in colorem rubeum mutatur, cujus ad tincturam carmeſini uſus eſt, monentibus Lacuna & Anguillara, & coccus radicum quibusdam dicitur. Sunt qui hæc grana

grana Coccionellam sylvestrem aut in granis appellant.

Destillant quidam ex radice & integra herba florente Junio ac Julio mense collecta aquam, alii radices condiunt iisque deinde in electuariis stomachicis & alexipharmacis utuntur.

IN NOSTRATIBUS OFFICINIS PROSTAT *Essentia Pimpinellæ*, *Pimper-*
nell-Essenz / *Essence de Pimpernelle*, ex radice cum Spiritu Vini recti-
ficato parata, quam ob virtutem diaphoreticam & alexipharmacam
in febribus continuis benignis & malignis cæteris paribus ut & in sca-
bie commendant. Dosis guttæ viginti, triginta &c.

Radix Graminis.

Non graminis cujuscvis, sed graminis canini arvensis seu graminis Dioscoridis C. B. P. Germ. *Queck-Gras*. [Radix tenuis admodum, longa, geniculata, alba; saporis subdulcis, cum aliquali in recessu acrimonia, odoris nullius.]

Temperatior videtur saxifragia, ideo non tantum lene est diureticum, sed in atrophia & affectione hypochondriaca deobstruens est, laudatur quoque tanquam anthelmin-
ticum.

Ingreditur infusa & decocta, nunquam vero exhibetur in substantia. Aqua destillata appropriatum menstruum est & vehiculum diureticorum, deobstruens anthelminticum, stimulat saxifragia. In vermibus jungitur filici, osmundæ, semini fantonici aliisque.

℞. Rad. Gramin. ℥ij. utric. min. c. tot. Mj. f. decoct. in atrophia & macie, ubi materia peccans educenda per Urinam.

℞. ꝑ̄ dulc. gr. v. si sit puer 6. vel 7. annorum ∇ gramin dest. cochl. ij. contra vermes puerorum.

℞. ꝑ̄ viv. ℥j affund. ∇ dest. gramin. pone in digestionem per 24. horas, decanta ∇ & exhibe contra vermes, singulis diebus.

℞. Thereb. Venet ℥β. vitell. ov. q. s. Cum ∇ gramin. ℥vj
K f. Emuls.

f. Emuls. diuretica in ischuria renum, addi potest Tinct. Castor 3℔. Mell. 3j. Ad 3℔ Thereb. addi potest succi limonum 3℔.

RADI-

GRAMEN à gradiendo quia radices multum per terram gradiuntur. GRAMEN absolute sic dictum, ut SCHROEDERUS ait, Officinis graminis speciem denotat, quam Discorides ἀγρωσιν καὶ ἐξοχὴν vocat, estque GRAMEN CANINUM seu ARVENSE, GRAMEN CANARIUM MEDICATUM, Gras / Niech, oder Queck, Gras / Hunds, Gras / Wurm-Gras / Tzwecken / CHIENDENT

Pertinet ad plantas flore apetalo, cujus pistillum abit in semen subrotundum vel oblongum parum admodum farinaceum calyce obvolutum, gaudentes. Species Graminis quæ hic intelligitur est

Gramen loliaceum radice repente sive Gramen Officinarum Tourn. I. R. H. class. 15. f. 3. g. 8. Gramen Caninum arvense sive Gramen Dioscoridis C. B. Pin. 1. Gramen repens Officinarum torte triticeæ spicæ aliquatenus simile I. B. 2. 457. Gramen Dod. Pempt. 558.

Floret Julio & Augusto, in arvis & satis, ubi uti & in hortis multum incommodi parit.

In usu potissimum est radix colligenda Majo vel Septembri, quæ refertur inter RADICES QUINQUE APERIENTES MINORES, quæ sunt Radix GRAMINIS, RUBIÆ, ERYNGII, CAPPARIS, ONONIDIS.

Commendatur quoque hæc radix in calculo.

Easdem vires quoque foliis tribuunt & adhibent in obstructionibus viscerum, succum ex planta integra hæmoptysin curare ferunt. Secundum allegatum SCHROEDERUM extrinsecus herba adhibetur in dolore capitis leniendo (seligunt gramen septem nodorum) in oculorum inflammationibus ac defluxionibus (has sedare dicitur gramen trium nodorum decrecente Luna evulsum ac collo circumligatum) in auribus purulentis in odontalgia in tumoribus podagricis discutiendis. In Gallia omnia fere decocta pro potu ingreditur.

AQUA GRAMINIS ex radice mense Majo collecta destillatur, Quecken-Gras-Wasser / Eau de Chiendent.

℞. Rad. graminis, Cichorii, petrosel. asparag. urticæ minoris cum

cum herba omn. recent. ana q. s. pro decocto vernali Hoffmanniano pro Hypochondriacis & atrophia laborantibus ex venarum lactearum obstructione.

RADICES SALE BLANDO BALSAMICO CONSTANTES.

Salsaparilla.

China.

Sunt Smilacis asperæ Peruanæ sive Salsæparillæ C. B. P. radices tenues, calami crassitie, longæ, farmentosæ, plicatæ & rugosæ, ex flavo pallidæ, intus candidæ, saporis & odoris nullius evidentis nisi farinacei.

Chinæ duæ sunt species 1. Chinensis 2. Africana seu Pseudochina. Est Smilacis asperæ Chinensis Lampatam dictæ radix crassa, tuberosa, lignosa, aliquantum resinosa, pallide rubescens, intus candida, saporis terrestris, leviter adstringentis.

Salsæparillæ & Chinæ effectus probat sal blandum, quod in farinacea salsæparillæ substantia, & in substantia chinæ nonnihil resinosa latet, & in utriusque radices decocto manifeste se prodit. Hoc cum tenuissimarum partium, & sanguini nostro naturali valde analogum sit, salia seu spiritus non tantum exaltat, sed & acida quævis pertinacissima etiam, remotissimis partibus inhærentia, à quibus Lues ̄ea, arthritis, scorbutus, atrophia, phthisis aliique Morbi oriuntur, infringit, & cum blanda vi anodyna per diaphoresin expellit.

Radix Chinæ penetrantior & spirituosior quam Salsæparillæ, utraque prius maceranda, in decoctis, lento Δe factis vase probe clauso, exhibetur, specificatur foliis chamæpitidis, & in variis morbis exhibetur.

℞. Rad. Chin. salsæparil. ana ℥iiij. Chamædr. Chamæp. ana Mj. si dolores intensiores add. flor. chamom. p. iij. rad. liquir. ℥ij. vel iij datur in arthritide & podagra.

℞, Rad. Chin. ℥j. coq. in ∇æ ℥ij ad medietatem f. apozema, add. fol. chamæp. pugillos aliquot, exhiberi potest in morbis chronicis contumacissimis.

℞. Rad. Chin. ℥j. ras. C. C. turion. f. conor. abietis. ℥i℥. coq. in ∇ f. q. f. decoct. in scorbuto cum Paralyfi.

℞. Rad. Chin. salsæparill. ana ℥ij. Cort. lign. Guajac. ℥i℥ vel ij lign. sassafras ℥j add. ♀ viv. ℥ij crud. in petia ligat. ana ℥℥. coq. invicem. f. apozema in Morbis ♀eis, singulis diebus bis vel ter sumendum.

RADI-

SARSAPARILLA, ZARZAPARILLA, ex duobus verbis est compositum vocabulum, Zarza vel Sarza dumus & parra vitis atque parilla vitilla, quasi planta media inter vitim & dumum, Sarsaparill/
SARSAPAREILLE, SALSAPAREILLE, SARCEPAREILLE.

Smilax aspera Peruana sive Salsaparilla C. B. Pin 296. Smilaci affinis Salsaparilla L. B. 2. 117. Sarcaparilla officinarum. Smilax viticulis asperis Virginiana folio hederaceo leni Zarça nobilissima Pluken: Juapecanga vulgo çarçaparilla Pison 258. Mecapatli Paratla Hern. 288.

Radix tantum in usu. Ex pluribus Americæ locis præferim ex Peru. Mexico, Brasilia &c. affertur. Eligenda radix nigrior, recens non cariota, fractu contumax, quæque assulatim frangitur & ponderosa est, quæ autem cariota est & dum frangitur pulverulenta existit inutilis existimatur.

In scabie, malo ischiadico, aliisque affectibus catarrhalibus & rheumaticis, hydrope, pectoris affectibus, febribus &c. prodest, ut & in scrophulis. Uncia una vel duæ decoquuntur in libris tribus vel quatuor aquæ ad dimidiæ quantitatis consumptionem.

IN OFFICINIS PROSTAT

Extractum Sarsaparillæ Sarsaparillen extract *Extrait de Sarsapareille* cum vino paratum

China

CHINA.

Ita dicta à regione ex qua defertur ad nos, Chinna, Cina, *Po-
tenthourg / Esquine*

China radix C. B. 296. Cina Cinna Casalp. 423. China radix
I. B. 2. 120. China Orientalis seu Smilax aspera Chinensis Lampa-
tam dicta Herm. Reperitur quoque in America, Nova Hispania,
Peru &c. præfertur tamen Orientalis quæ ex China advehitur. Sub
Carolo quinto primum frequentius in usum duci cepit.

Temperari debet China ne nimium exsiccet & inflammet
viscera.

RADICES CONSTANTES SALE VOLATILI BLANDO CUM TEMPERATA TENUI VISCOSITATE.

Orchis seu Satyrium.

Orchis est vel rotunda seu testiculorum forma, vel pal-
mata manusve referens. Utraque ejusdem virtutis. Sunt
radices rotundæ, succulentæ albidæ compressæ paululum, vi-
scosæ, subdulces, odoris feminalis.

Utriusque orchidis vim aphrodisiacam seu fem stimu-
lantem docet Experientia & Ratio, à substantia subdulci &
viscida subministrari semini generando materiam, ab ejus
sale blando volatili, sperma seu Urinam redolente excitari
orgasum in semine, & titillationem in partibus genitali-
bus.

[Refertur ad plantas tricapsulares flore monopetalo ri-
ctu & labio vario constante.]

Datur in substantia vel cruda ad ʒj. it. condita, vel in
essentiam redacta cum ω u formicarum, addita essentia am-
bræ. Juvatur Eryngio, nuce juglande condita, exterior
cortex nucis juglandis optimus est, constat enim Θ e aro-
matico, cujus interior pulpa plane expers est; priapo cer-
vi. Stimulatur formicis alatis, ∇ Magnanimitatis, it. se-
mine

mine sinapi, erucæ, speciebus diambri. ꝯu rofar. ambrato.

℞. Rad. satyr. cond. ʒj Elect. diasatyr. Nuc. jugl. cond. flaved. cort. aurant. cond. ana ʒss Eryng. cond. conserv. rofar. r. ana ʒj sem. eruc. ʒij ambr. gryf. gr. v. fol. Ori. n. iiij fyr. gran. cherm. & Cinam. ana q. s. f. f. Elect. ad ſem languidam excitandam.

℞. Coagul. leporis ʒj satyr. cond. ʒij ʃ majoran. gt. xii. amb. gryf. ʒj fyr. cherm. q. s. f. f. Elect. cap. ad ʒj. c. Eff. satyr. præcipue ad conceptionem promovendam, commode autem capiuntur illa medicamenta mox post fluxum menses & quidem ante introitum lecti.

In Italia recipiunt radicem recentem satyrii, expriment succum, & miscent cum vitello ovorum capiunt que singulis horis matutinis.

[De Mumia Satyrii aphrodisiaca conferri meretur Henr ab Heer obs. 9. p. m. 133. satyrium inter analeptica medicamenta à nonnullis refertur.]

RADI-

Duo nomina Orchidis & Satyrii hodie confunduntur, à Veteribus vero quibusdam distinguebantur, ita ut species quæ radicem bulbulosam eamque geminam obtinerent orchides, quæ vero tantum unicam Satyria appellarentur. ὄρχις aut ὄρχις quoniam radix testiculum alicujus animalis repræsentat, aut Veneris desiderium excitat. Σάτυριον a Satyris libidinosus vocatur, κυνὸς ὄρχις. CYNOSORCHIS TESTICULUS CANINUS. SERAPIAS, quod flores insecta fœcunda & lasciva referant à Serapi Alexandrinorum Deo qui impudente lascivia colebatur. Morio quoque audit. Vocatur etiam à quibusdam PALMA CHRISTI, Knaben-Kraut / Stendel-Kraut / Stendel-Wurk / Creutz-Blumen / Satyrion, testicule de Chien Orchis est plantæ genus flore polypetalo anomalo, sex petalis dissimilibus constante, quorum quinque superiora ita disponuntur ut galeam

galeam quodammodo æmulentur inferiori multiformi variasque figuras repræsentante. Calyx autem abit in fructum seu utriculum, tribus fenestris pervium, quibus totidem adhærent valvæ seminibus foetæ minutissimis ad instar scobis

Diversissimæ sunt hujus plantæ species, quæ in pratis, collibus, sylvis, montibus umbrosis, apricis, siccis humidis &c. nascuntur, diversoque tempore Vere, Æstate, Autumno florent. Communissime in usum trahuntur, quæ radice gaudent bulbosa & quidem imprimis sequentes species.

Orchis morio mas foliis maculatis C. B. Pin. 81. Orchis major tota purpurea maculoso folio I. B. 2. 763 Testiculus Morionis mas. Dod. Pempt. 236.

Orchis morio fœmina C. B. Pin. 82. Testiculus Morionis fœmina Dod. Pempt. 236. Cynosorchis morio fœmina Lob.

Reliquæ etiam in usum trahi possunt, quamvis non inferioris virtutis sint reliqui testiculi præsertim qui odoris sunt boni & grati, etiam testiculus hircinus quem ad opus generationis aptum magis esse vel solus odor prodit. Assumendi autem sunt notante I. BAUH. non ambo bulbi, sed durior plenior & succi plus habens, flaccidior ac rugosior minus idoneus est. Est autem plenior non semper qui major, sed non raro minor, si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps defloruerit, aut cum primum caulis erumpit. Non enim succulentior alterum magnitudine superat priusquam semen maturari cœperit. Nam alternis annis unus bulbus intumescit alter vero residet ac perit, ac cum durior ac succo plenior crescere incipit, alter flaccescit rugasque contrahit, donec maturato semine una cum foliis & cauliculis subinde totus subsideat, ac pereat, eo qui interea crevit vegeto ac succi pleno & vicissim.

Præter virtutem aphrodisiacam, etiam vi confortante memoriamque roborante gaudet, uterum ad conceptionem disponit, nec in dysenteria plane spernenda. In febribus ab aliis, podagra, epilepsia & ulceribus mundificandis, laudatur. Quamvis autem in his præsertim ultimis affectibus non tantam laudem mereatur, attamen inter remedia dubia cum neotericorum quodam non plane referenda. Suo relinquo loco & ulteriori experientiæ, an, sicuti radices bulbosæ seu succulentæ Venerem stimulant, rugosæ atque flaccidæ Venerem imminuant. In substantia & quidem in pulvere dantur ad ʒj. Sunt qui ex Satyrio præsertim maculoso aquam destillatam faci-

ciei

IN OFFICINIS PROSTANT

ciei nitorem conservare, maculas atque lentigines delere afferunt.

Radices Satyrii conditæ Eingelegte Stendel oder Knaben - Wurk /
condit de racine de Satyrium &
Electuarium. Diasatyrii aut *Diasatyriionis* Ständel - Wurk : Lattwerg
 oder Hochzeiter Lattwerg / *Electuaire Diasatyrium*, quod analepticum
 venditur medicamentum, consumptos & emaciatos reficiens, se-
 men augens & Venerem languidam concitans, contra renum &
 vesicæ imbecillitatem valet, remorantem Urinam promovet, datur
 dosi magnitudine nucis moschatæ ad unciam dimidiam. Maximam
 suam vim habet ab aromatibus. Sunt qui ex Satyrio quoque essen-
 tiam parare jubent. Multum hæc planta esset facienda, si verum es-
 set, quod quidam scribunt, quod si palmæ Christi radix in thoro po-
 natur, ubi conjuges discordes sunt, egregie & fascino quasi eorum
 animi componantur.

RADICES SALE BLANDO FIXO, TE-
 NUI VISCOSITATI INCLUSO CONSTAN-
 TES.

Scorzonera.

Eryngium.

Bardana.

Cichorium.

SCORZONERA.

[Scorzonera tum latifolia, tum angustifolia C. R. P. est
 radix oblonga, digiti crassitie, foris pallida, intus alba, sa-
 poris subdulcis ac grati, odoris nullius.]

Alia scorzonera ad nos transfertur ex Hispania, cui
 nostra viribus plane non convenit, caret enim virtute aro-
 matica.

Quæ

Quæ in nostris officinis prostat, gaudet sale blando tenui viscositati involuto, quo acria quævis & acida mulcet & temperat, unde in phthisi, macie, ictero, febribus malignis, variolis & morbillis laborantibus tam medicamentum, quam alimentum est.

Datur in substantia cocta cum brodio carnis pro alimento, condita vero pro medicamento. Jungitur egregie C. C. falsæparillæ cichorio. Decoctis acrioribus additur tanquam temperans.

℞. Scorzon. Sifar. pastinac. maj. ana coq. in brodio, exhibetur hecticis & tabe consumptis, temperat enim sanguinem acriorem.

℞. Scorzon. ℥ij Cichor. ℥j pomum integr. Citri simul decoque pro potu ordinario in febribus.

℞. Rad. scorzon. ℥iiij f. decoct. c. ∇ quo capiat castor. gr. v. l. Essent. Castor. aut Tinctur. Myrrh. gr. xv. contra variolas & Morbillos.

℞. Scorzon. ℥β hord. mund. ℥j coq. in f. q. ∇ fontan. add. Syr. rosar. vel violar. q. f. ut & — Δis per camp. q. f. ad gratiam f. julapium refrigerans in Morbis quibusvis calidis.

ERYN.

ESCORZONERA à voce Catalaunica Escorzo Vipera cujus morsui & assumpta & externe applicata mederi creditur, unde etiam VIPERARIA, SERPENTARIA, SCORZONERA Scorzoneren/ Schlangen-Mord/ SORZONAIRE.

Pertinet ad plantas flore semiflosculoso & semine pappis instructo calyce oblongo squamoso comprehensis. In usum præsertim venit

Scorzonera latifolia sinuata C. B. Pin. 275. Tragopogon Hispanicus sive Escorzonera aut Scorzonera L. B. 2. 1060. Scorzo-

nera maior Hispanica 1. Clus. Hist. cxxxvii. Colitur in hortis & agris, floret Majo & Junio.

Ob vim alexipharmacam in morbis pestilentialibus, venenis, moribus viperarum & serpentum commendatur. Vim quoque antepilepticam, contra vertiginem & cephalalgiam habere creditur, In uteri quoque morbis conducere asseritur, ast vires non semper respondent.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua destillata ex radice, Scorzoneren. Wasser / Eau de Scorzonere, in affectibus prædictis multum in vulgus commendata. Prostant etiam

Radices Scorzonerae conditæ eingelegte Scorzoneren! Racine de Scorzonere condite.

ERYNGIUM.

[Est Eryngii vulgaris C. B. P. radix longa, pollicem crassa, foris nigricans, intus alba, in medio nervo solidiore flavescente repleta, saporis subacris dulcis, odoris nullius. Refertur ad plantas seminibus solidis & floribus pluribus in capitulum digestis.]

Eryngii vis potior in cortice consistit, ob levem amaritiam potentior est scorzonera, unde incidendo & fluxile reddendo serum, id per Urinam elicit, cæterum scorzonera viribus respondet.

Non facile potest in pulverem teri, nisi siccetur, sed tum abit omnis vis, hinc radix in decocto & condita datur. Veneris quoque incentivum blandum est, & ad gonorrhæam simplicem commendatur à Welschio [syllog. observ. Marcell. Cumani obs. 44. p. m. 64.]

℞. Rad. Eryng. ʒij bacc. junip. ʒj f. decoct. ex quo ℞. ̄ genist. gr. xv. contra difficultatem Urinae cum ardore.

℞. Rad. Eryng. Scorzon. ana ʒij Cichor. bardan. ana ʒj
Sarsa-

falsæparill. ʒss sem. fœnicul. ʒj f. decoct. antiphthificum; addi potest colaturæ ~Θ*ci vel Θ volat. oof. Sylvii secundum iudicium Medici M. c. Syr. d. Symph. Fern. v. c. ad ʒij decocti ʒj. syrupi.

BAR-

Ἑρύγγιον, ἐρύγγιον, ERINGIUM, LYRINGIUM, ERINGUS, IRINGUS, ACUS VENERIS, CAPITULUM MARTIS, CENTUM CAPITA, CARDUUS LE-
PUSCULUS, CARDUUS VOLUTANS ACULEATUS, ASTER INGUINALIS,
Manns. Treu/ à virtute aphrodisiaca, Raben: Distel/ Bracken: distel/
Stech. Wurzel/ CHARDON A CENT TETES, PANICAULT, CHARDON
ROLAND

Herbis floribus umbellatis in capitulum conglobatis gaudentibus accensetur.

Species usualis est

Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. I. B. 3. 85. Eryngium campestre Dod. Pempt. 730. gaudet locis herbosis & arenosis, floret Julio. Refertur inter 5. radices aperientes minores.

Radix in usu: colligenda Sole existente in cancro.

Vires quoque alexipharmacæ adscribuntur & ob aperientem virtutem in nephritide, hepatis, Lienis, & mensium obstructionibus celebratur.

Sunt qui radices saccharo condiunt pro scopo aphrodisiaco.

Græci quidam Philosophi, ut I. BAUHINUS docet, Eryngium quasi ἐρύγγιον id est ructum dictum autumant, quod capræ, quæ morfu surculum Eryngii præciderint, vel deglutierint, cunctum gregem pone sequentem quasi stupore attonitum sistant, donec Eryngium ructu rejecerint.

Sunt qui aquam destillatam eryngii vel per se vel cum aqua nucum haustam in febribus, purificando sanguine, ictero & tumore œdematoso commendant: contusa radix & cataplasmatibus instas umbilico imposita abortum dicitur præcavere.

BARDANA.

Est Lappæ majoris, Arcii Diosc. C. B. P. radix oblonga, crassa, foris nigricans intus alba, saporis subdulcis, acris & amaricantis, odoris fere nullius, pertinet ad plantas capitatas pappescentes, floribus fistulosis.]

Quod potentior sit Eryngio judicatur ex eo, quia majorem habet amaritiem, præstat si radix recens usurpatur. Cortex radice acrimonia majori gaudet, quam interior substantia radice.

Primo anno enata digiti crassitie est effodienda, altero enim anno caulescit radix, suntque vires in floribus & caule.

Bardanæ radix Eryngio potentior, hinc non tantum Urinam movet, eamque sæpe turbidam reddit, sed etiam sudorem movet, & sanguinem congruatum resolvit, propterea in Pleuritide, phthisi, atrophia, arthritide pro specifica habetur.

Datur in substantia ejus raspatura recentior à ʒj ad ij, in pulvere vix habet usum. Datur & in decoctis. D. Herm. sæpe ægrotis ab alto delapsis præscribit. ▽ destillata vel potius decoctum est vehiculum conveniens in qua rasura radice bardanæ contra pleuritidem exhibenda est.

℞. Rad. bardan. ʒij. herb. Chamædr. Chamæp. ana Mj. coq. in lacte, exhibe contra arthritidem.

℞. Ras. bardan. ʒij cape ex decocto proprio bardanæ in pleuritide.

℞. Ras. bardan. ʒj. dent. apr. mand. luc. pisc. ana ʒß. fl. Ais gr. v. ʒ diaph. gr. x vel xv. M. f. pulv. sumendus ex decoct. bardanæ bis vel ter de die in Pleuritide.

CI-

Ἀρχτιον, Bardana αὐτὸ Βάρδος via cum ubivis reperiatur Ἀρχτιον, προσωπὴ aut προσωπίον, PERSONATA quoniam per morem veterum in ludis

ludis ne agnoscerentur ejus foliis faciem occultabant. Lappa major à λαβειν capere quoniam vestimentis adhærescit, Grosse-Kletten / Buben-Kletten / Ross-Kletten / GLOUTTERON, GLETTERON, HERBE AUX TEIGNEUX

Est plantæ genus flore flosculoso semine pappis instructo brevibus, calyce squamoso hamato ac vestibus hærente comprehens. Lappa major, arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. Personata sive Lappa major, aut Bardana I. B. 3. 570. Personata Lappamajor, Bardana Lob. Icon. 588. crescit passim ad vias publicas & urbium pomeria, floret Junio & Julio.

Folia semen & imprimis radix in usu quam etiam tempore verno comedere quidam solent.

FORESTUS arthritico desperato decumbenti summo cum fructu exhibuit decoctum Bardanæ unde album instar lactis minxit & evasit

Laudatur in calculo, pulmonum affectibus asthmaticis, ulcera renum repurgat ut & glandulas mesaraicas. Commendatur quoque tanquam alexipharmaca adversus pestem morbosque malignos, unde Medici Augustani aquam suam Bardanæ compositam maxime commendant, imprimis autem ejus vis sanguinem mundificandi & per consequens Luem etiam Veneream curandi maxime celebratur & quidem ratione hujus ultimi scopi tantopere decoctum radices Bardanæ æstimat SIMON PAULI, ut ipsi lignorum decocto præferat, præsertim in emaciatis & raræ texturæ agris: Quartanarios quoque decoctum ex vino albo juvat.

Radices comestæ & decoctum earundem externe applicitum faciunt bonum Longolium referente HOFFMANNO ex EPIPHANII FERDINANDI observatione

Externe usurpatur hæc radix in lotionibus & balneis ad scabiem, trita cum sale moribus canis rabidi adhibetur: applicatur quoque plantis pedum hydropicorum sed non multum præstat; strumas quoque ac tumores resolvit. Sunt qui dicunt radicem in lixivio aut aqua coctam capillos flavo colore tingere. MIZALDUS supra caput positam Bardanam prolapsum uteri curare asserit, sed fides sit penes authorem. Ovibus tussientibus & equis fere cæcutientibus à mulomedicis suadet. Folia vulneribus inveteratis & articulis luxatis imponuntur. Folia quoque resolvunt egregie & illorum vim in tumoribus genuum multum laudat

Chomel. Frixa porro dolores podagricos mitigant, & in unguentum cum butyro æque ac radix redacta ambustis medentur. Curiosum est quod hæc planta igni injecta instar Nitri strepitet

CICHORIUM.

Est Cichorii sylvestris seu officinarum C. B. P. radix oblonga, circulosæ, dum recens lacte turgida, saporis subacris subadstringentis, amaricantis. Radix Cichorii sativæ minus medicamentosa.

[Jungitur plantis seminibus solidis seu non pappeſcentibus & lactescentibus floribus planipetalis.]

Constat Æ diuretico admodum blando, & ferme tanquam polychrestum tum medicamenti tum alimenti loco variis in morbis laudatur, præcipue ubi resolvendum, temperandum, adstergendum est. Hinc in inflammatione faucium, ictero, obstructionibus vasorum lacteorum, in sanguine acri & acido temperando, in nimia siti, ingrato sapore oris, feliciter adhibetur, additur quoque medicamentis purgantibus justo acrioribus aliisve, ut & antiscorbuticis & antimelancholicis.

Datur in substantia vel saccharo condita, vel decocta in aqua vel brodiis carniæ, junctis appropriatis, datur & succus cum ∇ destillata. Taraxaco tanquam genuino analogo jungitur.

℞. Rad. Cichor. Mj. passul. min. ʒβ vel j. coq. in ∇ Colatur. infund. ferment. panis petiis except. q. s. repone donec fermentet, fit potus egregius pro siti fallenda.

℞. Rad. Cichor. ʒij. tarax. chelid. maj. fragar. ana Mj. coq. in vino vel ∇ in ℔j. Colatur. infund. fol. senn. ʒvij f. apozema alterans & temperans universaliter sanguinem.

RA-

κίχωριον, σέρις, CICHOREUM, CICHOREA, INTYBUM ERRATICUM
 INTYBUM AGRESTE, INTYBUM RUSTICUM, SOLSEQUIA, SOLSEQUIUM,
 SPONSA SOLIS, AMICA SOLIS, HERBA SOLIS, ROSTRUM PORCINUM *Weg-*
warth / quasi viarum custos: *Wegweiß* / quod secus vias locaque in-
 culta crescat. CHICORÉE. Pertinet ad plantas flore semistofculoso
 semine angulato quasi cuneiformi umbilicato & nullis pappis instru-
 cto gaudentes

Cichorium non modo in hortis colitur sed & secus vias ac
 locis incultis exit, mense Julio & Augusto cum floribus reperitur,
 usuales quam maxime species sunt

Cichorium sylvestre sive officinarum C. B. Pin. 125. Cicho-
 rium sylvestre Picris Dod. Pempt. 635. Cichorium sylvestre I. B. 2.
 1007. Chicorée sauvage

Cichorium sylvestre flore albo C. B. Pin. 126.

Quamvis etiam usurpari possint sed cultu mitiores.

Cichorium sativum C. B. Pin. 125. I. B. 1007. &

Cichoreum sativum flore albo C. B. Pin. 125.

Flores folia & radix in usum tum cibarium tum medicum cedunt &
 quidem radices teneræ succulentæ & molles tempore verno & autum-
 nali adhibentur in acetariis ut & folia. Cum pro præstantissimo hepati-
 co à quibusdam æstimetur, in cachexia hydrope biliosisque morbis
 comendatur. Laudatur quoque ut stomachicū atque febrifugum. Hæ-
 morrhagiis mederi censetur radix, præsertim festo natalitatis Mariæ
 eruta, imo sub lingua solummodo detenta ad hæmoptysin facere fertur.
 Cichoreum equis cachexia laborantibus cum avena exhibitum pro-
 desse asserit HOFFMAN: IN SCROED. Ridiculum est quod quidam di-
 cunt Cichorii flore albo præditi radicem vel per se vel cum
 usnea cranii humani assumptam corpus ita obfirmare ut ab omni
 ictu liberum sit. Flores cumulo formicarum sepeliti caeruleum
 colorem in rubrum absque miraculo mutant. Radix adhibetur in
 jusculis refrigerantibus ut & in Decocto sic dicto avenaceo.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Cichorii ex floribus & foliis *Wegweiß* / oder *Wegwarth*.
Wasser / *Eau de Chicorée*, multum laudata in febribus.

Conserva Cichorei florum *Wegweiß-Blumen-Zucker* *Conserve de*
fleurs de Chicorée.

Radices

*Radices Cichorei conditæ eingelegte Wegweiß/ oder Wegwart-
Wurzel / Condit de Racine de Chicorée.*

*Syrupus de Cichorio simplex Wegwart - Syrup / Syrop de Chicorée
simple. modo dicta remedia ad refrigerandum & humectandum
ut & ad bilis acrimoniam temperandam commendantur.*

*Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro laxierender Wegwart Syrup
mit Rhabarbara / Syrop de Chicorée avec de la Rhubarbe, qui laxat
bilemque evacuare creditur, ipsis etiam infantibus exhiberi potest
ad humores vitiosos educendos, in ipsis etiam torminibus infan-
tum & exinde ortis convulsionibus epilepticis ad scorias biliosas
acres eliminandas. Dosis à drachmis duabus ad uncias duas. Mul-
ti cum Hartmanno, Schrœdero &c. ex floribus cæruleis parant
aquam quandam ophtalmicam, dum eos vitro immittunt angusti
orificii, obturant optime & massæ panis circumvolutum commit-
tunt clibano, ut pinsatur cum pane, hinc exprimunt ac destillant in
M. B. Hanc aquam vel palpebris solummodo mane & vesperi il-
litam vix non in omnibus oculorum morbis imprimis in visu con-
fortando & conservando laudant.*

RADICES SALE BLANDO DIURE- TICO CONSTANTES.

Asparagus.

Ruscus.

Ononis.

Rubia tinctorum.

ASPARAGUS.

[Sunt Asparagi sativæ C. B. P. Radices spongiosæ,
longæ rotundæ ex uno capite in plures fibras sese diffun-
dentes, saporis subdulcis subacris, odoris nullius. Est
planta baccifera foliis capillaceis tenuissimis, alternis. Flo-
ribus

bus subrotundis parvis, propendentibus, radice fusi-
formi.]

Blandum suum sal diureticum in blanda mucagine fo-
vet & contra icterum, aliosque Morbos chronicos cum
appropriatis exhibetur.

Vis consistit in cortice radice recentis, ut & julis seu
novellis germinibus quæ ratione spiritus vegetantis, quo tur-
gent, sem stimulare creduntur.

Ob sui mucaginem in quam resolvuntur germina no-
cent iis in quibus temperamentum est acidiusculum, sunt &
viscosiores.

℞ Rad. asparagi. ℥i gramin. ℥ij. bacc. junip. ℥iiij f. de-
coct. diureticum ex vino & aqua.

Ex decocto asparagi datur etiam ꝑ vivus vel dulcis
contra lumbricos, infantibus & adultioribus, sed decoctum
ex ▽ graminis præstat in hoc casu.

RUS.

Ἀσπάραγος, ἀσφάραγος, quia ex asperis virgulis nascitur &
sapore asperitatem gutturis lenit, vel quod vox, ut monet SEBIZIUS,
generica asparagus, qua veteres tenella & succulenta cujusque
stirpis germina expressere, facta fuerit specialis, & ad turiones spa-
ragi juxta officinas καὶ ἐξοχὴν applicita. Quibusdam MYACANTHA
i. e. murina spuria quia tam tenuium & spissarum spinarum est ut
μύαε mures arceat, aliis HERBA CORALLI à baccis rubentibus audit
germanice Spargen / Sparglen / Gallis ASPERGES appellatur

Est plantæ genus flore rosaceo senis petalis prædito, pistillo in
fructum mollem seu baccam globosam seminibus duris fœtam,
abeunte ut & foliis tenuibus constans.

In usum cedit

Asparagus sativa C.B. Pin. 489. Asparagus hortensis & pratensis J.
B. 3. 725. Asparagus hortensis Dod. Pempt. 703.

Colitur in hortis & agris humido pingui beneque subacto

M

solo

solo. Turiones vere prodeunt, Junio & Julio floret, Septembri bac-
cæ maturescunt.

Turiones asparagi præsertim qui sunt crassi corpulenti succique
pleni magnæ gulæ delectamento, cum jusculis butyro sale & pipere
aliove coctos, aut cum aceto, oleo & sale & pipere conditos come-
di nemo est qui ignorat.

Asparagi non diu debent coqui alias fiunt pulpa, unde ad de-
scribendum celerem alicujus rei successum utuntur sequenti pro-
verbio, citius quam asparagi coquitur.

SERENUS ratione assumendi hoc suadet

Aut caput asparago cum vino fume vetusto

Seu mavis appone, modus conducit uterque

QUERCETANUS refert quod in viris augeant Venerem,
in foeminis extinguant. Excitant appetitum, ut loquitur Sebizius,
ciborum, leniunt alvum hepar & renes oppilatos aperiunt uri-
nam cient Venerisque injiciunt aculeos; hoc tamen habent vitii quod
urinam admodum foetidam & turbidam reddant id quod nosse Medici
interest. HELMONTIUS exinde asparagos ad productionem calculorum
facere autumat, refutatus propterea ab HOFFMANNO in SHROEDE-
RUM. Nollem tamen & ego præsertim in dispositione calculosa ho-
rum turionum usum multum suadere.

Radix, quæ alias in usum Medicum venit, inter s. radices aperien-
tes majores refertur, ictericis & calculosis quoque commendatur,
adeo autem insignem vim obtinere vix videtur.

In odontalgia & gingivarum laxitate quoque commendatur. Re-
ferente SIM. PAULI, qui succo asparagi recente sese inungunt tuti cre-
duntur à puncturis apum.

IN OFFICINIS OCCURRIT

Aqua Asparagi, ex integra planta cum baccis mense Septembri
collecta, destillata *Spargen-Wasser* / *Eau d'Asperges*, sed vix amplius
in usu

RUSCUS.

[Est Rusci C. B. P. radix crassa, obliqua, implexa, fi-
bras crebras longas albas demittens, similes fibris asparagi,
an-

annumeratur plantis bacciferis.]

Ruscus viscositate qua asparagus turget, caret, & propterea tutum & blandum est diureticum, imo potentius quam asparagus, ut in specie antihydropicum audiat. Datur in decoctis.

℞. Rad. rusc. ℥iiij coq. in ∇ communi, decocto adhuc calenti infunde fol. senn. ℥j. f. apozema. Est medicamentum Riverii contra arthritidem.

℞. Rad. rusc. ℥iiij ir. florent 3ij f. decoct. ex ∇, si radix ir. flor. non sufficit, possunt addi fol. sennæ, exhiberi potest in hydropo, ubi parcius mittitur Urina.

ONO.

MYRTACANTHA, Οξυμύρτιν i. e. MYRTUS ACUTA, quia folia myrti acuta & spinosa sunt, μυανάνθα quia arcendis muribus aptissima, SCOPA REGIA, CHAMÆMYRTUS, MYRTUS SYLVESTRIS, BUXUS PUNGENS Ruspcken / Bruspcken / Mäuf-Dorn / Myrten-Dorn / Houx FRELON, PETIT Houx, FRAGON, BOUIS PIQUANT, HOUSSEON. Est plantæ genus flore monopetalo campaniformi & globoso, pistillo in fructum mollem globosum uno vel altero semine plerumque duro foetum abeunte, gaudens.

In usu est

Ruscus Myrtifolius aculeatus Tourn. I. R. H. Clas. I. S. 2. g. 3. Ruscus J. B. 1. 579. Ruscum Dod. Pempt. 744.

Crescit copiose in Italia, apud nos in hortis colitur. Locis gaudet asperis. Primo vere turiones promit, autumnio semen.

Radix quæ est albicans ab initio saporis dulcis mox amari inter 5. aperientes majores recensetur, & hinc non tantum in hydropo sed & ictero atque mensium suppressione commendatur. In strumis & scrophulis discutiendis hæc radix ad 3j singulis mane vel sola vel cum radice Scrophulariæ aut filipendulæ assumpta deprædicatur.

Cum saccharo ex baccis Rusci parant quidam conservam quam juxta RIVERIUM in urinæ ardore & gonorrhœa virulenta admodum deprædicant. Datur ad 3ij. ℥ss pro dosi.

ONONIS.

[Sunt Anonidis spinosæ flore purpureo C. B. P. radices albidæ, fractu contumaces, lignosæ, saporis & odoris nullius. Pertinet ad leguminosas papilionaceas, filiquis unicapsularibus, singulis sequentibus singulos flores tetrapetaloides.]

Ononis sal suum diureticum ligneæ quasque terreæ substantiæ inclusum habet, hinc præter virtutem diureticam habet quoque vim absorbentem & absorbentem sarcocelen & ramices carnosas.

Datur cortex, in quo vis major quam in interiori substantia, ex decoctis & infusis. Stimulatur sale proprio vel genistæ.

Rad. ononid. ℥iiij herb. ononid. Mij f. infus. ex vin. Malvat. destilletur, destillatum novis radicibus & foliis affunditur, & ponitur in digestionem, & cochleatim cum Oleo proprio vel genistæ à gr. vij. ad xv. contra calculum exhibetur.

℞. Cort. rad. ononid. 3j exhibe ex decocto proprio per integrum mensem ad curandam sarcocelen.

RUBIA.

O'vavis, quod asinis opituletur. O'vavos, A'vavis, quod nullam utilitatem præbeat. ANONIS, RESTA BOVIS, REMORA ARATRI, quod inter arandum radices illius longissimæ & fibrosæ boves aratrumque remorentur; Hechel, Kraut / Hau-Hechel / Heu-Hechel / Ochsen-Brech / Pflug-Sterk / ARRET BOEUF, BUGRANE, BUGRANDE. Vocatur etiam ACUTELLA, URINALIS, URINARIA HERBA, quod urinam strenue moveat, unde equites Stall-Kraut vocant, eo quod decoctum ejus equis mejere nequientibus bibendum offeratur.

Est planta flore papilionaceo ex cujus calyce surgit pistillum quod abit in siliquam turgescens. Semina ut plurimum reniformia.

formia & folia terna singulis pediculis insident, quandoque tamen in eadem planta nascuntur etiam folia singularia.

In usu est potissimum illa species quæ maxime communis.

Anonis spinosa flore purpureo C. B. Pin. 389. Anonis sive resta Bovis vulgaris purpurea L. B. 2. 355. Anonis Dod. Pempt. 743. Nascitur in campestribus, dumetis, arvis secus vias, floret Julio & Augusto.

Radix hæc 5. radicibus aperientibus majoribus annumerata caute, ut bene TOURNEFORTIUS monet, in eo casu ubi calculus jam formatus in renibus existit, usurpari debet ne majores excitentur cruciatus.

Sunt qui afferunt Turiones Ononidis instar asparagi coctos urinam ciere renesque & hepar referare. Sunt qui decoctum hujus radicis in hæmorrhoidibus cæcis leniendis, putredine oris ac dolore dentium scorbutico commendant.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua ex integra planta cum radicibus eruta Hauhechel-Wasser / Eau d'Arretbaens, ut & Sal. Hauhechel-Salt / Sel d'arretbaens, quod præ reliquis salibus fixis nihil peculiare obtinet.]

RUBIA.

[Est rubia tinctorum sativa C. B. P. radix oblonga, tenuis, succulenta, extus & intus rubicunda, saporis ex dulci amaricantis & adstringentis, odoris nullius.

Refertur ad stellatas, seminibus post singulos flores nudis binis, foliis ad singula caulium genicula pluribus, radiatim decussatis.]

Si inculta nascitur parum rubedinis habet & ad usum tinctorum minus apta, sed ad usum Medicum optima. Rubia partium tenuiorum quam ononis, & proinde virtutis potentioris, viscerum simul obstructionem referat, & sanguinem congrumatum potenter dissolvit, quam ob cau-

ſam vulneraria cenſetur. Datur ad ʒj in pulv. in | dec. ad
3 ij.

℞. Rad. rub. ocul. ʒ. ana ʒj. sperm. Cet ʒj. Ө vol.
succin. ʒʒ. M. f. pulv. pro ij vel iij dosibus contra casum
ab alto, ubi metus sanguinis congrumati, simul gr. j. vel al-
terum moschi detineatur in ore.

R₂. Rad. rub. ꝑiiiij Cin. stip. fabar. Mß. coq. in ∇ f. apo-
zem. diureticum, in difficultate Urinæ seu ischuria à sanguine
congrumato.

RADI-

Εἰς ῥόδαν, Εἰς ῥοῦν RUBRUM quasi εἰς ῥοῦν ῥίξα rubra radix, RUBIA TINCTORUM quoniam iis ad tingendum inservit, Rōthe/ Färber Wurk/ Färber. Rōthe GARANCE

Planta est flore monopetalo campaniformi patente & multifido, calyce abeunte in fructum ex gemellis baccis constantem semine foetis ut plurimum umbilicato, ut & foliis verticillatis gaudens
 Rubia tinctorum sativa C. B. Pin. 333. Rubia sativa I. B. 3. 714.
 Rubia Dod Pempt. 352.

Solo pingui fœcundoque gaudet, æstate floret semenque produ-
cit.

Radix quæ una est ex 5. aperientibus minoribus, colligenda
Majo & Junio ex Rubia sativa, ubi deinde resiccata in usus Medi-
corum & Tinctorum venit.

Conducit in ictero hydropo & mensibus retentis. A TOURNEFORTIO multum commendatur in affectibus hysteriis præsertim cum dimidia parte succini & croci ♂ mixta. Laudatur a quodam ad herniam tum externe tum interne usurpata

RADICES AMARÆ SALE FIXO
CONSTANTES.

Conveniunt virtute cum Eibus volatilibus oofis, ve-
rum

rum rigidiora sunt & potentiora, ut in morbis chronicis pertinacissimis, & austeris acida putrida validius infringunt, ac per diuresin & diaphoresin expellunt.

G E N T I A N A.

[Est gentiana major lutea C. B. P. Radix longa, crassa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, saporis intense amari, odoris nullius. Pertinet ad plantas bicapsulares flore monopetalo uniformi.]

Gentiana ob amaritiem intensiorem & \ominus fixum rigidius & potentius in specie confert in febribus intermittentibus, & ab his orta ventriculi debilitate, expellit quoque lumbricos, quibus amara adversa sunt, & ratione virtutis alcalinæ, contrariatur acidis putridisve in quibus vermes nidulantur.

Sub specie turundæ fistulis intruditur, quia laxior radicis substantia à susceptis ex fistula humoribus intumescens eam sensim dilatat, & quia \ominus acre callum ulceris fistulosi exedit seu absomit: eandem ob causam pulvis ejus fonticulis ubi fluere desinunt inspergitur, vel sub forma globuli inditur.

In theriacam recipitur: ex solo melle & hac radice fac theriacam: in hydrophobia laudatur specificè; ob nimiam sui diaphoreticam & diureticam exsiccantem vim obesis & pinguioribus convenientior est quam emaciatis.

\mathcal{R} . Rad. gentian. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ \ominus absynth. gr. xv. in robust. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ commodissime in pilulas redigitur cum extract. inspissato absynthii q. f. f. pil. \odot fol. involvend. Conveniunt in omnibus febribus intermittentibus seu tertianis seu quartanis.

\mathcal{R} . Rad. gentian. serpent. virg. Cort. Chin. Chin. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. \ominus prunell. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. vel gr. xv. M. f. pulv. vel prædicto modo

do potest redigi in pilulas.

Cum saccharo 5ni potest exhiberi in ▽ graminis contra vermes.

℞. Rad. gentian. ʒiij. serpent. virgin. ʒβ. Cort. Ch. Chin. ʒiij flor. cent. min. p. j. pip. long. ʒβ. M. f. vin. medicatum, cui in alvi adstrictione adde rad. Jalapp. (folior. sen-næ) ʒβ. helleb. n. ʒiij. passul. exacin. ʒj f. infusum vel vinum medicatum.

RADI-

Γεντιάνη ab inventore Gentio Illyriorum rege appellata, **Gentian/ Bitter-Wurk / GENTIANE.**

Est plantæ genus flore monopetalo campaniformi vel patente vel tubulato & multifido cujus pistillum in fructum membranaceum ovato acuminatum bivalvem unicapsularem seminibus foetum plerumque planis orbiculatis & marginatis abit.

Ex variis gentianæ speciebus usualis præcipue est

Gentiana major lutea C. B. Pin. 187. Gentiana vulgaris major Ellebori albi folio L. B. 3. 520. Gentiana Dod. Pempt. 342.

Gentiana hæc major in montium pratis ac pascuis variis in locis observatur florens Junio semen maturans Augusto. Radix Augusto & Septembri colligitur estque maxime usualis.

Ob virtutem alexipharmacam rusticorū est Theriaca & propterea contra pestem morbosque pestilenciales maximopere commendatur Ob vim aperitivā commendatur in obstructionibus viscerū hepatis atque lienis Ictero, hydrope, urinæ mensiū obstructione, Chlorosi passione hysterica. Dosis interne est ad ʒβ ad ʒj in substantia, bolo aliove modo ut occultetur amarissimus sapor. Externe egregie vulneraria esse dicitur, in vulneribus mundificandis cumque Theriaca in morsu canis rabidi aliisque vulneribus venenatis imponitur. Non tantum Theriacam sed plures alias ingreditur compositiones Mithridatium, Diascordium, acetum Theriacale &c.

Ab Agricola commendatur ad longævitatē vitæ, si quotidie por-tiuncula assumatur. Cortici Chinæ Chinæ non solum addi sed & substi-tui

cui potest docentibus illud ipsis rusticis

IN OFFICINIS ASSERVATUR

Aqua Gentianæ destillata *Englian-Wasser/ Eau de Gentiane*. Sed si dicendum quod res est non tantarum videtur esse virium & potius præferendus succus expressus ad ʒj. ʒjv. &c. assumendus: vel saltem eligi debet *Extractum Gentianæ*, *Englian-Wurzel-Extract / Extrait de Gentiane* cum spirititu vini paratum quod ad febres intermittentes qualvis, morbos insuper omnes ab acido oriundos, hydro-pem præterea suffocationem asthma &c. deprædicatur. Dosis ejus per se est ad grana xv. ʒj &c. vel miscetur etiam cum aliis.

RADICES SALE FIXO CUM PAUCO
SALE VOLATILI CONSTANTES
INCLUSO RESINÆ.

Peucedanum.

Fraxinella seu Dictamnus albus.

Aristolochia.

Filix utraque.

Osmunda.

Huic Si conjuncta est resina, quæ ad strobilos pini & abietis accedit. Unde quoque judicatur participare de blanda quadam volatili aciditate, qua strobili pini gaudere videntur, idcirco convenit in Uteri obstructione, in sedandis doloribus, incidendo pulmonum muco.

PEUCEDANUM.

[Est Peucedani Germanici C. B. P. radix crassa, longa,
N ga,

ga, superius coma prædita, extus nigrescens, intus albescens, saporis pinguis acriusculi, odoris sulphurei.]

Datur ut superiores radices.

℞. Rad. Peuced strobil pin. & abiet. ana ℥ij herb. chamæp. M[℞]. f. decoct. ex ∇ vel vino, ad quoscunque dolores, & obstructions Uteri tollendas: remedium fuit Plateri.

FRA-

Πευκέδανον, πευκέδανες quod folio sit pinus, vel à piceo foetore dictum, FOENICULUM PORCINUM Eau-Fenchel / Haar-strang / à coma quæ supra radicem cernitur, QUEVE DE POURCEAU, FENOUIL DE PORC. Refertur ad plantas rosaceas umbelliferas. Calyx abit in duo semina plana fere, ovata leviter striata & marginata. Peucedanum Germanicum C. B. Pin 149. Peucedanum minus Germanicum I. B. 3. p. 2. 36. Peucedanum fœniculum porcinum Lob. Icon. 781.

Non tantum in montosis locis atque umbrosis sed & in pratis humidis aridisque etiam in ipsa Alsatia provenit, floret Julio & Augusto. In usu est radix colligenda potissimum autumno, quo tempore quandoque radici succus concretus adhæret. Rectius autem verno tempore quoniam magis succo plena legitur. Effossu quidem difficilis est, & juxta TRAGUM dum effoditur gravissimum spirat odorem, ita quidem ut nisi monitus quis illam aggrediatur lædatur odore: qua de causa veteres priusquam illam colligerent caput & nares rosaceo perfundebant ne capitis dolore premerentur & vertiginem sentirent. Ast memini aliquoties erutam fuisse radicem nullo subsequente incommodo.

Multæ huic radici adscribuntur vires tum internæ tum externæ. Ob virtutem autem attenuantem aperientemque ad obstructions viscerum & morbos inde dependentes imprimis in affectibus pectoris à materia crassa tenaci viscidaque ortis, tussi asthma ut & nervinis affectibus celebratur, quo in casu gelatina ex radice præparata aut conserva radice maxime extollitur, cui & virtus antihysterica tribuitur & antihypochondriaca. Sunt qui in ore detentam radicem sus-

fo-

focationem uteri tollere afferunt. Extrinsecus quoque maximopere commendatur in ulceribus sordidis etiam inveteratis curandis. Sic quoque lixivium radice capillos promovere dicitur, ne dicam de aliis viribus, quas affingunt, sed tamen sufficienti experientia nondum comprobatis, dum vix in usum trahitur hæc radix æque ac tota planta. Dosis interim radice exsiccatæ est ad drachmam semis &c. In infuso & decocto majori in quantitate adhibetur. Multi autem succum superius dictum præferunt.

FRAXINELLA.

[Est dictamni albi vulgo sive fraxinellæ C. B. P. radix, seu potius radice cortex crassiusculus, albicans, cannæ in modum convolutus, saporis amari.]

Fraxinella plus habet Θ is volatilis quam Peucedanum, quod arguit bituminosus & aromaticus odor, propterea etiam cortex, in quo vis concentrata est ad partum facilitandum, excludenda lochia, maxime laudatur, ob intensam sui amaritiem contra lumbricos exhibetur. Datur ut cæteræ radices.

℞. Rad. fraxinell. \mathfrak{z} ij. N. M. \mathfrak{z} ss. M. f. pulv. exhibetur ex vino vel ∇ puleg. ad facilitandum partum, loco stimuli add. Castor. gr. v. borrac. gr. v.

℞. Rad. fraxinell. \mathfrak{z} ij. aristoloch. \mathfrak{z} j. castor. \mathfrak{z} j. f. infusum ad passionem hystericam tollendam, it. ad remoras mensium & foetum expellendum.

ARI-

FRAXINUS PUMILA, ob foliorum similitudinem, Nesch-Wurz / Nesch-Wurz / DICTAMNUS ALBUS propter radicem albam, DICTAMNUS GERMANICUS, DICTAMNUS VULGARIS Weiser-Diptam / Gemeiner Diptam / FRAXINELLE

Est plantæ genus flore polypetalo anomalo vaginis insequentibus

bus in capitellum collectis capsulam aduncam complectentibus, quæ vi elastica bifariam diffilit, cornuum arietis in modum se inflectit, seminibusque ut plurimum turbinatis scatet.

Fraxinella Clusii Hist. 99. Dictamnus albus vulgo sive Fraxinella C. B. Pin 222. Fraxinella Officinis dictamnus I. B. 3. 494.

In usum quoque trahi potest altera species sed rarior est.

Fraxinella niveo flore Clus. Hist. 100. Crescit Fraxinella odore se commendans gravi in Gallia, Italia atque Germania & quidem in montibus & collibus, solo gaudet lutofo & saxoso. Colitur etiam in hortis, floret Junio.

Usurpatur pro scopo Medico sola radix, virtutibus præter allegatas gaudens siccante, aperiente, alexipharmaca. Cordialis atque Cephalica est maxime in affectibus serosis. Imprimis contra Epilepsiam laudatur. Sunt qui gravidis circa medium tempus suadent pulverem radices fraxinellæ cum polenta ac nuce moschata ad partum facilitandum & secundinarum faciliorem solutionem, sed quid si abortus sequeretur. Quidam aquam ex floribus destillatam ad faciem clarificandam deprædicant.

A R I S T O L O C H I A.

Aristolochia rotunda cæteris aristolochiis præstantior, sal fixum paucumque volatile in substantia pinguiori fovet, propterea in tussi, asthmate, facilitando partu, mensibus pellendis, scabie, incidit, aperit & anodyna est. Recipitur quoque inter vulneraria, & in clysteres ad Morbos soporosos, it. in cardialgia cum ovo forbili data specifica audit.

Aristolochia longa Θ ia sua in substantia laxa & nonnihil spongiosa gerit, unde simul imbibit, absorbet & abstergit, hinc veluti gentiana fistulis dilatandis intruditur sub specie turundæ.

Aristolochia tenuis remissiolem habet amaritiem, ast si sit recens intensiorem acredinem volatilem & penetrantem, quo nomine cæteris aristolochiis additur tanquam stimulan.

Aristolochia cava Θ fovet in substantia farinacea ferme in mucilaginem fatifcente, & à multis præfertur aristolochiæ rotundæ, præcipue quoad vim anodynam & mulcentem, si nempe sit recens.

Aristolochia fabacea remissior est & debilior quam cava, ob sui substantiam farinaceam majorem habet vim exsiccantem & absorbentem quam cæteræ Aristolochiæ, unde illam solent eligere Chirurgi in denudatis ossibus.

℞. Aristol. ir. flor. ana ʒj. f. pulv. tenuissimus ossibus denudatis inspergendus, ubi vero jam nigrescunt ossa, add. Euphorb. ʒj. in principio gangrænæ frequenter usurpatur.

℞. Arist. rot. ʒj. cape ex vino enulato contra scabiem cum asthmate & doloribus.

℞. Arist. rot. ʒij. Myrrh. gr. xv. borrac. ʒß. Castor. gr. vij. Croc. orient. gr. v. f. pulv. in partu difficili: sumi potest ex vino.

℞. Rad. arist. rot ʒj. sumatur ex ovo sorbili calido contra cardialgiam, quod mire deprædicatur.

℞. Arist. cav. ir. flor. helen ana ʒj. f. pulv. capiendus ex oxym. scyll. ∇ puleg. contra asthma scorbuticum cum doloribus.

℞. Rad. arist. cav. gentian. ana ʒj. φ dulc. rit. par. gr. xv. f. pulv. pro ij vel iij dos. sumi potest ex ∇ graminis contra lumbricos.

FILIX.

ARISTOLOCHIA quasi ἀρίστη τῶν λόχοις ἢ τῶν λοχέταις quoniam ad lochia optima & parturientibus & puerperis opem ferat Osterlucey / Hohle Wurß / ARISTOLOCHE

Quinque ab Authore hic recensentur species quarum tres priores propriè ad Aristolochiam, reliquæ vero duæ ad fumariam pertinent.

Est autem Aristolochia plantæ genus flore monopetalo anomalo tubulato & lingulato plerumque adunco, cujus calyx abit in fructum membranaceum ut plurimum globosum ovatum vel cylindraceum, in loculamenta sex divisum, seminibus foetum compressis sibi invicem incumbentibus.

Tres species Aristolochiæ hic recensitæ sunt

Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro C. B. Pin. 307. Aristolochia I. B. 3. 559. Dod. Pempt. 324. *Runde Osterlucey* / Aristolochie ronde.

Aristolochia longa vera C. B. Pin. 307. Aristolochia longa I. B. 3. 560 Dod. Pempt. 324. *Lange Osterlucey* / Aristolochie longue.

Aristolochia Clematidis recta C. B. Pin. 307. Aristolochia Clematidis vulgaris I. B. 3. 560. Aristolochia Clematidis Bætica Clus. Hist. LXXI. Aristolochia altera radice tenui Cæsalp.

Hujus tamen Aristolochiæ tenuis loco ab aliis recipitur radice quoque tenui prædita

Aristolochia pistolochia dicta C. B. Pin. 307. Aristolochia polyrhizos I. B. 3. 561. Pistolochia Dod. Pempt. 325.

Aristolochia authoris cava est

Fumaria bulbosa radice cava major, flore rubro dilutior C. B. Pin. 143. Fumaria bulbosa radice cava flore purpurascens I. B. 3. 204. Radix cava Dod. Pempt. 327. Aristolochia vulgaris rotunda Trag. *falsche Hohl-Wurk* / *Runde Hohl-Wurk* / *Herz Wurk* / *Donner-Flug* / *Racine creuse*: hujus rursus diversæ sunt species flore potissimum differentes sed promiscue usuales.

Aristolochia tandem fabacea est Fumaria bulbosa radice non cava minor C. B. Pin. 143. Radix cava minor Dod. Pempt. 327 *Kleine-Hohl-Wurk* / *Kleine Hahnen-Sporn* / Aristolochia Bulbosa radice solida calcari & folio cristato I. B. 3. 205. Aristolochia rotunda vulgaris solida Trag.

Aristolochia rotunda annotante JOHANNE BAUHINO crescit pingui solo in pratis & humidioribus agrorum marginibus Hispaniæ, Narbonensis Galliæ, Languedociæ, Provinciæ, Italiæ, floret calidioribus in regionibus ineunte vere. In Germania vero ubi in hortis colitur Majo & Junio flores promit. Longa quoque campestribus locis inter segetes & in quibusdam vinetis, reperitur in Gallia Narbonensi

bonensi & etiam in Hispania, apud nos in hortis alitur. Clematidis observatur quoque in hortis in quibus suo reptatu valde molesta. Repertur etiam in plerisque Galliae, Hispaniae, Ungariae Germaniaeque locis. Aristolochia pistolochia in regionibus quoque calidioribus provenit, floret cum reliquis.

Fumariae bulbosae species occurrunt in dumetis locis frigidis & opacis, ut & in vinetis: primo florent vere, imo, haud raro, citius.

Ex his plantis in usum praesertim cedunt radices & saepius etiam folia.

Aristolochia rotunda, quae etiam foemina audit, desiniente Dale, est radix crassa rotunda, rugosa & tuberosa, foris fusca intus lutea saporis tristi amarore gustum afficientis.

Aristolochia longa, quae mascula quoque appellatur juxta eundem, est radix oblonga rotunda, crassa, rugosa, foris fusca intus sublutea saporis itidem amari & acris odoris non ingrati.

Aristolochiae Clematitidis tenuis est radix multisque fibris capillata odore non ingrato sapore amaro.

Aristolochia autem polyrrhizos ex radicis, ut loquitur Bauhinus, argumento nomen invenit, quae ex plurimis junceae tenuitatis, buxei coloris radiculis in unum tandem caput coeuntibus est composita. Fumaria bulbosa alia est radice bulbosa cava, lata, sessili, fibris aliquot donata colore intus forisque buxea, sapore amaro interdum non maiore nuce juglande, alias pugno maximo major, quasi ex compluribus bulbis compacta, continuis tamen. Alia vero est radice bulbosa non cava rotunda, avellanae magnitudine interdum minore, interdum majore, membranula quae facile trahenti cedit investita, foris buxea subalba intus, amara cui fibrae capillares aliquot adnatæ.

Quod virtutes radicum Aristolochiae concernit licet non cum Apuleio, hyperbolice tanti Aristolochiam astimante, ut dicat Medicos sine ea nihil feliciter curare posse, sentiam, attamen haud parvi pendenda. Ob vim alexipharmacam Theriacae est ingrediens ubi disputant quænam proprie recipienda sit, aliis rotundam, longam aliis, quibusdam Clematitidem nonnullis pistolochiam recipientibus. Sicuti autem minime peccant qui vel longam vel rotundam seligunt, ita quoque ii non redarguendi, qui Clematitidis pistolochiam cum Charas praefereunt. Cephalica quoque habetur atque hepatica unde in ictero conducit. In serosis quoque affectibus, cachecticis, hydropicis & æde-

œdematosis utilis existit. Ventriculo dicitur esse admodum amica. In asthmate Scorbuto ad mucilaginem tartaream resolvendam maximopere extollitur. Vis uterina ad partum lochiaque promovenda adeo celebratur ut tam efficaces afferantur longa & polyrrhizos præfertim, ut radices utriusque pari momento partim intro dato partim in pessario admoto elicuerint foetum jam sesquidiem frustra erumpere conatum, foetusque involucra lacerata enixam puerperam tridui cruciatibus pene enectam: eoque multus omnium usus apud Mons-pelienses, verba sunt adversariorum PENÆ & LOBLEIL. Vis ejus vulneraria summopere quoque celebratur, dum non tantum ad vulnera recentia sed etiam ulcera sordida & antiqua putrescentiaque adhibetur, humores, ichorosos absorbet & imbibit, sordes extergit, vermes necat spiculaque extrahit. Imprimis in tibiæ ulceribus etiam cacœtheis pulverem Aristolochiæ in aqua veronica decoctum, petia exceptum & applicitum, vel etiam solum decoctum adhibitum multum profuisse testatur S. PAULI in Q. B. Hinc etiam veterinarii tam radice quam herba frequentissime in ulceribus & vulneribus equorum utuntur. Et quis ignorat commune plebejorum vulnerarium esse imponere folia Aristolochiæ vel per se vel in vino &c. decocta. Ejus usus quoque est externus in scabie tam in decoctis quam linimentis. Sicuti quoque ejus pulvis in scabie humida, serpigine, herpete inspergitur. Non solummodo autem externe hanc vim exserit sed & interne conducit, tumores & abscessus internos rumpendo & aperiendo juxta SENNERTUM & FERNELIUM, sanguinis grumos dissolvendo, & exulcerationes præsertim pulmonum curando, teste HOFFMANNO in SCROEDERUM, laudatur quoque in procidentia uteri. Sunt qui dicunt eo in casu ubi magis attenuandum rotundam, ubi vero magis abstergendum longam esse recipiendam, at hæcce differentia non nimis religiose est attendenda.

Fumaria bulbosa viribus cum Aristolochia fere convenit.

OLEUM ANTEPILEPTICUM HOFFMANNI

℞ Rad. Aristol. long. rec. & optim. mund. ℥j. Castor. Euphorb. ana ℥j. ol. oliv. ℥iij vel ℥jv. circiter: radix Aristolochiæ incisa prius coquatur & demum reliqua addenda sunt ingredientia, invicem mixta tecta operculo coquenda & demum per linteum colanda. Oleum hoc in insultu Epileptico & singulis lunæ quadraturis mane ac vespere spinæ dorsi à nucha incipiendo usque ad coxendicem inunctum mira præstare dicitur in ipso paroxysmo & extra paroxysmum.

F I L I X.

[Filix mas seu non ramosa dentata C. B. P. & foemina seu ramosa major pinnulis obtusis non dentatis C. B. P. est radix crassa, ramosa, fibrosa, foris nigricans intus pallida, multis appendicibus involuta & implexa, saporis primum subdulcis inde amariuscule subadstringentis, odoris nullius.

Jungitur plantis epiphyllispermis, floribus muscosis & seminibus pulverulentis aversa foliorum parte adnatis, exiguis vesiculis per maturitatem in binas partes dissilientibus inclusis, foliis divisis.]

Filix utraque Θ suum fixum particulis terreis & viscidis inclusum habet, laudatur tanquam aperiens in affectu hypochondriaco aliisque morbis chronicis; In pellendo calculo & nephritide ut & in vermibus expellendis singularis habetur. Decoctum ejus super vermes effusum eos necat; quia oleosum est & vermibus aërem non concedit. Expressa mucago membris ambustis mire medetur.

Contra lumbricos datur in substantia, stimulatur & dulci sem. cinæ seu fanton. it. in morbis chronicis datur in decocto.

Vis plurima consistit in julis seu novellis germinibus.

℞. Rad. filic. osmund polypod. ana \mathfrak{z} ij herb. capill. \mathfrak{q} Mj. passul. corinth $\mathfrak{z}\beta$. Θ \mathfrak{q} ri $\mathfrak{z}\beta$. coq. ex ∇ communi, decocto calenti add. Epithym Mj. caryoph. arom. $\mathfrak{z}\beta$. f. apozema contra morbos chronicos, add. syr. capill. \mathfrak{q} is. q. f.

℞. Rad. Filic. foemin. \mathfrak{z} j \mathfrak{q} dulc. gr. x. f. pulv. cap. ex ∇ gramin. pro ij. dos. excipe melle & fac bolum.

OSMUN-

Πτέρις & πτέρων Græcis dicta ab alis avium, quarum speciem ejus folia in ramulis disposita referunt, Farn / Faren / Farn / Kraut / Wald-

Wald-Fahrn / Steirn-Fahren / FOUGERE

Est ex herbis quæ floribus carent & quarum fructus foliis innascuntur, cujusque folia ex aliis foliis componuntur costæ utrinque adhærescentibus in pinnulas seu foliola ad nervum ferme plerumque sectis. Accedit propria quædam facies. Cum duplex filix in usum potissimum veniat, altera mas *πλεῖς* simpliciter dicta, foemina altera *θηλυπλεῖς* & *νυμφαία πλεῖς* dicta, merito hic notatur quod curiose de utriusque semine annotavit magnus TOURNEFORTIUS in I. R. H. Filicis scilicet maris vulgaris fructus foliis innascuntur bino plerumque ordine pinnulis affixi clavi ope, altera parte retusi: detracta vel corrugata membrana quadam convexa, quæ ferri equini formam habet, sese oculis objicit numerosa congeries vesicularum ferme ovatarum annulo elastica vi donato munitarum, cujus contractione rumpuntur illæ seminaque fundunt minutissima. Filicis foeminae vero & aliarum specierum fructus seu vesiculæ ovatæ occurrunt in sinibus quibusdam, namque autumnno pinnularum margo plerumque producit incurvatur & complicatur

Filix ubique sylvis & neglectis incultisque: innascitur agris, testante Horatio dicente: Neglectis urenda Filix nascitur agris. Marcescit sub Hyemem, nova vere erumpunt folia tota æstate in vigore futura

Species usuales sunt sequentes

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis C. B. Pin. 357. Filix major & prior Trago sive ramosa repens I. B. 3. 735. filix foemina Dod. Pempt 462. Fougere femelle ou fougere commune &

Filix non ramosa dentata C. B. Pin 358. Filix vulgo mas dicta sive non ramosa I. B. 3. 735. Filix mas Dod. Pemp. 462. Fougere mâle.

Utriusque radix in usu, & iisdem viribus gaudent, quamvis quidam marem alii foeminam præferant. Colligi autem debet tempore autumnali: Radix hæc imprimis latis tineis enecandis inservit, ubi vel ad ʒj pro dosi adhibetur cum aqua mulsa, vel decoquitur, & decoctum exhibetur. Addi pro ratione circumstantiarum possunt purgantia Scammoneum, Helleborus niger aliave. Vis ejus splenetica à quibusdam quoque celebratur. Calculosis atque podagricis commendatur ejus decoctum. Subjectis frigidis filix censetur esse inimica, gravidis abortum procurare, & mulieribus sterilitatem

lilitatem inducere fertur. Externe folia ejus recentia in pileo vel capite gestata caput dolore afficere asserunt; alias ejus farina ulceribus humidis inspergitur. Tempore annonæ panis quandoque ex hujus radicis farina paratur, sed gustus admodum ingrati. Sunt qui pro laxanda alvo commendant decoctum ꝑj radicis filicis in duabus libris aquæ. Folia cimices abigere dicuntur. Quod si equus conciderit, nesciasque qua ægritudine laboret, tunc particulam hujus radicis linguæ ejus subjice eoque facto equus confestim utrimque dejiciet recrementa rursusque confurget, testante Trago. Ex filice incinerata parari vitra notissimum æque est ac illud quod agris inspergatur cinis filicis pro fœcundatione. Superstitiosum plane est, quod quidam nebulones de filicis semine deblaterant, quod scilicet una solstitiali nocte imprimis Divi I. BAPT. festum præcedente floreat eademque hora cum defloruit maturum in terram semen cadat, ideo nisi quispiam tunc adfuerit nec videri florem nec colligi semen posse. Hoc certum est semen adesse, ast vana sunt & nugæ quæ de hoc semine dem so genanten Fahr-samen / proponuntur. Curiosum est illud, quod in radice majore transversim & oblique dissecta mensibus præsertim Julio & Augusto collecta aquila biceps nigricans compareat, cui experientiæ (frustra contradicit Welschius se nunquam nisi sequentes numeros arithmeticos ci vel io reperisse asserens. Utrumque autem verum esse potest, numeri comparent in radicibus tenerioribus & horizontaliter discissis, Aquila autem in majoribus & oblique separatis conspicitur.

OSMUNDA.

Filix ramosa non dentata florida C. B. P. Filici analoga est, ast temperatior & blandior, fovens in mucagine nonnihil Θ is volatilis, quare specificè commendatur in rachitide.

Mucago ejus ad curandam herniam in pueris extra applicata approbatissimum remedium: Vis omnis consistit in julis & in radicis medulla.

℞. Jul. Osmund. coq. c. lacte, cape singulis diebus contra rachitidem.

℞. Osmund. medull. ℥iij. Cort. Winter. ℥iij. herb. capill. ♀ Mj. coq. ex ▽et vin. f. decoct. contra rachitidem.

RADICES PURGANTES.

Constantes particulari textura & figura, poris membranarum tum ventriculi & intestinorum, tum particularum sanguinem constituentium ē directo contraria, vehementes simul auram subtilem sanguini inpermiscibilem & hostilem.

SALE

FILIX FLORIDA, FILIX PALUSTRIS *Wasser - Farn / OSMONDE*
FOUGERE AQUATIQUE. Est plantæ genus floribus carens cujus fructus in
uvam quodammodo colliguntur. Fructus autem sunt capsulæ sphæ-
ricæ, quæ fibrarum contractione rumpuntur seminaque fundunt mi-
nutissima.

Osmunda vulgaris & palustris Tourn. I. R. H. cl. 16. S. 2. g. 1.
Osmunda regalis sive filix florida Park. Theat. 1038. Filix floribus
insignis I. B. 3. 736. Filix ramosa non dentata florida C. B. Pin. 357.
Filix palustris Dod. Pempt. 463.

Nascitur locis riguis ac palustribus ut ait I. BAUHINUS non raro
in fossis aquas habentibus, in humidis quoque sylvis. Hyeme
folia marcescunt radice restibili.

Fructum quidam pro flore habuerunt, ex radice longa nigrican-
teque præsertim in usum trahitur pars radicis media subcandida.

Præter vires filici communes laudatur imprimis tanquam vulne-
raria & cæsis, ruptis & ex alto delapsis summopere commendatur.
Sanguinem enim coagulatum dissolvere & foras expellere di-
citur.

SALE

SALE VOLATILI GAUDENTES

Asarum.

Cyclamen.

Hermodactyli.

Rhabarbarum.

Rhaponticum.

ASARUM.

[Est Asari C. B. P. radix tenuis, fibrosa, ex fusco rufescens, saporis acris nauseosi, cum aliquali adstrictione, odoris ad Nardum accedentis, unde & Nardus sylvestris appellatur.]

Asarum gaudet Θ e purgante acri, fixo potius quam volatili, & styptica terra, quod confirmat odor, sapor, modus exhibendi & præparandi, in recessu habet quandam vim adstrictoriam.

Datur in substantia à 3ß. ad 3j. & 3iij. movet vomitum & sedes. Vomitus autem volatilitatis, sedes fixitatis argumentum sunt. Datur in infuso & decocto à 3ij. ad 3iij. in extracto à 3j. ad gr. xxv. in infuso rarius vomitum, sedes vero frequentius movet, fortiori igne coctum vel totum vim purgativam amittit, ac diureticum & uterinum fit.

Melancholicis ex asaro pessima accidunt symptomata, serosis & biliosis plurimum contulisse experientia probat: hinc in hydrope, hydrocephalo, ictero, febribus intermittentibus conducit. Riverius & Timæus extollunt in doloribus ischiaticis, coxæ, alii vero in asthmate tanquam specificum remedium. Ob odoris nardini graveolentiam vir-

tutis uterinæ indicem, Menses, foetum, lochia pellit & promovet. Pro scopo purgante datur ʒj. pro Utero movendo in minori quantitate gr. viij. ad ʒß.

Toti huic radici non est confidendum, in quibusdam officinis planta extat insipida, plures non purgavit radix etiam in sylvestribus proveniens, contra in quibusdam adeo vehementer, ut ultra ʒi. non liceat assumere.

Conjungitur, stimulatur, corrigitur variis medicamentis appropriatis, uterinis & thoracicis additur pro stimulo.

℞. Rad. galang. ʒß. asari ʒß. Θ ʒri gr. v. l. vj. M. f. pulv. capiendus ex oxymell. ʒj.

℞. Rad. asari ʒij. gentian. ʒß. centaur. min. pug. j. coq. leniter cum Cerevis. ex hoc decocto cape Θ absynth. ʒj. contra febres intermittentes, præprimis contra quartanam.

℞. Rad. asari ʒj. calam. arom. ʒß. curcum. ʒj. caryoph. ʒß. f. infusum cum vino antiictericum & hydropicum.

℞. Castor. ʒß. borrac. Ven. gr. xv. rad. asari. gr. v. M. f. pulv. excipiendus conserva florum stœchad. vel quocunque syrupo specifico, f. bolus in Obstructionibus Menstrui.

CY-

Ἀσάρον à *σάρω* orno & particula privativa α derivatur, eo quod olim in coronas non assumebatur. Vocatur alias ASARA BACCARA, BACCARIS, NARDUS SYLVESTRIS & NARDUS RUSTICA ob odorem, VULGAGO juxta Macri Æmilii versum

Est asaron Græcis Vulgago dicta Latinis, Hasel. Wurk / CABARET OREILLE D'HOMME, OREILLETTE, RONDELLE, GIRARD ROUSSIN, NARD SAUVAGE.

Est planta flore flammeo ex calyce tripartito surgente, cujus calycis

cis posterior pars abit in fructum ut plurimum angulatum in sex loculamenta divisum seminibusque foetum oblongis.

Asarum C. B. Pin 197. Dod. Pempt 358. 1. B. 3. 548.

Amat montium opaca atque umbrosa loca & plerumque sub corylis in Germania, Gallia &c. invenitur. Herba perpetuo viret, Aprili & Majo interdum tamen & autumnio flores & nova etiam folia promit.

In usu sunt ex Asaro radix & folia hederæ provectioris ætatis similia, rotunda, pingua & læto virore splendentia. Colligitur asarum nunc vere nunc sub finem Augusti initiumque Septembris.

Juxta ACADEMIAM REGIAM SCIENTIARUM analysi Chymica Spiritus Urinosi volatilis haud parum prodit, plurimum olei & nonnihil liquoris imprægnati copioso acido & terreo.

In quartana veluti panacæa habetur si scilicet ante paroxysmum ad ʒss ad ʒj exhibeatur. Dosis foliorum n. 6. 7. 8. 9. in infuso decocto. In viscidis crassis lentisque humoribus pulmoni inhaerentibus conducit. Interdum folia infunduntur & liquor per expressionem separatus pro purgante per inferiora & superiora usurpatur. Folia contusa pulsibus imposita febrem curare dicuntur. Eadem ut & radices in lixivio decoquuntur ad confortandum cerebrum & memoriam, ad nigredinem capillis conciliandam & alopeciam curandam commendantur. Sunt qui dicunt lepores & alias feras se esse esu Asari curare.

OFFICINÆ ASSERVANT

Aquam asari destillatam *Hasel-Wurz-Wasser* / *Eau de Cabaret ou d'Oreillette*, sed non magni est momenti aut usus: olim etiam reperiabatur Electuarium diasarum FERNELII ad ʒj ad ʒss dari solitum. Sed hodie exoluit.

CYCLAMEN.

Est cyclaminis orbiculato folio inferne purpurascente C. B. P. radix tuberosa, crassa, orbiculata, carnosæ, foris nigra, intus albicans, saporis acris pungitivi exurentis, ingrati, odoris nullius. Constat particulis Ænis volatilibus, quæ

quæ avolant cum senescit, cum terrestribus, quibus includuntur cathartîcis.

Planta est tricapsularis, pentapetala, (petalis ad ungues junctis) seminibus angulosis in capsulis rotundis.

Radix recens est valde acris, ubi vero exsiccata, nulla acredo percipitur. Purgat cum inflammatione Ventriculi, faucium & ani, ubi nulla purgantia in hydrope effectum dedere usurpatur.

Particulis purgantibus vehementioribus gaudet quam asarum, & proinde robustioribus datur pro purgando sero & bile. Ob sui penetrantiam succus abdomini hydropicorum applicatus aquas educit, unde unguentum de arthanita ingreditur, quod se-
ntibus stimulatur i. ʒ. colocynth. per infusionem facto.

℞. Unguent. d. arthanit. ʒj. ʒ. colocynth. q. v. inunge totam abdominis regionem. ʒ. ʒ. ex granis Tilli, quæ suppetunt ʒ. acerrimum paucissimis notum, penes Medicos Indos secretissimum. Additur quoque Clysteribus ad excitandos soporosos. Quidam ad suppositoria recipiunt cum aloë, ad promovendum fluxum hæmorrhoidum.

Licet cum violentia summa expurget humores, tamen tardioris est operationis, propter particulas terrestres ut propterea raro in usum trahatur. Stimulatur asaro, diagrydio, ꝑro. Plebeii robusti capiunt ejus substantiam ad ʒj. pro decocto ʒʒ. Sed tutior modus exhibendi est extracto facto cum — vini vel aceto à ʒj. ad gr. xxv. xxx.

℞. Extr. cyclam. ʒj. ʒ. ꝑri gr. vij. vel ʒʒ. diagryd. gr. v. oxymell. q. s. f. bolus. in hydrope, ubi alvus purganda.

℞. Extr. Cycl. ʒʒ. oxym. ʒij. corrigitur ∇ cinam. ʒʒ. f. haustus in hydrope.

κυκλάμινος, κυκλάμινον, CYCLAMINUS ob radicem & folia orbiculata, κισσάνθεμον, κυσσόφυλλον TUBER TERRÆ, RAPUM TERRÆ, UMBILICUS TERRÆ, TERRÆ MALUM, RAPUM PORCINUM, PANIS PORCINUS, porci enim hanc radicem comedunt, PANIS FAUNI, ARTHANITA Zicflamen / Schwein-Brod / Sau-Brod / Erdscheiben / Erd-rüben. PAIN DE POURCEAU.

Est plantæ genus flore monopetalo rotato globoso in quinque partes sursum revolutas secto, cujus pistillum abit in fructum fere globosum membranaceum bifariam dehiscens seminibus sætum ut plurimum oblongis & angulatis placentæ affixis.

Variæ etiam hujus plantæ sunt species, in usu autem est præsertim sequens. Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens C. B. Pin. 308. Cyclaminus folio rotundiore vulgatiore I. B. 3. 551. Cyclaminus orbicularis rotundifolius Dod. pempt. 337.

In montibus Rheticis, in Pannonia & Austria multum reperitur. Apud nos colitur in hortis, floret Junio & Julio Augusto & Septembri.

In usu est radix colligenda Autumno. Vix aliter usurpatur quam in *unguento de Arthanita* quod vocatur Germanice *Cyclamen-Salb-onguent de pain de pourcean*. Unguentum hoc egregium quoque est resolvens ad infarctus & tumores schirrhosos viscerum.

HERMODACTYLI.

Est Colchici radice ficcata alba, C. B. P. radix rotunda, ruberosa, cordis figura fere conspicua, avellanæ magnitudine, compressa, albida, saporis dum recens acerrimi, dum annosa subdulcis farinacei paulum viscosi vel lenti, odoris nullius.

Radix non nisi ficcata apud nos habetur.

Hermodactylus recens sem volatilem purgantem in farinacea mollecula substantia fovens, pituitam & serum per vomitum & alvum purgat, ficcatus vero vel tostus, & proinde sibus volatilibus orbatus, propter annositatem sæpe omni virtute cathartica orbatus est.

In Ægypto ob blandam viscidam farinaceam substantiam cedit, præsertim feminis emaciatis in nutrimentum, veluti ari radix & colocasia [conf. Prosp. Alpin. de plant. exotic. l. 2. c. 18.]

In oriente datur recens cum Zinzibere, sumunt hermodact. 3ß. Zinziber. ʒß. Zinziber additur propter excrementitiam ejus viscositatem tormina caussantem. Omnes Medici Indorum solo Zinzibere purgantia sua corrigunt.

Siccatus qualis in officinis prostat, non nisi cum cæteris purgantibus fortioribus præscribitur, contra arthritidem & podagram.

Hermodactylus commendatur in gutta serena tanquam specificum, seq. modo.

℞. Hermod. 3ß. exhibe ex ∇ fœnicul. ad gutt. serenam, quæ fit à nervo optico obstructo vel compresso à materia viscida.

℞. Hermod. ʒj. turbith. gialap. ana gr. viij. Diagr. gr. iiij. Zinz. ʒß. M. f. pulv. ad podagram, ubi alvus est adstrictissima.

RHA-

Ἡρμόδακτυλος quasi Mercurii digitus *Hermodactilen* HERMODACTE.

Est species colchici, scilicet *Colchicum* radice siccata alba C. B.

Pin: 67. *Colchicum minus* malignum sive *Hermodactylus* officinarum L. B. 2. 658. *Hermodactylus legitimus* Dod. Pempt. 461.

Hæc Radix quæ a nonnullis inprimis Pometo male pro fructu habetur, a quibusdam rejicitur, quoniam colchici venenati radice adulterari potest, alii tanquam remedium drasticum & robustis corporibus tantum conveniens habent, ast celeberrimus WEDELIUS recte *Hermodactylos* inter leniora & mitiora purgantia recenset, cum non sint acres nec mordaces sed pulverem farinaceum largientes.

Notæ bonitatis *Hermodactyli* sequenti disticho comprehenduntur.

Lam.

*Laus tibi de jure datur Hermodactyle clare,
Ac solidus si sis, albi cui signa coloris.*

Nigredo atque rubedo ut & caries maxime in his radicibus vituperatur. In Lue Venerea multum à quibusdam commendatur. In affectibus serosis laudatur, An titulum animæ articulorum nervosarumque partium mereatur, multi dubitare volunt. Frequentius in infusis & decoctis quam in substantia datur. In infusis autem adhibetur ad $\text{z}ij. \text{z}\beta$ &c. Olim prostabant in Officinis *Pillulae de Hermodactylis*, sed exoluerunt æque ac *electuarium caryocostinum* cujus ingrediens quoque constituunt Hermodactyli.

RHABARBARUM.

Est lapathi maximi Sinensis radix prægrandis, oblonga, tuberosa, circularibus zonis rugosa, tuberibusque inæqualis, communiter ponderosa, foris fusca intus crocea, non-nihil fungosa, saporis amaricantis & lenta viscedine subadstringentis, nauseosi odoris pontici debilis.

Constat Θ e purgante volatili, pauca resina, & terrâ, hinc ob Θ volatile pinguedine quasi temperatum blande purgat bilem & pituitam, & specificum est in ictero, & affectionibus à bile oriundis.

Vim purgantem in volatilitate consistere exinde patet. 1. quia extractum cum ∇ factum purgat. 2. quod ficcatum ætate omnem vim purgantem amittit & acredinem. 3. quod aqua ejus destillata est nauseosa, acris & purgativa, quod jam Borrichius in act. Hafn. observavit. 4. ejus odore solo quidam ad sedes moventur 5. per coctionem amittit purgantem virtutem.

Subducit quoque copiose Urinam, eamque bene coloratam & pinguem reddit. Ob resinam blandam anodynum est & balsamicum in vulneribus, suas operationes cum vi anodyna absolvit, ob terram austeram relinquit in recessu vim adstringentem.

Tota sui substantia singulare antidysentericum infrin-
gens, purgans & mitigans acidum, relinquens in recessu
vim anodynam & adstrictoriam.

Conveniens est Medicina Melancholicis, quod acidam
ventriculi cruditatem tollit, nam quando acidum affundi-
tur rhabarbaro effervescit, ut & delapsis ab alto, quod san-
guinem congrumatum dissolvit.

[Rhabarbari elogium & de singulari ejus virtute contra
hydropem vid. ap. Scholz. Epist. med. xv. p. m. 13.]

Conducit in gonorrhæa, urinæ ardorem temperando,
malignitatem expellendo, fluxumque sistendo. Tostum &
volatilitate orbatum pulchre absorbet & adstringit, hinc in
gonorrhæa, hæmorrhagiis, aliisque fluxibus sistendis felici-
ter adhibetur.

Vertiginosis aliquando nocet, [conf. Joh. Mauric.
Hoff. C. N. C. Dec. III. an. 2. obs. 208. de vertigine à rha-
barbaro] quia ejus fumus & ponticus odor cerebrum petit
& turbat.

Crudum datur ad ʒj. ʒiʒ. in infuso ad ʒʒ. Ob debilem
purgandi vim jungitur & stimulatur variis. Corrigitur ejus
acredo & amarities refrigerantibus aqueis, v. c. ▽ Cichor.
Endiv. Plantag. sero lactis, succo violarum, rosarum. To-
stum seu fortiori Δe coctum & rursus siccatum datur ad
ʒj.

℞. Rhabarb. ʒj. ⊖ ꝓr. gr. x. vel. x. i. M. f. pulv. in icte-
ro ex vino calido sumendus.

℞. Rhabarb. ʒj. Elect. ē succ. rosar. ʒiij. ⊖ absynth.
Crem. ꝓri ana ʒʒ. syr. d. cich. c. rhab. q. s. M. f. bolus in
omnibus affectibus biliosis exhibendus.

℞. Rhab. ʒʒ. ⊖ absynth. ʒʒ. N. M. ʒʒ. caryoph. g. ij. l.
iij. M. f. pulv. exhib. ex ▽ Cinam. pro purgante in febri-
bus cum diarrhæa.

Rhab. ʒij. fl. ros. rubr. p. ij. infund. in feri lactis f. q. pone in digest. per aliquot horas R. Colatur ʒiij. add. syr. ros. sol. ʒß. M. f. pot. laxans in dysenteria benigna.

R. Rhab. ʒß. Laud. op. g. j. additur propter tormina, Conserv. ros. r. ʒj. syr. rosar. q. f. f. bolus in Dysenteria conveniens.

R. Rhab. ʒß. extr. tormentill. inspiss. gr. xv. terr. figill. l. C. C. præp. l. unicorn. fossil. ʒß. theriac. ʒj. syr. ros. q. f. f. bolus in Dysenteria maligna.

R. Rhab. tost ʒj. ʘ Nucist. expr. ʒß Corall. r. præpar. ʒj. Laud. op. gr. j. M. f. pulv. excipiendus si placet conserv. rosar. r. f. nymph f. bolus in quocunque fluxu sistendo.

R. Rhab. tost. ʒj. N. M. tost. sacch. ʒni ana ʒj. off. sep. præp. ʒß. resin. thereb. q. f. f. pil. in gonorrhæa simplici & pollutione nocturna ex debilitate, add. terr. aluminos. dulc. ʒj. ad malignitatem expellendam adde ʒ virid. quantum videtur, nempe pro qualibet dosi gr. iij. ad v. in principio, in progressu vero singulis diebus gr. j. sub finem gonorrhææ, si fluxus non vult sisti add. borrac calcinat. ʒj. & cum bals. peruv. f. pil.

R. Rhab. resid. ex tinct. ʒß. N. M. tost. ʒß. Laud. op. gr. j. cons. ros. ʘlat. ʒj. M. f. bol. adstringens.

R. Rhab. ʒß. thereb. ʒj. sacch. ʒ ʒß. ʒ virid. gr. j. vel ubi major malignitas adest gr. iij. cum vitello ovi & ∇ appropriata haustus fiat contra gonorrhæam.

RHA-

R H A quasi optima radix, RHEUM, nomen Rhabarbari videtur obtinuisse non tam quod in Barbaria aut circa flumen Rha quod hodie Volga audit, quam quod a Sinensibus in Indiam inde per Barbaricum Sinum aliasque regiones ad nos adferri solebat. Sic quia per Alexandriam Venetias apportabatur, R H A B A R B A R U M A L E X -

AN-

ANDRINUM quoque vocabatur. *Rhabarbara* / RHUBARBE.

De planta quæ hanc admodum u ualem radicem fert, multum disputatum fuit communia nomina sunt. *Rhabarbarum* Officinarum C. B. Pin. 116. & I. B. 2. 98. *Rhabarbarum* genuinum Officinarum Parck. *Rhabarbarum* lanuginosum sive *Lapathum* Chinense longifolium Munt. de herb. Brit. 169.

Ultimus citatus Autor se hanc plantam in Belgio excoluisse florentemque obtinuisse asserit, possidentem flores pallido colore cæruleo non ingrato donatos forma & magnitudine *Leucoidii* arborescentis floribus non valde dissimiles quinque plerumque quamvis interdum quatuor quoque foliolis subrotundis constantes, odore admodum ingratos, cum foliis manus unius longitudinem aut paulo plus continentibus, inferiore parte angustis in medio latioribus & in anteriore parte latissimis ac in mucronem plane rotundum desinentibus, molli lanugine in margine obductis, planis, colore viridi superiori parte inferiori vero pallidiori præditis, sursum tendentibus, anteriori tamen parte *Struthio* *Camelii* plumarum instar parum deorsum se incurvantibus, crassis, gustu amaris & tactu mollibus cum tempore marcescentibus flavescentibusque & in terram decidentibus

Radix est longæva crassa ferme rotunda parum ultra semipedem longa fibris quibusdam brevibus ac crassiusculis undique enatis onusta, colore obscuro externe fusco vel quasi è rubedine nigrescente, interne vero grato luteo, rubris nonnihil striis venuste permixto (quæ tamen radice postea marcescente & exsiccata emortuæ conspiciuntur) belle donata, Natura liquore plena, interneque succum ex parte viscosum è rubedine flavescentem possidente oreve commansa admodum amara nec non gustu ingrata.

Coincidit cum hac descriptione id quod Boimus in FLORA SINICA scribit, & KIRCHERUS IN CHINA ILLUSTRATA de hac planta differit, qui Jesuita porro ait, illam etiam si in universa Sina nascatur, in Provinciis tamen Su Civem Xensi atque Socieu Civitate ad muros Sinarum proxima uberius provenire, addit insuper quod si quis frustra, in quæ diffecatur radix, statim humida ad siccandum appenderet, experientia docuerit unctuosum illum humorem mox evaporare, radicemque levissimam remanere adeoque omnem virtutem deperdere. Ideo periti recentis *Rhabarbari* frustra primo in oblongis, & quant mensis & qualibet die tribus aut quatuor vicibus

ea revolvunt, ut per industriam succus incorporetur frustis & contipatus maneat, tum vero quatuor dierum spatio concieto humore transactis per frusta illa funiculis appensa vento exponunt, loco tamen umbroso, ne radiis solaribus contingantur. Effodiendo Rheubarbaro hybernium tempus est optimum antequam viridia folia incipiant pullulare, quod scilicet eo tempore circa mensis Maji initium succus & virtus unita & collecta sit. Quod si vero radix effodiatur æstate aut illo tempore quo folia viridia producit, uti nec dum hoc tempore maturuit flavoque illo succo & rubris venis caret, ita ad perfectionem Rheubarbari hyeme effossi miminè pertingit. Ex septem libris recentis Rhabarbari sicci, vix una vel altera libra obtinetur.

In China itaque præsertim Rhabarbarum provenire constat, unde in Indiam, Persiam, Ormuz, Barbariam, Turciam & hinc in Europam defertur.

Eligendum, juxta TILINGII RHABARBAROLOGIAM, Rhabarbarum quod rarum existit, & minorem stypticitatem habet, quod in mandendo glutinosum est cum levi tamen adstrictione, & croceæ tincturæ, cum varietate coloris dilute ex carneo colore rubens: commendatur etiam quod est grave cum raritate sua & in quo etiam in confractis frustis invenitur disgregatio ex ruffo & glauco. Frustis majoribus cum difficilius siccentur & sæpius intus putrescant non fidendum, quandoque enim superficies exterior elegans, interior vero putrida existit atque cariosa. Adeoque sæpius frusta mediocria sunt meliora. Hinc etiam est, quod majori pretio veniat Rhabarbarum, si permissum est frusta majora diffringere. Illud quod itinere terrestri advehitur præfertur illi tanquam citius corruptibili quod navibus adfertur. Hoc jam, RHABARBARUM ORIENTALE, Levantisch Guth/ quam maxime in usum debet trahi, interim prostat etiam RHABARBARUM MOSCOVITICUM Moscovitisch Guth/ sed cortice crasso lignoso colore obscuro, ponderosum, humidum & corrumpi proclive, adeoque, ut bene TILINGIUS ait, deterioris notæ est. Interim tamen a Lucripetis Orientali sæpissime, si non semper substituitur, attamen commiscetur, aut saltem ad medicamina exinde paranda usurpatur.

Quod virtutes attinet prolixissime & vix non ad hyperbolen usque illas describit jam citatus author, illud vix non in omnibus morbis

bis prodesse recensens. Purgat in genere omnes humores, & utilissime ubicunque laxandum est adhibetur.

Hepati dicatum est remedium ejusque anima vita pater & Theriaca audit. Sequentes de eo circumferuntur versiculi:

*Est Rhabarbaricum radix pretiosior auro,
Quæ purgat Cholera pblegmata crassa quoque,
Hanc jecoris vitam rerum discere periti,
Quod juvat ictericos, quod juvat Hydropicos.*

Non solummodo autem purgat sed & alterat atque roborat. Alterat autem in minori dosi datum. Sunt qui ad roborandum ventriculum & arcendos morbos quos bilis & imprimis ira excitare potest continuo Rhabarbarum mandunt, & commune admodum est post iram contractam assumere aliquid Rhabarbari. Adhibetur etiam in diarrhœis tum laxandi tum adstringendi scopo. Tonicum est nobilissimum & in multis morbis utile. Stranguria laborantibus ad hæmorrhoides pronis ut & gravidis &c. noxium esse quidam asserunt. Cum amaricet anthelminticum quoque egregium constituit. Quod de colore, quem Urinæ conciliat, ab authore monetur bene notandum Practico Tyroni, ne hallucinetur deinde in Urinæ examine.

Ultra ʒj ob levitatem vix ascendimus: inter stimulantia quæ Rhabaro adduntur eminent tartarea & imprimis Tartarus solubilis.

OFFICINÆ NOSTRATES SEQUENTIA ASSERVANT PRÆPARATA

Rhabarbarum tostum geröste Rhabarbara / Rhubarbe torrefiée; eum autem in finem torrefactio instituitur ut virtus adaugeatur adstringens. Quidam tamen hanc tostionem magni non faciunt.

Extractum Rhabarbari simplex Rhabarbara-Extract / Extrait de Rhubarbe, cujus dosi ad gr. xv. pro scopo laxandi, sed lente & tarde operatur. Hinc præferunt.

Extractum Rhabarbari compositum, Extrait de Rhubarbe composé cujus dosi ʒss. ʒj & ultra

Syrupus de Chichorio cum Rhabarbaro laxierender Wegwart-Syrup mit Rhabarbara / Syrop de Chicorée laxatif avec Rhubarbe. Laxat & bilem evacuare creditur, ipsis etiam infantibus exhiberi potest ad humores vitiosos educendos, in ipsis etiam torminibus infantum & exinde ortis convulsionibus epilepticis ad scorias biliosas acres educendas. Dosis à ʒij. ad ʒij.

Tinctura

Tinctura sive anima Rhabarbari Rhabarbara Tinctur / Teinture de Rhubarbe. Laxat, sanguinem mundificat & obstructions mesenterii aliorumque viscerum reserat, conducit in Cachexia Hydropes lctero, &c. Dosis est ad ℥j. ʒi. cochlear dimidium ad integrum & ultra.

Elyxir proprietatis Rhabarbarinum Exierendes. Magen. Elyxir / Elyxir de propriété avec Rhubarbe. Ab elixyrio dulci discrepat quod ratione menstrui mitius sit & in majori dosi assumi queat, perque inferiora purget ob Rhabarbarum: datur ad drachmas duas usque ad unciam semis in vehiculo.

Cæterum plures alias compositiones Rhabarbarum quoque ingreditur.

Circa formulas ab authore præscriptas nota quod bolus primus nimis magnus sit.

℞. Rhabarb. el. ʒß. ꝯr. Solub. ℥j. Msc. f. pulv. laxans è quolibet vehiculo sumendus

RHAPONTICUM.

Est Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis C. B. P. Est Lapathi Thracici maximi radix crassa, oblonga ramosa, bracchiata, foris fusca, intus crocea laxa & rara, transversim secta spiras ostendens, saporis adstringentis cum levi quadam acredine & lentore, odoris pontici debilis.

Rhabarbarum & Rhaponticum consimiles flores & semina habent, & facie plantarum nihil differunt, sed tantum ratione radice, idcirco præsumitur unam esse plantam, diversitas radice oriri potest a solo.

Constat particulis ☿inis purgantibus sed debilibus valde in Thracico, potentioribus in Chinensi, inclusis mucilaginosi balsamicis & terrestribus

Rhabarbaro mitius in purgando, potèntius vero in adstringendo: laudatur præterea ob blandum ☿ incidens in orthopnoea.

Q

Datur

Datur in substantia ad ʒj in decocto & infuso ad ʒj.

℞. Rhapont. Ocul. ℥ ana ʒj sperm. Cet. gr. viij Θ vol. C.
C. ʒj M. f. pulv. ad sanguinem congrumatum resolvendum,
ubi multo præstantius quam rhabarbarum propter levem
dulcedinem.

℞. Rhapont. ʒiβ. helen. ir. florent. ana ʒj imperat. ʒβ gly-
cyrrh. ʒiij fol. hyslop. marrub. ana Mj. sem. foenic. anis. ana ʒij
f. decoct. ex ∇ colatur. add. oxym. scyllitic. q. s. ut & ~ asth-
mat. q. s. f. apozema in gravi & difficili respiratione.

PUR.

Rhaponticæ / RHAPONTIQUE quoniam ad Pontum na-
scitur.

Intelligitur Rhaponticum verum non Rhaponticum vulgare seu
Radix centaurii majoris folio Helenii incano, quæ falso huic nostro
substituatur.

Ratione originis quoad partem consentit cum authore COME-
LINUS, qui etiam asserit Rhaponticum verum & Rhabarbarum esse
unam eandemque plantam, partem crassam esse Rhabarbarum, in-
feriorem vero minusque crassam esse Rhaponticum asserens. Dis-
sentit TOURNEFORTIUS & peculiarem plantam esse asserit, quam
etiam in hortis jam colimus & quæ a PROSPERO ALPINO de-
scribitur.

Est autem planta flore monopetalo campaniformi & multifido,
ex cujus fundo pistillum surgit, quod deinde crassescit semine foetum
triangularem capsulæ triangulari pariter per maturitatem ita affixo, ut ab
ipsa divelli nequeat.

Rhabarbarum forte Dioscoridis & Antiquorum Tourn. J. R. H.
cl. 1. S. 4 g. 1. Rhaponticum Prosper. Alpin. Exot. 187. in Thra-
ciæ monte Rhodope & pluribus aliis Scythiæ locis reperiri asserit Al-
pinus.

Dignoscitur a Rhabarbaro tum facie, tum imprimis quod lento-
rem glutinosum in ore relinquat majorem quam Rhabarbarum.

Laudatur

Laudatur in affectibus chronicis ubi vi absterfiva acidum vitiosum corrigit & simul vi adstrictoria viscerum tonum conservat. Rarius autem in usum trahitur. Ingreditur Theriacam.

PURGANTIA SALE FIXO RESINÆ INCLUSO CONSTANTIA

Gialappa.
Mechoacanna.
Turbith.

GIALAPPA.

Est convolvuli Mexicani Jalappa dicti radix oblonga, crassa, mechoacanna nigricantior [unde & Mechocanna nigra dicitur] & circulosior, sapore acuto incidente, muscoso, [nauseoso] odore nullo, scissa in taleolas ad nos adfertur.

Planta est monopetala seminibus angulosis in capitulis subrotundis, ut & Mechocanna.

Gialappa quamvis universaliter quosvis humores purgat tuto & citra ullam violentiam, ut & pueris exhiberi possit, tamen serum & aquas specificè expurgat. Ejus vis purgans consistit in resina, cui Θ ia inseparabili nexu sociata, eaque quasi temperata. hinc resina & extractum frequenter exhibetur.

Substantia datur à \mathfrak{z} j ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. resina à gr. vij. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. extractum à gr. xv. ad \mathfrak{z} j.

Tinctura Galappæ prostat in officinis Batavis, sed quia quantitatem \sim vini affusam nescimus non tuto præscribitur.

Gialappa in substantia multo præstantior est in hydropes quam

quam resina, & extractum [Borellus Cent. 2. obs. 13. appellat arcanum in hydrope] alias extractum mitius ipsa resina, quia Θ ia jam in eo sunt dissoluta.

Semper cum aliis jungitur purgantibus, [per se sola tuto potest exhiberi] salibus, morbo appropriatis, corrigentibus, adjuvantibus & stimulantibus, ut Θ e \square ri.

\mathcal{R} . Galap. gr. xv, Crem. \square ri gr. x. diagryd. gr. v. $\circ\circ$ foenic. gt. ij. M. f. pulv. purgans catholicus.

\mathcal{R} . Galap. gr. xv. diagryd. gr. v. \bigcirc tr. depur. gr. vij $\circ\circ$ cinam. gt. j. M. f. p. in alvi adstrictione.

\mathcal{R} . Galap. gr. xv. φ dulc. \mathcal{B} diagryd. vel troch. alhand. gr. iij. $\circ\circ$ junip. gt. ij. M. f. p. purgans in hydrope.

\mathcal{R} . Galap. 3j diagryd. 3 \mathcal{B} . Caryoph. arom. Zinz. ana \mathcal{B} . gumm. amoniac. q. f. in aceto vel ∇ Cinam. sol. f. pil. uterinæ ad 3j propinandæ.

\mathcal{R} . Resin. galap. gr. vij. diagryd gr. iij φ dulc. gr. x. \square r \bigcirc lat. gr. vij. M. f. pulv. vel cum conserv. ros. pallid f. bolus.

\mathcal{R} . Extr. Galap. 3j troch. alhand. gr. iij. $\circ\circ$ cinam gt. j. M. f. pil. deaurentur, ad usum Cephalicum, vel cum conserva florum tunicæ f. bolus.

ME.

GIALAPPA vocatur quoque JALAPPA, JALAPPIUM, BRYONIA INDICA OCCIDENTALIS, SOLANUM MEXIOCANUM a foliorum cum foliis Solani similitudine, FLOS MEXIOCANUS a loco natali, MIRABILIS PERUVIANA propter admirabilem florum in eadem stirpe varietatem. JASMINUM INDICUM ET MEXICANUM Jalappa / Schweiger. Hossen a floris convolutione. JALAP. BELLE DE NUIT.

Est plantæ genus flore monopetalo infundibuliformi plerumque leviter inciso, qui gemino calyce donatur, altero a quo involvi, altero vero cui insidere solet, is autem deinde abit in fructum subrotundum semine foetum ejusdem formæ. Usualis vocatur

Jalappa

Jalapa officinarum fructu rugoso Tourn. J. R. H. cl. 2. S. 3. g. f. Bryonia Mechoacanna nigricans C. B. Prod. 135. Convolvulus Americanus Jalapium dictus Raji Hist. 724. Floret ut reliquæ species Julio & Augusto. In usu est sola radix quam præstat ex America petere, cum, si apud nos colatur, multum de virtute purgante amittat.

Optima jalappa est exterius nigricans, interius ob copiosam resinam striis orbicularibus cepearum fere in morem hinc inde discurrentem magis rufescens, & si igni admoveatur flammam concipiens: dum teritur in mortario atomis suis nares ferit & sternutationem ciet, quod ut præcaveatur, aliquid aquæ aspergi potest. ROLFINGIUS illam tanti facit, ut pronunciet, quod, sicuti juxta PARACELSUM, quartam Pharmacopolii partem absolvat, Vitriolum, jalappæ tres reliquæ partes attribuendæ veniant.

Solam dari posse experientia constat & quidem dosis ejus est ad ℥j. ʒß & quandoque ad ℥ij. Infantibus exhibetur ad gr. ij. iij. v. pro numero annorum.

Inter salina, quæ adduntur, eminent tartarea, cremor & crystalli Tartari, & imprimis Tartarus solubilis seu Sal vegetabile, quod etiam in vehiculo frigido dissolvitur, secus ac Crystalli Tartari. Cum fructu quoque junguntur Nitrosa, Nitrum fixum, Nitrum antimoniatum &c. sed hæc minori adduntur dosi, cum Tartarea vel in æquali vel in dimidiata addantur quantitate.

Hoc notari merito debet quod infantes majorem Jalappæ dosim respectivo ferant, quam adulti, quodque infantes post assumptam Gialappam placide requiescant, quasi anodynum sumsisent, uti se hoc observasse WEDELIUS perhibet. Olea quoque destillata & Elæosacchara, modo caute procedamus, addi possunt.

VARIA EX GIALAPPA IN OFFICINIS PROSTANT NOSTRATIBUS REMEDIA PRÆPARATA, IN PHARMACOPOEA QUOQUE NOSTRATE DESCRIPTA.

Adest *Tinctura Gialappæ Jalappen*, *Tinctur Teinture de Jalap*, conducens in affectibus a colluvie serosa ortis, Hydrope, Leucophlegmatia, œdemate, affectibusque soporosis; dosis ad ʒj. ad ʒiß. pro ratione circumstantiarum. Drachma Spiritus Vini continet resinæ Gialappæ gr. viiß.

Deinde communissimum est sic dictum *Magisterium Gialappæ & Resina Gialappæ Jalappen-Harkl*, *Resine ou Magistere de Jalap*. Quæ

in rei veritate unum idemque sunt. Utrumque remedium paratur cum Spiritu Vini alcoholisato extractionem instituendo. Quando jam spiritus vel evaporetur vel exinde destillando abstrahatur *Resina* remanebit; quando autem solutioni tinctæ aqua instillatur, *Magisterium* ad fundum præcipitabitur. Egregium hæc resina est purgans, & adhibetur vel per se in pilulis, præsertim in subjectis phlegmaticis humidiorisque constitutionis; vel etiam dissolvitur in spirituosissimis liquoribus, vel emulsiones exinde parantur, vel etiam aliis medicamentorum formulis immiscetur. Dosis Resinæ est a gr. iv. ad xij. usque ad grana xvij. ulterius vix est ascendendum. Aliis purgantibus loco stimuli ad aliquot grana additur.

℞. Resin. Gialap. gr. xj. cum Spiritu Vini ꝑ pil. pondere grani unius. Hæ pilulæ pro dosi assumi possunt: notandum autem, id quod in omnibus resinosis etiam observandum, ne statim post assumptionem harum pilularum vehiculum aqueum hauriatur, alias facile Ventriculi parietibus adhærescunt, torminaque immania & hypercatharsin excitare possunt.

℞. Resin. Gialap. gr. viij. &c. Olei dest. cinam. gtt. j. tere optime in — Ceras. nigr. rect. 3j. aut altera addendo sub finem pro edulcoratione Syrup. cort. Citr. 3ß. Msc. pro dosi.

℞. — Ceras. nigr. 3ß. Resin. Gialap. 3ß & Syrup. ceras. nigr. 3ß. Msc. igitur *Purgier-Ratafia*.

℞. — Anis. 3ß. Resin. Gialap. gr. xij. Julep. viol. 3ß. Msc. pro dosi.

Pro eodem scopo in dicta Pharmacopœa prostat *Elixir Citri purgans purgierendes Citronen-Elixir / Elixir de Citron-Purgatif*, quod gratum humidioris & robustioris constitutionis hominibus, qui alias remediorum formulas averfantur, existit remedium, & ad 3j. & paulo ultra pro ratione circumstantiarum exhiberi potest. Drachmæ Spiritus respondent grana x. resinæ Gialappæ.

Mentio hac occasione quoque facienda apud nos usualis essentia, quæ vocatur *Essentia Aromatica laxativa, Gewürkte Laxier-Essenz / Essence Aromatique laxative*; purgat egregie, datur ad guttas decem, viginti, ad drachmam ad ʒij. Unciæ essentia respondent scrupuli duo hellebori nigri & gialappæ & scrupulus unus scammoniei.

E resina gialappæ parantur quoque egregiæ emulsiones, eo præsertim in casu ubi Spiritu Vini uti non licet. Solvitur autem in vehiculo

eulo aqueo vel terendo cum amygdalis, nucleis pineis aut seminibus melonum excorticatis, vel solvendo in vitello ovi, alias enim resinæ menstruis aqueis jungi nequeunt.

℞. Resin. Jalap. cum nucleis pineis optime trita ʒss. ▽ flor. acac. aut alterius ʒij. vel ʒss f. l. a. emulsio, edulcoranda sacchari quantitate sufficiente.

℞. Resin. Gialap. cum vitell. ov. solut. gr. xij. Aquæ cinam. bugloss. ʒss. Msc. f. emuls. addendo saccharum ad gratiam.

Imprimis autem apud nos celebre est *Diacydonium lucidum Gialappinum purgierende Quitten, Lattwerg/ Cotignac laxatif avec Jalap.* Nihil enim aliud est quam Diacydonium purgans, dum gelatinæ cydoniorum resina gialappæ in Spiritu Vini soluta, quo electuarium eo elegantius evadat, vel cum nucleis pineis trita, quo deinde potionibus aquosis jungi queat, immiscetur. Inservit communissime pro scopo purgandi vel per se vel aliis purgantibus mixtum. Per se datur ad ʒss. ʒij. ʒiij. ʒss. rarius & non nisi in robustissimis ad ʒvi.

℞. Diacyd. lucid. Gialap. ʒss. detur frustum elegans pro infante duorum annorum circiter.

℞. Diacyd. lucid. Gialap. ʒiij. aqu. Ceras. nigr. vel e fruct. rub. id. q. s. pro syrupo vel potiuncula.

Enarrandum porro est *Electuarium pectorale laxativum, Koster- Lattwerg/ Electuaire ou opiate pectorale laxatif.* Infantibus præsertim exhiberi solet ad mucum & pituitam expurgandam, imprimis in tussi aliisque pectoris affectibus, ubi infantes continuo humores expectorandos deglutunt. Dosis a drachma semis ad drachmam unam cum dimidia, drachma una electuarii continet grana quatuor cum duabus undecimis partibus grani Magisterii Gialappini.

Tandem apud nos quoque prostat pulvis vegetabilis laxans, qui vocatur *Specificum Gialappinum, laxierendes Saurbrunnen, Pulver/ Poudre composée de Jalap.* Purgat satis commode. Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis. Potest usus tempore addi oleum anisi, Citri, Cinamomi aut aliud simile.

Olim prostabat quoque Extractum Gialappæ, inspissando solutionem cum Spiritu Vini factam ad mellaginem, sed cum tutius dosin magisterii moderari possimus, exolvit. Tandem notandum quod Resina cum Spiritu Vini ex vino destillato imprimis Gallicano parata non æque nauseosa evadat, ac illa, quæ cum Spiritu Vini ex fecibus vini prolecto fit.

Jala-

Jalapam in infusis & decoctis aquosis imo in nodulis cum vino etiam paratis velle præscribere ignorantiam arguit.

MECHOACANNA

Est Bryonia seu Mechoacanna alba C. B. P. Est convulsi Mexicani radix crassa, substantiæ laxioris quam Galappæ, [alba unde & Rhabarbarum album dicitur - carnosâ, circumloâ, saporis farinacei, odoris nullius] Effoditur in regione Mechuacan, ubi in taleolas scissâ ad nos transfertur.

Mechoacanna Galappæ analogâ est, sed quia resinam habet pauciores ideo remissior est jalappa.

[Insigniter Mechoacannam dilaudat Gabelchov. C. 1. Cur. 13. p. 27. sqq]

Arthriticis in specie conducit. Placentæ seu trochisci ipsa radice præstant, radix enim admodum fallax est, quia una pars ejus cum vehementia, altera vero nihil quicquam purgat. Ratio est, quia plurima pars resinæ, in qua est vis purgandi, ad partem vulneratam in effossione tendit. Infantibus etiam commodissime dari potest, quia est insipida & inodora; contra lactis grumescentiam datur.

Datur in substantia à ʒʒ ad ʒj. extract. à gr. xv. ad ʒij. resina datur ut Jalappæ.

℞. Mechoac ʒʒ diagryd. gr. v. ΘϞri gr. iij. ʒo caryoph. gt. j. M. f. pulv. in Melancholia exhibendus.

℞ Mechoac. ʒʒ, amygd. dulc. ʒʒ sacch. in ∇ ros. solut. q. f. f. l. a. panis Martius. in arthritide.

℞. Mechoac. ʒj. ocul ʒ. ʒʒ. ΘϞri gr. iij. M. f. pulv. contra grumescentiam lactis infantum, puerperis etiam exhibendus, addi possunt sperm. ceti gr. vij. vel. ix.

MECHOACANNA ita dicta à loco natali; vocatur quoque **MECHOACANNA ALBA** ad distinctionem Mechoacannæ nigræ, quæ est gialappa, *Weisse Jalappa / weisse Rhabarbara / du MECHOACANNE.*

Pertinet ad convolvulorum species. Convolvulus Americanus Mechoacan dictus Raij Hist. 723. Jeticucu seu radix Mechoacan Margr. 4. ed. 1648. Bryonia Mechoacanna alba C. B. Pin. 297. Mechoacan. I. B. 2. 149.

Radix semper eligenda recens & insigniter albicans, improbatur cariosa & nigra: in infuso ad $\mathfrak{z}\text{ij}$ $\mathfrak{z}\beta$. præscribitur, sed raro.

Resina minime in usu, ut & extractum.

\mathfrak{R} . Mechoacan alb: pulver. Trag: alb. ana part. æqu. Msc. f. pulvis insignis & experientia sæpissime comprobatus, si cuspidatim, aliquoties de die, infantibus cum pulte exhibeatur, ad tormina, inflationes abdominis atque obstructiones alvi referandas.

TURBITH.

Est etiam species convolvuli indici, foliis althææ similibus. Radix oblonga, crassa, resinosa, foris ferruginea, intus albida, saporis subacris, nauseabundi resinosi. Tota planta lacte turget, concrecente in resinam, quia substantiam habet valde porosam, resina non æqualiter distribuitur, ita ut nihil resinæ in quadam parte sæpe subsit, ideoque non purgat.

Suspectum est, quod sæpius tormina excitet, quæ deducunt à resina pertinacior, ego vero à particulis irregularibus, in ima enim parte resinofitas tanta non est.

Turbith potentius in serum viscidamve lympham agit quam Jalappa, & propterea in podagra & arthritide, ubi potentioribus purgantibus opus est, conducit. Vis consistit in resina ejusque cortice, in quo resina latet.

Cave ne temere exhibeas gravidis quia Uterum valde commovet.

Datur in substantia à $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$ resina & extractum, quod

R

omnium

omnium optimum, velut in Jalappa. infusum à zij ad ʒß.

℞. Turbith. vegetab. resinof. ʒj troch alhand. seu diagr. gr. iij. Θ ʒri gr. v. ʒo caryoph. gt. j. f. pulv. pro educenda pituita.

℞. Extr. turbith. ʒj. diagr. gr. iij. caryoph. arom. gr. v. Θ ʒr. gr. v. bals. Peruv. q. f. f. bolus.

℞. Rad. turbith. ʒß. glycyrrh. ʒß. Θ vol. succin. ʒß. helleb. alb. gr. v. f. pulv. sternutatorius ad excitandos Apoplecticos. In officinis prostant species diaturbith. dos. à ʒß ad ʒß.

℞. Rec. spec. diaturb. ʒß Crem. ʒri. ʒij f. pulv. in hydropo.

R A-

Turbit, Turpethum, Torbedon.

Convolvulus Indicus alatus maximus foliis Ibis nonnihil similibus, angulosis. Turbith officinis Hermanni H. L. Bat. Turpethum repens foliis Althææ vel Indicum C. B. Pin: 149. Turbit. Tirastawalu Zeylanensibus.

Turbith frequens A U T H O R offendit locis opacis humidis ad fossarum margines, retro hortorum sæpes, aliisque sylvestribus à mare longe dissitis in Zeylan & in Malabara. Colliguntur in usum Medicum non caules, ut perhibet Garzias, sed radices crassiores turgentes lacte & resina copiosiore. Quæ ad nos transmittuntur, fodiuntur in Guzarata ubi proventus luxuriosus: conferatur A U T H O R IN H. L. B. p. 177. seqq. Radix eligenda recens, fractu contumax, resinosa, improbat levius cariota & cujus extremæ tantum partes resina muniuntur. Contorqueri solet Turpethum ut resinosis compareat.

Prostant olim species diaturbith cum Rhabarbaro, quas in expellendis præcipue vermibus à gr. xij ad ʒj præscribebant, hodie vix amplius in usu sunt.

Occurrit adhuc hodie *Electuarium diaphænicon* Purgierende Dattlen-Eattwerg / *Electuaire Diaphænic*; rectius appellaretur *Electuarium Diaturbith*. Convenit ad pituitam & humores serosos eva-

cuan-

cuandos, in hydrope, Lethargo, apoplexia morbisque soporosis
mensis quoque ciet, dosis ad ℥ss, ad ℥j. Drachma continet grana vj
Turbith, Diagrydii autem gr. ij. cum 4ta. parte grani. In Gallia ad-
huc ejus usus viget internus, alias in clysteribus ad ℥j. ℥i℥ adhibe-
tur.

RADICES SALE FIXO ACRI CON- STANTES ET VEHEMENTISSIME PURGANTES.

Cucumis asininus.

Esula major & minor.

Helleborus niger.

albus.

Bryonia.

CUCUMIS ASININUS.

Est cucumis Sylvestris asininus dictus C. B. P. radix crassa,
oblonga, alba, saporis acris nauseosi, odoris dum recens virosi.
Planta est pomifera flore monopetalo marginibus tanquam
partitis, fructu ovali, hispido hirsuto.

Serum & aquam per Vomitus sedes & Urinas copiosissi-
me, sed tarde & cum violentia excernit, hinc rarius exhibe-
tur hydropicis pro scopo purgandi per inferiora, sed tutius
datur extractum cum ℥ vini ☐isato vel acet. dest. factum à
℥ss. ad gr. xv & ℥j. additur ꝑ̄ dulc. stimulatur troch. alhand. si-
mul corrigitur o d. caryoph.

℞. Extract. cucum. asinin. gr. xv. quod perperam elate-
rium vocatur, extr. troch. alhand. gr. iij o d. caryoph. gt j.
Extr. absynth. q. s. f. pil. contra hydropem.

R 2

℞. Rad.

℞. Rad. ʒ. aperient. ana ʒj rad. cucum asinin. ʒiij M. f. de-
coct. cui add. syr. ʒ. rad. aper. pro scopo diuretico. possunt
etiam Θia addi.

[De elaterii virtute & effectibus in hydrope conf. Martin.
Lister. Exercitat. de hydrope p. 17. & hinc inde.]

ESULA.

CUCUMER SYLVESTRIS, SIVE AGRESTIS *σίκυς ἀγρος*, *Wilde*
Cucumern / *Spring-Gurken* / *Spring-Kürbiß* / *Wilde-Hunde-*
Kürbiß / *Esels-Kürbis* / *Esels-Cucumern* / *CONCOMBRE SAUVAGE.*

Cucumis Sylvestris asininus dictus C. B. Pin. 314. Cucumis
sylvestris five asininus L. B. 2. 248. Cucumis sylvestris Dod.
Pempt. 663.

Circa mœnia, areas & stabulorum fimeta in Italia & Narbonensi
Provincialique Gallia sponte oritur. In Germania autem (verba
sunt L. B.) non nisi satus provenit, semel autem satus pluribus in-
de annis facile renascitur, non tamen è radice revirescens, sed ex
feminibus sparsis proveniens. Julio & Augusto floret. Autumno
fructus maturatur pueris, ut cum LOBELIO loquar, notissimus, qui
fructum turgentem vix dum tactum digitis ludibundi in faciem in-
vicem elidunt semina, succoque peramaro & viroso os oculosque
perfundunt. Ex hac planta referente TOURNEFORTIO multum
phlegmatis Urinosi parum acidi, magna quantitas olei, multum
salis volatilis concreti cum cineribus & sale fixo per analysin Chy-
micam extrahitur.

Radix commendatur ad tumores veteres discutiendos, po-
dagram & malum ischiaticum mitigandum, vitiligines impetigines-
que ut & cicatrices nigras & maculas in facie depurgandas. Sed ra-
rius usurpatur.

Radix cucumeris asinini datur ad gr. xv. ʒß. folia exsiccata ad
gr. jv. ad gr. vj. Ingreditur unguentum de arthanita & alia.

ESULA.

Major & minor. Major est Tithymalus palustris frutico-
sus C. B. P. radix oblonga, pollicem crassa, foris fusca, intus
pallida, lacte acri exedente & nauseoso turgida, si recens: est
planta

planta tricapsularis tricoccos, conceptaculis post singulos flores singulis.

Minor est Tithymalus foliis pini, forte Dioscoridis Pityusa C. B. P. radix oblonga, Esula majori tenuior, foris fusca, intus ex flavo albescens, lacte acri turgida.

Esula minor virtute fortior majori, utraque supra & infra educit humores hydropicorum tanta cum vehementia & molestia, ut robustioribus tantum exhibenda sit, in cachexia, febribus, hydrope, scabie. Jungitur alterantibus pro stimulo. Additur etiam Clysteribus acris ad excitandos Apoplecticos.

Vis omnis consistit in cortice, qui à ʒʒ ad ʒj in substantia datur. Feliciori cum successu exhibetur extractum cum vini vel aliis menstruis subacidis factum. Extractum ex radice datur tantum ad gr. xv. & ʒj. Si in substantia datur corrigitur oleo anisi. v. c. R. Cortic. esul. min. ʒj. Elæosach. anis. Citr. ana ʒʒ. troch. alhand gr. v. f. pulv. antihydricu ex vino absynthite

℞. Extr. esul. ʒʒ. extr. lign. al. gr. vij. troch. alhand. gr. v. ʒʒ caryoph. gt. j. conserv. flor. persic. ʒj. l. q. s. f. bolus in hydrope.

Quidam Medicus exhibuit infusum in hydrope feliciter, quod tamen potentissimum & cum judicio dandum.

℞. Rad. Esul min. ʒʒ. Helleb. nigr. ʒij. Colocynth. in pet. ligat. ʒj. Caryoph. ʒj. affunde vini s. q.

℞. Esul. helleb. n. ana ʒvj. helen. ʒj. gentian. ʒʒ. rhabarb. ʒvj. fol. sen. ʒj. ʒʒri. ʒij. include nodulo, affunde vinum generosum q. s. f. alterans & simul purgans, in Cachexia, febribus, hydrope, scorbuto.

HEL-

Τιθύμαλος, TITHYMALUS, quoniam ejus species lacte turgent vocatur propterea à quibusdam LACTARIA, Wolffs, Milch / TITIMEL,

L. E. Est plantæ genus flore monopetalo campaniformi globoso multifido & duobus foliolis cincto, quæ calycis vice fungi videntur; pistillum autem deinde abit in fructum trigonum in terna loculamenta divisum ac seminibus foetum oblongis. Plures Tithymalorum species sunt, sed duas tantum usuales facit author, quæ hæ sunt

Tithymalus palustris fruticosus C. B. Pin. 292. Tithymalus magnus multicaulis sive Esula major L. B. 3. 671. Esula major. Dod. Pempt. 374. &

Tithymalus Cyparissias C. B. Pin. 291. & L. B. 3. 663. Tithymalus Cupressinus sive Humipinus Lob. Ic. 316. Esula Officinarum Cæsalpini 374. Et hæc ultima in usum præcipue trahi solet, Linariæ admodum similis, ut antequam floreat non distinguatur nisi succo lacteo. Nam

Esula lactescit sine lacte linaria crescit.

Hinc inde in agris, pratis, locis sterilibus incultis, aridis, montibus, sylvis &c. provenit sat copiose, floret Majo & Junio &c.

Folia, quæ tamen rarissime usurpantur primo gustum amygdalinum postea ardoris & acrimoniæ sensum imprimunt.

Analysi Chymica multum acidi & sulphuris, mediocrem terræ & salis fixi quantitatem, parum vero alcali exhibet. A Sulphure in phlegmate contento alborem succi prodire notum est. Hic succus acris admodum est & arrodens, ut impudentium Mendicorum fraudi inserviat, qui cutim sibi hoc succo exulcerant scabritiei specie, ut loquitur Schræderus. Vocatur alias Rhabarbarum rusticorum. Vim ejus drasticam corrigere nituntur Bdtellio, Tragacantha, mucilagine psyllii &c. Quidam cum spiritu sulphuris, aut Saccharo Saturni, à quibus sal acre tenuius & pungens obtunditur, correctionem instituunt. Succus esulæ, qui interne plane non debet adhiberi, externe verrucis inunctus prodest. Dicitur etiam quod Lac esulæ cum sale armoniaco in globulos redactum & denti cavo inditum eundem absque dolore cadere faciat.

IN OFFICINIS NIHIL AMPLIUS APUD NOS PROSTAT

Quam radices esula præparata præparante Wolffs-Milch-Wurzel/ racines de Tithymale préparées, macerando cortices per tri-duum in aceto acerrimo. Usurpantur in morbis à colluvie sero-

sa oriundis, in infuso aut decocto ad aliquot drachmas.
Extractum exoluit.

HELLEBORUS NIGER.

Est Helleborus niger flore roseo C. B. P. n. IV. Sunt radices tenues fibrosæ nigricantes ex uno capite prodeuntes, saporis acris pungitivi, amari nauseosi. Est planta multiflora, pentapetala.

Viscidos & Melancholicos seu acidos adustos & coagulatos humores validissime tam ^{αῖμα} quam ^{καῖα} expurgat, ut in morbis capitis, soporosis, maniacis, Chronicis, Catarrhosis, Hypochondriacis præ cæteris eligatur.

Fibras plurimi rejiciunt, reservantque tantum cuspidem superiorem, sed in hac tanta non est vis quam in fibris.

Raro pro basi præscribitur, sed potius tanquam stimulant pro cæteris purgantibus. In substantia datur a ℥j. ad ʒß in robustioribus. In Infuso à ʒj ad ʒij ex vino cydoniato, oxymelle, tanquam correctorio: tutissimum est extractum, vel cum ω vini vel aceto factum, quod est nonnihil resinosum.

Aquam destillatam purgativa acredine esse imbutam experimentis Zwelfferi. [Pharm. Reg. p. 35.] Olai Borrichij & aliorum constat.

℞ Helleb. nigr. sacch. cand. ana ℥j. M. f. pulv. exhibe in cochleari oxymell. pro robusto, vel add. Θ \square ri gr. v. \circ de caryoph. gt. ij. M. f. pulv. pro maniaco.

℞ Extr. hell. n. gr. xv. φ dulc. gr. vij. diagr. gr. iij. Camph. gr. v. Ess. Castor. q. s. f. pil. purgantes, valde conveniunt in chlorosi.

HEL.

Ἑλέβορς sive Ἑλέβορον, vel Ἑλέβορς ἀπὸ τῆς ἐλεῖν τῇ βορᾷ quod interimat esu si pabuli loco sumatur. Vocatur etiam MELAMPORDIUM, VERATRUM, quod vertat mentem, schwarze Nieswurz/ ELLEBORE NOIR.

Est planta flore rosaceo, ex cujus meditullio surgit pistillum plurimis corniculis inter stamina & petala jacentibus cinctum circa basin, quod abit in fructum in quo velut in capitulum colliguntur vaginæ membranaceæ, in cornu plerumque desinentes, secundum longitudinem dehiscences, seminibus foetæ plerumque subrotundis vel ovatis.

Species maxime usualis est.

Helleborus niger angustioribus foliis Tourn. J. R. H. cl. 6. S. 1. g. 11. Helleborus niger flore roseo C. B. Pin. 186. Elleborus niger legitimus Clus. Hist. 274. Elleborus niger flore albo interdum etiam valde rubente J. B. 3. 635. Christwurz/ Huic tamen etiam substitui potest.

Helleborus hortensis flore viridi C. B. Pin. 185. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo radice diuturna J. B. 3. 636. Veratrum nigrum ij. Dod. Pempt. 385. prioris speciei flos initio albidus deinde purpurascens postremo virens. J. BAUHINUS flores pro anni diversa constitutione albos aut rubentes valde esse observavit. Florent circa festum nativitatis Christi ad Aprilem usque.

Multum olim in Insulis Anticyris reperiiebatur, cumque helleborus stupiditati & insanix medeatur, varia orta proverbia, *Helleboros opus habet, navigare Anticyras, & tribus anticyris caput insanabile dignum.* In Austria, Styria, Alpibus & Pirenæis invenitur; ut plerumque autem colitur in hortis apud nos.

Radix tantummodo in usum venit & quidem haud raro ex Styria advehitur, ubi viget Helleborus niger amplioribus foliis Tourn. J. R. H. cl. 6. S. 1. g. 11. Veratrum nigrum stiriacum Tabern. Icon. 723. Colligitur juxta quosdam Martio, juxta alios æstate, septembri aut octobri. Hoc autem in collectione maximopere suadent observandum esse, ne confundantur cum radicibus Aconiti non adeo dissimilibus. Radix dum recens est in plicas flectitur & exsiccat.

Purgat insigniter & præsertim ex mente veterum est melanagogum. PARACELsus qui eum Dauram & Thesaurum vitæ vocat, Helleborum nigrum tantis extollit laudibus, ut non dubitet Heroem vocare contra morbos Herculeos, Apoplexiam, Maniam, Melancholiam

liam, Epilepsiam, Podagram, Lepram & Hydropem. In morbis arthriticis, cachecticis, obstructionibus viscerum nondum inveteratis, imo & mensium obstructione pertinaci &c. quoque laudatur. Suis relinquitur authoribus quod de ejus vi melancholiam dæmoniacam curandi deprædicatur. In infusis præsertim in nodulis haud raro ad ʒʒ & paulo ultra ascendimus. Veteres hanc radicem decoxere cum Lente & jusculis, PARACELsus autem aliiq̃ue cum carnibus decoxerunt, decoctumque pro purgante exhibuerunt. Sunt qui easdem virtutes foliis quoque tribuunt, ex quibus rursus in umbra versus Orientem siccatis cum saccharo pulverem ad vitam prorogandam ex mandato PARACELSI parant, qui quotidie ad ʒʒ. assumendus est. Externe radix in setaceis & fonticulis adhibetur. Sic in cephalæa, ophthalmia & suffusione frustulum auris lobulo perforato immittunt, in pestilentialibus bubonibus & anthracibus, cuti vicinæ perforatæ infigunt. Veterinarii jumentis asthmaticis ac torminosis, præsertim ab exhalationibus pestiferis, cuti carniq̃ue foramen infligunt, perque id ad ferositates noxias extrahendas frustum radicis hellebori nigri transmittunt.

Nonnulli in mensibus retentis pessarium exinde factum suadent; Sicuti autem in usu interno cautos esse oportet, ita & non temere quoad usum etiam externum procedere debemus, præsertim cum testante DN. DU HAMEL de affectionibus corporum radix hellebori fonticulo admota alvum subducatur & vomitum quandoque moveat. Hydropicorum quoque abdomini ad aquas discutiendas imponitur. Folia etiam in vino rubro cocta ad dolorem ischiadicum resolvendum commendantur. Cingulum ex foliis nudo corpori circumdatum ad hæmorrhoides & menses nimios deprædicatur. Cæterum usus Hellebori in pulveribus sternutatoriis notissimus est.

Multum occupati fuere olim in correctione etiam hujus hellebori nigri, eamque vel per aromata vel per coctionem in clibano aut sub cineribus infigendo radículas pomo cydoniorum, vel per macerationem in vino vel simplici vel cydoniorum aliove, vel per acida, acetum, phlegma Vitrioli vel per alia etiam tentarunt. Hodie cum in substantia vix amplius adhibeatur, non multum huic correctioni operam dant. Succus hellebori nigri tinnitum aurium tollere dicitur mane & sero instillatus.

Radices Hellebori nigri præparatæ, præparierte schwarze Nießwurzel / *Racines d'Ellebore noir præparées*, maceratas per triduum in vino Cydoniorum prius fibras pomo hinc cydoniorum pasta panis obvolvendo infixas coquendo & postmodum exiccando.

Habemus porro *Oxymel Helleboratum*, Saurhonig mit Nießwurzel / *Oxymel d'Ellebore composé*, quod miris laudibus a GESNERO extollitur pro scopo abstergendi, aperiendi, humores omnes omniaque recrementa e corpore protrudendi, omnesque meatus reserandi. Vix autem tantas meretur laudes. Dosis est ad drachmas duas ad drachmas sex.

Celebris præterea est *Tinctura Martis helleborata Wedelii*, Stahl-Tinctur mit Nießwurzel / *Teinture de Mars avec l'Ellebore*, quæ in morbis contumacibus, chronicis, affectu Hypochondriaco, ictero, arthritide, scorbuto, melancholia, mania celebratur, datur ad guttas viginti triginta quadraginta & ultra. Imprimis autem multum æstimatur *Extractum Hellebori nigri Mastichinum*, Schwarz-Nießwurzel-Extract mit Mastix / *Extrait d'Ellebore avec du Mastic*, quod fit extrahendo cum aqua sale tartari acuenda, addendo sub finem aliquid mastichis: in supra dictis affectibus multum celebratur. Datur per se ad grana quinque ad quindecim, sæpius etiam cum aliis miscetur. Ingreditur *pilulas Hypochondriacas beati parentis mei*, Pillen wider die Milchsucht / *Pilules Antihypochondriacæ*, quæ ad grana 15. 20. triginta & ultra in obstructionibus alvinis & hypochondriorum, in affectione hypochondriaca aliisque pluribus morbis non absque effectu usurpantur.

De vi purgante aquæ destillatæ ex helleboro alii dubitant, quicquid sit, non trahitur in usum.

Analysi Chymica eadem fere ex nigro ac ex albo educuntur principia.

HELLEBORUS ALBUS.

Est Helleborus albus flore subviridi C. B. P. radix oblonga, pollice aliquando crassior, foris fusca, intus alba, numerosis albicantibus fibris stipata, saporis acris, paululum amari-

amaricantis, subadstringentis, ingrati & nauseosi.

Helleborus albus nigro multo vehementior est, & aliquando convulsiones parit, proinde ejus substantia non nisi robustissimis, maniacis, furiosis, Melancholicis, quartanariis concedenda est.

Corrigitur vel per acida, vel per vinum Malvaticum, in quo vel coquitur vel maceratur, iterumque siccatur, & sic interne exhibetur, semper tamen genium suum retinet.

Externe ob sui acredinem pulveribus sternutatoriis ad excitandos Apoplecticos, & sanandos Catarrhosos admiscetur.

Substantia robustissimo datur à ʒss ad gr. xv. in infuso ad ʒj. melius tamen in extracto.

℞. Helleb. alb. ʒss. ☉ ꝑri gr. vij. ꝯ dulc. ʒss. L. O. gr. j. f. pulv. in mania exhibendus cum syr. de fumar.

℞. Galang. ʒij. affund. vin. helleborat. ʒiiij. f. Essentia cochleatim danda in mania.

℞. Extract. helleb. alb. gr. xv. ☉ ꝑri gr. v. conserv. fumar. ʒj. M. f. bol. pro ij. dosibus, robustissimo vero pro una dosi exhiberi potest.

℞. Helleb. alb. infundatur in vino Malvatico, eximatur radix & novum vinum superaffundatur, hoc secundum vinum helleboratum confert in specie maniacis ad cochl. j. vel ij. in quo etiam varia medicamenta aliis morbis appropriata exhiberi possunt, v. c. Essent. castor. vel castoreum ipsum in Uteri vitiis, seu Essent. absynth. in quartana.

℞. Helleb. alb. fol. majoran. summitat. organ. ana ʒj M. f. pulv. sternutatorius ad excitandos Apoplecticos, in graviore casu add. gr. j. vel ij. Cantharid.

BRY-

Ελληβορίς λευκός, VERATRUM Weiss. Nies. Wurk /
 Schampanier - Wurk / ELLEBORE BLANC.

S 2

Est

Est plantæ genus flore rosaceo, cujus pistillum abit in fructum, in quo velut in capitulum colliguntur tres plerumque vaginæ membranaceæ seminibus foetæ oblongis, grani tritici æmulis marginatis & quasi ala foliacea cinctis. Differt ab Helleboro quod corniculis careat & semen habeat marginatum. Discrimen inter album & nigrum dependet à colore radices : species usualis audit

Veratrum flore subviridi Tourn. I. R. H. cl. 6. f. 6. 12. Helleborus albus flore subviridi C. B. Pin. 186. Helleborus albus flore ex viridialbescente I. B. 3. 634. Helleborum album sive Veratrum Lob. Icon. 311.

Gaudet montanis & asperis locis & non solum in regionibus calidioribus, verum & in Germaniæ, Helvetiæ, Silesiæ &c. montibus, ut & Pannoniæ & Austriæ siccioribus pratis viret ex Clusii & Bauhini observationibus. Floret æstate, messibus aut sub autumnum legendæ sunt radices. Vetustissimus mos erat helleborum dare cum Raphano idque tripliciter, vel nimirum raphanum radicibus transfixum, ibique per 24. horas relictum dabant, vel raphanum radicibus transfixum in Oxymel infundebant, & Oxymel solum exhibebant, vel raphanum abiciebant de mane, & radices infundebant in dicto Oxymelite. Alii malo cydonio immisere radices & pasta farinacea obductum in fornace pistoria coxere, & abjectis postea radicibus pomum edendum præbuerunt. Corrigitur melius per acida quam per aromata aut acria, sed neque his neque aliis correctionibus & præparationibus opus est, cum non amplius in usum veniat, & dosis, uti recte LANGIUS judicat, secura sit, si plane non detur. Spiritus vini, in quo helleborus albus infusus fuit, ad gravem auditum magnæ dicitur efficacix, si in aurem affectam guttatim infilletur.

Ejus antidotum pulvis florum Nymphææ albæ esse dicitur. ETTMÜLLERUS autem & alii hunc in finem præferunt Castoreum.

Ingreditur Oxymel Helleboratum æque ac niger.

Helleborus hic fonticulo immissus non solum modo majorem feri quantitatem extrahit sed & violenter purgat.

Analyti Chymica extrahitur spiritus admodum acris solutionem Mercurii sublimati coagulans, quem insequitur liquor acidus corrosivus, Sal volatile concretum & oleum, remanente magna terræ quantitate.

B R Y.

BRYONIA.

Est bryonia aspera seu alba baccis rubris C. B. P. radix prægrandis, longa, crassa carnosâ, albida, quasi fungosa, intus circulis donata, saporis acris mordacis amaricantis, nauseabundi, odoris virosi dum recens est, mitior fit dum senescit. Decocta ejus acria sunt satis, extractum est optimum.

Est planta baccifera scandens, flores monopetali quinquefariam divisi.

Recens & vegetativo suo succo adhuc turgida validior est quam ficcata, hæc serum & aquas magis per inferiora, illa vero *ἄνω* & *κάτω* potenter exterminat. Speciale quid obtinet in sanguinis grumis dissolvendis, item in asthmate & hydrope pectoris, in hydrope Uteri, ut & ob insignem sui amaritiam in vermibus.

Sicca infusis diureticis additur pro stimulo, succus radicis à ʒij. ad ʒʒ. exhibetur cum oxymell. contra asthma.

℞. Rasur. bryon. rec. ʒij. Camph. ʒij. f. massa, excipiatur petiis in podagra.

℞. Succ. bryon. ʒij. ʒo thereb. spic. q. s. f. liniment. pro partibus convulsis.

In Clysteribus contra hydropem. ℞. Rad. bryon. ʒj. irid. flor. ʒʒ. cort. ebul. sambuc. ana ʒʒ. bacc. junip. sem. cummin. foenic. ana ʒij. coq. ex ∇ & Urin. colatur, add. hier. picr. ʒʒ. vitell ov. n. j.

Externe radix recens ingreditur Emplastra seu Cataplasmata contra tumores pedum œdematosos & podagricos. ℞. Bryon. rec. ʒij. flor. cham. melil. sambuc. ana Mj. f. catapl. ex ∇ & Urina.

℞. Bryon. ficc. rad. ari ana ʒʒ flor. ʒj. f. pulv. pro asthmaticis à ʒʒ. ad ʒij. sumendus ex syr. violar.

℞. Rad. bryon. ʒʒ. coq. cum oxymell. contra asthma.
 ℞. Rad. bryon ʒʒ. absynth. Mj. flor. viol. p. j. coq. in
 vino & aqua, applicetur totum parti dolenti in hemicra-
 nia.

RA-

Bryonia a vocabulo *βρύω* germino pullulo, quod abunde propullu-
 let, vel a *βρίω* quod est extollo, ex alto, eo quod in propinquos fruti-
 ces scandens se extollat; Ἀμπέλαιος λευκή, *Vitis alba a radice*, vitis quod
 foliis & viticulis vitem æmuletur. COLUBRINA vocatur quod sub
 hujus umbra densiori stabulare ament colubri, aqua ardens dicitur à vi
 caustica baccarum, MELOTHRON PSIOTRUM quasi nudatorium
 & depilatorium, quod ex acinis illius coria depilari ac præparari pos-
 sint. Saunruben/ Saunreben/ Hundstreben/ Stichwurk/ Stickwurk/
 Scheißwurk/ Schmerwurk/ Teuffels- Kirschen/ Hunds- Kürbsen.
 COULEUVREE, VIGNE BLANCHE, BRYONE.

Est plantæ genus floribus monopetalis campaniformibus paten-
 tibus & multifidis a calice ita comprehensis ut sejungi nequeant.
 Embryones, quibus flores sæcundi insident, abeunt in baccam glo-
 bosam vel ovatam seminibus sætam subrotundis. Adde claviculos
 quibus Bryonia tanquam manibus adminicula apprehendit.

Bryonia aspera sive alba baccis rubris C. B. Pin. 297. Vitis alba
 sive Bryonia J. B. 2. 143. Bryonia alba Dod. pempt. 400. Crescit
 in dumetis, flores æstate, autumno fructum producit, qui primo viridis
 postea maturescens rufescit.

Radix colligenda tempore verno, incidit, attenuat, menses & uri-
 nam movet, Splenetica est, hepatica atque uterina; sætum, ejicit.
 A quibusdam adversus venena animaliaque venenata commenda-
 tur. Vis anthelmintica concedi potest, an autem tantum valeat con-
 tra Epilepsiam, ut quidam volunt experientia sufficienti nondum
 constat. Nonnulli in arthritide, podagra & malo ischiadico tum ex-
 terne tum interne laudant Bryoniam, ita ut propterea quoque appelli-
 tetur Sicht-Wurk/. Affricatur recens evulsa e terra locis arthritide
 affectis soloque rursus conceditur, ut more sibi naturaliter insito cre-
 scere pergat. Reperiuntur qui illam contra maleficia & fascinationes
 prodesse credunt. Externe ad scrofulas & tumores duros discutien-
 dos

dos, res heterogēneas ex vulneribus extrahendas commenlatur ulceribus tibiārum etiam phagædenicis confert. Hoc certum quod in contusionibus maxime conducatur, ſive recens impoſita ſive exſiccata, ſed in Spiritu Vini rurfus macerata: ſugillationem & livedinem non ſolum tollit ſed & præcavet. In hydrope quoque renū regionī vel per ſe vel cum ſtercore vaccino aliove applicatur. Plantis pedum œdematoſorum recens quoque ſubditur. Peſſarium exinde formatum menſes & foetum ciet; ſunt qui ad maculas faciei atque rugas delendas, ut & nitorem conciliandum, radicem ſub cineribus cotam contuſamque applicant vel ejus decocto cum decocto ficuum utuntur. Applicatur quoque in taleolas diſſecta & toſta lateri dolenti, quem in ſinem & ſequens paratur oleum.

℞. Bryon. recent. remoto cortice in fruſta diſſect. lib. j. olei olivarum etiam libr. j. coque tam diu ad ignem lentum donec radix exſiccata fuerit, poſtea exime ex oleo fruſta & aliquoties in eodem ferum ignitum extingue, obſervando, ut quam primum oleum flammam conceperit illa mediante operculo ſuffocetur. Serva in vaſe clauſo, oleum antiſpleuriticum uſu externo haud ſpernendum exiſtit.

℞. Rad. Bryoniæ quæ ſit magna & bene nutrita lb ſs. in taleolas ſectam frige in ſartagine quouſque contabefcant, cola: adde terebinthinæ lb ſs. ceræ ʒv. fiat unguentum in ſtrumis vel diſſolvendis vel ad ſuppurationem deducendis a Zacuto Luſitano maxime laudatum. In officiis noſtratibus neque extractum neque aqua Bryoniæ proſtat, exulat quoque ſecula olim decantata maxime. Ex hac radice virunculos efformant, quos in arena exſiccatos poſtea pro Mandragoris venditant. Nondum extra omnis controverſiæ aleam poſitum eſt, quod Clauderus in E. N. C. dec. 2. ao. 5. obſ. 185. de Bryonia aſſerit. Tum demum ex baccis novam progerminare plantam, poſtquam ab avibus prius devorata & cum excremento rurfus ſemina excreta fuerint.

Asparagis primum germinantibus veteres veſci ſolebant. Si radix tempore verno terræ adhuc immerſa excavetur & proprio operculo tegatur, dicunt colligi ſuccum omni mane, qui intus ad aliquot cochlearia aſſumptus hydropicos curat, extus vero podagricis conducit

RADICES SALE PURGANTE BLAN- DO CONSTANTES ET VULGO LA- XANTES.

EBULUS.

Est Sambuci humilis C. B. P. radix oblonga tenuis digi-
talis crassitudinis non lignosa albida, saporis amaricantis,
subacris & nauseosi.

Est planta baccifera trypirena.

Serum & ∇. tam per sedes quam per Urinas blande e-
vacuat, præcipue cortex unde antihydronicus audit. Sub-
stantia lignea interior adstringit potius, & propterea in
fluore albo & nimio Mensium fluxu ex vino capitur.

Externe valet contra tumores pedum œdematosos R.
piper 3j. Cort. Ebul. 3j. helen. bacc. junip. ana 3℔ flor. cha-
mom. melilot. ana Mj. coq. in ∇ & Urin. pint. i. f. Catapl.

Interne R. Cort. Ebul. 3ij bacc. junip. 3j flor. sambuc p.
j. infund. vin. s. q. ad ∇as per Urinam & alvum educendas.

P O.

Χαμαιάκη, Chamæacte, ἀκλή ἄγρια, ἐλισσάκη SAMBUCUS HUMI-
LIS, SAMBUCUS PUMILA, SAMBUCUS HERBACEA, AGRESTIS, Alttich /
nldriger Hollunder / Alcer, Hollunder SUREAU BAS, HYEBLE, YEBLE
Sambucus humilis sive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456.
Ebulus sive Sambucus herbacea I. B. i. 546. Ebulus Dod. Pempt.
381.

Passim udis incultis & palustribus locis sæpissime ad arborum
margines florentem Junio & Julio baccas Augusto & Septembri ma-
turantem videas inquit I. BAUHINUS. Præter radicem ex Ebulo in
usum quoque cedunt folia, flores, cortex, bacca & in his contentum
semen.

Radici virtus quoque adscribitur alexipharmaca, laudatur contra
dolo-

dolores arthricos, spasmus atque paralyfin, & collo appensa in ulceribus sordidis ac vermiculationibus infantum deprædicatur. Folia mire laudantur externe imposita ad dolores podagricos & tumores in hernia discutiendos, in scroti tumore & inflammatione cataplasma ex foliis ebuli & agrimonia in vino rubro coctis multum commendat PAULI. Eadem folia Ebuli instar cataplasmatibus manibus & pedibus scabiosis superimposita elegantissimum remedium esse dicuntur in infantibus, præsertim si simul conqueruntur de æstu manuum seu pedum.

Cortex discutit, emollit, conducit in tumoribus serosis pituitosis arthriticis podagricis &c. Cortex medianus viridis erysipelati imponitur.

Dosis corticis præsertim à radice detracti solet esse in infusis & decoctis ad ℥iij. ad ℥ss &c. Notandum autem quod infusum magis violentum sit quam decoctum.

Flores Sambuci hujus discutiente & diaphoretica vi pollent, concordant cum floribus sambuci & horum instar quoque vino saporem moschatellinum conciliant. Baccae nigricantes suppeditant tum succum suum rutilantem tum semina. Semina hæc, præterquam quod vi hydragoga gaudeant, diuresin quoque cient. In hydrope vel comeduntur vel infunduntur in vino & vinum hauritur. Exprimitur quoque exinde oleum, quod umbilico inunctum alvum laxat & dolores arthricos demulcet, interne vero ad ℥j. ad ℥iiss. assumptum per superiora & inferiora purgat & imprimis in philtris laudatur.

Succus baccarum, quamvis pro scopo purgandi ad ℥j. ℥ij. commendetur, rarius tamen in usum trahi solet æque ac succus corticis, qui vim insuper habet emeticam. Inservit potius ad decantatam istam pulpam, quæ vocatur *Rob Ebuli Attich-Mues* / *Rob d'Yevle*. Nihil autem aliud est quam succus inspissatus, cui melioris asservationis gratia in Officinis aliquid sacchari admiscetur. Diaphoreticum est & alexipharmacum atque Diureticum pro sero hydropicorum imminuendo notissimum, per alvum & urinam suam operationem exerens. Adeo apud vulgum commendatur, ut quoties ad hydropicum Medicus vocatur, aut illud jam jam in usum ductum fuerit, aut an adhiberi tuto possit, interrogetur. Scabiosis quoque non inutile existit. Datur ad ℥j. ℥ss. & ultra. In Officinis præter modo dictum rob nihil ex ebulo prostat.

Sunt qui succo ebuli aut etiam decocto radice ad capillos denigrandos & crispandos utuntur.

POLYPODIUM.

Est Polypodii vulgaris C. B. P. radix oblonga, minimi digiti crassitie, foris rufescens intus herbacea, ex viridi pallescens, multis nodis & tophis quasi acetabulis geniculata, saporis subacris dulcis, quodammodo adstringentis & nauseosi.

Planta est Epiphyllispermos.

Optimum est quernum, præter virtutes cum filicibus & osmunda communes possidet vim blandam laxantem, ideo Melancholicis, Hypochondriacis scorbuticis, tussientibus speciatim conducit, præcipue ubi eorum alvus est adstricta, externe ad oris & faucium vitia scorbutica.

In decoctis & infusis frequentius datur circiter ad ʒj.

℞. Rad. Polypod. ʒj. Enul. camp. ʒiiij. coq. in hydromell. & vin. ana ℥ij f. apozema, quod à Poterio in asthma commendatur, præcipue ubi alvus est adstrictior, addi possunt fol. Nicot. ʒij.

℞. Rad. Polypod. ʒij. passul. min. ʒβ. Θϙρι ʒj. coq. in ∇ Colatur: adhuc calenti add. Mannæ ʒvj. sem. Coriandr. fœnic, cinamom. ana ʒij. f. apozema purgans antihypochondriacum.

℞. Rad. Polypod. ʒij. Malv. hort. flor. rosar. ana Mj. herb. prunell. salv. ana Mβ. coq. in ∇ ℥iiij. add. aceti circiter ℥β. & mell. rosat. q. s. f. gargarisma contra omnis generis inflammationes faucium, addi potest Alum. ʒj. prunellæ. ʒij.

RA.

Πολυπόδιον ἂν πολὺ multum & ποῦς pes, multipes, ob radice formam. FILICULA DULCIS, RADIX DULCIS A GUSTU, Engel, Süß, Süß-

Süß - Farn / Baum - Farn / Kropff - Wurz / Corallen - Wurz
Eich - Farn / POLIPODE

Est plantæ genus nequaquam ramosum, cujus folia ad nervum pene in partes angustas & oblongas secari solent. Fructus foliis innascuntur: capsulæ scilicet membranaceæ sphæricæ in acervulos congestæ, annulo carentes, quæ fibrarum contractione rumpuntur & semina fundunt minutissima. His notis addenda facies propria.

Polypodium vulgare C. B. Pin. 359. Polypodium I. B. 3. 746.
 Polypodium majus Dod. Pempt: 464.

In opacis sylvis & montibus ad petras muscidas, imprimis ad radices caudicesque vetustos arborum Fagi, Coryli, Quercus nascitur.

Ab antiquis remediis melanagogis accensitum fuit. In affectibus cachecticis & Ictericis & Schirrhois ut & in glandularum mesaraicarum obstructione, mensium vitiis & renum, hepatis & lienis morbis commendatur. Decoctum polypodii ad arthritidem & scabiem deprædicatur. Vix autem per se usurpatur, sed ut plurimum in infusis, nodulis & decoctis cum aliis adhibetur. Externe dicitur Polypum narium curare pulvis hujus radicis, quæ etiam luxatis prodest, adversusque rimas inter digitos manuum & pedum occurrentes in usum trahitur.

Continet multum acidi & olei, parum Spiritus Urinosi, nullum sal volatile concretum, mediocrem autem quantitatem terræ,

RADICES PARTICULIS DULCIBUS SEU BLANDE VISCOSIS CUM DULCEDINE CONSTANTES.

Dulcia concipiuntur corpuscula rotunda, mollecula, ad latera levissimis flexilibus & obtusis fibris instructa, linguæ meatibus cæterisque poris citra ullam renitentiam se insinuantia. Suntque vel alimentosa, dum in chylum facile mutantur & poris partium assimilantur, vel medicamentosa, & ob sui texturam villosam acria quævis, rigida & aspera obtundunt, temperant, emolliunt & flexilia reddunt, sanguinis

nis nimium motum sistunt, eumque nonnihil incrassant, hinc in faucium asperitate, siti nimia, defluxionibus acrioribus & sanguinis æstu convenientissima sunt.

CLYCYRRHIZA.

Est Glycyrrhiza filiquosa vel Germanica C. B. P. radix oblonga, farmentosa, digiti crassitie, coloris flavi, saporis subacris mellei dulcissimi, tenuis odoris mellei; debilis amarities latet in cortice, hanc excipit levis acredo, unde colliguntur Θ ia blanda.

Planta est filiquosa papilionacea unicapularis.

Copiose colitur in agris Bambergensibus, jam vero omnium optima ex insulis Canariensibus transfertur, quæ pugni crassitiem adæquat.

Ob sui dulcedinem acredine leni temperatam mulcet & incidit, ut proinde in faucium asperitate, tussi sicca, in Pleuritide, dysuria & stranguria, ut & in phthisi in specie laudetur; & ubi saccharata ob acetositatem non conveniunt, glycyrrhiza præscribitur: temperat quoque diaphoretica & diuretica, quæ ob sui acredinem suspecta habentur, infantum quoque alvum emollire & solvere creditur.

Datur in quavis formula. in substantia ad \mathfrak{zj} in infuso & decocto. ad \mathfrak{zj} .

\mathcal{R} . Rad glycyrrh. $\mathfrak{z}iiij$. Cinam. $\mathfrak{z}ij$. coq. ex ∇ Hordei add. ferment. pistor. petiis exceptum, repone donec fermentet, f. potus ad sitim tollendam, addi quoque possunt passulæ minores.

\mathcal{R} . Rad. glycyrrh. Doronic. ana $\mathfrak{z}\beta$. tussilag. $\mathfrak{z}ij$. ir. flor. $\mathfrak{z}\beta$. herb. salv. fol. tussilag. ana Mj . jujub. n. vj . vel vij . febeften. n. v . caric. ping. n. vj . sem. cubeb. $\mathfrak{z}\beta$. f. c. ∇ & vino decoctum pectorale.

\mathcal{R} . Gly-

℞. Glycyrrh. alth. ana ʒʒ. f. pulvis in ∇ chærefol. tussilag. & papav. exhibendus in Pleuritide.

D O.

Γλυκυρρίζα, dulcis radix, κλυκύνφορον, γλυκεία, Ἀδίψος adipos
à sedanda siti, unde & hydropicis suadetur, LIQUIRITIA, Süß-
Holz, Süß-Wurzel. REGLISSE.

Notæ characteristicæ ab authore appositæ addenda sunt folia bina
conjugata costæ adhærentia, cui summæ folium impar innascitur.

Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica C. B. Pin: 352. Glycyrrhiza
radice repente vulgaris Germanica I. B. 2. 328. Glycyrrhiza vulgaris
Dod. Pempt. 341.

Sicuti in Germania, ita quoque in Gallia, Hispania, Italia &c.
luxuriat. Bambergæ in agris colitur, tertio & quarto anno effodi-
tur, modo, ut JOHANNES BAUHINUS notat, sequenti: sulcus longus
per totum agrum ducitur duos fere pedes latus, profundus tres aut
quatuor dodrantes, sic majores radices eximunt, relinquunt minores.
Colligi autem debet Pleiadibus occiduis. Si in hortis feritur, his
quæ semel comprehenderit, ut recte loquitur FUCHSIUS: tam per-
tinaci fertilitate cohæret, ut vix unquam possit radicitus extirpari, tam
restibili fecunditate regerminat. Glycyrrhiza Germanica præfer-
tur Hispanicæ. Radix hæcce annotante TOURNEFORTIO fere
tota resolvitur in phlegma acidulum, oleum atque terram, unde ejus
dulcedo facile deducitur. Ob saporem suavem, virtutem demul-
centem & sitim sedantem, omnia fere decocta pro potu ingreditur.
Sitim sedat ore tantummodo detenta. Notandum autem utique ex-
teriore cortex paulum amaricantem removendum esse, & non
nimis diu decoquendam esse hanc radicem, ne potus vel nimis glu-
tinosis fiat vel amarorem contrahat. Præstat hinc illam sub finem
fere coctionis adjicere. Decoctis porro pectoralibus, vulnerariis at-
que sudoriferis sæpe sæpius admiscetur. In quibusvis affectibus re-
num eorumque ulceribus & calculo prodest. In summa in om-
nibus pulmonum, renum, vesicæ & Urinæ vitiis optime exhibe-
tur. In Lue venerea quoque conducit ut & gonorrhæa virulenta.

Pulvis liquiritiæ usurpatur instar infusi Thee. Pi-
lulæ quoque, partim ne coalescant, partim saporis gratia pul-

pulvere hoc consperguntur. Looch pectorale sumi solet cum baculo liquiritiæ & quidem reclinato capite, quo in ore lique scat. Baculus quoque liquiritiæ epilepsia & convulsionibus laborantium ori intruditur, ne linguam dentibus lædant. Infantibus dentientibus baculus etiam liquiritiæ masticandus offertur. Externe radix hæc pulverisata vel per se vel cum farina secalina aut triticea vel furfuribus mixta erysipelati inspergitur, quo modo etiam conducit in podagra, aphthis & ulceribus oculorum. Veterinarii pulverem liquiritiæ cum æquali quantitate sulphuris miscent & quotidie ad *℥iv.* equis, quos *Bauchstößig* vocant, exhibent Glycyrrhizam in aqua decoctam post accedentem fermentationem inebriare affert *RAJUS*.

EX LIQUIRITIA IN OFFICINIS PROSTANT

Liquiritia in baculis, vulgo sed male *cocta* dicta & quidem *Liquiritia cocta alba*, *Weißgebachen*. *Süß-Holz* / *Reglisse cuite blanche*, atque *Liquiritia cocta citrina* *Gelbgebachen*. *Süß-Holz* / *Reglisse cuite Citrine*. Lambuntur in tussi & raucedine à materia acri proveniente, alba autem magis incrassat. (Ex eadem massa vel paulo etiam simplici formantur *Trochisci becchici albi*, *Weisse Husten-Täffelein* / *Trochisques pectorales blancs* & *trochisci becchici Citrini*, *gelbe Husten-Täffelein* / *Trochisques pectorales jaunes*, qui etiam eodem modo & ad eundem finem usurpantur.) Prostat etiam *unguentum de Liquiritia*, *Süß-Holz-Salbel* / *Onguent de Reglisse*, quod inflammationes leviores, pustulas à sero falso productas, intertriginem & similes affectus sanat, ulceribus dolorificis à falsi seri acrimonia profectis confert, oculis medetur, humores acres mitigando, pustulasque à sanguine bilioso acriore oriundas desiccet. Conducit quoque fissuris papillarum in mammis lactantium.

Extrahitur ex hac radice succus, de quo infra.

DORONICUM.

Sunt Doronici radice scorpii C. B. P. radiculæ oblongæ, rotundæ, tuberosæ, nodosæ, digiti minoris crassitie, ex viridi pallescentes, plures ex uno capite tenuibus quasi filis dependentes, saporis subacris, subdulcis ad glycyrrhizam accedentis,

cedentis, odoris nullius: minorem habet dulcedinem quam glycyrrhiza, sed saporem magis aromaticum. Hodie nobis eo nomine non venit, quo veteribus, venenatam enim qualitatem non habet.

Planta est discoidea, radiata pappescens.

Habet in dulcedine si recens sit aliquid aromatici, quod cuminum redolet, seu semina nigellæ, & propterea ob hoc blandum aromaticum junctum dulcedini discutit vertiginosos vapores, & involvit sæpe existentes in confuso & inordinato motu.

Datur in substantia à ʒß. ad ʒj. in decocto vero more congenerum, sed rarius datur in decoctis & infusis. Jungitur visco querno. Stimulatur galanga, cubebis, cumino, ☉ volat. succin. Castoreo.

℞. Rad. Doronic. ʒj. galang. ʒß. ☉ Volat. succin. gr. v. castor. gr. vij. f. pulv. cum conserv. fl. anthos & syr. fl. tunic. q. s. f. bolus. In vertiginosis addi potest Laud. op.

In sanguine congrumato ℞. Doronic. ʒj ex ▽ Chærefol. add. ☉ Volat. C. C. Oc. ☿. sperm. Cet.

R A-

DORONICUM *Gämsß, Wurß* / quod credatur rupicapras alta petentes hac radice vesci, *Schwindel-Wurß* / quoniam vertigini medetur. *Doronic.*

Est planta flore radiato cujus discus ex flosculis, corona ex semiflosculis componitur, embryonibus qui postmodum in semina pap-
pis instructa thalamoque affixa abeunt, infidentibus & calyce pel-
viformi & multifido comprehensis.

Doronicum radice Scorpii C. B. Pin. 184. Doronicum lati-
folium Clus: Hist: xvj. aliis magis placet

Doronicum radice dulci C. B. Pin. 184. Doronicum folio
subrotundo serrato I. B. 3. 17. Doronicum iij. Austriacum ij. Clus.
Hist. xvij. In montibus Helvetiæ, Languedociæ, Provinciæ, Au-
striæ

striae, Styriae, Tyrolis &c. occurrit, floret Julio, in hortis vero Majo.

Huic radici, qua Damæ & venatores ipsas insequentes ad præcavendam vertiginem uti asseritur, plures adhuc virtutes alexipharmacæ, cordiales, præsertim in palpitatione cordis, cephalicæ &c. adscribuntur, ab aliis vero vix non tanquam maxime venenata rejicitur, præsertim cum animalibus quibusdam lupis, canibus, existat exitiosa &c. unde non doronicum sed dæmoniacum appellat **MARANTHA**. Quod si porro quis dissensum authorum, aliis pro, aliis contra, stantibus, consideret, dubius quisquam maxime hæret, præsertim dum **GESNERUM** & ipsum & alios eo innoxie imo cum fructu usos fuisse nonnulli perhibent, nonnulli vero ejus usu è medio sublatum fuisse clamitent. Adeo venenatam esse præsertim exsiccatam & debito modo atque quantitate adhibitam vix videtur, cum funambuli aliique ad evitandam vertiginem illam innoxie assumant. Interim magis hodie pro usu externo in nodulis ad vertiginem quam pro usu interno adhibetur. Nolo multa verba facere de usu superstitioso radicis hujus certo tempore effossæ & corpus immune à vulneribus quibusvis præstantis, sicuti quoque de *Ægagropilis*, quas ex fibris hujus plantæ in *Rupicaprarum* ventriculis generari autumant, sermonem nunc facere non vacat.

RADICES AQUOSIS CRASSIS SEU MUCILAGINOSIS CONSTANTES

Mucilaginosæ concipiuntur corpuscula oblonga mollia, minus mobilia ac aquea, multis obtusis ad latera fibrulis instructa, quibus fluida quævis & acria quævis comprehendunt, stringunt, incrassant & obtundunt, hinc virtute dulcibus accedunt, temperata sunt, potentius acria obtundunt, fluida incrassant, sanguinis nimium motum sistunt, rigida emolliunt &c.

ALTHÆA.

Est *Althæa* Dioscoridis & Plinii C. B. P. radix oblonga,
digiti

digiti crassitie, in ramos divaricata, foris pallide cinerea, intus pallida, ex ficcitate rugosa, saporis mucilaginosi & leniti, odoris nullius evidentis.

Planta est Pentapetala [monopetala, foliis divisis] semilunaribus in rotunditate caseolum exprimente seminibus dispositis.

Agit in omnia Θ ia, tam salsa quam acida, partim ea ∇ eis fundendo, partim Θ ina spicula involvendo.

Præter virtutes dulcibus cæterisque mucilaginosi communes, singulari proprietate tanquam anodyna confert affectibus Urinariis, stranguriæ, dysuriæ, prohibet calculosum acidum, & promovet generati calculi excretionem. Externe emollit, maturat & dolorem sopit, quam ob causam ingreditur Cataplasmata, Emplastra, Clysteres &c.

Datur in substantia ad \mathfrak{zj} . in decocto & infuso ab $\mathfrak{z\beta}$. ad \mathfrak{zj} .
 \mathfrak{R} . Rad. alth. \mathfrak{zj} . sacch. cand. $\mathfrak{z\beta}$. M. f. pulv. in dysuria add. nuc. mosch. $\mathfrak{z\beta}$.

\mathfrak{R} . Rad. alth. \mathfrak{zij} . fol. malv. Mij. passul. min. \mathfrak{zvj} . coq. in f. q. ∇ f. apozema, emolliens, laxans si velis habere add. fol. fenn. \mathfrak{zvj} . Crem. \square ri \mathfrak{zib} . & colaturæ permisce syr. d. spin. cervin. f. apoz. emolliens & laxans.

In fluxionibus acris salsis. \mathfrak{R} . Rad. alth. lil. alb. ana \mathfrak{zj} . tussilag. \mathfrak{zij} . herb. scabios. heder. terrestr. ana Mj. fl. pap. rhœad. p. j. sem. lin. foen. græc. ana \mathfrak{zij} . foenicul. \mathfrak{ziii} . fic. ping. n. x. dactyl. n. x. f. mitissim. decoctum ex ∇ vel vino.

In acido dysenterico expugnando \mathfrak{R} . Rad. alth. $\mathfrak{z\beta}$. rhab. tost. $\mathfrak{z\beta}$. $\circ\circ$ nuc. mosch. expr. gr. iij. Laud. op. gr. j. f. pulv.

In Nephritide & in calculo, qui oritur à particulis alcalinis cum acidis. \mathfrak{R} . Rad. aperient $\mathfrak{z\beta}$. alth. \mathfrak{zj} . glycyrrh. \mathfrak{zij} . flor. Melil. sambuc. ana Mj. fol. alth. Mj. f. decoct. ex sero lactis. Colatur. \mathfrak{tbvj} . add. syr. dialth. \mathfrak{zvj} . \sim Θ dulc. ad grat.

Vidi calculum excretum à puero sex annorum, benefi-

cio cataplasmatibus scroto impositi ex althæa, lacte & o lini expresso. Ingreditur etiam, omnis generis Clysteres.

LI.

Ἀλθαία ἀπὸ τῆς ἀλθαίας mederi, Ἰβίσκος IBISCUS, MALVA-VISCUS, BISMALVA quod duplo majores vires quam Malva possideat, Ulthee. Ibisch / Cibisch / GUIMAUVE.

Est planta floribus & fructibus Malvæ omnino æmulis, foliis lanuginosis & canescentibus.

Althæa Dioscoridis & Plinii C. B. P. 315. Althæa sive Bismalva, I. B. 2. 954. Althæa, Ibiscus Dod. Pempt. 655.

Nascitur, ut I. BAUHINUS innuit, locis quidem uliginosis, pinguibus, humentibus & palustribus in pratis & fossis. In pluribus autem locis colitur in hortis. Floret Julio & Augusto. Radix colligenda vere vel autumno. Analyti quidem Chymica sal volatile concretum & fixum lixiviale extrahitur, videtur tamen agere succo glutinoso, qui constat phlegmate multo, multa terra, acido atque sulphure, & salia ita sunt irretita, ut non nisi igne manifestentur. Tournefortio authore. Decoctum althææ radicis laudatur quoque in ileo, asperitate faucium, affectibus pectoris ut & in sedandis hæmorrhoidibus. Mucilago ex radice extracta cum saccharo mixta fissuras labiorum & papillarum curat, dolores cutis teneræ ab æstu solis mitigat & in doloribus post vesicatoria exortis conducit, item in ambustis. In dentitione infantum difficili infantibus masticanda datur. Adhibetur quoque ad purificandos dentes dum ea fricantur, ut autem occultetur, tingitur colore rubro, purificatam radicem coquendo cum Santalo rubro aut alumine vel cum vino rubro. Sunt quidam Empirici Germani, qui illam radicem rubram Gallicam vocant.

EX HAC RADICE SEQUENTIA IN OFFICINIS NOSTRATIBUS REPERIUNTUR PRÆPARATA.

Syrupus Althææ simplex, Ulthee-Syrup / Syrop de Guimauve, qui ob vim demulcentem in affectibus colicis, nephriticis atque pectoris præsertim, ubi simul acrimonia humorum peccat, utilis existit.

Syrupus Dialthææ vel Althææ Fernelii, Ulthee-Syrup / Syrop de Guimauve ou d'Althea de Fernel. Urinæ ardorem demulcet, viscidum &

& obstruentem renum saburram expurgat & in doloribus à calculo prodest. Sumitur cochleatim ad unum aut alterum cochlear vel etiam aliis commiscetur: conducit quoque in tussi, asthma, pleuritide, catarrhis falsis acribus & tenuibus.

*Unguentum Althææ, Dialthæa sive de Althæa simplex, Althee-
Gâblein / Onguent d'Althæa ou de Guimauve.* Usu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum & humectandum, pectoris dolorem à frigore contractum abolet, laterumque doloribus felicissime adhibetur, viscerum durities laxat & stomachi inflammationes discutit, valet ad nervorum duritiem ac resolutionem eosque præcisos glutinat, vulnera claudit, imprimis vesicæ benefacit, lenit, incidit & digerit.

Ex hoc unguento cum oleo Laurino fit *unguentum mixtum* vernacula *Althee-Porol* dictum, in vulgus magnopere commendatum.

Quidam ex mucilagine hujus radice cum saccharo parant tabellas vel rotulas præsertim ad morbos pectoris convenientes: alii addunt alia.

Tandem notandum, quod ex althæa radix, è malva vero folia in usum trahi soleant communiter.

℞. Rad. althææ ʒss. gumm. Ceras. ʒj. Sacch. alb. vel viol. ʒiij.

Msc. f. pulvis. in everrendis urinæ viis & sabulis impediendoque arenularum concremento mane & noctu capiantur tres cuspides cultri per se vel ex quolibet vehiculo præservationis gratia. Tempore autem paroxysmi ter, quater, imo pluries in die, pro doloris urgentia assumatur. Lentilio hic pulvis euporistus fuit familiaris.

LILIUM ALBUM.

Est Lilium Album flore erecto & vulgare C. B. P. radix bulbosa, squamosa, intus alba, extus parum fusca, saporis mucilaginosi & lenti, odoris nullius.

Planta est caule multis foliis cincto, floribus ipsis erectis.

Lentorem habet blandiorem quam althæa, in clavis pedum, & induratis puerperarum pudendis singulare est.

Anodynum est, ut & ꝑ̄ ejusque flores. Additur quoque Clysteribus anticolicis.

℞ Rad. lil. alb. ʒj. fol. Malv. Mj. flor. verbasc. sambuc. ana Mʒ. coq. in ∇ add. Colat. Elect. lenitiv. ʒʒ. Θ gemm. ʒj. M. f. Clyster in foecibus durissimis.

SYM-

Κεῖνον, λεῖον, LILIUM CANDIDUM, ROSA JUNONIS SIVE JUNONIA, quia ex lacte ejus dum Hercules iugeret in terram delapso natum fingitur; LILIUM SALOMONIS, Flos Regius & Regina, Weisse Lilien / Weisse Lilgen / oder Lilgen / LIS BLANC.

Est plantæ genus flore veluti campaniformi ex petalis sex composito nunc magis nunc minus repandis. Pistillum abit in fructum oblongum ut plurimum trigonum, in tria loculamenta divisum seminibusque foetum quasi marginatis, gemina serie sibi incumben- tibus. Addenda autem merito, notante Tournefortio, Radix bulbosa ex pluribus squamis carnosiss axi affixis constans.

Lilium album vulgare L. B. 2. 658. Lilium album flore erecto & vulgare C. B. Pin. 76. Lilium candidum Dod. Pempt. 197.

Hoc jam Lilium, quotiescunque in compositionibus Lilii simpliciter mentio fit, intelligendum est.

Colitur in hortis solo pingui stercoreato & umbroso, floret Junio.

In usum Medicum ex hac planta potissimum trahuntur radix, flores, & apices staminum lutei, qui antheræ vocantur. Radix interne rarius usurpatur, quamvis à quibusdam ad sanguinem congruatum ejiciendum, urinam, menses & partum promovendum commendetur. Externe vero, præter usum ab authore notatum, ad dolores nephriticos, inflammationem penis & vesicæ, impetigines, scabiem, ichorem, phthiriasin adhibetur. Ingreditur quoque cataplasmata emollientia atque suppurantia ad tumores imprimis vero ad bubones. Laudatur quoque ad ambusta hæmorrhoides cacas demulcendas & ad capillos generandos.

GODERUS Elisabethæ Reginae Chirurgus referente GERARDO & ex eodem RAJO multos hydrope laborantes sanavit radicis succo cum farina hordeacea mixto, pane scilicet ex istiusmodi massa confecto

fecto ægro per mensem aut sex hebdomadas continuas exhibito, quo solo & non alio pane per totum id tempus vesceretur.

Flores admodum fragrantés sunt temperatissimi, ingrediuntur cataplasmata, emplastra, unguenta, clysmata emollientia, maturantia, suppurantia. Ob odorem fortem nimis, præsertim recentes, non solum sternutationem cient, sed & dolorem capitis haud raro causantur. Antheræ sive apices & crocus liliorum alborum, Das gelbe von weissen Lilien / commendatur ad pellendum foetum & accelerandum partum, item ad foetum mortuum & secundinas expellendas atque menses ciendos, si in aqua verbenæ vel artemisiæ vel aqua cinamomi vel vino propinentur, vel jusculis incoquantur. Quamvis, ut præsertim LUDOVICI author est, hæc virtus nondum omnimodo extra controversiâ posita sit, licet antheræ juxta Cratonem & Joëlem tantæ sint potentiæ in expellendis mensibus, ut citra abortus periculum gravidis adhiberi non possint. Folia etiam Lilii albi confusa & imposita cancro corroderenti mirifice prodesse dicuntur. Curiosum utique est, quod caules lilii albi abscissi, in loco, ubi sol atque pluvia aditum non obtinent, suspensi è nodis proferant radículas, quas deinde in bulbos excrecere contendunt.

IN OFFICINIS EX LILIO ALBO PROSTANT.

Aqua liliorum alborum ex floribus, Weiß-Lilien-Wasser / *Eau de Lis blancs*, quæ præterquam quod ad supra dictos affectus commendetur, in affectibus pectoris, tussi, raucedine, asthmate, confortando capite & catarrhis sic dictis frigidis laudatur. Magis autem & frequentius externe usurpatur tanquam insigniter Cosmetica, ad nitorem faciei præsertim conciliandum vel sola vel cum aliis mixta. Virtutem ejus ad augeri putant, si oleum tartari per deliquium admisceatur parumque camphoræ adjiciatur.

HOFFMANNUS in Schroederum flores vim Hystericam, obtinere pronunciat, dum ex his in vino aliquot diebus infusis & postmodum destillatis aqua elici potest ad suffocationem Hypochondriacam seu hysteri-
cam præstantissima, non omnibus nota, cujus dosis est ad cochlear. j. ij. vel iij. ad præservationem & curationem.

Imprimis autem celebre est *Oleum liliorum alborum* per infusionem paratum, Weiß-Lilien-Dehl / *Huile de Lis blancs*, quod anodynum est, emolliens, laxans & inflammationes maturans atque suppurans. Convenit in affectibus renum & vesicæ ortis ex acrimonia
urinae.

urinæ. In Ischuria regioni pubis inungitur, & in unguentis anodynis adhibetur. Obstetrices manus hoc oleo inungunt, inunctasque in sinum muliebrem immittunt ut emolliatur & lubricetur. Adhibetur etiam in clysteribus pro emollienda alvo & laxando utero. Genitalia quoque circa pubem per aliquot dies ante partum oleo hoc illinire quædam mulierculæ solent. Ad dolores post partum usurpatur. In ambustionibus prodest, commendatur quoque in præcisis nervis & convulsionibus, in ulceribus manantibus, favis & furfuribus, ut & vulneribus recentibus consolidandis.

Basin hoc oleum constituit usitatissimi unguenti quod *Anodynum* à virtute appellatur, *Schmerz-stillende Salb / Onguent anodyn.*

SYMPHITUM.

Est symphitum seu consolida major C. B. P. radix oblonga, furculosa, pollicem crassa, nigra, intus alba, saporis subdulcis mucilaginosi & visceridi, odoris nullius.

Planta est asperitolia flore monopetalo cylindræo; quinque laciniis dissecto, seminibus quaternis.

Crassiore mucagine pollet quam althæa, cum qua convenit, in specie Vulnerarium est, antidyntericum, & antihæmoptoicum & in exulceratione renum & vesicæ ex cantharidibus orta.

Datur ut althæa, sed ob crassiorem mucaginem in minore dosi.

In Clysteres si recipitur, præstat, ut sindoni involvatur, ne crassior mucago decocto permisceatur, & intestinis justo diutius adhæreat ac acescendo tormina producat; corrigitur & alteratur mucago Camphora.

℞. Rad. symph. ʒ℔. urtic. cum toto Mij. affund. iij. pint. ∇æ. coq. ad consumptionem ij. pint. bis vel ter solo hoc decoct. D. Hermannus curavit hæmoptoën. Laud. opiatum quodvis extemplo levat ægrum si recidivam patiat. ℞. Con-

℞. Consolid. maj. bol. armen. tragac. Mastich. ana ℥j
conserv. rosar. r. antiq. syr. Corallor. q. s. f. f. Electuarium
in hæmoptysi.

Extra radix applicata confert in hæmorrhagiis, fractu-
ris, luxationibus, herniis, in sanguine coagulato singulare
quid præstare dicitur.

℞. Rad. torment. symph. ana ℥j. veron. alchymill. plan-
tag. ana Mj. summit. Hyperic. M℔. coq. in ∇. ℞. Colatur
℔ j. add. syr. d. symph. Fern. ℥j. cape provulnerario in-
terno, & in quovis haustu bals. Δis gr. vij vel x.

In phthisi ℞. rad. Chin. ℥ij. passul. min. ℥i℔. Consol.
maj. ℥℔. coq. in s. q. ∇æ.

Singulare hoc est contra herniam. ℞. Sem. nasturt.
hort. ℥℔. gumm. carann. Mucag. ex symphit. extract. ana:
contra quamvis herniam recentem exlaxato peritonæo.

In fracturis ossium intus exhibeo. ℞. Osteocoll. ℥℔.
cum rasur. consol. maj. ℥j. cito certe consolidantur. Ex-
terne unguentum ex ipsa mucagine addita osteocolle mire
prodest.

Contra fluxum alvi dysentericum. ℞. Consolid. maj.
℥j torm. bistort ana ℥℔. herb. pyrol. alchymill. fanicul. ana Mj.
coque in ∇ chalybeata f. decoct. add. Bals. Δ hyperic. addito
℔ rosar. f. Clyster.

R A-

Σύμφυτον ἀπὸ τῆς συμφύειν à facultate conglutinandi, quod hæc
herba quasi renasci faciat carnem, vel quod frustra carnis discissa,
si cum iis coquatur, conglutinet. CONSOLIDA porro MAJOR vocatur
& SOLIDAGO atque CONSOLIDAGO à vulneribus consolidandis. ALUM.
ALUS.

ALUS, Wall: Wurk / Schwarz: Wurk / Schmeer: Wurk /
 Bein Welle / GRANDE CONSOUDE, OREILLE D'ASNE.

Est plantæ genus flore monopetalo infundibuliformi oblongo
 & quasi campaniformi, ex calyce secto surgit pistillum quatuor
 veluti stipatum embryonibus, qui abeunt in totidem semina capitis
 viperini æmula, in calyce ampliato maturescentia. Sequentes spe-
 cies promiscue usurpari possunt.

Symphytum Consolida major flore purpureo quæ mas C. B.
 Pin. 259. Symphytum magnum L. B. 3. 593. Dod. Pempt. 134.

Symphytum consolida major flore purpureo cæruleo. C. B. Pin.
 259. &

Symphytum consolida major flore albo vel pallide luteo, quæ
 fœmina C. B. Pin. 259.

Crescit passim in pratis & hortis, loco gaudet humido. Floret
 Majo, Junio &c. Tota planta odoris expers est & perpaucosaporem
 prædita. Folia & flores rarius, radix autem frequentissime in usum
 trahitur, quam jubent colligere mense Martio & Aprili tempore ple-
 nilunii. Alii collectionem suadent Autumno. Serum falsum corri-
 git atque incrassat tenue. Adhibetur in decoctis vulnerariis. In Go-
 norrhœa & fluxu albo laudatur. Externum usum quod concernit,
 vix est emplastrum consolidans quod expers sit symphyti. Balnea
 quoque & infusus adstringentes ingreditur, quibus etiam utuntur
 meretriculæ ad sophisticationem virginitatis. Exemplum vide apud
 SENNERIUM. In contusionibus & suffusionibus multum prodest.
 Decoctum symphyti si post Venæsectionem brachium sanguine con-
 grumato tingitur à LEFEBURE laudatur. Doloribus quoque po-
 dagricis & ischiadicis mitigandis inservit.

IN NOSTRATIBUS OFFICINIS

non prostat ex Symphyto nisi Syrupus de Symphyto Fernelii,
 Wall: Wurk: Syrup / Syrop de Grande consoude. Vires obtinet ad-
 stringentes & roborantes, conducit in fluxibus alvinis & ad hæ-
 morrhagias, imprimis hæmoptysin laudatur. Pulmones roborat &
 convenit in phthisi.

RADIX CONSTANS MUCAGINE TENUIORE PAUCIS FIXIS SALINIS.

TUSSILAGO

Est *Tussilago vulgaris* C. B. P. radix tenuis, longa, candida, saporis subacris, cum levi lentore, odoris nullius. Planta eadem quæ *Petasitis*.

In blando suo lentore nonnihil \ominus . fovet, unde tam incidendo, quam obtundendo acria, specificè prodest in phthisi, tussi, tabe & pleuritide.

Datur in decocto ad \mathfrak{z} ij ex vino, lacte, cerevisia. *Lindanus* magno cum successu decoctum solum exhibuit.

\mathfrak{R} . Rad. tussilag. \mathfrak{z} ij flor. papav. err. Mj. bellid. min Mj. f. decoct. add. Mand. luc. pisc. \mathfrak{z} ss. \ominus volatil. C. C. \mathfrak{g} ss. M.

\mathfrak{R} . Rad tussilag. \mathfrak{z} iiij. alth. \mathfrak{z} ss. helen. \mathfrak{z} iiij. farsæpar. \mathfrak{z} v. herb. scabios. hed. terrestr. veronic. pulmonar. capill. \mathfrak{q} is ana Mss. sem. anis. foenic. ana \mathfrak{z} ij. coq. in ∇ vel vino vase probe clauso, colatur, add. syr. violar. vel scabios. \mathfrak{q} . f. f. apozem.

RA-

$\beta\eta\chi\iota\omicron\nu$ BECCHIUM à sedanda tussi, FARFARA, FARFARELLA, UNGULA CABALLINA, UNGULA ASININA, LACTUCA USTULARIA, FILIUS ANTE PATREM, quoniam februario & Martio foliis nondum egressis repente floret. APHYLLANTES quoque dicitur. \mathfrak{R} osß Sub/ \mathfrak{R} osß-Hüß/Hüß-Lattich/Brand-Lattich/TUSSILAGE, PAS D'ASNE.

Est planta flore radiato, cujus discus ex flosculis corona ex semiflosculis componitur embryonibus insidentibus & calyce multifido comprehensis. Embryones postea abeunt in semina pappis instructa thalamoque affixa. Discrepat itaque à petasite.

Tussilago vulgaris C. B. Pin. 197. *Tussilago* L. B. 3. 563. *Becchium* sive *farfara* Dod. Pempt. 596.

X

Secus

Secus fontes & rivulorum fluviorumque ripas, Scrobium ac fossarum margines aliisque humentibus & aquosis locis sponte nascitur. In hortos recepta multum incommodi parit. Februario & Martio flores fugacissimos profert, qui cito una cum pediculis marcent, inde folia progignuntur tota æstate in vigore futura.

In usum ex hac planta veniunt radix folia & flores.

Planta est Thoracica, asthmati, orthopnoæ vomicisque pectoris medetur. Adhibentur folia & flores in decoctis instar herbæ Thée. A quibusdam fumus foliorum siccatorum instar Nicotianæ per fistulam hauritur ad prædictos pectoris morbos. Extrinsecus folia profunt ulceribus & inflammationibus, item in fissuris & ulcusculis papillarum.

EX TUSSILAGINE OFFICINÆ ASSERVANT

Aquam destillatam Farfaræ ex foliis, *Huff-Lattich* oder *Rosshub-Wasser* / *Eau de fleurs de Tussilage* ou de *Pas d'asne*, tum interne tum externe refrigerare dicitur. Ad ulcuscula urentia in partibus pudendis mulierum ut & hæmorrhoides applicatur tepide.

Conserva Farfaræ, *Rosshub* oder *Huff-Lattich-Zucker* / *Conserve de Tussilage*.

Loboch de Farfara, *Rosshub-Lattweg* / *Loob de Tussilage* ou de *Pas d'asne*, in tussi, raucedine aliisque pectoris affectibus conducit.

Syrupus de Farfara, *Rosshub-Syrup* / *Syrop de Tussilage*, commendatur & hic in morbis pectoris, tussi, pleuritide, catarrhis salsis & acribus. Usurpatur vel per se cochleatim vel in decoctis & infusis Theiformibus pectoralibus.

RADICES PARTICULIS TERREIS CONSTANTES

Terrea concipiuntur corpuscula irregularia, porosa, gravia, fixa, ad motum inepta, quandoque secum vehentia quippiam subtilis vel acido austeri, vel alcalico aromatici.

Cognoscuntur quasi à priori gustu adstringente qui producit dum ex poris & meatibus Linguae absorbetur & exhau-

hauritur fluidum & serum, unde pori concidunt, exiccantur. Vehunt in se ut plurimum subtile acido-austerum, à quo feri fluiditas stringitur, quasque figitur.

Hinc eorum effectus est sanguinem cæterosque humores fluidiores & tenuiores incrassare & figere, ut & fibras partium coarctare, constringere & roborare. Propterea conveniunt in nimio sanguinis motu & æstu, in omnibus fluxibus, Vulneribus, internis visceribus roborandis. Sunt & nonnulla terrea simul alexipharmaca seu bezoardica, dum nimiam sanguinis resolutionem, quam venena maligna minantur, sua adstringentia impediunt. Potentius & felicius operantur, si ipsis quippiam acidi jungitur.

ALC ANNA.

Est anchusæ Monspeliacæ radix oblonga, crassa, foris rubicunda, intus alba, rubro colore inficiens, lignosa, saporis dum recens paulum adstringentis & insipidi, odoris nullius. Secundo sationis anno mense Martio dum spiritibus suis vegetabilibus gaudet colligenda.

Ex radice Indi cum calce viva extrahunt tincturam, cum qua dentes & ungues rubro colore tingunt, etiam crines equorum.

RI.

Α'γχασα ab ἀγχεῖν à virtute strangulatoria, vel uti Schwenckfeldt vult παρὰ τὸ ἀγχαίρεισθαι à fricando seu furo illinendo, quod tamen Rajo non probatur. BUGLOSSA RUBRA, ALCANNA OFFICINARUM, Alcibiadion: Nothe Ochsen-Zung/Alcannen. Wurk/Türkische-Nothe/ ORCANETIE. Pertinet ad species Buglossi.

Buglossum radice rubra sive Anchusa vulgatiores floribus cæruleis Tourn. I. R. H. cl. 2. f. 4. g. 2. Anchusa puniceis floribus C. B. Pin. 255. Anchusa Monspeliana I. B.

§84. Anchusa parva Lob. Jcon. 578. Reperitur in Gallia Pro-
vincia, Languedocia &c. affertur quoque ex Oriente. Radix qui-
dem pro usu Medico commendatur, sed licet vi adstringente gau-
deat, vix aliter usurpatur, quam ad colorem rubrum pannis, li-
gnis, ceræ aliisque rebus conciliandum, nisi quod ad sophistica-
tionem virginitatis quoque in usum cedat.

Testante CLUSIO in Hispania eadem utuntur ad fucandam
faciem, qui mos jam GALENI temporibus usualis fuit, nec ho-
dientum adhuc cessat. SIMON PAULI fucum facile detegi posse
asserit, si mandentes caryophyllum vel etiam crocum halitum
faciei afflent. Solet ut plurimum hodie usurpari ad medicamen-
ta colore rubro grato tingenda. Hinc miscetur Butyro rubro, seu
unguento potabili rubro, decoctis pro potu ordinario & aliis.

BISTORTA.

Est Bistortæ majoris radice minus intorta C. B. P. radix
oblonga, pollicem crassa, quasi tuberosa & geniculata seu
nodosa, nonnunquam retorta, foris ex spadiceo nigricans,
intus ex flavo rufescens, saporis austeriusculi adstringentis,
odoris nullius.

Planta est pentapetala spicata, seminibus triangulis
splendentibus.

Validius adstringit quam alcanna, hinc potens est in
fluxibus sedandis & nimia sanguinis resolutione causata à ma-
lignitate, laudatur quoque in præcavendo abortu.

Datur in qualibet forma, in substantia ad ʒj. decoct. ad
ʒj. ad ij. sudores etiam movet, cujus ratio à priori dari non
potest.

℞. Bistort. ʒʒ. conf. ros. r. ʒj. succ. Citr. q. s. f. bolus
adstringens.

℞. Bistort. ʒj. exhibe ex ▽ Plantag. cochl. j. ad præca-
vendum abortum.

℞. Bistort. tormentill. ana ʒj. borrac. calcinat. ʒʒ. conf.
ros.

ros. r. q. s. in adstringenda alvo. [it. in fluxibus feminalibus.

TOR-

BISTORTA ita a radice in se bis vel ter contorta dicitur. SERPENTARIA atque COLUBRINA quoque audit vel a vi alexipharmaca serpentibus præsertim resistente, vel quod folia è terra primum erumpentia linguam serpentis vel viperæ repræsentent.

Echlangen-Wurk / Natter-Wurk / BISTORTE.

Est planta flore apetalo, plurimis staminibus constante ex calyce multifido surgentibus. Pistillum ab it in semen plerumque triangulare, in capsula, quæ floris calyx fuit, reconditum. Adde flores in spicam disponi & radices carnosas esse quasi tuberosas, in se contortas & capillitio stipatas.

Sequentes species promiscue usurpantur.

Bistorta major radice minus intorta C. B. Pin. 192. Bistorta major rugosioribus foliis J. B. 3. 538. Bistorta Dod. Pempt. 333. &

Bistorta major radice magis intorta C. B. Pin. 192. Bistorta media folio minus rugoso J. B. 3. 538. Serpentaria mas seu Bistorta Fuchsi.

Locis humentibus, in opacis sylvis, pratis & pascuis quibusdam humidis, in montibus reperitur, flores spicatos Majo & Junio erigens. In hortos translata facile quoque crescit. In usu radix veluti contorti, ut *Schwenckfeldt* dicit, introque reflexi pollicis digiti manus faciem præ se ferens.

Vis sudorifera & alexipharmaca ex virtute adstrictoria particulisque terrestribus non adeo difficulter derivari potest. Mulierculæ lumbis applicant ad præcavendum abortum. Vulneraria quoque insignis est atque in sanguine quoque congrumato dissolvendo à quibusdam celebratur. Externe conducit ad hæmorrhagias sistendas dentiumque vacillationem, pluribus quoque remediis topicis immisceri potest. Radici Bistortæ quandoque a nascitur fungus, quem in vulneribus & hæmorrhagiis de prædicant.

X 3

TOR-

TORMENTILLA.

Est tormentilla sylvestris C. B. P. radix tuberosa, dura, nodosa, pollicem crassa, in obliquum acta, coloris ex fusco rubescentis, saporis austeriusculi. Subtilior & paulo temperatior est quam bistorta. In Variolis & Morbillis cum alvi fluxu habetur specifica. Dicitur à nonnullis contra Apoplexiam remedium præsentaneum.

Datur in qualibet forma, in substantia ad ʒj. melius in decocto quam infuso à ʒij. ad ʒj. Extracto c. Spiritu Vini vel ▽ propria facto ʒj.

℞. Extr. torment. ʒβ. castor. gr. v. Θ vol. succin gr. vij. f. pil. in Variolis & morbillis.

℞. Torment. alcann. bistort. ana ʒj. M. f. pulv. add. conf. ros. r. ʒj. f. bolus.

℞. Nuc. Mosch. tost. ʒj. sacch. ʒni gr. vij. Laud. op. gr. ij. extract. torment. ʒj. c. syr. ros. r. q. s. f. pil. vel cum conserva rosar. r. f. bolus in Dysenteria.

CON-

TORMENTILLA quia juxta PENA & LOBELIUM tormentum cruciatumve dentium savissimum placat atque venenatarum quarundam rerum compescit furorem cruciantem, Ἑπτάφυλλον HEPTAPHYLLUM. Tormentill / Roth-Wurk / Heyl-Wurk / Rothruhr-Wurk / Rothheyl-Wurk / Birck-Wurk / Nabel-Wurk / TORMENTILLE.

Est planta flore rosaceo quatuor petalis constante in orbem positis. Pistillum ex calyce monophyllo multifido & pelvisiformi surgens abit in fructum fere globosum in quo multa semina calyce ipso involuta colliguntur. Adde folia plusquam terna summo pediculo infidentia.

Tormentilla Sylvestris C. B. Pin. 326. Tormentilla J. B. 2. 598. seu l. 17. c. 74. Tormentilla Dod. Pempt. 118.

Passim

Passim provenit in herbosis & arenosis locis, floret Majo & sequentibus mensibus. In usum hæc planta suppeditat præsertim radicem.

Ex adstringentibus & vulnerariis quam maxime celebratur, ita ut in omnibus fluxibus alvi aliarumque partium, vel cum sanguine junctis vel absque sanguine contingentibus, suadeatur. Symbolizat quam maxime cum Bistorta, nisi quod Bistorta magis adstringat; Tormentilla autem magis quasi aromatica sit. Unde non spernendum HOFFMANNI consilium in CLAVE ad SCHROEDERUM: quod semper, ubi minore adstrictione opus est, Tormentillam Bistortæ præferamus, præsertim cum sit magis tenuiorum partium. Decoctum hujus radice abortum præcavere dicitur. Cum acidum absorbeat, stomachicum quoque constituit remedium. Mire hinc decoctum Tormentillæ, odorem quasi roseum spirans, in appetitu prostrato, ad roborandum tonum ventriculi deprædicatur. Sicuti autem porro ob vim vulnerariam in decocta recipitur, ita quoque eundem ob scopum externe quoque in vulneribus & hæmorrhagiis usurpatur. Ingreditur quoque gargarismata, ad dolores etiam immanes ut & vacillationem dentium. De hac radice ut & de aliis adstringentibus, præsertim paulo fortioribus, merito notandum Medicis cautè esse mercandum. Sunt, qui non absque ratione radicem recentem præferunt siccata. Nonnulli pulverem Tormentillæ cum tartaro emetico miscent æmulaturi hoc modo Ipecacuanha. Verum partim ob copiam hujus radice exoticæ tali permutatione non opus est, partim etiam effectus speratus præter vomitum vix expectari poterit.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua Tormentillæ, Tormentill oder Ruhr-Wurzel, Wasser / Eau de Tormentille, quæ tamen ut aliæ quoque adstringentes aquæ non multum valere videtur. Præferendum semper decoctum.

Extractum Tormentillæ, Tormentill Extract / Extrait de Tormentille quod ad aliquot grana usque ad ℥j. exhibetur.

CONTRAYERVA.

Est Clematis passionalis Peruviana folio bifido, seu Coane-

Coanenepilli: Radix oblonga, tenuis, nodosa, fibrosa, foris rubra, intus pallida, saporis nonnihil adstringentis, cum suavi sed debili acrimonia, odoris aromatici sed exigui. Inter alexipharmaca reponitur. Commendatur magis quam cæteræ radices in morbis malignis.

Datur ut Tormentilla in substantia, infuso, extracto.

℞. Contrayerv. ʒʒ. camph. gr. iij. syr. d. cichor. q. s. in Variolis & Morbillis.

℞. Contrayerv. ʒʒ. Corall. r. ʒi. f. pulv. adstringens excip. conserv. ros. r.

℞. Contrayerv. ʒiiij. santal. r. ʒʒ. — theriacal. ʒiiij. — Ol. dulc. ʒij. — vin. Camph. ʒiij. f. Tinctura Bezoardica. addi quoque possunt radices angelicæ, valerianæ, petasitis.

CA-

CONTRAYERVA ex Latino contra & Hispanico vocabulo Yerva, quasi diceret contra venenum, **RADIX YERVA**, **BEZOARDICA**, **ALEXIPHARMACA**. Drackena appellata fuit à Clusio in honorem F. Dracke qui ei illam dono dederat. **DRACKENA** Clusio, **Peruvianische Giff-Wurzel**. Quænam præcise planta sit, nondum plane constat. Multi Authori nostro assentiuntur, alii dissentiunt. Expectabimus decisionem litis. Interim sequentibus solet exprimi nominibus.

Contrayerva Hispanorum sive Drakena radix Clus. Exot. 83. Drakena radix l. B. 2. 740. Coanepilli sive Contrayerva Hern. 301.

Radix in usu tantum quæ eligenda densa & non cariota. Commendatur à quibusdam contra omnia venena excepto Mercurio sublimato. Laudatur in peste ad præservationem tum in substantia tum in aqua vel vino infusa, si quotidie in prandio haustus sumatur. Spleneticis insuper & Melancholicis auxilio est. Digestionem adjuvat flatulque discutit. A quibusdam ipsi lapidi Bezoar præfertur. Hoc certum est, quod non plane, uti quidam inepte faciunt, sit rejicienda, cum præsertim etiam in compositionibus suo non desit officio

officio. Ut solummodo nunc mentionem injiciam pulveris ab hac radice & regulo Antimonii Medicinalis virtutem suam quoad maximam partem obtinentis. Intelligitur autem à me usu suo & effectu celebratissimus *Pulvis Bezoardicus RollWagii, Hollmagens Gist, Pulver / Poudre Bezoardique de RollWagen*, qui in diverli generis febribus continuis & ardentibus, variolis, morbillis aliisque exanthematibus conducit, ut & in Dysenteria. Datur infantibus & adultis cuspidatim ad duos vel tres cultri cuspides, sive ad scrupulum unum, ad drachmam semis, bis vel ter de die. Prostat etiam paratus ex hac radice gratus ad modum *Syrupus Contrayerva Gist, wurzel Syrup / Syrop de Contrayerva*. Præter vim alexipharmacam quam eidem adscribunt pro scopo sitim sedandi, æstum refrænandi & corroborandi, in variolis, morbillis, febribus continuis & malignis, in mixturis & Julapiis usurpari potest.

CARYOPHYLLATA.

Est Caryophyllata vulgaris C. B. P. radices tenues, fibrosæ, ex uno capite crassiore prodeuntes, saporis subacris, grate amaricantis, odoris modo aromatici caryophyllati, modo nullius, pro diversis quibus colligitur locis, odoratior, quæ in locis crescit excelsis, quam quæ in hortis colitur.

Planta est pentapetala, seminibus in capitulum congestis, nudis crinitis.

Recens & in calidioribus locis nata blandumque aroma caryophyllatum spirans, possidet in substantia terrea aliquid Salis volatilis, ob quod contra Catarrhos & capitis obstructions commendatur. Sicca vero & Se volatili carens, blande adstringendo fibras relaxatas, præcipue Ventriculi, confortat. In specie commendatur à nonnullis in ictero à Bile acri & viscosa. Stimulatur serpillio, majorana.

℞. Caryophyllat. ʒj. majoran. serpill. ana p. ij. affund.
— Ceras. nigr. f. infusum pro Catarrhis.

℞. Rad. Caryophyllat. ʒß. Caryoph. arom. ʒß. conf.
ros. q. f. f. bolus.

CARYOPHYLLATA ita dicta ab odore radice, **BENEDICTA**, **SANAMUNDA**, ab efficacia contra multos morbos. *Benedicten* / *Krauth* / *Benedicten* / *Wurk* / *Mäglein* / *Wurk* / *Cariofilat* / **BENOITE**.

Est planta flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, è divisuris calycis monophylli & pelviformis prodeuntibus. Pistillum abit in fructum fere globosum, in quo plurima semina colliguntur caudata.

Caryophyllata vulgaris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata vulgaris* flore parvo luteo I. B. 2. 398. *Vulgaris Caryophyllata* Lob. Jcon. 693.

Provenit locis opacis magis ac umbrosis juxta vias, in dumetis, sepibus & Sylvis: floret Majo &c. Colitur quam maxime etiam in hortis.

Radix, quæ exterius nigricat, interius rufescit, quamque Martio colligendam esse asserunt, in usum Medicum venit.

Laudatur in apoplexia, epilepsia, cerebrum roborat, flatu præterea discutit, in dysenteria & fluxu cœliaco prodest. Refert obstructions viscerum. Prodest Hæmoptycis & ab alto delapsis, aliisque pectoris affectibus, expectorationem promovet &c. Putredini & venenis resistit: ad menses ciendos deprædicatur decoctum, ab aliis vero in fluore albo conducere dicitur. Potionibus vulnerariis immiscetur. Externo & interno usu ad enterocelen deprædicatur. Ejus decoctum sanat vulnera, & etiam navos maternos.

Tempore vernali vix non omnibus Vinis medicatis immiscetur, præsertim cum gratum conciliet saporem.

Appensa instar amuleti hæmorrhagias sistit & ad ophthalmiam atque Epiphoram laudatur. Sunt qui pulverem inspersum in cancro commendant, ut & ejus decoctum.

Dosis radice per se est ad ʒss. ʒi.

PIMPINELLA.

Est *Pimpinellæ* sanguisorbæ minoris hirsutæ C. B. P. radix calami crassitie, ex fusco subrufa, saporis sabamari, adstringentis, tenuis, non ingrati odoris. Culta in hortis
fit

fit delicatior longe. Gaudet foliis pinnatis, flore stamineo, seminibus ut plurimum quadrangulis.

Respondet caryophyllatæ. Hujus radicis usu hydrophobia fuit curata.

℞. Rad. pimpinell. ʒʒ. C. C. præpar. ʒj. M. f. pulv. addita conserv. rosar. r. f. bolus. addi quoque potest L. O. gr. j. item ʒo Nucist. expr. vel magma post destillationem residuum. Exhiberi potest in quolibet fluxu.

PEN-

PIMPINELLA a foliorum binis ordinibus pennatim sive plumatim dispositis. PIPENNULA PAMPINELLA, SORBA-STRELLA. Non solum sanguisorbæ sed & saxifragæ hoc nomen tribuitur. Alias non solum floribus distinguuntur, sed & discrepant quoad partem juxta versiculum.

Pimpinella pilos, saxifraga non habet ullos.

SORBARIA dicitur à sorbendo, quoniam sanguinem ex vulneribus sorbet. SANGUISORBA, SANGUINARIA, Bim-pernell / Pimpernell / Flein Sperber = Krauth / Flein Blut-Krauth / Flein Kölblins = Krauth / Klein Herr = Gottsbärtlein PIMPERNELLE.

Est plantæ genus flore monopetalo rotato ad centrum usque plerumque quadripartito staminibus plurimis stipato vel pistillo fimbriato. Calyx abit in fructum ut plurimum quadrangularem & utrinque acutum, modo unicapsularem modo bicapsularem, seminibus sætum sæpe sæpius oblongis. In usum præsertim venit

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. C. B. Pin. 160. Sanguisorba minor L. B. 3. part. 2. 113. Pimpinella sanguisorba Dod. Pempt. 105. quamvis etiam usurpari possit

Pimpinella Sanguisorba major C. B. Pin. 160. Sanguisorba major flore spadiceo L. B. 3. p. 2. 120. Pimpinella sive sanguisorba major Matth. 1033.

Pimpinella minor invenitur in limitibus agrorum aridioribus ac asperioribus incultis, item agris & campis, maxime vero iis, qui aprici existunt, soli scilicet expositi. Exit præterea petrosi montosis

tosus asperis locis. Major amat pingua & lutosa loca. Utraque colitur etiam in hortis. Floret Junio & Julio.

Utraque viribus convenit, & in usum suppeditat Radicem & herbam cum floribus, de qua infra. Radix virtute adstringente gaudet, unde in fluxibus sanguineis sicuti tota planta conducit. Commendatur ad dysenteriam mensiumque purgationem immoderatiorem. Potatur decoctum ejus aut infusum. Pulvis radiceis cum conferva rosarum commendatur in phthisi & exulceratione pulmonum.

PALMERIO citante I. BAUH. de morfu Canis rabidi Henrici 2. Galliarum regis venator bona fide asseveravit, Pimpinellam ad præcavendam, Hydrophobiam tantam vim obtinere, ut quicumque eam aliquot diluculis vel in acetariis, vel alio quovis modo comederit, nihil inde incommodi sentire possit.

Ad vermes equorum deprædicatur à TABERNÆMONTANO radix Sanguisorbæ majoris cum pabulo data, infundendo simul in potu herbam.

PENTAPHYLLI RADIX.

Est quinquefolii majoris repentis flore luteo C. B. P. radix oblonga, calami crassitie, foris rubicunda intus incarnata, transversim secta crucem vel stellam referens. Saporis primum adstringentis, postmodum incidentis. Odoris nullus.

Planta eadem est quæ tormentilla, constat terreis particulis, volatilibus paucis. Substituatur cortex hujus radiceis aliquando cum effectu cortici Chinæ Chinæ, si sumatur ad ʒj.

Substantia hujus interior est lignosa, & tota styptica. Cortex vero ob sui acredinem & Æis præsentiam in febribus intermittentibus & quartanis laudatur. Movet sudorem & Urinam, datur ad ʒij. Ingreditur gargarismata ad detergenda ulcera, & curandas aphthas.

In decoctis datur pro mictu cruento h. m.

℞. Rad.

℞ Rad. pentaphyll. ʒij. herb. agrimon. summit. hyperic. ana Mj. coq. in Cerev. f. q.

℞. Rad. pentaphyll. 3ʒ. Θ prunell. ʒj. M.

℞. Rad. pentaph. Cort. Ch. Ch. rad. gentian. ana ʒj. Θ prunell. gr. x. M. f. pulv. contra febres add. sacch. ʒn. gr. vij. L. O. gr. j.

NYM-

Πεντάφυλλον, *QUINQUEFOLIUM*, quasi planta quinque foliorum, *Sünffinger. Kraut/Sünffblatt/QUINTEFEUILLE*. Est planta flore rosaceo plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce monophyllo & multifido surgit pistillum, quod deinde abit in fructum fere globosum, in quo multa semina in capitulum quoddam colliguntur, ipso calyce involutum. Adde folia plura quam terna summo pediculo insidentia.

Quinquefolium majus repens luteum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum sive quinquefolium vulgare repens* C. B. 2. 397. *Quinquefolium majus* Dod. Pempt. 116. Passim provenit locis præsertim arenosis campestribus, floret Majo & Junio. In usu radix vere colligenda ut & herba cum floribus.

Radix laudatur quoque in catarrhis & morbis inde dependentibus, adeo ut à *TABERNÆMONTANO* ipsi radici Chinæ æquiparetur. Decoctum radice commendatur ad Icterus, obstructions hepatis atque lienis, Phthisicis quoque atque podagricis prodesse dicitur. Imprimis laudatur in fluxibus alvinis, hæmorrhoidibus nimis, mensibus nimis, hæmoptysi. Ad libras duas aquæ sumitur ʒj. radice. Quæ de radice dicta, valent etiam quoad maximam partem de herba. Laudatur etiam ad convulsiones & epilepsiam. Notante *SCHROEDERO* aliisque in febre quotidiana unum folium, in febribus tertianis folia trina, in quartana quaterna exhibent. Externe hæc planta prodest in inflammatione oculorum & laxitate dentium, præsertim scorbutica. Radix masticata dolorem dentium sedare, & manu detenta hæmorrhagiam sistere dicitur. In herniis quoque curandis laudatur. Succus in ictero potus quam maxime

maxime commendatur, in vulneribus porro, ulceribus antiquis, fistulis, imo ipso cancro à quibusdam usurpatur. Ob vim alexipharmacam immiscetur Theriacæ.

Quidam cum BORELLO folia saltem radicitus collecta arteriis brachii dextri cum sale imponunt pro antifebrili externo topico.

N Y M P H Æ A.

Est Nymphææ luteæ vel albæ majoris C. B. P. radix crassa, foris ex fusco flavescent, intus pallida, fungosa, levis, saporis adstringentis austeri, odoris nullius.

Planta est pentapetala, capitulo oblongo striato verrucam exprimente, multicapularis, in quibus semina splendentia, triticeo grano minora.

Habet in substantia levi, porosa & laxa, nonnihil Θ is volatilis alcalini, nam solutiones cum acidis factas præcipitat, unde & acidorum actiones, phlogoses causantes, temperat & sistit, mitigatque spiritus Δ eo acidus, & propterea in nimis vigiliis tanquam specifica extollitur. Ob easdem causas peculiare quid obtinet in sistendo fluxu seminali, pollutione nocturna, & ea, inflammationibus renum & vesicæ, ut & in febrium æstu.

Datur decoctum, ∇ , succus, syrupus & ipsa substantia ad 3j. decoctum ad 3ij.

\mathcal{R} . Rad. nymph. 3iiij. flor. nymph. Mj. anagall. flor. phœniceo Mij. coq. ex vino austero vel ∇ fontan. f. apozema contra maniam.

\mathcal{R} . Camph. gr. v. rad. nymph. gr. xv. sacch. 5ni gr. vij. L. O. gr. ij. excip. conserv. flor. nymph. & syr. menth. q. s. f. bolus in mania & quovis delirio.

\mathcal{R} . Cort. saffrafras 3ij. rad. Nymph. 3iiij. flor. Nymph. p. ij. coq. ex vino contra fluorem album mulierum.

RADI

Νυμφαία, quod aquosis locis gaudeat, vel quod ex Nympha Zelotypia erga Herculem demortua orta esse fingatur, unde & HERACLEON, HERACLEA, NENUPHAR, NENUFAR; PAPAVER AQUATICUM, a fructu Nilufar. Seebumen/Wasser Lilgen / Haarstrang/ Haarwurk/ Seepuppen/ Seerosen / Weyers Rosen. NENUFAR.

Est plantæ genus flore rosaceo plurimis scilicet petalis in orbem positis constante ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum fere globosum vel conicum multcapsularem seminibus foetum ut plurimum oblongis. Flore fructuque carens dignoscitur foliis amplis subrotundis aquis innatantibus. Duæ præsertim species in usum veniunt

Nymphæa alba major C. B. Pin. 193. Nymphæa alba J. B. 3. 762. Dod. Pempt. 585. Weiße Seebumen / Wasser Lilgen / Weiße Seerosen / Weiße Seefannen / Weiße Mummelen / Weiße Nixenblumen / Wasser-Mänchen / Nenufar blanc & Nymphæa lutea major C. B. Pin. 193. Nymphæa lutea J. B. 3. 763. Dod. Pempt. 585.

Nascitur utraque in paludibus, stagnantibus aquis, amplioribus fossis & pigro lapsu dilabentibus rivulis, ac subinde fluminibus, floret Majo & Junio.

In usum veniunt Radix, folia, flores & semen. Flores desumuntur ex Nymphæa alba, de quibus ut & de foliis atque semine inferius agitur. Radix ex utraque depromitur. Commendatur in vino rubro austeriore decocta tanquam certum remedium ad nimium mensium fluxum ex mente TRAGI aliorumque, id quod etiam de semine dicitur. Radix hæc porro laudatur ad alvi fluxus compescendos. Quidam radicem sole cancrum ingrediente effossam ad vertiginem arcendam collo appendunt. Alii radicem decoquunt, decoctum vel per se adhibent, vel cum butyro in unguentum redigunt, eoque utuntur ad pilos pulchros & prolixos reddendos. Observarunt autem exinde contractam Cephalæam contumacissimam.

RADICES TERREIS ET SIMUL MUCAGINOSIS VOLATILIBUS PARTICULIS CONSTANTES.

POEONIAE RADIX.

Est poëoniæ maris folio nigricante splendido C. B. P. radix crassa, tuberosa, foris fusca, intus pallida, saporis dum recens subacris, subdulcis, cum levi quadam amaritie, odoris nullius.

Planta est multifiliqua polypetala, seminibus lucidis nigris oblongo rotundis.

Hujus vis antepileptica à Medicis decantata, consistit forsan in modica adstringentia, juncta blando volatili lentiori, à quibus contra acidum Epilepticum cerebrum corroboratur, spirituumque impetuosus & violentus motus sedatur. Eandem ob causam laudatur etiam in motibus convulsivis, vertigine, tremore, pavore puerorum nocturno, tanquam prodromis Epilepsiæ.

Datur in qualibet forma, additur quoque Clysteribus antepilepticis. In substantia à ʒʒ. ad ʒj. Decoctum ab ʒj. ad ʒij.

℞. Rad. poëon. sem. poëon. ana ʒij. visc. quern. ʒj. Θ volatil. C. C. vel. Θ Urinæ vol. Cinnab. ʒij. ana ʒj. in robustioribus ʒʒ. M. f. pulv. pro vj. dosibus: cape ex ▽ flor. tunic. ʒiiij.

℞. Rad. poëon. ʒj. angel. acor. ʒʒ. summit. organ. stœch. rutæ ana Mj. coq. in ▽.

℞. Colatur. ʒx. add. Θ vol. C. C. ʒij. f. Clyster. contra vertiginem & Epilepsiam.

℞. Rad. poëon. ʒʒ. Cinnab. ʒij. gr. iiij. M. f. pulv. contra pavores nocturnos infantum.

CYNO.

PÆONIA à Pæone Medico, qui ea curasse perhibetur Plutonem ab Hercule vulneratum. Παιονία, PÆONIA a pæanibus, id est laudibus; Pionia. Vocatur etiam γλυκυσίδη, Dulcisidia, Θεοδόνιον, quasi divinum donum. SELINUM, SELENOGOGONUM, quasi Lunæ GENITURA. ROSA BENEDICTA, SANCTA, LUNARIS, REGIA. HERBA CASTA, CASTA RADIX &c. Pœonien / Pœonien = Rosen / Pfingst-Rosen / à tempore florendi, Sicht-Rosen / à virtute. PIVOINE.

Est planta flore rosaceo plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce polyphylo surgit pistillum quod abit in fructum, in quo plurima cornicula velut in capitulum colliguntur deorsum inflexa, lanugine plerumque pubescentia, per longitudinem dehiscencia & seminibus foeta fere globosis. Ex pluribus Pœoniæ speciebus in usum Medicum præsertim veniunt sequentes duæ.

Pæonia folio nigricante splendido quæ mas C. B. Pin. 323. Pæonia mas procerior J. B. 3. 492. Pæonia mas Dod. Pempt. 194. Pivoine masle, Pœonien-Männlein. &

Pæonia communis vel fœmina C. B. Pin. 323. Pæonia fœmina vulgatio I. B. 3. 492. Pæonia fœmina altera Dod. Pempt. 195. Ex his rursus mas præstantior censetur, coluntur in hortis, florent majore.

Vires porro nervinæ ac Cephalicæ, pectorales, Uterinæ, in mensium præsertim obstructione & doloribus post partum, ut & antinephriticæ & antarthriticæ adscribuntur huic radici. Externe quoque tanquam amuletum inservit, de Collo enim suspensa ab epilepsia liberare dicitur. Volunt autem ut debito tempore sit collecta. Alii illam eruunt sole existente in Leone die ac hora solaribus, Luna decrescente. Alii sole in ariete existente, dum Luna ei vel jungitur vel opponitur, effodiunt. Alii rursus Luna crescente effossionem suadent. Quidam jubent ut noctu, quidam vero ut tempore meridiano extrahatur. Nonnulli aurea vel argentea instrumenta adhibenda esse volunt. Sunt qui eo superstitionis progrediuntur, ut hanc radicem gestatam phantasmata & demones depellere, Lemuribus adversari, tempestates atque grandines arce-re &c. persuadere conentur. Sed quis tam ridiculis & absurdis virtutibus fidem adhibere poterit. Is certe minime, cui ipsa tantopere

topere decantata virtus antepileptica nondum extra omnem dubitationis aleam posita est. Dandum interim aliquid plebi.

Olim ex succo expresso radice per subsidentiam colligebatur pulvis, quem feculam pœoniæ appellabant. Hodie tamen exolevit.

Basin hæc radix constituit deprædicati tantoperè *Pulveris Epileptici Marchionis. Marggräffisch-Pulver / poudre contre l'Épilepsie du Marquis.* Remedium est in vulgus sat notum & mulierculis usitatissimum in motibus convulsivis & epilepticis tum curandis tum præservandis, infantibus exhiberi solitum ad ℥jss. ℥j. vel cuspidatim etiam infantibus recens natis ut plurimum porrigitur.

CYNOGLOSSA.

Est cynoglossi majoris vulgaris C. B. P. radix oblonga, crassitie digitali, foris ex atro rubens, intus albida, saporis fatui muscosi, aliquando subdulcis, odoris graviusculi, aliquid foetidi canis redolentis, narcotici, si crescit in locis uliginosis, in ficcioribus inodora fere, admota naribus somnum conciliat.

Planta est asperifolia pentapetaloides, seminibus lappaceis compressis. Est solani species. Mulcet acres Catarrhos, & in dolore capitis, fluxu albo, in gonorrhœa ut & in asthma commendatur.

Externe scrophulas & strumas colli curat, & si recens ac canino odore adhuc foeta, abigit pediculos. Imponuntur nempe infantibus folia cynoglossæ Capiti ad abigendos pediculos.

Suspecta à nonnullis virulentia, idcirco corrigitur cinamomo, croco, Castoreo. Vis narcotica exaltatur opio, aliisque narcoticis.

Pilulæ de cynoglossa dantur à gr. vij. ad ix. per se. vel
 ℥. Pil. de cynogloss. gr. ij. ∇ papav. rhœad. ℥j. syr.
 pap.

pap. rhœad. ʒij. f. haustus ad tollendum capitis dolorem,
ubi opium est suspectum.

MAN-

Κυνόγλωσσοι, Κυνόγλωσσαν, CYNOGLOSSA, LINGUA CA-
NIS, LINGUA CANINA, HERBA CANINA. *Hunds- Zun-
gen/ Langue de Chien.* Ita dicitur vel à foliorum forma, Linguam
caninam æmulante, vel à foetore, cum compressa canem redo-
leat.

Est planta flore monopetalo infundibuliformi & multifido,
cujus pistillum ex calyce surgens abit in fructum, ex quatuor ca-
psulis constantem, ut plurimum asperis & semine fere plano foetis,
placentæ pyramidatæ & quadrilateræ affixis.

Nihil itaque cum Solano commune habet, nisi virtutem nar-
coticam.

Cynoglossum majus vulgare C. B. Pin. 257. Cynoglossum
vulgare. 1. B. 3. 598. Cynoglossum Dod. Pempt. 54.

Crescit passim locis aridis, per hyemem folia illa durant, ap-
petente Junio caulem emittit, in parietinis & juxta sepes floret Ju-
nio & Julio.

Flores, folia & radix, quamvis ad varias fluxiones sistendas &
humorum acrimoniam, alvi fluxus, hæmoptysin &c. commen-
dentur, vix tamen hodie interius usurpantur, nisi quod exinde pa-
rentur ab authore allegatæ *Pilulæ de Cynoglossa, Pillen von Hunds-
Zungen-Krauth/ Pilules de Cynoglosse.* Vim habent anodynā,
dolores mitigant & sistunt catharrales defluxiones in thoracem,
quæ gravant pectus. Commendatur in tussi atque Phthisi, ut & in
diarrhæis atque dysenteriis. Scrupulus continet de Cynoglossō se-
mine Hyoscyami atque opio de quolibet circiter grana tria. Olim
frequentioris erant usus, postea fere exoleverant, nunc rursus à
quibusdam in usum revocantur. Curiosum est, quod de his pilulis
scribit HYERONIMUS JORDANUS. Verba hæc sunt: JOHAN-
NES Medicus Coloniensis puellæ obsessæ clam somnum conciliatu-
rus, pilulas de Cynoglossa exhibuit, quarum una devorata obsessæ
alterum oculum digito clausit, & vide, inquit ægra, dæmon, quam
egregie dormiam.

Z 2

MAN-

MANDRAGORA.

Est Mandragora fructu rotundo C. B. P. radix crassa, oblonga, bifida, foris cinerea ferruginea, intus pallida, odore ingrato, viroso, caput feriente & narcotico. Cortices cinereo ferruginei scabri, intus albidii.

Planta est baccifera, floribus monopetalis in quinque segmenta divisis, seminibus compressis rugosis.

Mandragoræ radix duplici notatur virtute. 1. purgante tam per superiora quam per inferiora, cum violentia & virium etiam prostratione & aliquando convulsionibus subsequentibus, unde per se non datur, nisi dosi minima ad ℥ss. ℥j. Extractum ejus cum Spiritu Vini ex corticibus factum datur pro anodyno. 2. Narcotica stupefactiva, quæ in mucagine volatili consistere videtur, à qua spiritus æque ac ab opio involvuntur. Inde forsan est, quod in Epilepsia motibus convulsivis quibusdam commendata sit.

℞. Cort. Mandrag. Gentian. ana ℥j. Cort. Chin. Chin. Θ absynth. ℥ss. f. pulv. propinandus ex vino. vel

℞. Rad. gentian. serpent. Chin. Chin. ana ℥j. Mandragor. ℥ss. Θ absynth. gr. v. f. pulv. pro j. dosi, quo agyrta curavit febres tertianas & quartanas.

℞. Cort. Mandragor. ʒij. sabin. Mj. asar. ʒj. coq. ex Cerevisia pro expellendo foetu mortuo.

Empyricis laudatur in quartanis pro Emetico. Uterum valde movet & abortum causatur, unde gravidis non danda. Veteres utebantur cortice infuso cum vino pro narcotico & stupefactivo, præcipue ubi membra erant amputanda. Datur tantum robustioribus cum circumspectione.

℞. Extract. opij. Rad. pœon. cort. Mandrag. ana ʒij. visc. quern. ʒj. sem. pap. alb. & nigr. ana ʒiij. C. C. coral. r. ana ʒss. M. f. p. cujus dosis ℥j. contra Epilepsiam seu convulsiones

vulSIONES, seu impetus spirituum animalium. Exhibendus ex
 u Ceraforum nigrorum. Externe in doloribus dentium
 à putredine commendari potest sequens.

R. Cort. Mandragor. 3^{ss}. opij. ʒj. pil. pest. Ruffi ʒj. ʒo
 d. caryoph. gt. v. f. turund. in momento sistit dolores.

[Joh. Jacob. Manget. in Biblioth. Pharm. Medica seqq.
 profert de Mandragora ex Herman. Mat. Med. MSta. Man-
 dragora est planta pentapetala, baccifera, feminibus com-
 pressis rugosis, quæ nota cum omnium solanorum sit,
 Mandragora ad solanorum species referri debet. Incipit
 florere primo vere, quo tempore radix ut plurimum effi-
 cacissima colligitur. Ex odore viroso colligitur ejus vis
 narcotica, incidens & attenuans, sed omnis hæc vis est in
 cortice, & medulla inferior rejicitur, unde etiam in offici-
 nis nonnullis cortices tantum in umbra exsiccati prostant.
 Specificum uterinum est, sed caute adhiberi debet, sin in
 nimia exhibeatur quantitate dira inde sequuntur sympto-
 mata ut spasmi &c. in pulvere dosis esse potest ʒj. (forte ʒj.)
 in infuso ʒij. Circumforanei utuntur contra febres inter-
 mittentes sed minus tuto. Extractum ejus valet contra
 tertianam & quartanam. Præparata præterea nulla.]

CAPUT

Mandragora, quod ut I. BAUHINUS loquitur, solis fervi-
 dioris impatiens ad mandras pecorum, antra aliasque speluncas
 umbrosas proveniat. Quidam vult ac si Mandragora idem sit ac
 Manntragen. *Κίρκαια* vel *Κίρκαιον*, CIRCÆA vel *Circæos* à Cir-
 ce Solis filia Venefica & procurandi amoris artifice; Mandra-
 goras enim, ad amatoria conducere creditur. *ἀνδρωπόμορφος*, à
 radice truncum corporis humani quadantenus referente, *Altrunn*/
Altrunn / *Altroun* / *Schlaff-äpfel* / *Mandragore*.

In charactere Mandragoræ designando vel author sibi non
 constat, vel quod probabilius est, Manget male excerpsit, revera

enim est planta flore monopetalo campaniformi & multifido, cujus pistillum abit in fructum fere globosum in quo veluti nidulantur semina ut plurimum reniformia. Adde folia obscure virentia subrotunda foetida, radicesque longas & crassas quas antropomorphas appellitant.

Mandragora fructu rotundo C. B. Pin. 169. Madragora mas I. B. 3. 617. Mandragoras Dod. Pempt. 457. &

Mandragora flore subcæruleo purpurascente. C. B. Pin. 169. Mandragora foemina I. B. 3. 618. Clus. Hist. LXXXVII. Utraque species usurpari potest, præfertur tamen mas. In regionibus calidioribus, Italia, Hispania imo quibusdam in provinciis Galliae provenit. Apud nos colitur in hortis, floret vere, quo tempore etiam radicem colligere jubent. Cortex, qui potissimum usurpatur, maximam partem ex Italia affertur. Cum, ut recte judicat LUDOVICI, agyrtis relinquenda sit, non opus est, ut ratione usus interni multa fiant verba. Externe in lotionibus pedum, in cephalalgia & oculorum inflammationibus à quibusdam laudatur, adhibetur quoque pro scopo emolliendi & resolvendi tumores duros & scirrhosos. Rarissime autem usurpatur. Quidam decoctum Mandragoræ ebur, si senis horis decoquatur, ebullire dicunt cum DIOSCORIDE: falluntur autem quam maximè, ut testatur SANCTORIUS Method. vitandorum errorum. An fructus Mandragoræ qui vel olfactu somnum conciliant, sint Dudaim, aliorum est inquirere. Quidam ex Mandragora oleum per coctionem parant, quod soporiferum & anodynum, inflammationes sistit, fissuras papillarum & dolores partus mitigat. Caute mercandum.

Illud non plane silentio involvendum sed vel verbo tangendum, quod impostores scelesti quidam celebratos illos Virunculos Magicos, die Ultraunen/ Galgenmânlein / quos quidam ex urina innocenter suspensorum sub patibulis nasci, & non nisi summo cum periculo obtineri posse male credulis persuadere conantur, ex hac aliisve radicibus conficiant. Scivit istud artificium ab ejusmodi nebulone sibi detectum suo jam tempore MATTHIOLUS. Verba ita sonant. Radices illæ, quæ humanam formam referunt, quas impostores & nebulones quidam venales circumferunt, factitiæ sunt ex arundinum, Mandragoræ Bryoniæ aliarumque plantarum radicibus, sculpunt enim in his adhuc virentibus tam virorum quam

quam mulierum formas, infixis hordei & milii granis in locis ubi pilos exoriri volunt, deinde facta scrobe, tamdiu tenui sabulo obruunt, quousque grana illa radices emittant, quod fit viginti dierum spatio. Denum eas eruunt & adnatas è granis radices acutissimo cultello scindunt aptantque ut capillos, barbam & cæteros corporis pilos referant. De virtutibus his virunculis falso & superstitiose adscriptis facile hinc judicare est.

CAPUT SECUNDUM.

DE CORTICIBUS.

CORTICES CONSTANTES SALE
VOLATILI OLEOSO.

Cortex Aurantiorum.

Citri.

Cinamomi.

Cassiae Lignæ.

Caryophyllatæ.

Winteranus.

Guajaci.

CORTEX AURANTIORUM.

HOrum exterior flavedo Æe volatili oleoso foeta, in flatibus & torminibus abdominis pæcipue colicis, in passione hysterica, stranguria, dysuria, præsidium specificum est. Interior autem fungosa substantia ob sui adstringentiam in dysenteria & nimio fluxu mensium prodest.

Datnr

Datur flavedo in substantia ad 3ß. it. ʒo tam destillatum quam ex flavedine expressum ad gt. ij. vel iij. in ▽ appropriata destillata, addito simul syrupo saporis gratia.

Amstelodami prostat ʒo ex flaved. Cort. aurant. rec. expressum, quod ex Hispania transfertur, & venditur sub nomine quintæ essentiae aurantium, magis laudatur ac ʒo destillatum. Viget quoque essentia, extractum, infusum.

℞. Flaved Cort. aur. 3ij. Mand. luc. pisc. Ocul. ʒ. præpar. ana gr. xv. succin. præpar. 3ß. Zedoar. ʒß. ʒo expr. cort. aur. gt. v. vel vj. M. f. pulv. anticolicus, cujus 3ß. adjungi possunt L. O. gr. ij. ut & in colica convulsiva Castor. gr. vij. exhibe ex ▽ appropriata, sive Tinct. cum Spiritu Vini ex corticibus facta.

℞. Elæosacch. ʒo Cort. aur. 3ß. Zedoar. gr. v. Nuc. Mosch. gr. vj. vel vij. M. f. pulv. capiendus ex vino seu Cerev. seu ▽ chæref. contra stranguriam & dysuriam.

℞. Cort. aurant. inter. fungos flavedine rejecta, coq. forti Δe cum ▽ s. q. sume decoctum contra nimium alvi & mensium fluxum.

COR-

MALUS AURANTIA, ARANTIA, AUREA, NERANTIA, Pomeranzen, Baum ORANGER. Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum foliolis in stamina desinentibus stipatum, quod deinde abit in fructum fere globosum, cortice carnoso obductum, in varia loculamenta divisum succi & vesicularum plena seminibusque foeta callosis. Adde folia ad exortum cordiformia.

Plures equidem species existunt, sequentes autem quam maxime usuales. Aurantium acri medulla vulgare Ferrar. Hesper. 337. Malus Aurantia major C. B. Pin. 436. Arantia Malus I. B. I. 97. Aurantium dulci Medulla vulgare Ferr. Hesper. 377. Aurantium Olyssiponense Ferr.] Hesper. 427. Provenit sponte

te in Gallo Provincia pluribusque Italiæ locis. Colitur tum ornatus tum utilitatis gratia in hortis. Perpetuo viret, & Majo Junio &c. floret.

In usum ex hac arbore trahuntur flores atque fructus, qui vocantur MALA sive POMA AURANTIA, ARANTIA, NERANTIA, ANERANTIA, AUREA, à corticis colore, CHRYSOMELA, Pomeranhen / quasi poma aurantia corrupte pronunciantes. Discrepant non solum ratione magnitudinis & figuræ, sed & imprimis colore & sapore. Dantur magna, parva, mediocria. Quædam aurea, quædam viridia, quædam subrubentia sunt. Sapor discrepat tum ratione corticis nunc amari, nunc dulcis & edulis, tum ratione pulpæ, quæ nunc est acida, nunc dulcis, nunc media, quam vinosam appellant. Dulcia ut plurimum vocantur POMA LUSITANICA, POMA SINENSIA, POMA CHINENSIA, Pomesinen / ORANGES DE PORTUGAL. Dulcia præsertim laudantur in scorbuto, acida autem & vinosa in febribus continuis & ardentibus, imo ipsa laudantur peste, ad sitim sedandam, humorum æstum refranandum & putredinem arcendam. Quandoque promiscue usurpantur. Solo eorum usu quosdam à Scorbuto liberatos fuisse, authores testantur.

Apponuntur, uti SEBIZIUS loquitur, Aurantia mala, imprimis vinosa, in orbiculos concisa & Saccharo conspersa mensis. Adduntur & ferculis aliis ad gratum saporem conciliandum. Dulcia vel per se comeduntur, vel etiam cum Saccharo. Nimio usu autem utique nocent, non enim solummodo nimis refrigerant, sed & diarrhœa atque dysenteria insequi possunt. Optime faciunt, qui corticem simul cum medulla comedunt, iusta enim sic emergit temperies.

Oleo volatili constare cortices vel exinde apparet, quod per candelam accensam transpulsum flammam concipiat, & vino exceptum eidem fragrantem communicet odorem & saporem gratum. Gallis dicitur faire de Zestes. In ventriculi debilitate, nausea, ructibus, cruditate acida, appetitu prostrato, profunt. In doloribus post partum, in ictero, in febribus intermittentibus, lumbricis &c. commendantur. Poma integra quoque dissecta & in vino albo decocta in febre quartana profuisse dicuntur. SEPTALIUS ad mentum nimium fluxum cortices trium aurantiorum acidorum ali-

quanto adhuc viridium in aqua vel simplici vel chalybeata coquit, & colaturam ad ℥viij. aliquoties exhibet, addendo quandoque in casu necessitatis manipulum herbæ pilosellæ.

Quidam juxta ALEX. PED. excavant pomum aurantium acidum, indunt Theriacam, crocum, acetum, permiscunt cum succo & sub cineribus assant, inde parant unguentum, quod temporibus illitum blandum somnum conciliat, umbilico applicitum vermes necat, & cardiacam infantum mitigat. Alii pulpam & semen leniter contundunt & addito tantillo theriacæ, aloes & olei absinthii, sub cineribus torrent, succumque exinde expressum regioni umbilicali verminantium puerorum inungunt.

Semen Aurantium vi alexipharmaca, diaphoretica & anthelmintica gaudet, usurpatur in variolis, morbillis &c.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua ex floribus vel cum aqua, vel cum vino quæ durabilior est, destillata, *aqua florum aurantium* dicta, quæ singulari nomine appellatur *Aqua Naphæ* vel *Naphæ Pomeranzen-Blüthwasser*. *Eau de fleurs d'Orange*, quæ fragrantissima & suavissima vim alexipharmacam, diaphoreticam, cordialem, stomachicam & in certis casibus etiam antihystericam possidere fertur. Ut plurimum tamen solummodo externe adhibetur, in epithematibus, odoramentis, suffumigiis &c. ob fragrantiam variis quoque obsoniis permiscetur.

Conserva florum aurantium, *Pomeranzenblüth-Zucker*, *conserva de fleurs d'Orange*; quæ cordialis atque stomachica habetur. Hodie etiam præparatur sicca.

Cortices Aurantium conditi, *eingelegte oder überzuckerte Pomeranzen-Schalen*. *Ecorce d'Orange condit*, parantur hoc modo. Exterior flavedo radícula abradiatur & cortex à pulpa candicante liberatur, ita præparatus aquæ tepidæ imponitur coquiturque dum ab amarore sit liberatus. Affusio aquæ autem aliquoties reiteratur. Hoc facto saccharum lento igne liquatur, injiciuntur cortices, tamdiu ebulliunt, usque dum similes sint conservæ; durante coctione cochleare ligneo sæpius vertuntur, post extrahuntur & in loco apto ad siccandum reponuntur. Usurpantur ad stomachum roborandum anhelitumque oris corrigendum. Qui acidulas bibunt, iis in frequentiori sunt usu.

Essent

Essentia corticum aurantium ex corticibus siccis, Pommeranzen-Schaalen. Essenz auß durren Schaalen/ Essence d'Ecorce seche d'Orange, & quæ jucundior est, Essentia corticum aurantium ex corticibus recentibus, Pommeranzen-Schaalen. Essenz auß frischen Schaalen. Essence d'Ecorce recente d'Orange. Utraque stomachica, carminativa, cordialis atque Cephalica existit, dosis ad guttas viginti, triginta &c.

Essentia corticum aurantium sicca seu Essentia aurantium saccharina. Pommeranzen-Zucker/ Essence d'Orange en poudre. Fit optime, affricando saccharum cortici pomorum, donec optime fuerit imprægnatum. Usurpari potest vel per se, vel tragæis immiscetur. Si drachma semis vel una vini Vitro infundatur, gratissima fragrantia vino conciliatur.

Oleum corticum aurantium expressum ex corticibus recentibus, außgepreßt Pommeranzen-Schaalen-öhl. Huile d'Ecorce d'Orange tirée par expression: à quibusdam sub nomine quintæ essentiæ venditur: præfertur quoniam nullum empyreuma contraxit. Usurpatur tanquam stomachicum, carminativum & cordiale vel per se ad aliquot guttas, in vehiculo, vel in Elæosaccharum redigitur.

Oleum corticum Aurantium destillatum, destillirtes Pommeranzen-öhl. Huille d'Ecorce d'Orange. Iisdem ac antecedens virtutibus gaudet & eadem dosi ac modo adhibetur, sed non æque gratum.

Prostat tandem Syrupus corticum Aurantium, Pommeranzen-Schaalen-Syrup/ Syrop d'Ecorce d'Orange. Paratur autem vel ex corticibus siccis, vel ex corticibus recentibus, qui longe gravior existit. Stomachicus, carminativus & cordialis est, gratiaque sua in mixturis blanditur palato.

CORTICES CITRI.

Horum flavedo fragrantior & spirituosior est, quam corticum aurantium, & propterea in syncope, lypothymia & capitis debilitate ad confortandam memoriam singulari cum successu adhibetur. Videtur etiam aliquid volatilis acidi in se habere, & propterea antiscorbutici audiunt. Dantur ut cortices aurantium.

℞. Essent. s. Jus Citri ʒij, ▽ rub. id. ʒiij. acet. theriacal. ʒij. syr. rub. id. ʒβ. M. f. potus in virium languore & syncope, add. conf. alk. ʒβ.

℞. Cort. Citr. ʒβ. sem. Citr. Card. Bened. ana ʒij. ▽ Papav. q. s. f. Emuls. in febribus malignis.

℞. Flaved. Cort. citr. ʒij Cort. Winteran. ʒβ. infund. in vin. Malvatic. f. infusum contra scorbutum.

CINA-

Μηλέα μηδική, MALUS MEDICA, quoniam in Media olim Asia regione multum reperiēbatur. MALUS CITRI, quoniam folia Cedri colorem referunt, Citronen-Baum / CITRONIER.

Est arbor flore rosaceo plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum plerumque oblongum, crassa carne donatum, in varia loculamenta divisum, succi & vesicularum plena seminibusque callosis foeta. Adde folia simplicia.

Citreum vulgare Tourn. I. R. H. cl. 21. §. 6. g. 2. Malum Citreum vulgare Ferr. Hesp. 61. Malus Medica C. B. Pin. 435.

In regionibus calidioribus, in quibusdam Galliae Provinciis ad mare mediterraneum, in Italia Hispaniaque sponte proveniunt, apud nos coluntur in hortis. Perpetuo virent; florent Majo, Junio &c.

Suppeditat hæc arbor pro usu Mala, quæ, ut SEBIZII verbis utar, CITRONES in officinis vocantur, forsan à citrino corticis colore. μηλα μηδικά, MALA MEDICA, MALA HESPERICA, CHRYSOMELA: Citronen/ CITRONS.

Diversa quoque horum malorum dantur genera. Oblonga sunt ut plurimum rugosa ac aurum colore imitantia. Odorem Cortices obtinent, juxta H. GRUBE, fragrantem tenaciorem ac mirifica suavitate nares olfacientium recreantem. Saporem quod concernit, de eo sequentia idem author pronunciat. Acrem in corticibus reperiri saporem, in succo acidum, in semine vero amarum, fugere non potest explorantes, cum gustantium linguæ manifesta corticum acrimonia, adstrictione succi ac amarore seminum insigniore afficiantur.

Mensis

Mensis apponuntur non tantum in taleolas concisa & saccharo conspersa, sed & ferculis variis bellariisque, ut condimentum, adjiciuntur, præsertim cortices. Succus quoque variis jusculis carnibusque instillatur.

Mala Citrea, si tota in usum veniunt, censentur alexipharmaca atque cordialia. Immunes præstare dicuntur homines à venenis animalium & in calculo conducunt, anhelitum oris emendant. Cortices sale volatili oleoso imprægnati egregieque aromatici æque ac aurantiorum cortices existunt. Virtute gaudent carminativa, antihypochondriaca, antiscorbutica, stomachica, cardiaca, antifebrili & alexipharmaca. Flores fragrantissimi eodem modo usurpari possunt ac flores Aurantiorum.

Succus imprimis est alexipharmacus inventus in Febris continuis, ardentibus, causo, imo malignis & ipsa conveniens peste, bilem refranat, sitimque sedat. Cordialis porro existit & vi pollet anthelmintica. Laudatur insigniter in scorbuto & arthritide Scorbutica. Commendatur etiam pulpa seu caro in pica gravidarum & cruditate nidorosa, verminatione infantum &c.

Seminibus inest virtus diaphoretica, diuretica & vermifuga. Inter semina expellentia recensentur; ingrediuntur emulsiones in variolis, morbillis similibusque morbis. Adhibentur imprimis semina excorticata, geschelte Citronen • Kernen / *Semence de Citron sans ecorce*. Externe à quibusdam membra arthritica & scorbutica pomis discissis fricantur. Laudantur quoque ad epithemata cordialia, si in taleolas dissecta poma, cum vino vel alia quadam materia spirituosissima pulsibus & cordi applicantur. In ptisanis frequentissime usurpantur ut & in aliis decoctis, infusis & nodulis, vel integra, vel in frusta discissa.

MULTA EX CITRO IN OFFICINIS ASSERVANTUR.

Succus Citri. Roher • Citronen • Saft / *suc de Citron*. Si cum saccharo parum fermentetur, fit Vinum Citri.

Aqua Citri è corticibus, Citronen • Schaalen • Wasser. *Eau d'Ecorce de Citron*.

Cortices Citri conditi, eingelegte Citronen • Schaalen. *Ecorces de Citrons condites*, asservantur vel cum brodio, vel exsiccantur, & deinde Citronata a quibusdam vocantur. *Caro Citri condita*, eingelegt Citronen • Marcf. *Condit de Chair de Citrons*.

Conserua Citri è *pulpa*, remotis scilicet corticibus ac semine succoque expresso, *Citronen-Marc*, *Zucker*. *Conserve de Pulpe de Citron*. Adhibentur modo dicta remedia pro usu cordiali atque stomachico.

Aqua Cornu Cervi Citrata, *Hirschhorn-Wasser mit Citronen* / *Eau de Corne de Cerf Citrée*, quæ analeptica, æstum sedat & alexipharmaca habetur; exhibetur cochleatim aliisque mixturis immiscetur.

Electuarium Diacitri seu *de Citro Solutivum*, *Citronen-Lattweg* / *Electuaire de Citron*. Cholagogum dicitur, pituitam quoque educit, datur ad drachmas duas ad drachmas sex &c. Drachma continet Dacrydii granum unum cum dimidio, Turpethi grana duo cum dimidio.

Elixir Citri purgans, *Purgierendes Citronen-Elixir* / *Elixir de Citron purgatif*. Gratum hoc remedium humidioris & robustioris constitutionis hominibus, qui alias remediorum formulas averfantur, ad drachmam unam usque & paulo ultra pro ratione circumstantiarum exhiberi potest. Drachmæ spiritus vini respondent decem grana Resinæ Gialappæ.

Extractum Diacitri, *Purgierender Citronen-Extract* / *Extrait de Citron purgatif*, ad humores biliosos & serosos expurgandos laudatur. Dosis ad ℞. ℥ij. ʒj.

Morsuli Citri ex succo, *Citronen-Morsellen* / *Tablettes de jus de Citrons*. Cordiales sunt atque stomachici, dantur ad unciam semis & ultra.

Tabulæ ex Succo Citri, *Citronen-Täffelein* / refrigerant sitimque sedant.

Oleum Citri destillatum, *Citronen-Schaalen-öhl*. *Huile d'Ecorce de Citron*. Quod stomachicum est atque carminativum, guttatim assumitur, vel in *Eleosaccharum* mutatur. Quod ultimum tamen gratus fit, affricando saccharum corticibus recentibus, flavedinemque abradendo, quo mediante deinde elegantissimum *Vinum Citratum* parari potest, quod alias per infusionem Corticis, in minuta frusta concisi, in Vino fieri consuevit. Ex modo dicto quoque oleo parari potest *Balsamum Citri*.

Syrupus Acetositis Citri, *Citronen-Safft-Syrup*. *Syrop de jus de Citron*; gratus admodum est, refrigerat, sitim sedat, bilem refrænat, putredinem arcet & vermibus resistit.

Syrupus corticum Citri, *Citronen-Schaalen-Syrup* / *Syrop d'Ecorce*

d'Ecorce de Citron, paratur vel è corticibus siccis vel recentibus, unde gravior evadit. Vires obtinet cordiales stomachicasque, venenis putred inique resistit & graveolentiam anhelitus emendat. Tandem quoque mentio illius potulenti, quod è Citro paratur communiter, & *Limonada*, *Simmonade* / *Limonade* dicitur, facienda. Nempe vel in aqua simplici, vel in aqua & vino infunduntur Cortices recentes, & postmodum succus, quem quidam prius filtrant, instillatur sufficiensque sacchari quantitas immiscetur.

℞. Malor. Citrior. cum corticibus in taleol. rotund. ac tenues incis. No. j. ij. iij. Sacchar. Albiss. ℥iv. Aqu. Font. Libr. vj. coquantur ad tertias. Usurpari potest pro potu in febribus, paratur quoque absque corticibus.

CINAMOMUM.

Est Cassiæ Zeilanicæ C. B. P. cortex tenuis, ab exteriori pellicula purgatus, ex flavo rubescens seu ferrugineus, in cannulas contortus, saporis acris suaviter pungentis, subdulcis & aromatici, odoris frangratissimi.

Arbor est baccifera calyculata nucleo quercino.

Ex radice arboris Cinamomi in insula Zeilan paratur camphora. [Conf. act. Hafnienfis. Vol. 3. obs. 23. p. 37. ubi Paul Hermannus noster allegatur, & Camphoram triplicem ex cortice radice cinamomi insulam Ceylon suppeditasse. 1. crudam. 2. arte per calcem. 3. per se sublimatam: duplexque oleum, alterum è cortice radice, alterum è foliis cinamomi elicium.

Sale suo volatili spirituosissimo — bus animalibus valde homogeneo, junctum habet subdulcem blandumque lentorem, hinc præter cardiacam & analepticam virtutem, in tussi & pulmonum mucositate laudatur, tam ob vim incidendi, quam ob lenientem & mitigantem. In Mensium suppressione & lochiorum fluxu, in corrigenda purgantium violentia cæteris omnibus præfertur.

Vis

Vis cinamomi concentratio est in pellicula interiori corticis, cui subjacet lignum. Nimia hujus acredo ubi inconveniens videtur, optime temperatur hordeaceis.

Datur in qualibet forma ut cortices aurantiorum. In substantiâ à ʒʒ. ad ʒj. it. in infuso, rarius in decocto, nisi pro asthmaticis.

℞. Cinam. ʒij. Zinz. ʒj. Flav. Cort. Citr. Aurant. Nuc. Mosch. ana ʒj. M. f. pulv. & cum vino infusum confortans.

℞. Cinam. ʒʒ. borrac. ʒj. M. f. pulv. dandus ex ∇ puleg. ad Menses & lochia pellenda.

℞. Cinam. ʒʒ. Myrrh. gr. viij. borrac. ʒʒ. ʒʒ cinamom. gt. j. M. f. pulv.

℞. Cinam. ʒij. oxym. scyll. ʒj. M. f. haustus in asthmate & tussi.

℞. Gumm. ammoniac. ʒʒ. solv. in ∇ Cinam. ʒij. add. fyr. puleg. ʒij. f. haustus in asthmate extra paroxysmum.

℞. Cer. alb. q. v. dissolv. in ʒʒ been s. q. fiat corpus pro balsamo, huic instilla ʒʒ cinam: pro balsamo conficiendo, si velis balsamum hunc tingere nativo colore, adde magisterii istius s. q.

℞. Sacch. cand. ʒj. ʒʒ d. cinamom. gt. v. vel vj. ambr. gryf. gr. v. Mosch. gr. j. M. f. pulv. analepticus ad ʒj. exhibendus. ex ∇ Cinam. Meliss. rub. id.

℞. ʒʒ exp. bacc. laur. ʒʒ. dest. succin. gt. xv. ʒʒ cinam. gt. vij. M. f. liniment antiparalyticum.

℞. ☺ Cinam. ex destill. resid. ʒj. fungos. substant. Cort. aur. ʒʒ. M. f. p. contra Dysenteriam vel diarrhoeam. add. Nuc. Mosch. ʒʒ. L. O. gr. j.

CASSIA

κιννάμωμον, Κινάμωμον, CINNAMOMUM, Cinamomum
quasi amomum ex China, CINAMUM, CANELLA, quoniam
canu-

canulam sive tubulum & fistulam repræsentat', Zimmet / Zimmet /
Kinde / Zimmet / Röhrlin / Kaneel. CANELLE.

Merentur hic inferi, quæ AUTHOR IN HORT. LUGD. BAT. p. 129. seqt. differit. Verba hæc sunt. Cassia Cinamomea. Cinamomum sive Canella Zeylanica C. B. Pin. 408. Canella sive Cinamomum vulgare L. B. 1. 440. Canella quæ Cuurdo Pison. Mantiss. arom. 165. Kurandu Zeylanensibus.

Cortices duos transmittit Oriens in Medicorum officinas, facie quidem & genere consimiles, sed nomine discretos, videlicet Cassiam Cinamomeam, vulgo Cinamomum seu Canella dictam & Cassiam ligneam. Prior luxuriat in Insula Zeylon, posterior in Malabara, Sumatra, Java & FRANCISCO HERNANDE HIST. MEXIC. 1. 2. 35. teste in Insulis Philippinis. Cassia vero Malabarica in HORT. MALAB. TOM. 1. 107. nomine Caruæ accuratissime describitur, & a Cinamomea seu Zeylanica tantum acrimoniæ, suavitate & virtutis præstantia, neutiquam facie modove crescendi discriminatur. Cæterum Cassia Cinamomea aliquoties à me ex Zeylan in Belgium transmissa viguit in horto Bentingiano, Beverningiano & nostro, ad secundum tertiumve annum, quo incidente bruma rigidiori interiit. Hactenus author. Mentem in his verbis mutasse videtur, antea quippe habebat pro Lauro Zeylanica baccis calyculatis ex qua Cinamomum.

In Insula Zeylan frequens admodum est & provenit absque cultura, & ad focum instruendum ædificiaque construenda promiscue cum aliis arboribus usurpatur. Folia fert Lauroceraso vel potius Citro fere, excepta latitudine, similia, fragrantissima, cum floribus albescentibus fragrantissimis & fructibus instar glandis quercinæ, è quibus novæ resultant arbores. Cortice tegitur duplici, quorum exterior coloris est cinerei, (verba sunt LANGII,) nec adeo manifesta fragrantia præditus, alter subtus positus albicans magis odore similiter caret, quamdiu arbori inhæret; postquam vero remotus fuerit & in cannulas formatus, aliquot demum mensium spatio emenso prædictam spirare incipit specificam fragrantiam. vid. PISON. MANT. AROM. p. 167. Abraditur itaque exterior cortex, subtusque latitans cultro falcato circumcirca discinditur, faciliqve opere sic à Ligno albo & inodoro plane, removetur. Remotus ad solares radios siccatur, à cujus calore contorquetur & in cannulas

istas fingitur, sub qua deinde forma venditur. Arbor hæc suo cortice spoliata, postmodum marcescit & emoritur, nihilominus è fructibus deciduis nascitur brevi annorum spatio nova arbor. Quod ultimum etiam magis credibile est, quam id, quod alii asserunt, nempe, post tres quatuorve annos nova cortice arborem rursus indui. Sunt, qui non totas arbores decorticari, sed ramos tantum, præsertim majores, autumant.

Eligendum Cinnamomum ponderosum subrubrum, odoris fragrantissimi, saporis subadstringentis & acris, unde & præscribitur in formulis. *R.* Cinamomi morsu electi, id est acris & acuti.

Magni, uti SEBIZIUS loquitur, usus Cinnamomum est in re escaria, plurima enim fercula & bellaria eo condiri suavioraque reddi solent. In Medicina quoque magni & multi est usus. Vi carminativa gaudet & in nausea, ructu, vomitu aliisque affectibus stomachi & intestinorum conducit. Usurpatur in partu difficili, ubi tamen notandum, quod Idiosyncrasia muliercularum bene sit respicienda, cum non omnes Cinnamomum ferant. Virtute quoque pollet cephalica atque aphrodisiaca, memoriam confortat & visum acuit. Venenis insuper resistere dicitur. Masticatum halitum oris emendat.

IN OFFICINIS PLURA EX HOC CORTICE PROSTANT
PARATA MEDICAMINA.

Aqua Cinamomi cum Vino, Zimmet-Wasser mit Wein destillirt / Eau de Cannelle avec du Vin. Hæc ex aquis Cinamomi maxime spirituosæ in morbis à causa sic dicta frigida ortis, confert, calefacit & roborat viscera, pituitam & flatus incidit atque discutit, nauseam sistit, digestionem promovet & colicæ medetur. Refocillat egregie, in affectibus soporosis conducit, sicuti quoque menses & partum promovet, inque variis uteri affectibus locum habet, modo respiciatur ad idiosyncrasiam. Dosis cochlear unum aut alterum.

Aqua Cinamomi buglossata, Zimmet-Wasser mit Ochsen-Zungen-Kraut / Eau de Cannelle buglossée. Cordialis, stomachica atque carminativa est, datur ad unum aut alterum cochleare.

Aqua Cinamomi Cydoniata, Zimmet-Wasser mit Quitten / Eau de Cannelle Cydoniée. Cordialis æque ac prior, imprimis autem commen-

commendatur in affectibus Ventriculi & intestinorum, ubi roborandum & adstrictione opus est; in anorexia, apepsia, nausea, vomitu, diarrhœa, dysenteria, Cholera similibusque affectibus laudatur. Datur vel per se ad unum aut alterum cochlear, vel aliis, ut cæteræ, aqua Cinamomi intermiscetur mixturis.

Oleum Cinnamomi destillatum, *Zimmet-öhl* / *Huile de Cannelle*, quod minori pretio à Batavis emitur quam apud nos præparatur. Suspiciantur quidam, inquit R A J U S, Cinnamomum ad nos ex Indiis delatum olei sui maxima parte ibidem spoliari antequam navibus in Europam deportandum imponatur, quippe quod hic destillatum paucissimum oleum præbeat. Stomachicum, Cephalicum atque cardiacum & carminativum, internè ad aliquot guttas, & externe existit. Additur quoque purgantibus tum pro gratia concilianda, tum pro impediendis flatibus & torminibus. Habemus ex hoc oleo.

Balsamum Cinnamomi, *Zimmet-Balsam* / *Beaume de Cannelle*, usu externo se commendans.

Eleosaccharum Cinnamomi, *Zimmet-öhl-Zucker* / *Eleosaccharum de Cannelle*, quod datur vel per se cuspidatim, vel aliis remediis commiscetur. Pertinent quoque huc *pulvis ad palpitationem cordis ruber*, *rothes Herz-Pulver* / *poudre rouge pour la palpitation du cœur*, qui pro confortante cordialique remedio usurpatur, datur ad ℥j. 3ß. vel sumitur cuspidatim; item *Pulvis ad partum Augustanorum*, *Pulver zur Geburth* / *poudre pour les accouchemens*. In partu accelerando, facilitando & secundinis pellendis conducit, dosis ad ℥j. ad 3ß. Porro *pulvis ad dystokiam*, qui ad eundem scopum & eodem modo usurpatur.

Species diacinamomi, *Zimmet-Specerey* / *Poudre composée de Cannelle & d'autres Aromates*. Stomacho præsertim sunt dicatæ in cruditatibus acidis & pituitosis, dantur ad ℥j. ad ℥ij. Tandem occurrunt quoque.

Syrupus Cinnamomi, *Zimmet-Syrup*, *Syrop de Cannelle*. Delicatus sed & pretiosus hic Syrupus viribus pollet cordialibus atque stomachicis, in ventriculo præsertim languido ac frigido emendando coctioneque promovenda, sicuti quoque oris halitum emendat. Cinnamomum ingreditur Theriacam. Cinnamomum quoque aptissimum ingrediens suavis istius tantopere decantati potulenti

quod appellatur à manica Hipocratis Vinum Hipocraticum, *Hippocras / Vin d'Hippocras*, quod paratur ex speciebus pro Vino Hipocratico, *Hippocras, Species, poudre pour le Vin d'Hippocras*. Stomachicum est remedium.

CASSIA LIGNEA.

Est Cassiæ lignæ Malabaricæ seu Sumatrensis bacciferæ cortex, cinamomi in modum convolutus, cinamomo crassior, odore & sapore debilior, cum majore aliquantum lentore. Differt à cinamomo non nisi loco natali, utrumque ex arboribus prægrandibus instar quercus nostratis, dum sex annorum est, deraditur: cortices hi, dum recentes sunt, albicant, beneficio caloris rufescunt, & in cannas sua sponte convolvuntur.

[De differentia Cassiæ lignæ & cinamomi conf. Andr. Cleyer. C. N. C. Dec. II. an. IV. obs. 6. p. 8. it. d. arbore cinamomi, & cassiæ lignæ Theodor. Carol. C. N. C. Dec. II. ann. 8. obs. 59. p. 149.

Utraque arbor fructus fert olivæ instar, baccas nempe totas sebaceas, quarum oleo expresso utuntur Indi loco sebi in candelis, nullius est odoris. Hi fructus sunt magnitudine baccarum lauri, membranæ pulposæ inclusi, sapore juniperino præditi. Flores habent odorem liliorum convallium.

Ratione virtutis aromaticæ debilior est, astringentis viscositatis efficacior quam cinamomum, hinc convenit in asperitate faucium, tussi, inflammatione uvulæ.

Datur ut cinamomum, astringentis in dosi majori, in thoracis affectibus præstantior Cinamomo.

℞. Cass. lign. ℥ij. passul. min. ʒβ. M. f. infusum ex vino, seu leve decoctum ex ∇, contra asperitatem faucium & tussim. Si

Si recens est, fundit ☉ fat copiosum, quo adulteratur ☉ Cinamomi.

CASSIA

XYLOCASSIA, CASSIA AROMATICA, CANELLA
IGNOBILIOR, CASSIA SYRINX, Cassien-Holz/ Cassien-
rinden/ Holz, Cassien/ Mutter-Zimmet/ CASSE LIGNEUSE

Cassia Lignea officinarum Hern. 35. Cinamomum sive Canella Malabarica & Javanensis C. B. 409. Cassia lignea fusca aromati & glutinosi saporis L. B. 1. 451. Arbor Canellifera Malabarica cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum offic. Breyn. 2. prod. Carua Hort. Mal. tom. 1. 107.

Cassia lignea à cinamomo differt, non tam loci natalis ratione, sed quod, ut CHARAS cum aliis annotavit, Cassia lignea masticata visciditatem in ore relinquat, in hoc dissolvatur sensim & liquecat, nullo superstite ligni vestigio, id quod Cinnamomo non accidit, cujus reliquiae perpetuo supersunt. Atque ex his constat, hallucinatos illos fuisse, qui censuere cortices Cinnamomi & Cassiae Lignae sibi incumbentes, ab una eademque arbore detrahi.

Cum non adeo cara sit, haud raro Cinnamomum ea adulteratur. Viribus interim cum eodem correspondet, sed in minori gradu.

Cassia lignea ingreditur Theriacam & alia antidota.

CASSIA CARYOPHYLLATA.

Est Myrti arboreae Americanae Caninge cortex cinamomo tenuior, ex rufo ferrugineus, à pelliculis suis exterioribus derasus, & in modum tubuli convolutus, sapore acri aromatico, odore ad caryophyllos accedente.

Arbor est baccifera, baccis rotundis umbilicatis acinos geminos includentibus, sapore & odore caryophyllorum.

Virtute caryophyllos æmulatur, quibus & hodie substituitur, habet autem in recessu multum viscositatis, à qua

Omnia ejus volatilia multum temperantur. Additur tanquam roborans & confortans diureticis & hydragogis contra hydropem, ut & medicamentis Uterinis ad accelerandum partum.

Datur in substantia a ℥j. ad 3℔.

℞. Cass. caryophyllat. 3℔. Castor. ℥j. Camphor. 3℔. f. infusum hystericum in partu laborioso, admotum naribus, vel cochleatim datum.

℞. Cass. Caryophyllat. 3℔. Sassafr. 3j. radic. vincet. Valerian. ana 3vj. bacc. Junip. 3v. sem. foenic. 3iij. rhabarb. 3iij. infund. in vin. rhenan. f. infus. diureticum, hydragogum.

COR-

CORTEX CARYOPHYLLATUS, CANELLA CARYOPHYLLATA, Nägelein-Kind / Nägelein-Zimmet / CASSE GEROFLEE, CANELLE GEROFLEE, ECORCE DE GEROFLEE, CAPELET, BOIS DE CRABE.

Cassia Caryophyllata seu Cinamomum Americanum offic. Hæc arbor nondum omnimode descripta. Fructus hujus arboris vocantur Nuces Madagascariæ. Invenitur enim hæc arbor in Insula Madagascar, Cuba, Brasilia & aliis Indiæ Occidentalis locis.

Frequenter in usum non trahitur, nisi quod pro condimento caryophyllis, tanquam majori pretio constantibus, substituat, quam ob causam etiam à mercatoribus ad fraudem pronis pulveri caryophyllorum immisceetur.

CORTEX WINTERANUS.

Ita appellatur ab Admirali classico, qui ipsum in freto Magellanico invenit. Non est Costus, sed arboris Magellanicæ bacciferæ cortex crassus, cannulatus, foris integumento cinereo fungoso inæquali, fisso & multis rimis hiante, intus

intus solidus, densus, ad piperis & cochleariæ saporem accedens, odoris fragrantis.

[Est Laurifolia Magellanica cortice acri C. B. P. Magellanica aromatica arbor Clus. Extot. Nonnullis appellatur peryclimenum odoratum.]

Habet \ominus volatile \circ sum cum levi amaritie & acido volatili, in Anglia sub nomine corticis antiscorbutici præscribitur. Nascitur ferme in locis inaccessibilibus, unde mirum tantam ejus esse hodie copiam.

Salibus volatilibus penetrantissimis & spirituosissimis gaudet, potenter incidit & attenuat, quidpiam acidi volatilis videtur admixtum, & propterea in scorbuto specificum est. Conducit imprimis in ructibus & Vomitibus acidis, it. in Paralyfi, quod confirmat Willis ex experientia. [Pathol. c. 9. commendat Cerevisiam medicatam ex saly. beton. stœch. lign. sassafr. & Cort. Winterano.]

Datur in substantia à 3^{ss}. ad 3j. in infuso ad 3ij.

℞. Cort Winteran. 3^{ss}. ari præpar. 3^{ss}. Oc. \mathfrak{S} 3j. M. f. p. pro ij. dosibus add. L. O. gr. i. contra Vomitiones acidas.

℞. Cort. Winteran. 3ij. rad armorac. 3i^{ss}. fol. cochl. Mj. cass. Caryoph. 3iij. Cort. Citr. 3ij. f. infusum in ∇ cochleariæ. Seu, si vinum non noceat, affunde vinum Malvaticum.

℞. Cort. Winteran. 3j. sem. Citr. 3iij. Cort. aur. 3j. feri lactis pint i^{ss}. f. infusum in scorbuto.

In amissa loquela. ℞. Pyrethr. utr. saxifrag. ana 3ij. Cort. Winteran 3^{ss}. summ. organ. p. ij. f. decoctum ex ∇ & vino adde colaturæ Essent. Castor. 3^{ss}.

Suppeditat oleum copiosum, quod ut \circ cinamomi partim supernatat, partim fundum petit.

COR-

CORTEX WINTERANUS quibusdam audit CANELLA ALBA, CINAMOMUM MAGELLANICUM, COSTUS ALBUS. Magellanischer Zimmet. ECORCE WINTERANE ou CANELLE BLANCHE.

Laurifolia Magellanica cortice acri C. B. Pin. 461. Cortex Winteranus acris sive Canella alba I. B. 1. 460. An Ligni Aromatici Monardis cortex, Raj. Hist. 1. 801. à DALE habetur pro Periclymeno odorato.

Virtute quoque pollet adstringente, conducit in obstructionibus hepatis & Lienis, prodest Cachecticis & Hydropicis. In febribus etiam quam maxime commendatur.

CORTEX GUAJACI.

Sunt Guajaci officinarum C. B. P. cortices, tenues, duriusculi, lignosi ex pluribus lamellis congesti, ex cinereo rufescentes & nigricantes & maculati, intus pallidi, nitidi & quasi lævigati, saporis acris amaricantis, odoris fere nullius.

Arbor est hexapetala nucifera, fructu cordis figura, binis vel trinis nucleis membranæ corticosæ involutis. Sponte sua nascitur in India Occidentali.

Cortices Guajaci nobi iores habent virtutes quam lignum, & constant tam Eibus volatilibus quam fixis utroque Balsamo & resinæ permixto. Horum ratione sudoriferi sunt & diuretici, ac in Morbis Chronicis, Catarrhis, odontalgia, scorbuto, scabie maligna, lue & ea mire laudantur. Dantur in decocto, in quod Balsamicam aromaticam vim deponunt.

Oleum destillatum & rectificatum, ac cum proprio spiritu cohobatum, singularis Medicina est in affectibus hystericis, colicis, febribus malignis, & lue & ea, & dicitur Q. E. Guajaci.

Resina

Resina vel ex corticibus extracta, vel sua sponte emanans [quæ est adrida, friabilis, subnigricans, pellucida, saporis acris, odoris grati præsertim igni impositum] medetur lvi & gonorrhoeæ, ubi specificum censetur.

℞. Cort. Guajac. ʒβ. Lign. Guajac. ʒiiij. passul. min. ʒj. lign. al. ʒj. coq. in ∇ Mens. iiij. sub fin. add. ras. lign. safr. ʒβ. sem. anis. ʒiβ. Cinam. ʒij. M. f. apoz. in omnibus Morbis Chronicis.

N. quod contra luem &eam huic decocto possit addi ꝑ viv. & ʒij. crudi ana ℥β. petiis except.

℞. Resin. Guajac. ʒj. ꝑ virid. gr. v. sacch. ʒn. ʒβ. succin. præpar. gr. xv. Thereb. s. Balf. Peruv. q. s. M. f. pil. contra gonorrhoeam pro j. dosi.

COR-

Frankosen-Holz-Kind / Ecorce de Gajac ou de Bois Saint.

Cum ligno magis sit medicamentosus, mos invaluit, ut in præscribendis lignorum decoctis partes duæ vel tres ligni & pars una corticis sumatur, quo hujus additione stimuletur lignum.

Resina Guajaci, quam alii Gummi vocant, Quajac-Harz / gomme ou resine de Gayac, in substantia ad ʒβ. ad ʒij. datur. Infunditur quoque in vino. Laudatur ab Ettmullero in scabie.

CORTEX PERUVIANUS SPURIUS CHINÆ CHINÆ FALSÆ.

Sunt arboris cujusdam Peruvianæ Kinkina dictæ, cortices Kinkina vera tenuiores, foris cinerei canescentes, intus ferruginei, saporis amaricantis & simul subpinguis, odoris debilis. Potentior est & nobilior ratione virium quam china vera, habet o gratiosissimum.

Cc

Sale

Sale tam fixo quam volatili cum levi quadam resinofitate scatet, & præter cæteras facultates quam cum aromaticis communes habet, possidet virtutem antiscorbuticam, & antihystericam.

℞. Chin. Chin. falsæ & veræ, Θ absynth. s. Θ prunell. ana ℥j. M. f. pulv. divid. in 2. dos.

℞. Chin. Chin. fals. ʒij. Cort. Winter. ʒj. Caryoph. arom. ℥j. rad. ari ʒij. M. f. cum vino infusum stomachicum & antiscorbuticum.

℞. Chin. Chin. fals. cinam. ac. ana ℥j. Croc. or gr. viij. borrac. ʒ℥. M. f. pulv. antihystericus pro ij. dos.

℞. Elæosacch. Chin. Chin. fals. exhibe contra passionem hystericam.

COR-

CHINA CHINÆ FÆMELLA, KASKARILLA, CHACARILLA, CHAQUARILLA, SCASCARILLA, SCHACARILLA, SCHACHRINILLA. Schagrille Arbor hunc ferens corticem nondum plene innotuit. Quidam hunc corticem esse corticem Winteranum putant. Odor corticis in se quidem debilis, sed si accendatur, admodum fragrans; unde à fumibibulis Nicotianæ intermiscetur, delicatioribus autem subjectis capitis dolorem infert.

Virtutem diaphoreticam, resolventem, tonicam & motus sedativam obtinet; laudatur in alvi fluxibus, ipsa quoque dysenteria & motibus spasmodicis mitigandis. Imprimis celebratur etiam in febribus tam intermittentibus quam continuis, in quibus ultimis tamen caute procedendum. Ab APINO in febribus epidemicis specifica ipsi attribuitur vis.

IN OFFICINIS PROSTANT EX HOC CORTICE

Essentia Chacarillæ, Eßenz von Schacarillen / Essence de Chacarille, ad febres utilis ad guttas 20. 30. & ultra, aliquoties de die sumpta.

&

Extractum

Extractum Chacarillæ, cum aqua & vino factum, *Schacarillen*, *Extract / Extrait de Chacarille*. Commendatur in Febribus intermittentibus, continuis & Catarrhalibus, variolis atque morbillis ut & in alvi fluxibus. Dosis grana 5. modo plura, modo pauciora, in formam pilularum acta, aut in potiuncula soluta, vel qualibet sexta hora, vel saltem mane & vesperi.

CORTEX SALE FIXO AMARISSIMO CONSTANS.

CHINÆ CHINÆ.

Sunt arboris cujusdam Peruvianæ Gannanaperide dictæ cortices ex crassitie mediocri, foris scabri, paululum canescentes, sæpe musco obducti, intus læves colore ferrugineo seu cinamomeo.

N. Kinkina cum China vera nullam habet convenientiam, sed quod male pronuntiatur, à nobis China Chinæ audit.

Arbor est procera, crassa, tiliaë instar baccifera.

[De utroque hoc cortice conf. Dale Pharmacol. part. 1. p. m. 372. ubi inquit: sunt qui duas corticis species esse affirmant, videlicet veram, & spuriam seu falsam, utramque autem ex India occidentali adferri, prima seu vera ita describitur; cortex crassitie mediocri, foras scaber, paululum canescens, aliquando musco obductus, intus lævis, coloris ferruginei, saporis acris intense amari.

Altera seu falsa tenera esse dicitur, foras coloris cinerei & canescentis, intus ex fusco aut obscuro ferruginei, saporis acris amaricantis subpinguis, odoris fragrantis. Quæ descriptiones cum Autoris nostri conveniunt.]

Ob Θia fixa rigidissima & amarissima substantiæ terreæ

& adstringenti inclusa insignem obtinet antifebrilem vim, & in specie contra quartanam intermittentem. Quidam volunt hunc corticem esse etiam Uterinum, cum aliis præscriptum.

Datur tam in substantia ad ʒʒ. quam in infuso ad ʒij. Præmissis purgantibus convenit, vel his tempestive interpositis, plurimis enim relinquit alvum adstrictam, unde semper purgantia adjunguntur.

Jungitur Gentianæ, centaur. min. absynth. serp. virgin. Stimulatur ☉ Card. B. Abs. Cent. min. ☉ prunell. adduntur quoque huic cortici terrea, scil. Corall. præpar. succin. &c.

℞. Cort. Ch. Chin. ʒj. rad. serp. virg. ʒj. ☉ prunell. gr. xv. M. f. p. antifeb. capiendus ex ▽ taraxac. bihorio ante paroxysm. vel ex Tinctura bellidis.

℞. Ch. Chin. ʒʒ. gentian. ʒiʒ. flor. cent min. p. i. pip. long. ☉ Tri ana ʒij. M. f. pulv. cujus ʒj. exhibeatur ex ▽ Cichor. vel taraxac. vel acetos. bihorio ante paroxysmum.

℞. Cort. Chin. Chin. ʒij. Gentian. serp. virg. ana ʒj. helleb. n. ʒiʒ. affund. vin generos. ad pint. iʒ. f. infusum, de quo singulis diebus bis vel. ter sumendum.

℞. Lap. bez. ʒj. vel Bezoard. min. ʒj. Chin. Chin. ʒʒ. lap. prunell. gr. xv. o d. caryoph. gt. i. f. p. antifebrilis.

COR-

CHINA CHINÆ ita dicitur, non quod ex China afferatur, sed ab uxore Comitis del Cinchon proregis regni Peruviani, quæ febris tertiana decumbens ejus usu conualuit, unde etiam pulvis Comitissæ vocatur. KINKINA, KINA KINÆ, CINA CINA, QUINQUINA. A loco Natali CORTEX PERUVIANUS appellatur, male autem à quibusdam dicitur CORTEX SINENSIS, & PULVIS INDICUS, cum id AMMANNO teste tantum factum sit,

ut

ut patria celaretur. CORTEX ANTIFEBRILIS etiam auditur
item PULVIS PATRUM, PULVIS JESUITICUS, PULVIS
CARDINALIS DE LUGO, à quibus videlicet primum receptus
& experimentis comprobatus fuit. FEBRIFUGUM PERUVIA-
NUM, PALO DE CALENTARAS sive LIGNUM FEBRIFU-
GUM, CORTEX ANTIQUARTIUS. Germanice nominatur
Quinqina/ Rincfina/ QUINQUINA OU KINKINA, LE FE-
BRIFUGE ANGLOIS.

Et hujus corticis arbor, quæ in regno Peru, præsertim in provincia
Quito ejusque cognomine urbe Metropoli multum provenit,
nondum plenarie descripta. Folia Pruno fere similia, flores au-
tem à floribus aurantiorum non multum discrepantes ferre dicitur.

Circa saporem hujus corticis notandum, quod non tantum sit
amaricans, sed & adstringens, odorem juxta MORTONUM de-
bet spirare suavem aromaticum & nonnihil mucidum sed absque
molestia.

Hoc remedium revera antifebrile specificum, licet jam anno
seculi superioris circiter 40. detectum sit, ad quod tempus us-
que ex odio Indorum erga Hispanos de industria celatum fuit: aut
50. Patr. Jesuitis præsertim innotuerit: attamen postmodum ne-
scio quo fato, de quo videri poterit VALENTINI IN POLYCH-
REST. EXOT. diss. 4 §. 3. Et RICHARDUS MORTON, Medicus
Anglus Exerc. 1. c. 7. de morbis universalibus, per tempus sup-
pressum fuit, donec eodem ex aliis annotante, in Gallia præcipue
& Anglia decantaretur, postquam Delphinus Galliarum variis ante,
sed in vanum adhibitis remediis à TALBOTIO Anglo cortice hoc
à quartana liberatus fuit. Unde factum, ut Rex Christianissimus
LUDOVICUS XIV. jure meritoque Magnus dictus, a dicto TAL-
BOTIO medicamentum hoc in secretis habitum, magno pretio
redimeret & in subditorum solatium scripto publico propalaret.
Consulatur hac de re etiam NICOLAUS DE BLEGNY in Zo-
diaco. TALPOTIUS itaque Anglus hujus remedii restaurator
quali extitit.

Dixi, remedium esse in febribus intermittentibus specificum,
addo nunc & tutum & necessarium. Reclamant equidem quidam,
qui occæcati præjudicio contendunt ipsa solida (sunt verba propria
cujusdam scriptoris) & attenta experientia probari, quam ini-

que hic cortex febribus curandis subveniat, ita ut communiter pessimi effectus exinde redundent. Allegata autem experientia suspecta plane imo falsa & nulla comparet. Experientiam Experientiæ oppono. Sancte namque testari & ad testimonium publicum provocare possum, me ante septem, & quod excurrit annos, dum in Nosocomio Regio absente Medico ordinario, ejus vices per sex menses jussu superiorum peragerem, non unum aut alterum, non centum, sed aliquot mille milites, ut jam non loquar de aliis curæ meæ commissis, diversis febrium intermittentium generibus afflictos, divino hoc febrifugo curasse, vix occurrente uno aut altero male, & quidem ex culpa ægri, cedentis remedii exemplo. Addo, quod plures hydrope, febres ab empyricis & famulis Chirurgorum male curatas, insequente jam laborantes, ubi tamen aliquid febrilis adhuc suberat, hoc cortice à febre liberasse & additis simul aliis remediis convenientibus servasse. Nescio itaque qua fronte, qua audacia, tantum Naturæ donum proscribatur, nec comprehendo, quo jure huic medicamini, è regno vegetabili deprompto, hinc in corpore adhuc superabili, aliud æque adstringens è regno minerali desumptum minusque domabile præferatur.

Hoc non nego, quod quandoque sinister aut nullus observatus fuerit effectus: at, ut non dicam de aliis causis, illud sæpe exinde provenit, quod corticem hunc genuinum atque verum & bonum non semper obtineamus; quandoque enim effectus, putridus atque adulterinus & ex arboribus in locis paludosis crescentibus aut etiam demortuis detractus est; unde Medici deinde nullum ab exhibito remedio experti sunt effectum, qui tamen alias purgato bene corpore & præmissis præmitendis vix unquam fallit. Accedit, quod nonnulli legitimam exhibendi methodum operandique modum vel ignoraverint, vel non bene consideraverint. Ingens autem intercedit diquisitio inter Medicos, an hic cortex ante vel post paroxysmum sit exhibendus & an in substantia, an vero in alia forma sit propinandus. Diu satis pondere zij. semel tantum & quidem ante paroxysmum fuit usurpatus, non perpendendo dosin pro una vice nimiam, neque tamen ad perfectam curationem sufficientem esse. Optima certissimaque methodus sæpissime reiteratis experimentis comprobata est, ut videlicet præparato bene corpore per vomitoria, (quæ haud raro ipso die paroxysmi ante ejus accessum summo

summo cum successu adhibentur) purgantia aliaque & si opus fuerit, ipsam etiam Venæsectionem, post paroxysmum finitum exhibeatur, ad ℥j. usque & ultra, sed quod bene notandum, divisim, atque usus ejus post profligatam febrim per aliquot adhuc dies, imo septimanas continuetur. Quamprimum itaque paroxysmus ad apyrexiam pervenit, exhibeatur ʒß. pulveris corticis Chinæ, vel in juscule, vel in vino, vel alio vehiculo, continueturque hæc dosi singulis 4 imo si opus fuerit 2. aut 3. horis, donec febris profligata fuerit, qua cessante postea per 2. 3. pluresve dies ʒß. his solummodo in die, postea per aliquot dies unica tantum dosi & tandem semel aut bis in septimana usurpetur.

Exhibetur autem ut plurimum infusa in vino rubro, præsertim Burgundo hoc modo, ut quando dosi una est propinata, altera statim infundatur. Quia tamen non omnibus subjectis vinum conducit, ideoque alio quoque vehiculo, aqua simplici vel destillata aut juscule, uti licebit. Quod si à pulvere abhorreat æger, vel in bolum, vel in electuarium, aut etiam in Tabulas redigi poterit. Quod si etiam hic modus displiceat, infundi potest vel in Vino, imprimis rubro, vel etiam in aqua v. gr. Cichorei &c. ubi ad libras ij. ℥j. ad ℥ij. assumi potest.

Inter ea quæ adduntur, recenseri quoque merentur arum, Cinamomum, sal armoniacum.

Modum operandi Corticis quod attinet, multi rationem in sale volatili amaricante, alii vero in sale fixo ibidem latitante quaerunt. Haud inepte ii sentire videntur, qui statuunt, corticem Peruvianum in substantia, quoad totam suam agere substantiam, id est, neque particulas ejus terrestres separatas, neque sal fixum separatum, aut ipsius essentiam atque extractum qualitatem illam specificam febres curandi adeo possidere, quin potius credamus Corticem ipsum in substantia ejusque poros ita esse constitutos, ut specialem atque aliis febrifugis vix competentem obtineant facultatem, fermentum illud morbificum (aut quomodocunque causam febris appellare velis) in se recipiendi, frangendi curandique. Quæ vis ejus partibus ab invicem separatis minime in tanta excellentia competere potest. Nec timendum est ab exhibitione, uti bene monent saniores, hujus corticis: cum rite exhibitus nullam noxam post se relinquat, præmissis præsertim, uti decet, universalibus; neque

neque credendum, quasi stomachum debilitet, sanguinem turbet, Hydropem, asthma &c. producat, cum hi ipsi morbi tum demum subsequantur, quando omissis præmittendis & non debito tempore exhibetur.

Varios quandoque effectus in corpore edit, cum nunc purget, nunc obstruat, ubi in primo casu, nisi nimia accedat alvi solutio, res relinquenda, quippe cortex conjunctus cum materia febrili, intestina ad excretionem stimulet, & optimo quidem cum successu eliminatur hoc ipso materia morbifica. In altero casu, si diutius duret obstructio, potest exhiberi laxans clyisma, aut jusculum carniū, cui beta est incocta, ita tamen ut observemus, ad recidivam impediendam post exhibita hæc remedia corticis usum esse continuandum.

In ipsis etiam ad alvi obstructionem inclinantibus subjectis non inconsultum erit purgantia ipsa, Gialappam, specificum Gialappinum, pulverem Cornachini &c. cum hoc febrifugo jungere. Memini, me hac ratione sæpius una fidelia duos dealbasse, uti loquuntur, parietes, præscribendo hunc corticem, præsertim in nodulis. Accidit quandoque, ut febris, præsertim quartana adeo contumax sit, ut & huic resistat remedio, adeoque verum reddat, quod in proverbio dicitur, Hydrops quartana Medicorum scandala plana; quo in casu, id quod expertus loquor, felicissimo cum successu cortici jungere poteris unum aut alterum granum Laudani opiatum vel Theriacæ cœlestis, hæc tamen cum cautela, ut per diem nonnisi unum aut duo grana dentur. Contingit porro, ut alii quandoque conjuncti sint morbi, ubi tamen & ipsum hunc corticem adhibere licet, modo febris intermittat. Cavendum ab ejus usu summopere est in febribus continuis, præsertim ardentibus, experientia funestos semper effectus ostendente, ille tamen excipitur casus, ubi remissio fere ad apyrexiam pervenit.

Febres intermittentes febris lenta atque hectica subsequitur interdum, quam de novo per ipsum hoc remedium præmissis præmittendis curandam esse MORTONUS aliique volunt.

In aliis quoque affectibus, ubi acidum peccat & in quibus certum paroxysmorum tempus observatur, usui venire potest, quæ de re consulatur modo allegatus MORTON atque SYDENHAMUS, quorum hic in uteri & ventriculi affectibus, ille vero in calore

lore hectico & gradu aliquo tabis ab hæmorrhagia ortæ, hoc medicamen commendat. Sunt quoque, qui in affectibus arthriticis, podagra atque Chiragra, præsertim non inveteratis, laudant. Ad exemplum HELVETII quidam in febribus tum intermittentibus, tum etiam continuis clysmata ex cortice Peruviano maximopere deprædicant.

Tandem notandum, quod, post profligatam per hoc remedium febrem, medicamentum purgans non sit assumendum ob metum recidivæ. De Diætâ sub usu hujus remedii instituenda, cum illa notissima sit, nolo nunc verba facere.

OFFICINÆ NOSTRÆ SEQUENTIA ASSERVANT
PRÆPARATA.

Electuarium antifebrile pretiosum, Kostbare Fieber-Electuarium / Electuaire ou opiate febrifuge. Exhibetur post paroxysmum singulis tribus vel quatuor horis, dosi Nucis Moschatæ, aut Castaneæ, aut ad aliquot cultri cuspides, aut ad drachmam, aut paulo ultra. Assumitur vel per se, vel involutum in pane azymo; Drachma circiter scrupulum corticis continet.

Electuarium antifebrile pro pauperibus, gemeine Fieber-Electuarium / Electuaire ou opiate febrifuge pour les pauvres. Exhibetur ut præcedens.

Essentia Chinæ Chinæ, Sinfina-Essenz / Essence de Quinquina, adhibetur ad guttas viginti, triginta & ultra, aliquoties de die. Optime se habet usus ejus post profligatas febres, ad recidivam impediendam.

Extractum Chinæ Chinæ, Quinquina-Extract / Extrait de Quinquina; ad grana quinque, decem, viginti & ultra, in febribus intermittantibus, tum curative, tum præservative datur.

Ex hoc cortice cum aliis febrifugis & aromatibus paratur quoque *Elixir antifebrile seu essentia antifebrilis Wedelii, D. Wedels Fieber-Elixir / Elixir febrifuge de Wedel,* in febribus intermittantibus, ad obstructions tollendas, humores viscidos incidendos & ad febrem profligandam datur bis vel ter de die ad guttas triginta, quadraginta & ultra, in corporibus phlegmaticis & obesis. Commode etiam usurpatur ad recidivam præcavendam.

℞. Cort. Chin. ʒiſs, infund. in Vin. Burgund. lbij. stent per

24. hor. postea colaturæ sing. 3. aut 4. horis pro ratione circumstantiarum propinetur haustus mediocris.

℞, Cort. Chin. Chin. ℥j. infundatur in Aqu. Cichor. ℔j. stent in digestionē per plures horas, postea colaturæ adde Syrup. Cortic. aurant. ℥i℔. Syrup. Cinam. ℥℔, d ad vitr. usurp. ut præcedens.

CORTICES CONSTANTES SALE FIXO DIURETICO.

CORTEX FRAXINI.

Sunt Fraxini excelsioris C. B. P. cortices ex crassitie mediocres, ex cinereo viridantes, saporis acris amari, cum adstrictione.

Lignum ejus ipso Johannis Baptistæ die cæsum à multis habetur vulnerarium, [it. ad hæmorrhagias] Parantur & ex hoc ligno cyathi contra omnis generis venena.

[De ligno hoc vulnerario seu sympathetico dicto prolixè agit, ejusque vires recenset Hohberg Kunst-Buch num. 37. p. 30 annex. Georgic. Curios. Tom. 2. sed multa hyperbolica & superstitiosa enarrantur.]

Ob Θ acre diureticum & diaphoreticum convenit in morbis Chronicis, passione hypochondriaca, scorbuto, nephritide, hydrope, ascite, Catarrhis, Lue & aliis.

Datur decoctum ad ℥iij ad ℥iiii. quod aliquando ex vini & aquæ anatica portione paratur. Viget quoque Θ per incinerationem factum, dos. à ℥j ad 3℔. in Variolis & Morbillis.

℞. Cort Fraxin tamarisc ana ℥j. rad. helen. armorac. polypod. ana 3℔. helleb. n. ℥ij. summit. absynth. Cent. min. fol. agrim. ana Mj. bacc. Junip. ℥i℔. affund. vin. Rhenan. f. Malvat. pone indigest. f. infus. antihydopicum & antiscorbuticum.

℞ Cort,

℞. Cort. fraxin. ℥iiij. coq. in vin. ℔iiij. f. apoz. ex quo
 cape ☉ fraxin. gr. vij. l. ὀβ. contra hydropem & Urinæ sup-
 pressionem.

COR-

FRAXINUS vel à frago, flecto, vel à fragosis locis. Græcis
 Μελία, Μελίνη dicitur, *Aschbaum/ Eschbaum/ Eschen/ Steineschen/*
Wundholz. F R E N E.

Est arbor flore apetalò, cujus stamina gemino plerumque
 apice donantur, è quibus sæpe surgit pistillum, quod deinde abit in
 fructum linguiformem planum membranaceum, semine foetum
 ejusdem pene formæ.

Species usualis est

Fraxinus excelsior C. B. Pin. 416. Fraxinus vulgatioꝝ I. B.
 I. 174. Fraxinus Dod. Pempt. 833. de hac notissimus versiculus;

Fraxinus in Sylvis pulcherrima, Pinus in hortis.

Crescit in sylvis opacis, montibus & clivosis; floret Aprili &
 Majo, semen autumnò maturescit. In usum suppeditat folia,
 corticem, lignum atque semen.

Folia sicca vulneribus medentur, in suffumigiis ad surdita-
 tem, imprimis vero ad ictus serpentum & viperarum lauda-
 tur.

De fraxino P L I N I U S illud curiosum refert, quod serpenti-
 bus adeo sit inimica, ut umbra eos abigat. Longe autem curiosius
 esset, si verum, quod P A R Æ U S notat; Expertus refero, inquiens,
 si fronde fraxini gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius
 quam in fraxinum fugere serpentem. Alii autem multum contra-
 dicunt. Lignum, *das Wundholz* / cædunt vel ante Solis ortum,
 vel tempore meridiano, vel intra horam undecimam & duodeci-
 mam nocturnam; & quidem abscissio fieri debet una vice median-
 te securi nova, quæ nondum in usum tracta. Borellus baculum, cum
 Sol in arietem ingreditur, conficiendum esse jubet, cujus sola ad-
 motione hæmorrhagias sisti vult. Absint solummodo omnia su-
 perstitiosa. Pocula ex ligno spleneticis & hepaticis L A N G U S suadet,
 suntque qui hoc modo Lienem absumi credunt. Lignum hoc

quidam Quajaco substituunt: Corticem vero haud pauci tanquam insigne febrifugum in febribus intermittentibus quibusvis Cortici Chinæ Chinæ vel admiscent, vel substituunt. Melancholicis quoque, Hypochondriacis & calculosis prodesse fertur. Virtus porro alexipharmaca & antipestilentialis adscribitur.

Cineres fraxini scabiem atque impetigines curant, commendantur quoque ad calculum internè in infuso. Juxta ZWELFFERUM præbet singulare cauterium atque nobile.

Semen fraxini, quod & *Ornithoglossa*, *lingua avis*, *lanque d'Oiseau* vocatur ob figuram, usurpatur excorticatum, imprimis in calculo urinæque vitiis, hepatis & Lienis, hydrope atque pleuritide. Adscribitur quoque eidem vis aphrodisiaca. Non autem ubivis speratus sequitur eventus.

OFFICINÆ nihil ex fraxino alunt, præter *Sal fraxini*, *Neschbaum-Salz* / *Sel de bois de Frene*, quod multum quidem deprædicatur, sed præ aliis Salibus plantarum fixis, per incinerationem paratis, peculiare nil obtinet.

R. Cort. Fraxin. rad. gentian. ana ꝑ℥. Sal. absinth. ʒj. Msc. f. pulvis Febrifugus euporistus LENTILII, cujus dosis ʒ. cultri cuspides singulis 4. aut 6. horis.

Cortex interior fraxini, juxta CÆSALPINUM, aquam in qua maduerit, cœruleam reddit.

CORTEX TAMARISCI.

Est Tamarix fruticosa folio crassiore seu Germanica C. B. P. Conspirat cum corticibus fraxini & cum his simul solet præscribi, utrique cortici assignatur specifica vis contra vitia Lienis. Unde ex ligno tamariscino conficiuntur pocula, ex quibus Lienosi omnia medicamenta & potulenta capiunt. Externe cataplasma ex corticibus Lienosis applicatur, admodum conducit, præcipue si addatur cortex capparis.

COR-

Myrica, MYRICA, MYRICE, TAMARIX, Tamariscen/
Tamariscenbaum - Pors / Birthenbenz / TAMARISC.

Est fructus flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positus constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in capsulam salicis fructus æmulam oblongam, nempe membranaceam, in duas partes dehiscentem seminibusque foetam pappo instructis. Tamariscus Germanica Lob. Jcon. 218. Tamarix fruticosa folio crassiore sive Germanica C. B. Pin. 485. Tamarix Germanica sive minor fruticosa L. B. I. 351. Frutex hic Sabinae similis juxta Rhenum & Danubium provenit. Invenitur quoque in Gallia, præsertim Narbonensi; floret Majo & Junio, ac deinde tota æstate, ut loquitur I. BAUHINUS, flores & semen proferre non desinit.

In usu ex hac planta lignum, radix & cortex, præprimis radici detractus. Cortex laudatur quoque in ictero, fluore albo mulierum, Melancholia, scabie, Lepra & lue Venerea. Radix infusa in Urina icterici & postmodum combusta, morbum sanare dicitur. Lixivium cinerum Ligni in Phthiriasi & tinea commendatur.

IN OFFICINIS PROSTAT

Extractum Tamarisci, Tamariscen - Extract / *Extrait de Tamaris* &c.

Sal Tamarisci, Tamariscen - Salt / *Sel de Tamaris*, quod ratione virtutum cum aliis salibus fixis coincidit.

CORTEX CAPPARIS.

Est Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo C. B. P. Sunt radicum cortices tubulosi, rugosi, crassi cinerei, saporis acris austeri.

Cum tamarisci & fraxini corticibus convenit, nisi quod austeritatis ratione in recessu plus adstringat, datur in substantia ad ʒj. in ∇ Malsa, oxymell. ad viscerum obstructionem ex sanguine acido adusto. Decoctum datur ad ʒiiij.

℞. Cort. Cappar. ʒiiij. flor. cappar. muria cond. coq. in

▽ Mulsa, vel oxymell. seu vino f. apoz. ad induratum lienem.

℞. Cort. cappar. fraxin. tamarisc. ana ℥j. herb. cusc. epith. plantag. capill. ♀is ana Mj. f. decoctum ex ▽ ad quemvis morbum ex obstructione mesenterii dependentem.

Prostat & ∞ coct. ex capparibus. ℞. ∞ coct. cappar. dissolv. gum. ammoniac. ad emolliendos tumores viscerum.

COR-

κάππαρις, Kappern / CAPRIER.

Est planta flore rosaceo quatuor plerumque petalis in orbem positis constante, è cujus calyce surgit pistillum embryone instructum, qui deinde abit in fructum ut plurimum pyriformem vel siliquosum, carnosum, in quo veluti nidulantur semina non raro subrotunda & quasi reniformia.

Capparis spinosa fructu minore folio rotundo C. B. Pin. 480. Capparis spinosa L. B. 2 63. Capparis retuso folio Lob. Jcon. 635. Frutex hic in Italia, Hispania Galliaque provenit; floret æstate, viret usque ad Vergiliarum occasum, sabulosis familiarissimus.

Flores & cortex radicis in usum trahuntur; flores Capres / CAPRES, antequam expanduntur, muria condiuntur, & non tam, ut cum SEBIZIO loquar, alimentum sunt, quam ciborum obsonium & condimentum. Collapsam ciborum appetentiam instaurant, humido Ventriculo conducunt, salivationem reprimunt, pituitam detergunt hepatis & lienis obstructions recludunt, lienosis conferunt. Tempore pestis quoque commendantur.

Eduntur vel cum aceto & oleo, vel decoquuntur in variis jusculis, adduntur diversis ferculis.

EX CORTICE SEQUENTIA IN OFFICINIS ASSERVANTUR
REMEDIA.

Oleum Capparum, Cappres. öhl / Huile de Capres, quod usu externo in obstructionibus Lienis potissimum commendatur, &

Trochisci de Capparibus, Cappres. Zeltlein / Trochisques de Capres. Obstructionibus hepatis atque Lienis aliorumque viscerum sunt

sunt dicati, vim obtinent carminativam, diureticam & emmenagogam. Dosis est ad. ℥j. ad ʒj.

CORTICES PARTICULIS TERREIS CONSTANTES.

CORTICES CASTANEARUM.

Sunt Castaneæ sativæ & sylvestris C. B. P. cortices rubicundi, castaneam fructum seu nucleum immediate cingentes. Est arbor nucifera, pluribus in communi integumento echinaceo inclusis.

In specie conducit in sistendo nimio mensium fluxu & metuendo abortu, ut & in gonorrhœa & fluxu albo. Ingreditur quoque gargarismata refrigerantia & adstringentia.

Ex pulvere horum corticum cum pinguedine quadam vel oleo appropriato, paratur unguentum, quod in nimio mensium fluxu pudendis illinitur.

℞. Cort. Castan. ʒij. auric. jud. ʒj. hord. excort. 3℔. flor. malv. arbor p. j. coq. ex ∇. plantag. add. colatur. syr. violar. q. s. f. garg. in inflammatione faucium.

- COR-

CASTANEA, Kastanien-Baum / CHATEIGNER.

Est arbor flore amentaceo, plurimis nempe staminibus è calyce quinquefolio surgentibus constante, tenui capillamento seu axi affixis. Fructus autem seu echini in eadem arbore separati nascuntur, subrotundi quadrisariam plerumque dehiscentes, Castaneis foeti nucleum continentibus.

Castanea sativa C. B. Pin. 418. Castanea I. B. I. 121, Castaneæ majores Lugd. 31. Maronnier. &

Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea C. B. Pin. 419. Castanea Dod. Pempt. 814. Prior species multum in agro Lugdunensi

dunensi & in Delphinatu, altera vero passim in sylvis, etiam in Alsatia superiore & inferiore circa Weissemburgum proveniunt. Gaudent montibus & acclivibus. Primo vere germinant, postea mox florent, sed fructum maturum non nisi sub finem Septembris exhibent.

In usum ex hac arbore veniunt fructus, quæ vocantur *Kαῖσαρα* vel *Kασάρα*, à Castano Magnesiæ oppido, unde primum advectæ, *Kāsten/ Kesten/ CHATAIGNES*. Vocantur quoque *JOVIS GLANDES*, *NUCES SARDIANÆ* &c.

Castanæ aliæ sunt sativæ, eæque vel majores, quæ *MARONES*, *Marons/ MARONS* appellantur, vel minores; aliæ autem sunt sylvestres, quæ peculiariter Castanæ nominantur, & Plinio coctivæ & populares audiunt. Illæ divitum mensas exornant, hæ vero vilioris pretii communiter usurpantur. Partium sunt crassiorum atque tenuiorum, hinc etiam commestæ, crassum præbent succum. Interim iis, qui se valide exercent, utilem præbent cibum: flatus excitant, ventrem obstruunt, ventriculum gravant, dolorem capitis producunt & incubum generant, præsertim simulstusum desuperbitatur. Virtus aphrodisiaca quoque ipsis adscribitur.

Nostri homines, I. B. inquit, tostas eas non modo gratius, sed & in deliciis habent, præsertim amplissimas illas Maronnes dictas, quas cum cæteris promiscue diurnis ac nocturnis commestationibus apponunt. Quidam cum pipere & sale comestas innocentiores & illicia Veneris & Bacchi esse putant. Torrentur duobus modis, vel in perforata patella ad ignis flammam, vel sub prunis & cineribus candentibus. Prius tamen quam igni, aut cineribus credantur, cultello obiter vulnerari debent, ut plagæ hiatus flatus igne citatus evadat, alioqui ubi flagrantem incaluerint, concepto intus spiritu, magno cum crepitu profiliunt. Elixantur quoque in aqua. Multa porro fercula castaneis infarciuntur, anseres, porcelli, anates, ventriculi quorundam animalium, Brassica &c. Ad porcos quoque saginandos inserviunt. In annonæ caritate inserviunt etiam ad panificium.

Hac occasione paucis quoque mentionem injicere liceat sic dictæ *CASTANÆ EQUINÆ*, quæ Constantinopoli Viennam primum & postea in reliquas regiones est delata. Est autem arbor flore rosaceo plurimis scilicet petalis in orbem positis constante,
ex

ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum multifariam dehiscentem & seminibus foetum Castanearum æmulis

Hippocastanum vulgare Tourn. I. R. H. cl. 21. S. I. g. 5. Castanea folio multifido C. B. Pin. 419. Castanea equina folio multifido I. B. I. 128. Castanea Equina Dod. Pempt. 814. *Maronnier d'Inde*, Fructus hujus arboris CASTANÆ EQUINÆ, *Ros-Râsten / Chataignes de Cheval* vocantur, quoniam anhelosis & tussientibus equis profunt. In pulverem insuper redacti hi fructus sternutationem cient, & sic Hemicraniam mitigant naribus attracti.

CORTICES GRANATORUM SEU MALICORIUM.

Sunt fructuum mali Punici C. B. P. Cortices coriacei duri, rugosi, foris ex spadiceo luteo punicei, intus vero lutei, saporis amaricantis adstringentis austeri. Est arbor pomifera, fructu rotundo, in summitate umbilicato, floribus fructui insidentibus pentapetalis.

Acido-austerum Ælicum, particulis terreis admixtum, potenter exaltat horum corticum virtutem adstrictoriam, propterea conducit in fluxu albo, hæmorrhagiis & profluvio feminis. Convenit quoque in Vomitu nimio tam simplici, quam cruento, ut & gravidis pica laborantibus.

Ingreditur quoque gargarismata & clysteres adstringentes. Externe ad suffusiones Oculorum & leucomata, ut & ad pudenda exulcerata laudatur. Præcavent quoque ne Oculi à Variolis & morbillis lædantur.

℞. Cort. granat. ʒj. N. M. tost. ʒj. Laud. op. gr. j. M. f. pulv. contra omnem fluxum alvi, exceptus conserv. rosar. ʒlat. f. bolus.

℞. Cort. granator. ʒʒ. succin. præpar. osteocoll. ana ʒj.
Ee f. pulv.

f. pulv. exhibe ex succo Igranator. tam ad fluorem album, quam ad nimium mensium fluxum.

℞. Cortic. granator 3℔. exhibe ex succo granator. seu cydonior. contra picam. f. add. miv. cydonior. qt. v. addi possunt Zedoariæ grana aliquot.

COR.

MALUS PUNICA, quoniam circa Carthaginem copiose proveniebat, MALUS GRANATA, vel a granis in fructibus contentis, vel à Granata Hispaniæ regione, Granaten. Baum / GRE-NADIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, cujus calyx campaniformis, multifidus abit in fructum fere globosum coronatum, in plura loculamenta divisum, acinis succi plenis foeta placentæ affixis, membranis tenuissimis distinctis, & semine turgentibus ut plurimum oblongo. Species sequentes in usum trahuntur.

Punica quæ malum Granatum fert Cæsalp. 141. Malus punica sativa C. B. Pin. 438. Malus Punica I. B. 1. 76. Malus Granata sive Punica Tabern. Icon. 1033.

Punica sylvestris Cord. Hist. 184. Malus punica sylvestris C. B. Pin. 438.

Punica fructu dulci Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 8. g. 6. Malus Punica sativa fructu dulci C. B. Pin. 438.

Punica fructu medii quasi saporis Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 8. g. 6. Malus Punica sativa fructu medii quasi saporis C. B. Pin. 438. &

Punica flore pleno majore Tourn. I. R. H. Malus Punica flore pleno H. R. Par. Balauſtia Hispanica I. B. 1. 82. Balauſtium Tabern. Icon. 1033. Baluſtia flore pleno majore C. B. Bin. 438.

In Italia, Gallia, Hispania aliisque regionibus calidioribus, imprimis sylvestres Mali Punicæ & flore pleno luxuriant, ut sæpe etiam in sepibus reperiantur. Apud nos coluntur in hortis caloris amantes; florent æstate, & calidioribus temporibus etiam fructus maturos perficiunt. Ex hac arbore in usum veniunt flores & fructus; de floribus vide inferius.

Fructus

Fructus vocantur MALA PUNICA à Pœnis, vel à puniceo colore. MALA VEL POMA GRANATA, Granat-äpfel / GRENADES, GRANATES. Triplicia autem sunt ratione saporis, DULCIA, quæ continent succum multo phlegmate acidulo & paulillo sulphure constantem; ACIDA plus acidii habent & magis sunt frigida, dum dulcia magis sunt temperata, VINOSA, sive acido dulcia, mediæ inter dulcia & acida naturæ. Vinosa & dulcia vires habent cardiacas cephalicas & stomachicas, commendantur ad sanguinis orgasmum, ad hæmorrhagias ut & ad sitim sedandam. Conducunt in febribus morbisque biliosis. Acida poma stomachum etiam roborant, sed magis adstringunt. Licet autem in febribus poma granatorum comedi possint, ita tamen agendum, ne nimis parci, nec nimis liberales simus, ob vim dictam adstringentem, quam vim quidam temperare volunt saccharo. Nuclei magis adstringunt, quam succus.

Decoctum Malicorii cum solutione Oli atramentum constituit.

IN OFFICINIS PROSTAT

Succus Granatorum, roher Granaten-Safft / *Suc de Grenates*, qui præter virtutes allegatas, ad hæmorrhoidum fluxum & in pica gravidarum laudatur.

Vinum Granatorum, Granaten-Wein / *Vin de Grenades*, ex succo videlicet cum Saccharo fermentato.

Syrupus Granatorum, Granaten-Syrop / *Syrop de Grenades*, qui cordialis, refrigerat, sitim sedat, bilem refranat, fluxus alvi & hæmorrhagias compescit, abortum præcavet. Potionibus & Julapiis ægros reficientibus additur.

CORTICES QUERCUS.

Sunt cortices crassi, foris ex cinereo fusci, intus pallide rubentes, saporis adstringentis.

Substantia terrea crassiore constant quam cortices granatorum, cui tamen non nihil Ois alcalini videtur admixtum, decoctum cui aliquid Oli adjicitur nigrescit. Conve-

niunt in fluxu alvi, ut & hæmorrhoidum, tenesmo, item in foda, & acida effervescentia temperanda. Horum decoctum ex ∇ chalybeata factum datur pro Vulnerario, de cætero conveniunt cum corticibus granatorum.

℞. Cortic. querc. \mathfrak{z} iiij. calic. gland. \mathfrak{z} j. coq. ex ∇ chalybeata, add. syr. Cortic granat. q. s. f. apozem. contra ardorem Ventriculi.

Paulo subtilioris Naturæ sunt calices glandium, quam cortices quercus, cum quibus in omnibus conveniunt. Et cum his simul & semel præscribuntur.

CAPUT

$\Delta\epsilon\upsilon\varsigma$, ROBUR, *Eichbaum*/CHESNE, vocatur etiam ARBOR PLACIDA, JOVIS ARBOR, quoniam ei dicata erat.

Est arbor flore amentaceo, plurimis scilicet apicibus constante, tenui capillamento denso agmine affixis. Embryones autem in eadem arbore à floribus separati nascuntur, abeuntque deinde in glandem cupula munitam, nucleo scetam in duas partes fissili. Addenda sunt folia sinuosa.

Querus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. *Quercus vulgaris* brevibus pediculis L. B. 1. 70. *Platyphyllos* mas Lugd. 2.

Ex hac arbore, quæ in sylvis, collibus & montosis provenit, & Julos Aprili & Majo promit, in usum trahuntur Lignum, cortex, folia, glandes earumque cupulæ, gallæ, viscus & fungus, ut taceam jam nucamenta, quæ etiam à quibusdam usurpantur pro scopo adstrictorio. Curiosum est, quod Hoffmann. in clave ad Schröderum annotat, quod equi scutellati, *die weisselechte Aepffel*, *Brauepferd* / nigricent, inque iis pili veteres nigri fiant, aut nigriores pili veterum albidorum loco renascantur, si verno tempore unum & alterum pugillum, aut manipulum gemmarum, (addunt alii nucamentorum) quercus arboris recentium in modium avenæ conjeceris & equi aliquandiu his pascantur, ob Sal Vitriolicum, quod in illis delitescit.

Lignum

Lignum destillatione exhibet plurimum acidi & olei cum multa terra, Salinibi latens ad Naturam Vitriolicam accedere videtur, unde ex hac arbore quidam Vitriolum elicere conantur.

Lignum à quibusdam multum æstimatur, imo æquiparatur ipsi ligno Quajaco, unde etiam Quajacum Germanorum vocatur. Infusum quoque hujus ligni, ut & lixivium cinerum commendant ad hydropem & pedes œdematosos. Quidam hoc lignum celebrant ad epilepsiam. Cineres porro ad icterum laudantur. Afferculum quernum calefactum abdominique impositum, colicos dolores sedare dicunt. Affer porro quernus bene calefactus & mastiche, vel medulla cervina, aut hircina illitus, cui, quam calide ferri possit, insideat æger per horæ quadrantem, contra ani procidentiam & firmandum intestinum rectum HARTMANNI est experimentum. Fuligo Ligni querni secretum habetur in peste. Juxta HOFFMANNUM in Schroederum, morbi per incantationem ope ligni querni inducti à betula curantur. Aqua, quæ in cavitatibus quercuum annosarum reperitur, ad scabiem fœdam & verrucas commendatur.

Succus ex quercu terebrata contra mictum cruentum deprædicatur ab ACTIS ANGLICANIS. Quantum usum in re Oeconomica, imprimis in ædificiis construendis, præbeat Lignum Quercinum, satis in vulgus notum est.

Lignum, cortex, folia, glandes, cupulæ æque ac Gallæ ad atramenti confectiorem usurpari possunt.

Ligno adnascitur muscus, qui pariter adstringit æque ac fungus, qui est substantia coloris ex fusco cinerei, solida satis & lignosa, truncis annosis quercuum adhærescens, saporis adstringentis. Huic fungo virtus quoque antepileptica à quibusdam tribuitur.

CAPUT TERTIUM DE LIGNIS

LIGNA CONSTANTIA SALIBUS OLEOSIS AROMATICIS.

LIGNUM SASSAFRAS.

Est arboris Virginianæ folio ficulneo Pavame dictæ. Radix deberet prostare, nam melior est, & sic describitur, sub cortice tenui, foris cinereo, intus sanguineo, includens materiam ex albo rufescentem, lignosam, aliquantulum ponderosam, saporis subacris, subdulcis, tenuis aromatici, odoris fragrantis & fœniculati.

Transfertur ex Virginia & Florida. Dicitur sassafras quasi saxifraga, ob virtutem lithontripticam. Duplex ejus species, altera folio ficulneo, floribus pentapetalis, habentibus odorem anisi, quos flores sequuntur baccae, & hæc usualis est. Altera non, cum fructibus corni, exceptis foliis valde convenit.

Hujus Θ ia volatilia temperata sunt fœniculacea dulcedine, ut tam per diuresin, quam diaphoresin diminuat etiam in remotissimis locis viscosa, crassa & vitiosa. Hinc tanquam Catholicum in morbis Chronicis usurpatur. In specie corrigit crudam acidamve lympham, [Brunnero in consiliis audit verum alexipharmacum Catarrhorum] medetur tussi, tabi, phthisi, lvi & in ruptis abscessibus internis singulare est mundificans, specificum est in fluore albo.

℞. Rad. helen. $\mathfrak{z}\beta$. lign. sassafr. $\mathfrak{z}\text{ij}$. f. decoct. ex vino, quotidie exhib. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. add. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Cort. Winteran. si scorbutus adsit.

In

In hoc exhibe 3^{ss}. succin. præpar. in fluore albo. Hoc modo Hermannus puellam curavit.

Datur infusum, decoctum, essentia & oleum destillatum.

℞. Ras. lign. sassafr. ʒij. flor. pap. rhœad. p. ij. coq. leniter, add. colatur. syr. papav. q. s. f. f. apozema contra Catarrhos.

℞. Cort. sassafr. ʒi^{ss}. Spir. Vinos. serpilli ℥ij. f. infusum, quod præservat à Catharrhis eosque curat.

℞. Sassafr. lign. sanct. rad scorzon. liquirit. ana ʒij. caric. ping. n. ix. f. decoctum mundificans sanguinem à rupto abscessu, vel à pleuritide, vel alia causa orto.

LIGNUM

LIGNUM FOENICULATUM ab odore, Sassafras / Fenchel-Holz. SASSAFRAS.

Sassafras arbor Monardi Clus. Exot. 320. Lugd. 1786. Arbor ex florida ficulneo folio C. B. 431. Sassafras Hern. 61. Sassafras sive Lignum Pavanum I. B. I. 483. Nascitur in maritimis locisque temperatis.

Ad frigidos ventriculi affectus & flatus, vomitus &c. à Monarde commendatur. Laudatur ad febres diuturnas, fœdos virginum colores, hydropem &c. Podagricis atque arthriticis conducit. Siccioris autem constitutionis hominibus hoc in casu non prodest. Valet etiam in Parexi, dentiumque dolores mitigat. In sterilitate quoque & utero squalido mundificando prodesse dicitur. Scabiem profligat, aliasque sanguinis impuritates corrigit. Sunt, qui coctionem ejus suadent, alii vero infusionem, & haud abs ratione præferunt, quoniam partes volatiles avolant in decoctione.

In substantia datur ad ʒj. &c, in infuso ad unciam unam ad alteram.

IN OFFICINIS PROSTAT

Extractum Ligni Sassafras cum Spiritu Vini paratum, Fenchelholz-Extract / Extrait de Sassafras. & Oleum

Oleum Ligni Sassafras destillatum, *Sassafras* oder *Fenchelholz* *öhl* / *Huile de Sassafras*, quod stomachicum est & uterinum, valet etiam in Catharrhis in Lue Venerea prodest, asthmaticis atque nephriticis conducit mensesque provocat.

℞. Pulv. Ligni Sassafras ʒj. Pulv. Viperarum. ꝯr dulc. ana. ʒj. Elect. Cathol. f. bolus in Gonorrhœa utilis.

LIGNUM GUAJACUM ET SANCTUM.

Guajacum est arboris Indiæ Occidentalis Guajacan dictæ, lignum solidum, densum, resinofum, buxei coloris, medulla intus nigricante durissima & densissima, ponderosa & resinosa, [saporis acris, amaricantis & aromatici, odoris fragrantis.]

Sanctum est arboris Indiæ Occidentalis Hoaxacan dictæ, lignum solidum, densum, Guajaco albidius, medulla intus solida durissima &c.

Differt à Guajaco specie, non genere, utraque enim est ejusdem figuræ & faciei, utraque prægrandis est & nucifera, destillat ex utraque etiam resina. [Resina arida est friabilis, pellucida, nigricans, saporis acris, odoris grati.]

Utraque hæc ligna quoad vires corticibus respondent, & cum his simul præscribuntur in decocto, essentia &c. prostant & eorum oleum & spiritus.

℞. Lign. sanct. cort. mal. granat. ana ʒj.thur. mastich. ana ʒij. flor. balauſt. roſar. r. ana Mj. bulliant in ∇ f. q. ad medietatem, f. apozema contra fluorem album, add. tantillum vini austeri. Pro abluendis pudendis & injiciendo.

Decoctum in Lue ſea vid. supra in capite de radice chinæ.

Oleum destillatum externe applicatum singulare est in nephritide

nephritide. Commendatur etiam ☉ destillatum exterius cum ☉ bacc. laur. spic. lavend. in arthritide.

LI.

QUAJACUM, vocatur quoque QUAJACAN, LIGNUM GALLICUM, LIGNUM SANCTUM, Frankosen-Holz/ Blatter-Holz/ Bocken-Holz/ Heilig-Holz/ GAYAC, BOIS SAINT.

Lignum Quajacum & lignum sanctum à multis pro uno eodemque habentur, ab authore vero TERENCE IN NOTIS ad HERNANDEZ, aliisque distinguuntur, promiscue interim usurpari possunt.

Quajacum sive lignum Sanctum Parck. Guajacum foliis Lentisci C. B. Pin. 448. Guajacan Clus. Exot. 312. Guajacan Hern. 63.

In Hispaniola, Jamaica aliisque Americæ locis ac insulis crescit.

Conducit in morbis fere omnibus ex causa acida, pituitosa, frigida, natis. Sanguinem purificat, putredinique resistit & serum corrigit. Usurpatur in arthritide, podagra, rheumatismo atque dolore ischiadico, in asthma, tussi, imo ipsa Phthisi à quibusdam laudatur. Sunt qui peculiariter in vertigine & Epilepsia deprædicant; ad odontalgiam decoquitur & in ore detinetur. Cum antidotum verum & specificum Luis Venereæ habeatur, exinde paratur decoctum cum aqua, quod, ex mente NICOLAI MONARDIS Medici Hispani, ad plures septimanas cum tenui victu usurpatum luem radicis extirpat. Sæpiissime miscetur cum radice Chinæ, ligno Sassafras &c. unde emergit sic dictum *decoctum lignorum*, der Holz-Frank/ Tisane sudorifique, quod eodem modo usurpatur. Vocatur hinc cura die Holz-Cur.

IN OFFICINIS PRÆPARATA PROSTANT

Spiritus Ligni Quajaci, Frankosen-Holz-Spiritus / Esprit de bois de Gayac, in quo acidum prædominatur, sudorem atque urinam ciet. Dosis est ad guttas 25. 40. 60. & ultra.

Oleum ligni Quajaci, Frankosen-Holz-Öel / Huile de Gajac, quod vel absque rectificatione asservatur, vel rectificatur supra arenam, cineres aut ossa calcinata, per os vix assumitur ob ingratum & foetidum saporem. Commodissime ad usus externos ac felicissime ad ulcerum omne genus usurpatur, nominatim venereorum, ad vul-

nerum mundificationem, fungosarum carniū consumptionem, ut & ossium exsquamationem atque cariem adhibetur. Ad dentes quoque dolentes optimo cum successu applicatur, particulis enim oleosis aëri exitus præcluditur, particulis vero salinis acribus serum stagnans corrigitur, fluxileque redditur. Tophis venereis illinitur, ad passionem quoque hysterica, vermes necandos & foetum mortuum atque secundinas pellendas commendatur.

Referendæ huc sunt *species pro decocto Lignorum*, *Species zum Holz. Franc.* / *Poudre pour la tisanne sudorifique*, in affectibus catharrhalibus, scabie, morbis venereis &c. diversa dosi pro intentione & scopo curantis in aqua decoquuntur.

Essentia Lignorum, *Holz. Essenz* / *Essence de Bois*. In massa sanguinea depuranda & sudore movendo laudatur, hinc in morbis venereis, scabie, affectibus catharrhalibus egregie conducit. Datur ad ℥j. ʒj. & ultra.

Essentia lignorum concentrata, concentrirte Holz. Essenz / *Essence de Bois concentrée*. Longe acrior, sed & penetrantior, absque tamen augmento motus & sanguinis evadit, & in prædictis morbis majori quoque cum successu ad guttas 30. 40. 60. & ultra porrigitur. Quod si hanc essentiam concentratam cum Tinctura antimonii concentrata jungas, habebis Medicamentum nobilissimum & efficacissimum.

LIGNUM ALOES.

Sub nomine Calambac transmittitur ex Tartariæ intimis oris & in regnum Sinæ transfertur. vid. du Vall. *Reise-Beschreibung* part. i. p. 507. Sunt arboris Chinensis Calambac interioris medullæ fragmenta lignosa, magnitudine varia, solida, densa, spadicea, striis aliquando nigricantibus & resinosis conspicua. Saporis subacris, amari, aromatici & pinguis, odoris dum accenditur vel incalescit fragrantis. Præstat si annosum, grave, resinosum, æquale est. Si odoris fragrantia adest à principio accensionis ad omnimodam consumptionem usque. Ex integra sæpe arbore, quæ quer-

CU

cu magnitudine non inferior est, vix ss . ligni laudabilioris eruitur, unde tam charum. Chinenfes maxime ejus odoratu delectantur, & quo gratior amicus, eo meliorem portionem ipsi offerunt.

Lignum aloës grave, totum resinofum & prunis injectum, suaviffimum spirat odorem, nullo vel paucō relicto carbone.

Salia volatilia resinæ sociata adeo analoga sunt spiritibus nostris, ut inter analeptica & confortantia catholica habeatur, inprimis Cephalica, stomachica, cardiaca & Uterina. Hinc in Lypothymia, Syncope, singularem habet energiam, & tanquam specificum confortans jungitur appropriatis stomachicis & Uterinis. Ad fluorem album compescendum, & abortum præcavendum: sistit quoque Vomitus & singultus: curat incontinentiam Urinæ à spirituum defectu ortam: laudatur in Epilepsia, & necandis veribus. Datur in substantia \mathfrak{zj} . in decocto \mathfrak{zj} . sed decocta reddit nimis amaricantia. Extractum, *Paradiesholz = Extract/Extrait de bois d'Aloes*, & essentia facta cum —u vini, vel formicar. vel rorismar. vel Ceras. nigror. habetur optima.

Unà cum ambra hoc ligno aloes ad memoriam confortandam Professor quidam Leidenfis usus est cum successu.

\mathfrak{R} . Extr. lign. aloës \mathfrak{zj} margar. præpar. \mathfrak{zj} ambr. gryf. in ss cinam. solut. gr. vij. sacch. cand. \mathfrak{zj} . M. f. pulv. cui add. ss cardamom. gt. vij. ad \mathfrak{zj} . ex ∇ Cephalica usurpandus, in memoria confortanda, in virium lapsu, syncope cardiaca.

\mathfrak{R} . Lign. aloës \mathfrak{ss} . theriac. \mathfrak{zj} . ss Mac. gt. ij. Laud. op. gr. j. M. f. bolus ad compescendum & sistendum vomitum.

\mathfrak{R} . Lign. aloës gr. vij. Corall. rubr. succin. præpar. Mastich. ana \mathfrak{ss} . f. pulv. adstringens & confortans uterum, in fluore albo, adde ad singulas doses ambrae gr. j. valet quoque in incontinentia Urinæ.

XYLO ALOES, ξυλοαλον, vel ab odore, vel ab amaritie dictum, LIGNUM CALAMBA, LIGNUM CALAMBAC, à quibusdam etiam AGALLOCHUM, ἀγάλλοχον ab ἀγάλλομαι ornor, vocatum, Aloes-Holz / Paradies-Holz / quoniam quidam credebat in Paradiso solummodo nasci, & exinde cum fluviiis effluentibus advehi. BOIS D'ALOES, BOIS DE CALAMBOUC, BOIS DE TAMBAC.

Sicuti in aliis exoticis, ita quoque in hoc Ligno adhuc hallucinamur. Quidam unum idemque faciunt Lignum Aloes & Agallochum: Author autem cum aliis distinguit. Quidam hoc lignum in Malacca, Cambaya, Sumatra, Ceylon &c. nasci contendunt, alii in China provenire putant.

Conferatur Kircherus in China illustrata de Ligno Aquilino & Calamba.

Cum tam diversi adhuc sint authores, expectabimus decisionem.

Virtutibus nihil addimus, quam quod hoc lignum in Vino infusum cito inebriet. Obviam ire & ebrietatem arcere atque profligare possumus aceto aliisque acidis.

AGALLOCHUM.

Sunt arboris Calambac affinis, fragmenta lignosa, solida, ex fusco rufescentia, striis interdum albicantibus notata, bituminosa, ligno aloës laxiora & crassiora, saporis amaricantis pinguis, odoris debilioris, earundem cum ligno aloës virtutum, sed gradu longe debiliori.

[De Agallochi generibus & arbore excœcante conf. Georg. Everhard. Rumphius C. N. C. Dec. II. ann. 3. obs. 22. p. 74.]

SANTALUM CITRINUM ET ALBUM.

Citrinum est arboris Timorensis bacciferæ Sercanda dictæ

etæ cor seu medulla, densa, solida, colore citrino ab integumentis suis cortice & ligno separato, saporis aromatici amari, odoris fragrantis & grati.

Album est ejusdem arboris, [à multis affirmatur ex una eademque arbore produci, scribit tamen Garcias ab Horto arom. hist. l. 1. c. 17. p. m. 88. tantam esse inter utriusque santali arbores affinitatem, ut pallidum à candido discerni non possit, nisi forte ab ipsis incolis, qui eas cæsas mercatoribus vendunt] lignum solidum & ponderosum pallidum, non prostat amplius apud nos [apud eund. Garc. l. c. p. 90. in notis: dubitandum an legitimum santalum pallidum habeamus, quandoquidem ejus pretium majus sit apud Indos quam Lusitanos. Fieri igitur poterit ut aliquod aliud odoratum lignum nobis pro legitimo santalo obtrudatur. Certe candidum nostrum plane inodorum] Indi scriinia ex eo conficiunt, est enim solidius.

Indi unguento santalino sese tingunt præcipue puellæ, santalum citrinum contusum inque subtilissimum pulverem redactum, in oleo recenti insolant, leniterque inspissant, non debet nimis incalescere, alias rancescit, & ex curcumæ radice colorem addunt, gratissimi hoc est odoris [Ad æstus corporis tollendos & odoris conciliandi causa. Est enim regio admodum calida, & incolæ plurimum odoribus delectantur Gracias l. c.]

Citrinum potentius est & odoratius albo, Æia sua volatilia tenuia & blanda multis terreis & paucæ resinæ habet inclusa, hinc præter vim incidentem & Urinam moventem, obtinet quoque virtutem adstringentem & roborantem. Et propterea tam inter deobstruentia & antihydrica refertur, quam etiam inter adstringentia, quæ conveniunt in nimio sudore, præcipue febrium sudatoriarum, compe-scendo. Hujus æquivalens est lignum rhodium, stimulator corticibus Citri.

Datur ejus decoctum, rarissime substantia, valet quoque essentia cum ω u vini, melius cum ω u Cortic. Citri facta.

\mathcal{R} . Rad. helem \mathfrak{z} j. Cichor. \mathfrak{z} ij. polypod. $\mathfrak{z}\beta$. fantal. citr. \mathfrak{z} vj. herb. capill. ling. cerv. ana Mj. bacc. Junip. \mathfrak{z} j. coq. ex ∇ & vino. f. apoz. contra obstructions viscerum.

\mathcal{R} . Lign. fantal. \mathfrak{z} ij. Cort. Citr. intern. \mathfrak{z} j. lign. aloës $\mathfrak{z}\beta$. M. f. decoct. ad nimios sudores nocturnos & febres sudatorias.

LI.

SANDALUM, SANTALUS, SANDALUS, Sandel-Holz /
SANDAL, SANTAL.

TRIPLEX SANDALUM; CITRINUM, Selber wohlriechender
Sandel / SANTAL CITRIN OU JAUNE, SANTALUM ALBUM,
weißer Sandel / SANTAL BLANC. &

SANTALUM RUBRUM, de quo infra.

Juxta DALE Santalum album & Citrinum ex una eademque arbore producitur, cujus pars corticalis Santalum album dicitur, medullaris Citrinum, ut à multis affirmatur.

Inter remedia cardiaca atque Hepatica recensentur. In Lypothymia, palpitatione cordis, obstructione hepatis commendantur, commendantur quoque in arthritide & affectibus cutis.

Externe in catarrhis, Cephalalgia, vomitu, intemperie, uti loquuntur, hepatis calida usurpantur. Ingrediuntur cucuphas, nodulos odoratos & Epithemata, præsertim Hepatica. Non adeo multum à Medicis præscribuntur. Interim ex iis prostant

Species diatrion Santalorum, dreyerley Sandel, Pulver / Poudre de Santaux. Medicamentum constituunt hepaticum, ictericum, cardiacum atque stomachicum. Dosis a $\mathfrak{z}\beta$, ad \mathfrak{z} ij.

Unguentum Santalinum, Sandel-Salb / Onguent de Bois de Sandal. Hepati & Lieni dicatum, virtute adstrictoria etiam quandantenus gaudet.

LI.

LIGNUM RHODIUM.

Est Aspalathi albicantis torulo citreo C. B. P. seu Cytisi potius, Cytisi incani filiquis falcatis C. B. P. ab inventore Bartholomæo Marantha, Cytisus Maranthæ dicti radix lignosa, ex flavo pallida, densa, solida, venulis pinguibus subinde interdistincta, saporis amari, odoris fragrantis gravis & rosei.

Fructus est filiquosus, papilionaceus, nascitur in insulis Canariensibus.

In radicibus sunt conspicui nodi pingues, in quibus maxima vis, Θ ia sunt temperatiora quam in santalo, in pellenda Urina paulo potentius est santalo. In oleo ejus destillato blanda vis cardiaca est, nonnihil anodyna. Externe convenit cum rosis in mitigando dolore capitis.

Lignum datur in infuso. \circ destillatum Rosenholz-Dehl/ huile de Bois de Roses [odoramentis sacrum] additur pulveribus dentifriciis & sternutatoriis & Balsamis cardiacis.

\mathcal{R} . Pumic. calcin. \mathfrak{zj} . oss. sæpiæ \mathfrak{zij} . Corall. alb. 3β . \circ ligni rhod. gt. \mathfrak{iiij} . Θ *ci \mathfrak{ij} . \bigcirc ust. $\mathfrak{3\beta}$. pro pulvere dentifricio; vel conserv. cochl. q. s. pro antiscorbutico.

\mathcal{R} . Lign. rhod. santal. Citr. ana \mathfrak{zj} . bacc. Junip. \mathfrak{zij} . liquirit. \mathfrak{ziii} . f. infusum vel leve decoctum ex ∇ gramin. ad promovendas Urinas.

\mathcal{R} . Lign. rhod. \mathfrak{iiij} . ∇ rosar. \mathfrak{zj} . beton. \mathfrak{zij} . + rosac. 3β . f. Epithem. ad mitigandos dolores capitis præcipue febriles, addi potest sacch. $\mathfrak{5ni}$ 3β . it. santal. rubr.

LIGNA

LIGNUM RHODIUM ab Insula Rhodo, LIGNUM ROSACEUM ab odore, LIGNUM CYPRIUM, quoniam ex Cypro etiam obtinetur, Rhodoxylon, Rosen-Holz/ Rhodiser-Holz/ BOIS DE RHODE, BOIS DE ROSE, BOIS DE CHYPRE, Nec

Nec circa hoc Lignum authores hodiernum conveniunt. Authori nostro refragatur HOFFMANNUS, quoniam Cytisus non fundit resinam ut Rhodium, nec alium præter herbaceum obtinet odorem.

LIGNA CONSTANTIA SALE BLANDO DIURETICO.

LIGNUM NEPHRITICUM.

Lignum peregrinum aquam cœruleam reddens C. B. P. Est arboris Mexicanæ Coarthi vel Coalti dictæ, lignum ex flavo pallidum, durum, cœruleo tingens colore, includens sub cortice nigricante medullam fuscam, solidam, duram, gravem, saporis subacris, amari, aromatici, vim incidentem in lingua relinquens.

Nascitur in regno Mexicano pyri vel pruni magnitudine, foliis rutæ alatin dispositis, floribus papilionaceis, quos sequuntur siliquæ retiformes includentes semen. Arbor refertur ad Cytisi genera, unde & vocatur Cytisus Mexicanus.

Robert Boyle tract. d. coloribus. [Part. 3. exp. x. p. m. 78. ad. 82. it. pag. 124.] multa cum ipso fecit experimenta.

▽ hujus ligni 10. vel 12. ℥ post infusionem colorem diversissimum demum acquirit, imo uni uncia ter vel quater nova potest affundi ▽ & tingitur. Color vero debet ad radios solares spectari, ubi erit elegantissimus. Infusum ex vino Urinam & alvum movet, ex ▽ vero sola Urinam.

Agyrtæ adscribunt ei vim alexipharmacam, tincturam enim ejus præbent gallinæ, cui prius dederant arsenicum, & servantur.

Ob sal blandum alcalicum, quod ligni tinctura coerulea à quovis acido destructibilis probat, sed restituitur affuso ☉ Pri per deliquium, diureticis, antinephriticis, & antihydropicis annumeratur.

Datur decoctum, infusum seu tinctura cum vehiculo conveniente, scil. liquore betulae, ▽ graminis &c.

℞. Ras. lign. Nephrit. ℥j. affund. ▽ gramin. vel al. destillat. ℔ss. f. infusum ad nephritidem.

℞. Rasur. lign. nephrit. ℥iiij. liquor. betulae ℔iij. Elæo-sacchar. citr. q. s. ad gratiam, contra dolorem nephriticum.

℞. Ras. lign. neph. cort. fraxin. ana ℥j. santal. Citr. ℥ss. infund. ▽ gramin. prius imprægnatæ Ee genist f infus. diureticum contra hydropem & obstructions viscerum.

[Nic. Monardes l. simpl ex India allator. ad renum vitia, Urinae difficultates ac arenulas pellendas usurpari in nova Hispania ait: quod confirmat Boile l. c. h. v. infusione ipsius in limpida facta contra renum calculos uti solent: & sane insignis quidam Medicus mihi familiariter notus, qui explorando isti morbo enixius incubuit, mihi asseverat, se infusionem ejusmodi comperisse unum ex efficacissimis remediis, quæ unquam adversus morbum istum terribilem propinavit.]

LIGNA

LIGNUM NEPHRITICUM, quibusdam SANTALUM CAERULEUM, Griech: Holz/ Bois NEPHRETIQUE,

Nec & hæc arbor, sive frutex omnibus modis ab authoribus describitur.

Lignum peregrinum aquam caeruleam reddens. C. B. Pin. 426. Lignum nephriticum caeruleo & flavo tingens. I. B. I. 492. Coatli seu aqueus serpens Hern. 119.

Lignum hoc aquam, cui infunditur, flavo, & si diutius relinquitur, croceo colore tingit, si aqua scilicet colorata phiala vitrea excepta inter lucem & oculum collocata per radios refractos spectetur. At vero, si oculi situs sit inter phialam & lucem, & aqua per radios reflexos spectetur, cærulea apparet tinctura. Pauca grana magnam aquæ copiam tingunt.

Lignum hoc assulatim, ut MONARDES ait, & minutim concisum in optima & limpidissima aqua fontana maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus fuerit absorpta. Hac aqua assidue utuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus sine ulla humorum commotione, neque opus est alia victus ratione quam temperata. Aquæ sapor non magis immutatur ligni injectione, quam si pura esset, & nihil in ea maceratum, Deobstruit jecur & Lienem.

Infusum ex vino datur solummodo ad ℥j. ℥ij.

LIGNA AMARISSIMA ET SALIBUS FIXIS CONSTANTIA.

LIGNUM COLUBRINUM.

Quod prostat in officinis potius est radix quam truncus. Est arboris Timorensis radix lignosa, bracchium crassa, sub cortice ex fusco ferrugineo subinde maculis cinereis notato, includens materiam solidam, densam ponderosam, saporis amarissimi, odoris nullius.

Ob insignem sui amaritiam, symbolizat cum gentiana, Centaurio minore, aliisque amaris.

Fructus hujus arboris sunt nuces Vomicae majores, aliae enim Timorenses, aliae Zeilonenses minores, sunt venenum, pulpæ luridæ ingratissimæ sunt inclusæ.

Arbor est pomiferis affinis, fructu rotundo in cortice tenui duriusculo includente mucaginem, cui nuclei compressi, orbiculati involuti sunt 3. vel 4. sibi invicem incumbentes.

bentes. Hujus ligni usus non est, nisi annosioris, recens enim primo anno maniam, tormina, hinc Vomitum & tandem convulsiones excitat. Laudatur quidem in febribus intermittentibus, quartanis, nec non vermibus necandis, sed deleteria gaudet facultate.

Datur in infuso ex vino absynth. f. ex ∇ Card. Bened. imprægnata Θ e Card. Ben. corrigitur amarities pipere longo.

\mathcal{R} . Lign. Colubrin. $\mathfrak{z}\beta$. infunde in vin. abs. per noct. f. haustus contra quartanam.

\mathcal{R} . Lign. colubrin. $\mathfrak{z}\beta$. summ. absynth p. j. piper. long. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ∇ æ Cent. min. imprægnatæ Θ e absynth. $\mathfrak{lb}\mathfrak{j}$. f. infus. contra febres.

\mathcal{R} . Lign. colubrin. sem. cinæ ana $\mathfrak{z}\beta$. summ. absynth. p. j. Θ abs. $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$. f. infus. ex ∇ gramin. cum qua ∇ singul. dos. cap. \mathfrak{q} dulc. contra vermes.

[Hic non abs re iudicium Casp. Hofmanni de Med. offic. l. 2. c. 162. p. m. 402. subjungendum videtur, ubi de Nuce Vomica agit: In hac rerum incertitudine, cum certo utentis periculo, quid faciendum est ei, qui facultates rimatur? quam incerta sunt ista, tam certum est, quod jam dicam: Utrumque est venenum, si enim semel bene cessit, non ob id tutum est experimentum. Ut in Politicis qui semel malus semper præsumitur talis, ita in Medicina non utar incertis, cum certa præ manu habeo. & ibid. lib. 2. c. 4. p. m. 89. ubi de Doronico disquirat an venenatam qualitatem habeat, concludit tandem, qua de re dubitas, ne feceris.]

LIGNA

LIGNUM SERPENTARIUM, Schlangen-Holz / Bois couleuré, à cortice maculato.

Laudatur quoque adversus venenatos morsus *serpentum aliorumque animalium*. Cum tutiora prostant, raro, imo vix unquam a Medicis præscribitur, De Nuce Vomica infra.

Hujus Ligni usum animalculum Quil, aut Quirpele Lusitanico idiomate appellatum, serpentibus infensum & continuo cum iis pugnans, adinvenisse dicitur, dum esu hujus ligni se præserval & curat.

LIGNA TERREIS CONSTANTIA.

SANTALUM RUBRUM.

Est arboris filiquosæ Indiæ orientalis cor seu medulla, ab integumentis exterioribus cortice & ligno separata, folida, densa, ponderosa, coloris ex fusco rubicundi, saporis & odoris nullius evidentis.

Arbor est filiquosa, floribus papilionaceis affinis.

Ob vim terream & adstrictoriam, commendatur ad nimium sudorem compescendum & sanguinis æstum. Forestus laudat in phthisi tanquam corrigens & temperans salis lympham. Externe recipitur ad Epithemata pro capitis dolore & ardore, ubi sudor in capite simul erumpit.

Datur frequentius decoctum, rarius in substantia.

℞. Crem. Fri ʒʒ. ℞r. Olat. ʒj. santal. rubr. gr. vj. — Oli irroretur f. pulvis, ad roborandas Ventriculi fibras, dicitur bibitorius.

[Coincidit cum pulvere Hepatico rubro Dresd. quem describit Frid. Hoffmann. Th. Pharm. p. m. 98.]

℞. Decoct. santal. rubr. ℥ij. succ. Citr. rec. ʒʒ. syr. ros. rubr. ʒij. ▽ papav. ℥ʒ. Cinam. ʒj. f. Julapium refrigerans in febrium æstu, maxime in ephemera.

℞. Santal. rubr. ʒʒ. Citr. ʒij. assafr. ʒiʒ. coq. ex ▽ hordei, f. apoz. addi possunt passul. min. ʒij. ad temperandam acriorem lympham in phthisi.

℞. Santal.

℞. Santal. rubr. ʒj. flor. rosar. r. Mj. + rosac. q. s. M.
 f. Epith. ad capitis dolores febriles, add. in nimio æstu sacch.
 ʒni. ʒj. & ubi febris maligna, camphor. ʒj.

VIS-

SANTALUM RUBRUM, Kother-Sandel / Kothes Sandel : Holz / SANTAL ROUGE.

Inferius censetur reliquis Santali speciebus ; adhibetur ut plurimum ad tingenda medicamenta varia. Sicuti etiam Tincto-ribus quam maxime inservit, quem in finem in pulverem est redigendum. Sed hic opus, hic labor. Optime in nostro Argentorato id præstatur, ubi in peculiari molendino in pulverem redigitur accedente quodam artificio. Sed arcanum revelare nefas esset.

PROSTAT IN OFFICINIS

Emplastrum incognitum sive *Santalinum*, Ungenandt oder Sandel. Pflaster / *Emplatre Santalin* ou *inconnu*. Hepar roborare, ejus obstructions reserare, infarctosque humores peccantes resolvere, & sanguinem mundificare quidem dicitur : an autem tantos effectus edat, experientia dubium reddit.

VISCUS QUERNUS.

Sunt arbusculorum quercubus innatorum ramuli lignosi, digiti crassitie, sub cortice tenui herbaceo aut flavescente includentes materiam lignosam pallide rubentem, odoris & saporis nullius.

Viscus hic est planta parasitica, nullum succum ex terra haurit, sed ex aliis corporibus. Viscus corylinus est optimus.

Ratione terrearum particularum acida absorbentium, & nimium sanguinis motum sistentium convenit in hæmorrhoidum, alvi & mensium fluxu, ut & inflammationibus

internis. Forſan ob eandem rationem commendatur in Epilepfia & Convulſionibus. Hujus vis ab autoribus contra incantationes decantata prorfus imaginaria videtur.

N quoque poſt uſum viſci contra Epilepfiam utendum eſſe convenientibus purgantibus, ne acida in ſua quaſi minera à viſco nimis fixata, febrem excitent.

℞. Viſc. Quern. ungu. alc. ana 3℔. Cran. human. ʒj. Ө volat. C. C. gr. xv. M. f. p. add. Caſtor. ʒ℔. balſ. Copaiv. q. ſ. f. pil. contra Epilepfiam, & ſuperbibe cochl. j. ∇æ Epilepticæ, vel flor. til. vel lil. convall.

℞. Viſc. quern. 3j. cape ex ovo ſorbili contra nimium menſium fluxum.

℞. Viſc. quern. 3j borrac. calc. ʒ℔. f. pulv. exhibendus cum vino ſaſſafr. in fluore albo.

℞. Viſc. quern. 3j. ſucc. expr. bugl. q. ſ. f. bol. in Dyſenteria ex mente Willifii.

LIGNA

Ἰξός, dicitur etiam VISCUM, LIGNUM SANCTÆ CRUCIS Mistel/ Miſpel/ Eichen-Mistel/ GUI DE CHENE.

Eſt planta flore monopetalo, pelviſiformi, plerumque quadripartito, verrucis conſperſo, tanquam apicibus pulverem effudentibus. Embryones autem à floribus ſeparati naſcuntur; tener ſcilicet fructus quatuor foliolis ſtipari ſolet, abitque deinde in baccam ſubrotundam glutinis plenam, ſemineque ſœtam compreſſo & cordiformi.

Viſcum baccis albis C. B. Pin. 423. Viſcum Dod. Pempt 826.

De generatione hujus viſci mire circumferuntur ſententiæ, non tantum vulgi, ſed & eruditorum. Quidam cum THEOPHRASTO & PLINIO eam ſovent opinionem, ac ſi naſceretur tantummodo ex ſemine baccarum per alvos turdorum palumbarumque & cæterarum id genus avium, poſtquam acinorum pulpam concoxere, reddito; unde & cum PLAUTO dicunt de turdo, quod ipſi ſibi avis mortem creet & Turdus exitium ſibi cacet, ob glutem quod ex eo fit,

fit, quo postea aves capiuntur. Huic sententiæ autem uterque BAUHINUS & SCALIGER se opponunt acriter, qui viscum ex arboribus quasi cornua ex ossibus animalium educi persuadere volunt. Acu rem tetigisse videtur RUD. JAC. CAMERARIUS in EPH. NAT. CUR. demonstrans, baccas visci deferri posse ad ramos arborum tam delapsu raptuque ventorum, quam ab avibus non solum devoratas & redditas per alvum, sed rostro delatas, nec sphaerica sua figura à ramulis rotundis tam facile decidere, quam ruptas vel sponte vel ab avibus, suo glutine adhærere.

Non autem quercui tantummodo, sed & aliis arboribus, abieti Tiliæ, pyro, pomo, Corylo &c. adhæret. Pro scopo epileptico, ipsi visco querno Corylinum vel Tiliaceum quidam præferunt.

Vix compositio epileptica invenitur, quæ non pro ingrediente agnoscat viscum. Externe quoque contra epilepsiam & convulsiones amuleti loco appendunt. Commendatur porro ad vermes ejiciendos, quartanam, arthritidem, vertiginem, apoplexiam, & nescio quos morbos. Sed sæpius hæ assignatæ virtutes usurpantem eludunt.

Paratur è visco ex baccis, quæ interne nunquam dantur, ob vim purgantem nimis violentam & inflammationes excitantem ex mente veterum, præsertim in aqua decoctis, Viscus aucuparius, seu gluten atque extractum viscosum, der Vogel-Leim/ quod nonnulli ad emplastra adhibent: alias ad capiendas aves solet usurpari.

LIGNA SALE PURGANTE TAM FIXO QUAM VOLATILI CONSTANTIA.

PANAVA SEU LIGNUM MOLUCCENSE.

Panava [seu Pavana, utrumque legitur apud scriptores] est Ricini arboris indicæ lignum spongiosum, leve, raram, pallidum, tenui cortice cinereo obductum, saporis acris mordacis & caustici, odoris nauseosi.

Arbor est tricoccus, floribus muscosis, prunorum magnitudine.

Recens

Recens & adhuc vegetum adeo potens est, ut serum & aquas tam per Vomitum quam per alvum expellat, relinquens ob intensam sui acredinem in ano inflammationem. Siccum vero alvum blandius subducit, & si in parciore dosi exhibeatur sudorem elicit, in hydrope, leucophlegmatia & pluribus Morbis chronicis specificum est.

Pro scopo purgandi datur recens in substantia ℥j. ad 3℔. annosum vero datur ad 3j. In infuso & decocto ad 3℔. Jungitur variis purgantibus, stimulatur optime granis Tilli, corrigitur Zinzibere. Temperatur vero mellitis, saccharatis vel passulis. Pro sudoribus movendis datur à 3℔. ad ℥j. In infuso vero & decocto ad 3ij. 3iij. Additur egregie decoctis sudoriferis pro stimulo.

℞. Panav. rec. ℥j. gr. till. gr. j. Zin. gr. vij. sacch. cand. 3℔. M. f. p. loco sacchari cape mellis vel conserv. ros. q. s. f. bolus contra hydropem.

℞. Ras. lign. guajac. 3iij. sassaf. 3j. lign. Panav. 3℔. passul. min. 3ij. coq. in s. q. ▽ f. decoctum in obstructione chronica.

In passione hysterica sumunt Indi radic. Curcumæ 3j. terunt super lapide add. Panavæ 3℔. f. pulv. pro iij. dosibus ex infuso Thee vel lavendulæ.

Grana Tilli sunt fructus hujus arboris à Garcia ab Horto sunt descripta, sed non scivit hanc arborem ferre grana Tilli. vid. infra.

CAPUT

PAVANA sive LIGNUM MOLUCCENSE ab Insulis Moluccis, in quibus reperitur, BOIS DE MOLUQUES.

Ricinus Indicus arborescens, grana Tiglia dictus offic. an Lignum Moluccense Lugd. 1864. Pavana Incolis Acoſtæ Clus. Exot. 277. Pinus Indica Nucleo purgante C. B. Pin. 492.

Seritur ibi coliturque in hortis: tantum æstimatur ab incolis, ut peregrinos ne quidem ad ejus conspectum admittant. Dicitur esse

esse arbor domestica Mali Cotonei magnitudine, cujus folia Malvæ vulgaris foliis sunt similia, fructus vero avellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante.

Laudatur quoque hoc lignum ad quævis venena, tum interne, tum externe. Inspergitur quoque moribus animalium venenatorum.

Si Hypercatharsis superveniat, suadetur decoctum hordei, bibendum, aut avicula comedenda.

CAPUT QUARTUM.

DE FUNGIS.

ONnes fungi seu spongiæ venenatæ censentur, quoniam in earum substantiam densam & quasi coriaceam lymphæ stomachalis digestrix agere nequit. *Hoc authoris de fungis assertum patitur exceptionem maximam, ob plures fungorum esculentorum et quidem citra noxam assumptorum species. Hoc certum, quod nimia in quantitate assumpti, ut reliqui cibi noceant. Interim plures sunt venenati.*

BOLETUS CERVI.

Est substantia fungosa, sub terra nascens, tuberosa, rotunda, inæqualis, in magnitudinem Nucis Moschatæ crescens, includens inter corticem coriaceum callosum crassiusculum, ex cinereo nigricantem, in superficie granulatum, medullam raram, fungosam, ex nigro fuliginosam, subinde purpurascentem, & per maturitatem tandem abeuntem in pulverem, saporis & odoris dum recens gravis muriatici spermatici, dum sicci nullius evidentis.

Hh

Recentissimus

Recentissimus nondum ficcus cujus substantia interna adhuc mollis & mucaginosa est, scatet ☉e volatili, ob odorem spermaticum specificum est aphrodisiacum augens genituram & orgasmum in ea excitans. Datur substantia interior cortice rejecto ʒj. Ex vin. Malv. ▽. Magnanimitatis f. ♀u formicar. in infuso ad ʒj.

℞. Bolet. cerv. rec. ʒj. succolad. q. v. dissolve in lacte calido ad languorem ♀eum.

℞. Bolet. cervin. ʒj. Elect. diasatyr. ʒij. ambr. gryf. gr. vij. fyr. gran. cherm. q. f. f. Elect. aphrodisiacum.

Pulvis in boleto contentus Balsamo Apoplectico nigrum suum conciliat colorem.

FUN.

BOLETUS CERVINUS, CERVİ BOLETUS, FUNGUS CERVINUS, TUBERA CERVINA, Hirschbrunst / Hirschschwamm.

Tubera Cervina C. B. Pin. 376. Tuberum genus quibusdam Cervi Boletus. 3 835.

Sub terra nasci plures cum Matthiolo autumant, ast DILLENIUS, in Catalogo plantarum circa Gissam nascentium, ea tubera supra terram gigni observavit. Vidimus, inquit, ea plerumque ad sylvarum vias locis apricis ab Augusti initio ad Octobrem usque, qui hac in re assentitur SCHWENCKFELD, asserenti in altissimis montibus sub musco terra quasi cortice incluso, nasci.

Sunt, qui ex spermate Cervi profuso oriri putant, idque probare imprimis conantur, quoniam in iis quandoque reperiantur locis, ubi cervi libidinem exercent, & quod boleti tales quandoque mentulam virilem æmulentur, ast teste CORDO aliisque, in talibus locis inveniuntur, ad quæ ne Damæ, multo minus Cervi pervenire possunt. Forsan Boletus Cervinus dicitur, quoniam eidem, dum recens est, gravem odorem spiranti, Cervi inhiant. Vis aphrodisiaca præsertim Boleti recentis nulla alia est, quam reliquorum fungorum esculentorum.

Commen-

Commendatur hic fungus porro tanquam remedium diaphoreticum, & alexipharmacum in morbis etiam pestilentialibus. Partum accelerare, lac quoque provocare & augere fertur. Externe ad Hæmorrhagias compescendas laudatur, præsertim fuligo. Abutuntur hoc fungo ad philra. Magnam possent demereri gratiam Medici, si verum esset, quod ex DORSTHENIO scribit J. BAUHINUS. Si mulier accipiat Cervi boletum ad magnitudinem unius pisi, & dimidiam partem manducet & alia parte umbilicum oblinat, statim absque dolore parituram, si vero imprudenter gravida utantur, magnum illis malum inde oriri posse.

FUNGUS TERREIS SUBAUSTERIS CONSTANS.

AURICULA JUDÆ SEU FUNGUS SAMBUCI.

Est substantia fungosa, nascens ex imo trunco sambuci veteris, spongiosa, levis, coriacea, membranacea, auriculæ instar, subtus incana & cinerea, supra nigricans, saporis terrei & aquei insipidi, odoris nullius.

Ingreditur gargarismata & epithemata tanquam potens adstringens & refrigerans, contra inflammationes faucium, anginam, Aphthas, ut & Erysipelas.

℞. Auric. Jud. q. v. infunde ∇æ dest. sambuc. f. infusum ad inflammationes oculorum.

℞. Auricul. jud. ʒij. hord. mund. glycyrrh. ana ʒß. flor. malv. arbor. p. ij. coq. ex aqua plantag. ℞. Colatur. ℥j. add. lap. prunell. ʒj. syr. violar. ʒj. f. gargarism. ad inflammationes faucium.

AURIS JUDÆ. Ita dicitur, quod plexu multiplici plicisque Auriculam hominis quali referat. Auricula Judæ autem, quia sunt, qui credunt Judam in hac arbore se suspendisse. *Holderschwâmlein / Hollunderschwâmlein / OREILLE DE JUDAS.*

Cum truncis Sambucorum annosarum adnascatur, à **TOURNEFORTIO** ad Agaricum refertur. Est itaque Agaricus auriculæ forma *Tourn. 1. R. H. cl. 17. S. 1. g. 5.* Fungus membranaceus auriculam referens siye Sambucinus *C. B. Pin. 372. l.* Genus perniciosorum fungorum *Clus. Hist. ECLXXVI.* Fungus auriculæ Judæ coloris ex cineraceo nigricantis perniciosus in Sambuci caudice nascens *I. B. 3. 840.*

In aqua mollescit & spongiæ instar tumet. Ex vino decocti contra anasarcam à quibusdam suadetur, quamvis ejus usus internus minime tutus. Locis à podagra dolentibus quoque maceratus prius imponitur.

FUNGUS PURGANS.

AGARICUS.

Therebinthina est succus collectus Laricum & abietum juniorum. Agaricus nascitur in laricibus, & si crescit in his arboribus, tunc therebinthinam non amplius reddunt. Nascitur ex trunco laricis, rarius in ramis invenitur. Est ex crescentia fungosa ex rotundo angulosa, inæqualis, pugni magnitudine, quandoque major, candidissima, levissima, friabilis, paucis fibris intertexta, ex cortice calloso cinereo subrufo, cui inclusa exempta. Saporis primum subdulcis, mox amari acris & nauseosi, cum levi quadam adstrictione.

Resinosus adhuc melior est albissimo & levissimo, & purgans magis volatile quam fixum resinæ, per ω vini extrahendæ sociatum in levi farinacea sua terra fovet. Immersus in acido effervesceat, & in terram Cretaceam abit, ustulatus Θ e purgante orbatur, & in inertem terram mutatur.

Bilem

Bilem & serum viscosius per alvum, interdum & Vomitus educit, & in specie tussi & asthmate laborantibus conducit.

Ejus vis purgans tardior stimulatur diagrydio, additur etiam ꝑ dulc. Ob levem sui substantiam ubique supernatantem & è Ventriculo facile ad fauces regurgitantem & nauseam causantem, sub forma pulveris vel haustus non exhibetur, sed potius sub forma trochiscorum, vel pilulari. Ejus usus in substantia suspectus, tutior in infuso vel decocto 3j.

Datur trochiscatus ad 3ß. in Extr. ʒj. ut & resina ad gr. xv. Corrigitur vis tormentosa Zinzibere ʒo caryoph. & maccis. Specificatur variis Morbo appropriatis.

℞. Agar. troch. ʒj. diagr. gr. v. al succotr. ʒß. ʒo cinam. gt. j. Elix. propr. q. s. f. pil. purgantes.

℞. Agaric. troch. 3ß. Resin. Jal. gr. v. ꝑ dulc. gr. x. aloës succotr. gr. xv. ʒo d. succin. gt. ij. majoran. gt. j. Extr. Castor. q. s. f. pil. Catarrhales.

℞. Resin. agric. ʒß. ꝑ dulc. gr. vij. diagryd. gr. iij. M. f. pil. purgantes.

FUN-

ΑΓΑΡΙΚΟΝ dicitur ita ab Agaria seu Agria regione Sarmatarum, unde olim advehebatur. FUNGUS LARICIS, Agaric/ Lerchen schwamm / dicendum autem esset Larchenschwamm/ AGARIC.

Agaricus sive fungus Laricis C. B. Pin. 375. Agaricus Dod. Pempt. 486.

In Alpibus, montibus Tyrolensibus, aliisque Laricum est proventus.

Duplex est, mas & foemina; mas ut C Bauhinus ait, rotundus est & undique sui similis, foemina praefertur, quæ quidem rectas intus habet pectinum modo venas & quasi divisuras. Mas nigrior est & gravior, foemina albicantior & levior.

Hh 3

Notæ

Notæ bonitatis sequentibus continentur versiculis.

*Res frangi præsto pretiosus Agaricus esto,
Candidus & splendens, libramine leveque pendens,
vel*

*Qui fractu facilis, levis est & candidus, iste
Imprimis Medicis pretiosus Agaricus esto.*

In substantia ob summam levitatem vix datur, licet etiam Trochiscatus sit. In infusis vero, decoctis & nodulis sæpius præscribitur Agaricus mundatus & Trochiscatus ad zij. ʒß. & ultra, pro intentione Medici. Solet quoque in Clysteribus adhiberi, sed linteo debet includi, tum ob levitatem, tum quæ ratio videtur esse præcipua, ut exprimi hoc modo possit, & virtus purgans tanto magis decocto communicari.

IN OFFICINIS PROSTANT

AGARICUS ALBUS MUNDATUS, Außerleßener gereinigter Lerchenschwamm / *Agaric choisi & mondé.*

Agaricus Trochiscatus sive Trochisci de Agarico, Lerchenschwamm Röchlein / *Agaric en Trochisques ou Trochisques d'Agaric*, in infusis ad zij. ʒß. præscribitur, æque ac Agaricus mundatus.

Extractum Agarici, Lerchenschwamm Extract / *Extrait d'Agaric*, à quo non multum differt resina ab authore allegata. Pro scopo purgante, & vermes necante adhibetur; datur ad ʒij usque, debiliter autem admodum agit.

Pilulæ de Agarico, Pillen von Lerchenschwamm / *Pilules d'Agaric*. In morbis ferosis caput aliasque partes afficientibus ad ʒj. ad ʒj. usque dantur.

Electuarium hieræ cum Agarico, de quo sub Aloe.

FUNGUS ORBICULARIS SEU BOVISTA.

Est substantia fungosa, innascens superficiei terræ, levis, aliquando pugnum magnitudine excedens, sub tenui coriaceo

coriaceo ex cinereo livido investimento includens medullam levem, raram, spongiosam, fuliginosam, lividam, quæ compressa pulverem profundit subtilissimum: odoris & saporis nullius evidentis nisi terrestris & paululum adstringentis.

Principia activa sunt particulæ terrestres. Intèrne ob metum veneni non exhibetur. Externe adstringit, incrassat, absorbet humida, unde in hæmorrhagiis, intertrigine, pustulis &c usurpatur.

℞. Terr. ♂l. dulc. phlegm. ♂li. bovis. ana q. s. f. massa in venis apertis, extemplo sistens fluxum sanguinis.

CAPUT

FUNGUS CHIRURGORUM, quoniam ipsis admodum familiaris, CREPITUS LUPÍ, LYCOPERDON à λύκος Lupos & πῆγμα, quia Sonum edit crepitui ventris respondentem cumque foetore conjunctum, Fungus ἰχθυήσας seu sanguinem sistens, Bosist/ (forte à crepitu boum ut Zornius censet) Bosist/ Bubenist/ Weiberist/ Wolffsfurk/ Vesse de Loup.

Cum hic fungus durus primum & carnosus postea rumpatur, & pulverem tenuissimum effundat, ad Lycoperdon refertur. Est itaque

Lycoperdon vulgare Tourn. I. R. H. cl. 17. S. I. g. 6. Fungus rotundus orbicularis C. B. Pin. 374. Fungus orbicularis Dod. descript. Pempt. 484. Fungus pulverulentus dictus crepitus Lupi I. B. 3. 832. In pascuis & pratis nascitur ut & Sylvis. Pernionibus conducit & hæmorrhoidibus nimis, pulvis oculis noxius &c.

CAPUT

CAPUT QUINTUM.
DE FRUCTIBUS ET
SEMINIBUS.

SALE VOLATILI OLEOSO
AROMATICO CONSTANTIA.

CARYOPHYLLI AROMATICI.
ANTHOPHYLLI.

Sunt arboris caryophylloferæ Tſinka dictæ fructus immaturi oblongi, instar clavi, angulosi, depressi, rugosi, ex rubigineo nigricantes, quatuor stellatim decussatis apiculis notati, cum medio capitello convexo & cavo, futuri floris rudimento.

Sunt fructus immaturi, Anthophylli vero maturi, caryophyllis crassiores & tumidiore, includentes sub cortice duriusculo semina oblonga, fusca, saporis & odoris ejusdem cum Caryophyllis. Solent in arbore relinquī, ut ex illis deciduis nova arbuscula iterum enascatur.

Fructus sunt primo viridis coloris, post rubescunt, ficcantur, & ad nos deferuntur.

Caryophylli præstantiores Anthophyllis, gaudent sale volatili admodum penetrante, subtili & oleoso, spiritibus nostris adeo analogo, ut vel hos torpentes, vel crassis viscidisve humoribus involutos exsuscitent, vel plane prostratos

stratos regenerent. Unde in Morbis soporosis, Apoplexia, Paralyfi, Catarrhis præ cæteris palmam merentur: eandem ob causam in primarum viarum muco incidendo, à quo vomitus aliaque mala oriuntur, nulli facile cedunt. Purgantibus tanquam corrigens junguntur, & singulare quid obtinent in frigore febrium intermittentium.

Dantur in substantia ad gr. vij. in infus. ad 3^{ss}. ʒ. dest. ad gt. j. ingreditur linimenta & unguenta ad Paralyfin, & Balsamum Apoplecticum.

℞. Caryoph. ʒss. Cinam. ʒj. Nuc. Mosch. gr. xv. M. f. p. pro. ij. dosibus.

℞. ʒ. Caryoph. organ. ana gt. iij. vel iiij. camphor. gr. v. excip. gossyp. & intrudatur cavo dentis s. excipiatur opio & f. turunda cavo dentis intrudenda.

Caryophyllis in Electuarium vel cum melle vel syrupo redactis, strictissime observata diæta Luem Veneream curavit D. Hermannus, sudorem valdopere movet.

AMO.

Hos fructus ferens arbor est flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, calyci insidentibus. Is autem deinde abit in fructum ovatum, umbilicatum, unicapsularem, semine foetum oblongo. Adde folia Lauro fere similia.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo C. B. Pin. 410. Caryophylli Camer. Epitom. 349. Caryophylli Indici J. B. I. 425. Caryophyllus Aromaticus Indiæ Orientalis fructu clavato monopyreno Pluck. Phyt. T. 155. Tshinka Pis. Mant. Arom. 177. Calafur Indorum, Carunfel Arabum. Caryophylli Aromatici Lugd. 1759.

Arbores Caryophylliferæ præcipue in insulis Moluccis inveniuntur. Merentur hic allegari verba Pisonis quæ ita habent. Ex insulis, quæ Moluccæ dicuntur, sub unius Reguli imperio sunt Ternate Mackian & Mutier, Quarta quæ Baciam alium sibi Regulum habet. Hæ quatuor olim abundare Caryophyllis solebant,

nunc penitus iis destituta culpa non novercantis naturæ, sed largissimæ & benignissimæ matri invidentis fortunæ. Reguli enim à Batavis nostris aliquot millenis Imperialibus excæcati, ex pacto omnes ibi Caryophylliferas arbores eradicarunt. Nostri vero, ut uni lucro satis student, sua interesse putant, ne tam nobile Aroma vilescat copia & fertilitate divina. Ita avaritia lege, modo, ratione carens, audet ipsi Naturæ auctori omnisque boni largitori tantum non suam exprobrare benignitatem & liberalitatem. Moluccensium interea cæteræ Tidor & Marigeron, quas sui juris Hispanus fecit more suo, Caryophylla satis abundanter ferunt. Quemadmodum & Amboina, quæ nostratium commerciis patet eorundem arboribus & arte confita est & Naturæ beneficio, frequentibus locis dotata. Hætenus PISO Medicus Amstelodamensis. Hodie tamen in insula Ternata adhuc coli POMET, TOURNEFORT, alique contendunt.

Describitur autem arbor Caryophyllifera varie. Imprimis dicitur esse ramosa in Lauri forma & foliis, sed angustioribus & copiosis, furculos varios de se spargens, quorum extremitatibus insident caryophyllorum initia, è quorum extremitate globosa flos erumpit. Prædicta nempe sphaerula nil aliud, nisi rudimentum floris est, ex quatuor foliis constans, quæ complicata firmissime hærent, quando immaturi hi fructus demetuntur. Alias si diutius inhæreant suis furculis, solent se expandere in quatuor foliola summe fragrantia, coloris cærulei, lineolis albis notata, stamina autem in meditullio contenta purpurei omnino sunt coloris. Calyx floris ex rotundo oblongus, semipollicem longus, in superna parte quadrifariam dissecatur.

Fructus jam immaturi vocantur CARYOPHYLLI AROMATICI, CARYOPHYLLA, CLAVI AROMATICI à figura, Nägelein/ Nägelein/ Gewürz. Nägelein/ GEROFLE, GIROFLE, CLOU DE GEROFLE. Collectio caryophyllorum fit à 15. Septembris ad Februarium usque, decerpuntur manu, aut ut plurimum arundinibus decutiuntur, mundato prius sub arbore solo. Caryophylli recentes rufi sunt & leviter nigricantes, postea per aliquot dies fumo exponuntur, tandem in sole extreme siccantur & in eam, qua apparent, verba sunt LANGII, reducuntur nigredinem. Qui in arbore remanent, maturando intumescunt & sub cortice duro fructum fusci coloris comprehendunt.

Vocantur

Vocantur ANTOPHYLLI, MATER FRUCTUUM, Mutter-
Nägelein/ MERES DE GEROFLE, OU CLOUS MATRICES. A
vulgaribus Caryophyllis non nisi perfectionis atque maturationis
tantum gradu differunt. Ex antophyllis sponte decidentibus ger-
minant furculi, qui octo vel novem annorum spatio excrescunt in
arbores satis proceras, quæ fructum feliciter ferunt.

Præcipuus usus caryophyllorum est culinaris ad condimenta &
embammata. Nec eorum tantum pulvis multis ferculis & intin-
ctibus admiscetur, sed & Gallinæ, Capones, Galli Indici, Bubulæ
linguæ, Vaccarum ubera, aliaque ejusmodi Caryophyllis transfixa
assantur, quin & iis fructus transfigi ad condituras, ut mala, pyra co-
tonea à mulierculis consueverunt. Usurpantur item ad obfactorio-
la. Vi quoque cardiaca & aphrodisiaca gaudere dicuntur, oris hali-
tum emendant et ad oculorum aciem contribuunt, nauseam tollunt
coctionemque promovent, flatu discutiunt, uteri vitiis etiam ob-
viam eunt, Antophylli præsertim. In dolore capitis pulvis aspergi-
tur. Sive suffimento, sive esu contra aerem pestilentem facere di-
cuntur. Tam calidæ & siccæ sunt naturæ, ut referentibus historicis,
in camera clausa asservati, apposito vase aqua aliove liquore pleno,
omnem humorem biduo imbibant & exhauriant.

OFFICINÆ NOBIS EXHIBENT

Oleum Caryophyllorum destillatum, Nägelein Oel/ huile de Gerofles,
quod præter supra allegatas virtutes denti cavo inditum odontalgiam
sedat. Contra rigores febrium ante paroxysmum aliquot guttæ
hujus olei assumuntur. Illinitur quoque regioni sterni. Ad gan-
grænâ & cariem quoque commendatur. Quod si destillatio fiat
per descensum, oleum primo clarum & postmodum rubicundum
prodit. De cætero notandum, quod dissolvendo Phosphorum so-
lidum in hoc oleo, fiat Phosphorus liquidus. Adhibetur alias ad
Balsamum Caryophyllorum, Nägelein Balsam/ Baume de Gerofle.

AMOMUM.

Sunt arboris Americanæ Caninga dictæ, baccae rotun-
dæ ex fusco nigricantes, piperis magnitudine, in summo

umbilicatæ, includentes sub tenui pellicula & substantia fungosa, binos acinos nigros parvos, tenui membrana vestitos, saporis & odoris ad caryophyllos accedentis.

Sunt fructus cassiæ caryophyllatæ.

Caryophyllis aromaticis accedunt & respondent, sed virtutibus sunt debiliores, in specie conferunt in vertigine.

℞. Cort. Winteran. ʒj caryoph. arom. ʒij. amom ʒiij. saffr. ʒj. bacc. Junip. ʒij. summ. absynth. Mj. f. infus. antihydopicum.

℞. Amom. ʒß. galang. ʒj. rad. doronic ʒiß. M. f. p. vel addita conserva florum tunicæ f. bolus contra vertiginem, vel infundatur vino & fiat infusum.

MA-

Si de Amomo in genere sermo est, multa adhuc de eo inter authores disceptatio est. Illud, cujus author meminit, est annotante RAJO

Amomum quorundam odore Caryophylli L. B. 194. Amomum aliud quorundam & Caryophyllon Plinii Clusio suspicatum Park. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo, Caryophyllon Plinii C. B. Pin. 411. Piper odoratum Jamaicense nostratibus Raj. Hist. l. 26. i. p. 1507. Alpice dicitur Anglis, quasi omnium aromatum instar, & in culinis apud eos ad cibos condiendos in frequenti est usu. De Nuce Moschata, Cinamomo & Caryophyllis participat. Vocantur à quibusdam baccæ pantaromaticæ.

Author fructum Cassiæ Caryophyllatæ esse asserit, repugnat TOURNEFORTIUS, asserens esse fructum arboris, quæ LIGNUM INDUM, Campesch Holz / Bois de Campeche suppeditat.

Præter hoc celebratur Amomum verum quod à RAJO dicitur esse

Amomum verum Gerar. emac. Parck. Amomum racemosum, quod verum credimus Amomum C. B. Pin. 413. Amomum

no-

novum Cardamomi vulgaris facie sive Indicus racemus I. B:
1. 197.

Describitur autem ab eodem RAJO ex MARONEA, quod sit parvus racemus absque pediculis ex uno sarmento enatus, sibi ipsi arcte cohærens & convolutus in uvæ modum, constans decem aut duodecim ad summum acinis seu folliculis fibrosis se mutuo comprimentibus tanquam de communi loco certantibus, adeo ut sibi invicem parvas cavitates imprimant. Racemo inest odor validus, sed *ευωδης* ingenitus, non ascititius, qui vulgarem lavendulam quodammodo redolet, suavior tamen exemptis a folliculo seminibus major odoris acrimonia inest, minor autem odoris gratia; eadem ratione & racemus & nuda semina acri sapore sunt prædita, sed in racemo hebetatur acrimonia, in nudis seminibus vehementior percipitur; quæ vulgarem caphuram quodammoda sapit. Hoc cum MARONEA pro vero Amomo veterum quidam habent, & in Theriacam recipiendum esse cum CHARAS suadent. Nihilominus RAJUS pro Cardamomi specie hoc Amomum venditat. Taceo aliorum sententiam, qui Amomum vel Rosam Hierichunticam, vel Cubebas, vel Cinamomum, vel Piper racemosum, vel Piper Æthiopicum, vel pedem Columbinum, vel aliud quid existimant.

M A C I S.

Est Nucis Moschatæ cuticula membranacea, crassiuscula, ramosa, quasique reticulata, ex aureo flavescent, incumbens putamini corticoso, cui medulla Nucis moschatæ inclusa est.

Macis Θ aromaticum oleo sociatum paulo temperatius est quam caryophyllorum, suas operationes quoque blanda vi anodyna absolvit.

In colica, Vomitu & pellendis Mensibus specificè commendatur. Datur in Substantia ad gr. x. in infus. ad. zij. In India pro pellendis mensibus adhibent macin ex infuso

▽æ ferventis vel cum floribus lavendulæ. Vis anodynâ intenditur Nuce Moschata, ∞ que ejus expresso.

℞. Macis. ʒiβ. infund. vin. ad tormina abdominis, add. Nuc. Mosch. ʒβ. contra colicam.

℞. Mac. flaved. Cort. aurant. ana ʒβ. Ocul. 69. ʒj. f. pulv. ad colicam add. Laud. op. gr. j.

℞. Theriac. ʒβ. ∞ d. mac. gt. ij. f. macis ʒβ. L. O. g. j. succ. cydon. q. f. f. bolus ad Vomitus sistendum.

℞. ∞ mac. expr. ʒβ. Zibeth. gr. viij. f. linimentum in colica a debilitate ventriculi, regioni umbilicali applicandum, addi potest ∞ dest. macis.

NUX

MACER, Muscat-Blüth / MACIS OU FLEUR DE MUSCADE. Vocatur quoque CORTEX AROMATICUS & NUCIS MOSCHATÆ OPERIMENTUM.

Male dicitur flos, melius, uti Author ipse innuit, cortex vel involucrum, convenit cum reti nigro, quod putamen nostrarum nucum circumdat, initio eleganter rubet, sed aëri expositum elegantiam illam amittit, & flavescentem colorem contrahit.

Saporis est acris aromatici suaviter amaricantis, odoris fragrantis. Vires quoque obtinet nervinas atque cephalicas.

Externe adhibetur in nodulis, cucuphis & sacculis cordialibus. Multi illam plus penetrare autumant, quam ipsam Nuce Moschatam.

IN OFFICINIS PROSTAT

Essentia Macis, Muscatblüth, Essenz / Essence de Macis. Vires obtinet stomachicas, carminativas & anticolicas, conducit in cruditatibus acidis & viscidis, anorexiæ & dyspepsiæ medetur. Datur ad guttas 20, 40. & ultra.

Oleum destillatum Macis, Muscat, Blüthöhl / Huile de Macis; quod stomachicum est, & in vomitu multum valet. Datur ad guttas tres, quatuor &c. Externe miscetur variis linimentis & Balsamis.

NUX

NUX MOSCHATA.

Est arboris Nuciferæ aromaticæ Pala dictæ, nucleus rotundus aut oblongus, solidus exterius quodammodo rugosus & cinereus, intus pallide flavescent, venis albicantibus hinc inde interpolatis, saporis acriusculi aromatici, simulque pinguis, odoris fragrantis satisque grati.

In Moluccis crescunt non sua sponte sed cultura, arbores magnitudine accedunt ad mala vel pruna, flores habent pentapetalos cum nullis staminibus.

Maci respondet, sed temperatior est, & ob terreas adstringentes partes & o crassum habet vim potentiores anodynâ, ad indolem opii quodammodo accedentem, hinc anodyna est & hypnotica, sistens nimium spirituum & sanguinis motum, & in vomitu, colica, dispnoea, stranguria, elegans specificum est. In cardialgia, Paralyfi, & ab hac læsa deglutitione singularem fert opem.

Stomacho applicata externe eum mire roborat. Datur ut macis, sed cave ne à nimia dosi ob olei copiam Ventriculi fermentum obtundatur, neve torpor & stupor spiritibus inducatur. Tosta & Sibus aromaticis orbata, tota terrea, adstrictoria, anodyna & hypnotica est. Et in quolibet fluxu compescendo auxilium fert.

Oleum suppeditat triplex. 1. o destillatum tenue & subtile 2 expressum, crassum & sebaceum, in quo vis aromatica adhuc integra hæret. 3. coctum, itidem crassum & sebaceum, at virtute aromatica plurima ex parte orbatur. Hoc colligitur ex residuo destillationis Nucis Moschatæ, cuius superficiei instar sebi supernatat.

℞. Nuc. Mosch. tost. gr. xv. Corall. r. præpar. C. C. ust. ana ʒj. Laud. op. gr. ij. M. f. pulv. vel cum conserv. ros. Qlat. f. bolus ad quemvis fluxum alvi. ℞. Vi.

℞. Vitell. ovor. q. v. Nuc. Mosch. ʒj + rosac. par. coque simul ad duritiem, ad quosvis alvi fluxus.

℞. ʒj Nuc. expr. gr. x. L. O. gr. ij. conf. ros. ʒlat ʒß. f. bolus in alvi fluxu, adde si velis, Corall. præpar. f. C. C. præpar. ut & sacch. ʒni gr. vij.

℞. ʒj N. M. ex destillat. resid. ʒj. Corall. r. præpar. C. C. præpar. ana gr. xv. L. O. gr. ij. Conf. ros. ʒl. & syr. non-nihil. vel q. f. f. bolus præstantissimus in omnibus fluxibus.

℞. ʒj Nucist. expr. & multiplici affusione — us vini odore aromatico orbat ʒj. ʒj succin. gt. v. caryoph. gt. iij. ʒj express. ex flaved. cort. aurant. gt. viij. cinam. gt. ij. M. f. Balsamus apoplecticus vel analepticus in quovis casu ex torpore spirituum.

℞. ʒj Nucist. expr. ʒj. ʒj succin. gt. x. spicæ gt. xv. camph. gr. vij. f. linim. antiparalyticum. Hujus grana iij. vel iiij. possunt exhiberi ad convulsiones.

℞. ʒj Nuc. Mosch. expr. ʒij. rad. ir. flor. ʒiß. Croc. or. ʒß. L. O. gr. xv. styrac. benz ana ʒj. Bals. Peruv. q. f. M. f. pomum hypnoticum, naribus admovendum, ad conciliandum somnum.

CUBE-

Nux Moscata ab odore, *Μοσχονάρου, κάρου αρωμαλινόν*, **Nux Aromatica**, **Nux Myristica**, **Nux Unguentaria**, **Muscata**, **Nucista**, *Muscatus / Muscaten / Muscade*, *Noix Muscade*.

Arbor subsequentibus nominibus describitur. **Nux Moschata** fructu rotundo C. B. Pin. 407. **Nux Aromatica** vulgo **Muschata** I. B. I. 265. **Pala** & **Pongopala**. Pis. Mant. Arom. 173. **Nux Myristica** Matth. Lugd. append. 4. &

Nux Moschata fructu oblongo C. B. Pin. 407. **Nux Moschata** mas oblongior. Lob. hanc sylvestrem esse dicunt, illam vero coli asserunt.

In Insula quoque Bandam hæ arbores nuciferæ quam maxime proveniunt juxta OLEARIUM, bis, juxta alios ter fructus maturos in anno ferunt.

Discrepant Noces Moschatæ magnitudine & figura. Est enim major & minor, est rotunda & oblonga. Rotunda, qua communiter, ut SEBIZIUS loquitur, in culinis & officinis utimur, à CLUSIO aliisque vocatur fœmina, oblonga vero mas, eo quod mares facere credebatur, at longe inferior est priori. Leguntur Noces maturæ, lectæ remotis putaminibus aqua marina consperguntur & siccantur ad solem, siccatis adimitur macis, & postea nuclei lavantur calce, ut eo melius à corruptione serventur. His nucibus certæ quædam aves inhiant, quas propterea Nucivoras vocant.

Quod si totum fructum consideremus, in fructibus hisce primo sese offert pulpa carnea, eodem fere modo, ac in malo persica, ubi mediante cortice lignoso tenui & duriusculo nucleus est inclusus, qui vocatur Nux Moschata. Post pulpam se offerunt filamenta flava, quæ ambiunt immediate corticem illum lapideum, & vocantur macis, male autem flos, quoniam videlicet reti nigro convenit, quod putamen nostrarum nucum circumdat.

Nux Moschata remedium habetur stomachicum, carminativum, cephalicum & uterinum. Utero enim insigniter conferre dicitur, & aliquando prodesse pro arcenda sterilitate. In doloribus post partum flatulentis & in torminibus alvi apud gravidas commendatur. Adhibetur quoque in roborando fœtu & præcavendo abortu, hinc etiam mulierculæ sumunt Nucem Moschatam sub cineribus assatam & in 6. partes divisam, ad roborandum fœtum.

In hæmorrhagiis pulvis Nucis Moschatæ cum alumine laudatur. Porro celebratur in dysenteria, Lienteria, diarrhœa &c. ubi miscetur vel cum vitello ovi, vel cum Rhabarbaro tosto. Commune admodum est, in fluxibus alvinis inspergere Nucem Moschatam ferculis, vel ovo sorbili, vel frixo & ad duritiem cocto, vel etiam pani tosto & in vino Burgundo macerato. In fœtore oris commendatissima quoque est, si jejuno stomacho assumatur. Variis admiscetur ferculis.

Externe inservit quoque pro roborando fœtu, ubi vel vino Malvatico, vel Spiritu Vini frustum panis humefit, cui deinde inspergitur pulvis Nucis Moschatæ. Idem remedium abdo-

mini impositum pro arcenda diarrhœa, & compescendo alvi fluxu nimio & vomitu adhibetur. In suffitu conducit ad passionem & Lipothymiam Hystericam, quo in casu accensa Nux naribus admoveatur, & fumus ore capitur. Idem suffitus è Nuce Moschata per infundibulum ad partes genitales admissus, prodest in flatibus uteri & inflammatione post partum, ab aëre frigido contracta. Ad suffocationem hystericam arcendam & præcavendam, appendunt etiam Nucem Moschatam, præsertim sic dictam, Mutter. Muscaten / sub quibus quidam intelligunt nuces dictas oblongas, alii vero nuces ex duplici constantes nucleo.

IN OFFICINIS PROSTANT

Nux Moschata in Indiis condita cum Saccharo & aromatibus, Nux Indica condita, eingelegte Muscatnuß/ oder eingelegte Indianische Nußen. Noix d'Inde, ou Noix Moschade condite, ou confite. Stomachica, cordialis & aphrodisiaca est.

Oleum Nucis Moschatæ seu Nucistæ expressum, außgepreß Muscatnuß-öhl/ Huile de Noix Muscades tirée par expression; in massis seu laterculis quadratis consistentia duriore coloreque pallidior ex Hollandia advehitur. Interne pro fluxu alvi compescendo adhibetur, præprimis infantibus cum pulvere; externe pro roborando ventriculo & intestinis inungitur. Oleum Nucis Moschatæ odore & colore vel per coctionem, vel per spiritum vini privatum constituit sæpissime sic dictum corpus pro Balsamo.

Oleum Nucistæ destillatum, Destillirt Muscaten-öhl/ Huile de Muscade distillé; datur interne ad aliquot guttas, externe in unguentis & linimentis stomachicis & carminativis adhibetur. Ex hoc destillato oleo cum corpore pro Balsamo parari potest Balsamum Nucistæ.

C U B E B Æ.

Sunt fruticis convolvulacei Javanensis Curane dicti, rotunda piperi similia, paulo majora, fusca, rugosa scabra, cum appenso tenui pediculo caudæ instar, includentia sub cortice tenui nucleum parvum rotundum, foris nigricantem, intus albicantem, saporis aromatici potenter acris, odoris suavis. Adeo

Adeo penetrante acri & aromatico Se pollent, ut in ore volutatae faucium & linguae poros aperire & quasi dissolvere videantur. Hinc quoque in Catarrhis, glandularum obstructionibus, raucedine, Paralyfi, Apoplexiam maximam habent virtutem, conferunt quoque ad confortandam memoriam, & stimulandam Fem, in siccitate oris à spirituum animalium denegato influxu, singulare quid promittunt.

Dantur in substantia à gr. v. ad viij. in infuso ad zij. ꝑ. dest. ad gt. ij. ad memoriam confortandam.

℞. Cubeb. zij. sacch. penid. ʒj. infund. ▽ puleg. q. s. f. infus. s. coque saccharum ad consistentiam & fac rotulas contra raucedinem.

℞. Cubeb. gr. vij. caric. ping. ʒj. cape singulis diebus ad præcavendam Apoplexiam.

℞. Cubeb. ʒß. Castor. gr. v. sacch. par. M. f. pulv. aut fac trochiscos seu rotulas ad nimiam siccitatem oris, ortam à uuum animalium denegato influxu.

CAR-

Cubeben/Cubeblen/ CUBEBES, POIVRE à QUEUE.

Undenam hi fructus proveniant, præcise nondum extra litem positum est, RAJO aliisque contra Authoris nostri mentem putantibus ex arbore provenire. His interim nominibus solent insigniri.

Cubebæ vulgares, nec Arabum Cubebæ, nec Galeni Carpesium Matth. C. B. Pin. 412. Cubebæ I. B. 2. 109.

Cubebæ quandoque vacuæ reperiuntur. Ad vertiginem specialiter commendantur, unde & lingua Germanica, Schwindel-Rörner / appellantur, ab iis, qui alta scandunt, deglutiuntur. Ventriculum roborant, concoctionemque promovent, halitum oris emendant. Si in ore detineantur coitus tempore, illum jucundiores fore sibi quidam persuadent. Ad Apophlegmatismos & Hernutatoria quoque adhibentur.

PROSTANT IN PHARMACOPOLIIS

Confectio Cubebarum, seu *Cubebæ saccharo incrustatæ*, *überzuckerter Cubeben* / *Cubebes confits* &

Species diacubebarum, *Cubeben-Specerey* / *poudre de Cubebes composée*, quæ pro remedio aperitivo, hepatico & antihydrico celebrantur: dosis ℥j. ʒss. & ultra.

CARDAMOMUM.

Cardamomum majus non est in usu, nam non fert ætatem ut minus. Minus sunt plantæ indicæ capsulæ membranaceæ triquetrae, pallescentes, tribus per longitudinem distinctæ cellulis, quibus includuntur acini angulosi ex fusco nigricantes, involuti tenui & albicante pellicula, saporis acris aromatici, ejusdemque odoris.

Majus sunt plantæ indicæ Benzal dictæ, capsulæ membranaceæ triquetrae, cardamomo minori triplo longiores, tribus per longitudinem distinctæ cellulis, saporis & odoris minori fragrantioris.

Minus majori præstantius. Vi aromatica gaudet remissiore & minus desiccativa, quam Cubebæ, attenuat satis & penetrat, ut in vertigine, confortanda memoria cubebas superet.

Datur in substantia ʒss. in infuso ut cubebæ, stimulat ut camphora.

℞. Cardamom. ʒss. Coriandr. ʒij. sinap. ʒss. M. f. p. pro Apoplexiæ præservatione.

℞. Ambr. gryf. gr. xv. solv. in ʒo cinam. cubeb. cardamom. f. q. sacch. albiss. ʒiiij. Mosch. or. gr. iij. M. f. p. ad confortandam memoriam.

PIPER

Cardamömlein / CARDAMOME.

Cardamomum majus ab authore hic allegatum minime confundendum cum granis Paradyfi, quæ Cardamomo huic quandoque in officinis substitui solent, de quibus infra. Factum hinc est, ut distinxerint alii in Cardamomum maximum, majus & minus.

CARDAMOMUM MINUS Bontii 126. Matth. advers. Lob. 2. 204. Tab. Icon. 915. Cardamomum simpliciter in officinis dictum C. B. Pin. 414. Cardamomum cum siliquis sive thecis longis & brevibus I. B. 2. 205. **Klein Cardamömlein / gemeine Cardamomen / CARDAMOME ORDINAIRE.**

Bontius se primum hanc plantam descripsisse gloriatur, & à subsequente discrepare asserit.

CARDAMOMUM MAJUS Bontii 127. Cardamomum majus officinarum C. B. Pin. 413. **Groß Cardamömlein.** Hujus quoque capsulæ involvunt semen angulosum fuscum, sed raram est, & quotiescunque Cardamomum simpliciter exposcitur, minus est intelligendum. Cardamomum utrumque in India Orientali ejusque variis locis, Java, Ceylon, Malabar &c. provenit.

Remedium constituunt cordiale, stomachicum, carminativum atque cephalicum & uterinum, concoctionem adjuvant, anhelitum oris corrigunt, urinam, & menses cient, in obstructionibus viscerum conducunt. Virum fortem faciunt & audacem foeminam. Venerem enim languidam excitant.

Cardamomum minus in Theriacam & Mithridatium recipitur. In cibis quoque condiendis inservit.

PIPER ALBUM ET NIGRUM.

Piper album & nigrum non differunt ratione plantæ, sed ratione fructus. Datur etiam factitium. [Quod ita describit Sam. Dale Pharmacol. p. m. 446. Javanenses & Amstelodamenses immittunt piper nigrum in ▽ ut decorticetur, & tum involvunt in Creta, ut fiat piper album factitium.]

Nigrum sunt fruticis sarmentosi piperiferi grana rotunda, pisi magnitudine, globosa, nigricantia, rugosa, in-

cludentia sub cortice intus albicante nucleum nullum vel exiguum saltem. Saporis acris & fervidi aromatici, odoris fragrantis.

Album sunt ejusdem grana, cortice cinereo tecta, pellicula minus rugosa.

Album si naturale sit, non factitium, gratius est & laudabilius nigro, utrumque gaudet. Θ e aromatico acerrimo pungente, fixo potius quam volatili, cum paucis oleo subtili, acredine piperata fere privato, quod mirandum.

Ob salis penetrantiam, viscida & acida potenter penetrantis stomachicum est & anticolicum, leniens simul horripilationes febrium intermittantium, ipsarumque febrium paroxysmos, præcipue si fomes earum sit in Ventriculo.

Externe resolvit nervos obstructos, uvulam elongatam & à Pituita obsessam curat. Integrum seu grosso modo contusum felicius datur, quam minutius tritum, hoc enim membranas Ventriculi & intestinorum aliquando inflamat, illud vero aromaticam suam virtutem transmittit in sanguinem. [vid. hac de re Casp. Hofmann. de Medic. officinal. l. 2. cap. 175. p. m. 424.]

Decocta piperum, quia Θ e fixo gaudent, acerrima fiunt.

In substantia dantur gr. iij. in infuso datur ad \mathfrak{z} ss. nimia acredo temperatur oleosis, præcipue baccis lauri, saccharo & fœniculo.

\mathfrak{z} . Piper gr. iij. integra cape ad cruditates Ventriculi ex passione colica, vel contund. & add. conserv. menthæ.

\mathfrak{z} . Piper integr. gr. iij. cap. ex cochl. j. \mathfrak{z} us vini in febribus ante paroxysmum.

\mathfrak{z} . Piper gr. iij. bacc. laur. \mathfrak{z} ss. L. O. gr. j. M. f. p. ad febres.

\mathfrak{z} . Piper

℞. Piper. gr. vii. 〇 gr. v. f. pulv. uvulæ applicandus.

℞. 〇 Piper. dest. gt v. Extr. gentian. absynth. ana ʒj. ad febres intermittentes præcipue quartanam, ut & illarum horripilationem.

℞. 〇 laurin. expr. ʒij. 〇 piper. dest. ʒj. 〇 nardin. ʒj. f. linimentum dorso applicandum, contra horrores febriles.

N. quod fructus piperis Hispanici recentioris fumum suppetant, qui attractus tussim excitat vehementem, adeo ut omnes qui adsunt in conclavi tussire cogantur. Ope hujus tussis potest rejici, si quid incidit in asperam arteriam.

PIPER

Πέπερι, Pfeffer/ POIVRE.

Datur triplex, Nigrum, Album & Longum, de quo postea.

PIPER NIGRUM, vocatur μελανοπέπερι, Schwarzer Pfeffer/ POIVRE NOIR, ALBUM vero λευκοπέπερι, Weißer Pfeffer/ POIVRE BLANC.

Piper rotundum nigrum C. B. Pin. 411. Piper nigrum I. B. 1. 181. Et Raji Hist. 1341.

Piper rotundum album C. B. Pin. 412. Piper album I. B. 2. 184. Raj. Histor. 1342.

In eo fere conveniunt, quod planta utrumque Piper ferens sit sarmentosa, sed discrepant quam maxime authores, an non ex eadem planta & album & nigrum proveniat, præsertim cum Pisone aliisque testantibus Piper album nihil aliud sit, quam nigrum ante insolationem decorticatum. Decorticatio autem illa fit bene maturo Pipere, ex marina macerato. Maceratione enim cortex exterior niger dehiscit tumescendo, atque ita facillimo negotio granum, quod intra illum includitur, album eximitur & ad modum piperis nigri exsiccat. Quem laborem laboris impatiens natio nisi fugeret, non tanta esset Piperis albi, si cum nigro compares, inopia. Accedit, quod quandoque Piperis albi grana reperiantur, a quibus cortex niger rugosus non omnimodo fuit ablatus. Addunt, Piper album majus esse nigro, quoniam ab aqua, in qua maceratur intumuit, comparet etiam absque rugis, quoniam cortex, qui contrahi poterat, abest

abest. Insuper colorem eundem habet ac Piper nigrum decortica-
tum, & tandem saporis est mitioris, ob partem salis in aqua amissam.
Alii tamen, licet non aliud, quam inter vitem uvas albas & vitem
uvas rubras ferentem discrimen, inter plantas Piper album & Piper
nigrum dantes, faciant, attamen album separatim à nigro crescere
contendunt. Forſan hinc provenit, quod duplex conſpiciamus
Piper album, alterum ſibi relictum, quod in peculiari ſpecie cre-
ſcit, alterum, creta vel etiam calce viva cineribuſque involutum,
geſalchter Weiſer Pfeffer appellatum, quod ex nigro factitium exi-
ſtit. Expectabimus Litis deciſionem cum accurata deſcriptione flo-
ris plantæ piperiferæ.

Juxta CLUSIUM in planta hac ad ramorum internodia na-
ſcuntur uvæ teretes & oblongæ multis granis orbicularibus, nunc
majoribus modo minoribus ipſi ſcapo ſine petiolo adhærentibus
conſtantes.

Piper nigrum in pleriſque Indiæ Orientalis regionibus, præſer-
tim in Malabar, Java, Sumatra, Bandam &c. provenit. Candidi
autem plantas rariores eſſe dicunt, nec niſi certis Malavar & Mala-
cæ locis naſcuntur. Quod ſi POMEI fides adhibenda, magna quo-
que copia Piper album in Inſula St. Laurentii aut Madagaſcar oc-
currit.

Piper præſertim nigrum colligitur ante plenam maturitatem,
ubi in colorem præſinum adhuc inclinant grana, aut, ut alii vo-
lunt, cum plene jam maturuerint, id quod Septembri, Octobri &c. fit,
& in ſegetibus palmeis expaſa Soli exponunt, cujuſ calore intra tri-
dum nigreſcunt & corrugantur.

Piper album ob ſuavitatem præfertur nigro. Piper juxta Deoda-
tum omnia aromata ſalubritate ſuperat. Ex aromatibus Piper
condimentum eſt communiffimum, Culiniſque magis quam uſui
Medico inſerviens. Quod autem ad hunc attinet, de eo Schola Sa-
lernitana ita canit.

*Quod Piper eſt nigrum, non eſt diſſolvere pigrum
Phlegmata purgabit, concoctricemque juvabit;
Leucopiper ſtomacho prodeſt tuſſique dolorique
Utile, præveniet motum, febrisque rigorem,*

Virtus aphrodiſiaca quoque ipſi adſcribitur. Novem Piperis
grana

grana per plures dies deglutita, à quartana liberare dicuntur. In febribus non semper cum successu, sed quandoque cum noxa assumitur. In humoribus pituitosis catarrhalibus dissolvendis conducit, unde in tussi & aliis pectoris affectibus prodest. Visum quoque acuere fertur. Putatur & conceptum impedire, præsertim si post coitum usurpetur. Quando de Pipere dicitur, quod refrigeret, illud per accidens fieri intelligendum est. Uvulæ relaxatæ afflatur, vel subditur pulvis Piperis. Extrinsecus apophlegmatismis, gargarismis, sternutatoriis immiscetur. In angina quoque celebratur, sed caute usurpandum. Odontalgiam sedat. In paralyti in linimentis adhibetur. Cholericis & tenerioris constitutionis homines, ut ab aliis aromatibus, ita & à piperatis quam maxime sibi caveant.

OFFICINÆ NOSTRÆ EX PIPERE ASSERVANT

Species diatrion Pipereon, Dreyffesser Pulver / Poudre de trois Poivre; stomacho, in cruditate præsertim acida, flatibus discutendis & concoctione juvanda, conducunt. Dosis est ad ʒss. ad ʒj. imprimis post partum. Quidam exinde cum saccharo parant rotulas bibonibus convenientes.

Oleum de Piperibus coctum, Pfeffer-öhl / Huile de Poivre. Cerebri & nervorum frigidas noxas propellit, calefacit, abstergit, discutit, aperit, ad paralytin, spasnum, tremorem, epilepsiam, uteri, coli & vesicæ vitia, item ad ventriculum frigidum prodest.

Oleum destillatum Piperinum, Destillirt Pfeffer-öhl / Huile de Poivre distillé; commendatur, præter virtutes ab authore descriptas, ad atrophiam membrorum.

℞. Olei de piperibus cocti, olei Capparum ana v. gr. ʒij. Msc. pro linimento ad dolores lumborum rheumaticos, præsertim frigidos, applicando frigide. Piper ingreditur Theriacam, Mithridaticum &c.

PIPER HISPANICUM, CAPSICUM vel à græca voce *καίπτω*, mordeo, propter vim deurentem fructus, vel à voce Capsa, quoniam idem fructus capsulam refert: PIPER INDICUM, PIPER CALEUTICUM, PIPER BRASILIANUM, Spanischer Pfeffer / Indianischer Pfeffer / Calecutischer Pfeffer / POIVRE D'INDE, POIVRE DE GUINEE, POIVRE DE BRESIL, PIMENT.

Est planta flore monopetalo, rotato & multifido, cujus pistillum

stillum ex calyce surgens abit in fructum mollem, membranaceum, in duo loculamenta divisum, seminibus foetum compressis, ut plurimum reniformibus.

Ex pluribus speciebus fructus ratione praesertim differentibus, inprimis species vulgarissima in usu est, quae vocatur

Capficum siliquis longis propendentibus Tourn. I. R. H. cl. 2. S. 7. g. 5. Piper Indicum vulgarissimum C. B. Pin. 102. Capficum Actuarii sive Caninum Zinziber, Avicennae Calecuticum Piper sive Piper Indicum longioribus siliquis Lob. Icon. 316.

Olim ex locis, unde nomina habebat, advehebatur, nunc ubi-vis in hortis colitur; floret Augusto.

Tanta acrimonia praeditum est, ut linguam fortissime feriat, & vapor ex siliquis, dum aperiuntur, exhalans nares percellat fortiter, sternutationemque excitet, manus quoque dum tractantur, acriter afficiunt siliquae. Imo si siliquae particula prunis injiciatur, fumus naribus exceptus immania & continua sternutamenta ciet, quae non cessant, donec fumus diffletur & evanescat. Sunt qui pulvere harum siliquarum cum farina coctarum instar panis utuntur condimenti loco instar piperis.

Has siliquas quoque rubicundas condiunt vel saccharo, vel aceto & sale. Aceto quoque ad majorem acrimoniam conciliandam immerguntur.

PIPER LONGUM.

Piper longum sunt sarmentosi fruticis fructus oblongi, teretes, cinericei, [instar nucamentorum seu Julorum Coryli,] ex numerosis vermiculato plexu dispositis granis minutis compacti, saporis pipere nigro acrioris [& amaricantis.]

Piper hoc rotundo quidem ingratius, sed virtute potentius, & proinde ad excitandos soporosos, emendandas Ventriculi cruditates usus elegantioris est, quam piper rotundum

R. Piper. Castor. rad. pyrethr. ari, fol. origan. ana q. v.

℞. f. infus. ex vino vel aqua vini adde si vis Nuc. Moschat.
[In essentia stomachica Thomsoni, in cruditate acida &
viscida commendatissima piper basin constituit.]

℞. Piper. castor. helleb. alb. ana ℥j. ʒ. rut. major. salv.
ana gt. ij. M. f. pulv. sternutatorius ad excitandos soporo-
sos.

GRA-

Μακρόπειρι, MACROPIPER, Langer-Pfeffer / PIMPILIM,
POIVRE LONG.

Piper longum Orientale C. B. Pin. 412. Piper longum L. B
2. 185. Razi Histor. 1343.

Plantam, quæ hoc Piper fert, reliquis piperiferis non multum
abfimilem, nisi quod minus alte ascendat, ac juxta quosdam, quod
adeo se non circumvolvatur & fructum peculiarem obtineat, esse di-
cunt. Ex nonnullorum sententia Piper longum racemus est vel
scapus Piperis vulgaris, dum adhuc virescit, collectus, & ante-
quam grana incrementum adepta sint, sed recte à CHARRAS refu-
tantur, testantibus id insuper peregrinationum scriptoribus. Piper lon-
gum in India Orientali, Bengala & Java præsertim crescit. Nasci-
tur tamen etiam in America, testante MONARDE aliisque.

Ingreditur Theriacam, Mithridatium, Diascordium &c.

GRANA PARADISI.

Sunt species Cardamomi, arilli angulosi, nitidi, fusci,
fragmentis lapillorum granatorum similes: utuntur Indi lo-
co piperis [saporis acris & fervidi medii inter cardamo-
mum & piper.]

Virtute cum pipere coincidunt, ejusque defectum sup-
plent, tam condimenti quam medicamenti loco. Usurpa-
tur ut piper, idcirco huic admiscetur, & iis adulteratur.
Præbent ʒ. acerrimum.

℞. ʒi laurin. ʒj. ʒi gran. parad. gt. viij. in Ventriculi debilitate.

Capiuntur ad Epithemata contra Paralyfin.

Infusum ex vino in Ventriculi debilitate ejusdem est facultatis cum infuso acori.

SEMEN

CARDAMOMUM MAXIMUM, MALAGUETTE, MELEGUETTA, ab urbe Melega unde olim advehebatur, *Parisi. Körner / Paradisi. Körner / MANIGUETTE*, ou GRAINE DE PARADIS, ob jucunditatem odoris.

Cardamomi genus maximum grana Paradisi Officinarum C. B. Pin. 413. Melegetta seu Cardamomum Piperatum Cord. Malaguetta Cardamomum 1. Camer. Epit. II. Cardamomum Arabum majus Tabern. 1. c. 915.

Ex Orientalibus quoque locis ad nos advehitur. In officinis substituitur Cardamomo majori. Virtutibus convenit cum reliquis Cardamomi speciebus.

SEMEN AMMIOS.

Sunt Ammios majoris C. B. P. semina parva, petroselino minora, ex cinereo spadicea, saporis amari, acris, odoris fragrantis.

Minoris semine apii, odore origani J. B. sunt semina parva, striata, petroselino minora, ex rufo spadicea, saporis acris aromatici, quasi ex pipere & cumino compositi, odoris fragrantis ad origanum accedentis.

Minus majori præstantius & præter virtutes aromaticis affines vim habet specificam anticolicam, ex plurimorum sententia vim ad promovendam foeminarum fecunditatem. [vid. hac de re Matthiol. lib. 3. in Diosc. c. 61. p. m. 557.] ob salis aromatici & -uosi penetrantiam, quod se ad Uterum

rūm extendit, etiam fluori albo conducit, unde quoque ingreditur Clysteres Uterinos.

Majus datur ad ʒʒ, minus ad ʒj.

℞. Sem. ammios ʒʒ, fol. horm. p. j. lign. sassaf. ʒj. affund. ▽ cinam. & fac infusum, quod cape cum toto. In fluore albo.

℞. Sem. ammi. ʒʒ, sacch. cand. par. f. pulv. ad ij. vel iij. dof. exhibeatur infantibus contra tormina.

℞. Aristol. rot. ʒʒ. rad. Zed. ʒj. Cent. m. rorismar. ana Mj. chamom. artemis. ana Mʒ. coq. in ▽ f. Clyster Uterinus.

Indi exhibent à ʒj. ad ʒij. contra sterilitatem mulierum, sæpe cum fructu, ubi scilicet adest obstructio vaforum.

℞. Cinam. ʒj. caryoph. ʒij. Nuc. Mosch. piper. galang. ana ʒʒ. sem. ammios ʒij. affund. ▽ regin. Hung. datur infusum cochleatim contra sterilitatem.

SEMEN

Ἀμμι, ἄμι, ἄμμιον, AMEOS, AMIOS, AMMEOS, à semine arenam quasi referente, Ἀμμεν / AMMI.

Ammi majus est plantæ genus, flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis constante cordiformibus, inæqualibus, in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum exiguis, hinc gibbis & striatis, inde vero planis. Addenda sunt folia oblonga & angusta costæ per conjugationes innascentia, ultimo impari claudente.

Ammi majus C. B. Pin. 159. Ammi vulgare majus latioribus foliis semine minus odorato L. B. 3. p. 2. 27. Ammi vulgare Dod. Pempt. 301.

Ammi minus ad fœniculum refertur a TOURNEFORTIO & dicitur

Fœniculum annuum Origani odore Tourn. I. R. H. cl. 7. S. 2. g. 1. Ammi parvum foliis fœniculi C. B. Pin. 159. Ammi semine tenuis-

tenuissimo & odoratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum Lob. Ic. 725.

Ammi in usum Medicum supeditat semen. Præstantius est AMMI VERUM seu CRETICUM, quod etiam CUMINUM ÆTHIOPICUM, ALEXANDRINUM, ÆGYPTIACUM, SYRIACUM, REGIUM appellatur, & ex Candia, Ægypto aliisque locis ad nos adfertur. Huic autem substituitur semen Ammeos vulgaris, quod colitur in hortis, Junio, Julioque florens.

Est ex quatuor SEMINIBUS CALIDIS MINORIBUS, quæ sunt AMMEOS, AMOMI, APII, DAUCI. Incidit & aperit, menses referat, Urinam ciet, in stranguria conducit. SIMON PAULI adversus fluorem album, præmisso uterino clystere, pulverem ex veronica, semine Ammeos, Cardamomo minore, Cinamomo & saccharo, cum aliquot guttis olei Cinamomi compositum multis sterilibus novis nuptis se commendasse asserit, quæ ingravidatæ & à fluore albo fuere liberatæ. A quibusdam hoc semen pro antidoto Cantharidum habetur, Ut Alexipharmacum in Theriacam recipitur.

SEMEN ANISI.

Sunt Anisi herbariis dicti C. B. P. semina oblonga, rotunda, in obtusum acumen desinentia, parva, striata, colore ex rufo spadiceo.

Duplex est semine majore & minore, sed solent confundi.

Semina constant Æ de volatili oſo dulcibus inclusis, si-
ve salibus aromaticis dulcedine temperatis gaudent, unde
in raucedine asperitate faucium, tussi, colico dolore, &
promovenda Urina conducunt, sistunt singultum & simul la-
xant alvum tardio rem puerorum & durio rem; impediunt
quoque lactis coagulationem, corrigendo acidum & aman-
dando illud ad Urinam. Datur a ʒss. ad ʒij.

℞. Sem anis. ʒiʒ. coq. in ∇ s. vino ad passionem colicam.

℞. Sem.

℞. Sem. anis. ʒ genist. ana ʒj. f. pulv. diureticus.

℞. Rhabarb. ʒj. sem. anis. ʒj. f. pulv. ad alvum laxandam.

℞. Flor. benz. ʒj. ʒ volatil. C. C. ʒ d. anis. gt. ij. sacchar. q. f. in tussi.

℞. Sem. anis. ʒj. ʒ d. anis. gt. ij. rad. alth. ʒj. sacch. q. f. f. pulv. ad raucedinem asperitatem & tussim.

Oleum anisi destillatum blandum anodynum est & alvum simul laxat, in colica & fluxu albo specificè laudatur. Externe suffusionibus, coryzæ, cardialgiæ, inflationibus abdominis & hypochondriorum atque singultibus medetur.

SEMEN

Ἀνίσον, ὅτι ἀνίησι τὰς ἐμπνευματώσεις, quod remittat seu laxet flatulentas tensiones, ἄνησον, γλυκάνισον, Plinio ANICETUM, quasi ἀνίκηλον, quod appetitionem cibi præstet, Ἀνίσ / Ἐνίσ / ANISE.

Pertinet juxta TOURNEFORTIUM ad Apii species & sunt sequentes.

Apium Anisum dictum semine suaveolente majori Tourn. I. R. H. cl. 7. S. I. g. 2. Anisum Herbariis semine majori C. B. Pin. 159. Anisum veteribus I. B. 3. p. 2. 92. Anisum vulgare Clus. Hist. ccij. &

Apium Anisum dictum semine suaveolente minori Tourn. I. R. H. cl. 7. S. I. g. 2. Anisum herbariis semine minori C. B. Pin. 159.

Hodie colitur in hortis, campis & agris, floret Julio circiter, semen autumno maturescit: quod solum in usum cedit, odore præstans, sapore dulci, grato leniterque mordaci.

Juxta SALERNITANOS enim, Copia dulcoris anisi sit melioris.

Quo recentius eo melius, cum tempore enim eroditur virtusque evanescit.

Inter SEMINA quatuor CALIDA MAJORA refertur, quæ sunt ANISI, FOENICULI, CARVI, CUMINI.

Vim

Vim possidet Anisum discutiendi, attenuandi, resolvendi, incendi, aperiendi, abstergendi. Ut aromaticum insigne est carminativum, atque uterinum. Omnibus visceribus, imprimis stomacho est amicum. HEURNIUS, HOFFMANNUS in SCHROED. alique anisum in substantia aut in decocto facilius discutere flatus, quam oleum destillatum, asserunt. In affectibus infantum pluribus prodest, cum lactis vitia emendet, digestionem promoveat, flatus discutiat, acoremque corrigat. In herniis porro commendatur. Virtus aphrodisiaca quoque aniso tribuitur & alexipharmacum censetur. Commendatur in asthma tam humorali quam flatulento, ut & in aliis pectoris affectibus. In variis præterea capitis affectibus, epilepsia præsertim infantum, vertigine, confortanda memoria, dolore capitis sedando &c. laudatur. Ophthalmicum præterea dicitur esse insigne, tum externe tum interne usurpatum, unde ab HÆER vapor oculis exceptus ad visus claritatem multum conducere asseritur. Hinc SALERNITANI,

Emendat visum stomachum confortat Anisum.

In auditus difficultate, tinnitu aurium, Anisum quoque confert. Masticatum halitum oris emendat, foetoremque tollit. Decocti vapor naribus exceptus olfactum amissum restituere dicitur.

Cum cibis à quibusdam tanquam condimentum coquitur, & sæpius Tragæis immiscetur. In potu quoque usus ejus est frequens, hinc decocto anisi utuntur vel per se, vel cum hordeo, vel aliis, semine fœniculi &c. pro re nata, pro potu ordinario ipsis etiam infantibus exhibendo. In Theriacam recipitur.

EX ANISO MULTA IN OFFICINIS PROSTANT.

Confectio Anisi simplex, überzuckerter Anis / Confection d'Anis ou Anis sucré; optime in Gallia obducitur, vocaturque Anis couvert, Anis à la Reine, ou petit Verdun; inter bellaria æque ac medicamenta locum habet.

Confectio Anisi laxativa, Laxir: Anis / Confection d'Anis laxative. Qui acidulas bibunt, hac confectione frequenter utuntur, ut flatus dissipent & acidulæ per alvum operentur facilius; assumitur ad drachmam unam & alteram, ad unciam semis.

Aqua Anisi vel ex herba & semine, vel ex solo semine, uti fit plerumque,

plerumque, destillata, *Anis. Waſer / Eau d'Anis*, prodit eodem labore, quando destillamus

Oleum Anisi, *Anis. Öl / Huile d'Anis*, quod oleum æthereum, aromaticum, adeo subtile est, ut vel duabus tantummodo guttis vix non amphoram aquæ odore & sapore anisi inficias. Attenuat, discutit, resolvit, in affectibus ventriculi & intestinorum, à causa ut loquuntur, frigida ortis, in pectoris morbis à pituita crassa viscida natis, item in flatibus discutiendis conducit: admiscetur purgantibus, imprimis specifico Gialappino. Dosis ad guttas duas, octo &c. vel in vehiculo, vel cum Saccharo. Renibus atque pubi pro urina pellenda inungitur. Tandem etiam nominandus est decantatus

Spiritus Anisi, *Anis. Geist / Anis. Brandtentwein / Esprit ou Eau d'Anis*, qui stomachicus est & carminativus, vulgo etiam notissimus, datur ad unum aut alterum cochlear. Saccharo edulcoratus gratiores evadit.

℞. Pulv. semin. anis. ℥ss. Ocul. 69. pp. 3j. Croc. Orient. ʒss. Sacch. albiss. ad pond. omnium, de hoc infantibus in primo cochleari cum pulte exhibeatur.

℞. Semin. Anis. ℥iv. Spiritus Vini Gallici mens. ij. post institutam digestionem destilla & edulcora sacchari ℥viii, Habebis liquorem anisatum egregium, *Eau d'Anis* dictum.

SEMEN ANISI CHINENSIS.

Anisum peregrinum C. B. P. anisum Philippinarum insularum. Anisum stellatum, fœniculum Sinense. Semen Badianum. Zingi etiam vocatur.

In Moscoviam transfertur ex Tartaria. Semina sunt absque omni odore & sapore. In involucris consistit omnis vis anisata, in semine nihil.

Oleum hoc nunquam concrescit, ut nostrum 00 anisi.

Convenit virtute cum aniso vulgari, sed ob dulcedinem gratiorem & fere penetrantiolem vim aromaticam, quæ in seminum involucro consistit habetur præstantius.

Creditur vulgo cōfortans & roborans catholicum, Magnates volvunt sub lingua ad conciliandam gratiam ori, ad arcendam nauseam & fastidium, ut & tollendum aëris foetidioris incommodum. Chineses infundunt cum radice Ninzin, seu masticant in ore & superbibunt potum Thee, horum exemplo nostrates utuntur hoc semine cum potu Caffee.

SEMEN

FOENICULUM SINENSE, ANISUM SIBERIAE, FOENICULUM MOSCOWITICUM, *Indianischer Anis/ Stern-Anis/ Moscovitischer Fenchel. Anis de la Chine ou de Sibery.*

Ex qua arbore desumatur, nondum constat. Appellatur à Plucken. Alm.

Evonymo affinis Philippinarum insularum, Anisum spirans, nucas in capsulis stelliformiter congestis proferens.

Fructus hic stellæ figuram repræsentat, constatque ex septem nuculis particularibus radiorum in morem in centro coeuntibus triangularibus, longis, leviter compressis, ea parte, qua committuntur impressis, extima & convexa peripheria semicirculum fere describentibus, cortice gemino tectis, exteriori duro & spadiceo, nigricante rugoso, interiori propemodum osseo, interna substantia cupri diffracti instar lucente, bivalvi atque in siccis & inveteratis nonnihil hiantes. Nucleus in singulis nucibus latitat singularis, lævis, splendens, colore seminis Lini aut pomorum sed dilutiore paulo. Odor & sapor Anisi plane est, relinquit etiam aliquid acrimoniæ in lingua.

SEMEN FOENICULI.

Sunt foeniculi vulgaris Germanici C. B. P. 147. semina foeniculo dulci similia, sed longiora, odore & sapore debiliori. Dulcis seu Italici sunt semina ex cinereo spadicea, oblonga, striata, vulgari foeniculo rotundiora, saporis dulcis, acris & suavis, odoris fragrantis.

Fœniculum

Fœniculum dulce, quod optimum, convenit cum semine anisi & propria radice, qua tamen potentius est, in Variolis & Morbillis, stranguria, calculo, augendo lacte in frequentiori usu est. Externe medetur oculorum aciei.

Siccum præfertur viridi quod ob excrementitiam humiditatem torminosum est, datur ut semen anisi.

℞. Sem. fœnic. ʒj. anis. ʒʒ. ꝰc dest. fœnic. gt. j. Sacchar. par. f. pulv. contra tormina.

℞. Rad. helen. ʒij. sem. fœnicul. ʒʒ. passul. min. ʒiʒ. M. f. decoct. in asthmate & tussi. vid. plura d. radice fœnic. p. 33.

℞. Olei fœnicul. — Θ*ci M. invicem., inungantur hypochondria contra inflationes. Infantibus obesis & robustis hæc mixtura valde convenit, contra qui non sunt sat robusti ferre non possunt ob —um Θ*ci.

℞. ∇ fœnic. Cent. min. ana ʒij. syr. C. B. ʒj. Θ C. C. gr. v. Tinct. Castor. ʒʒ. ut & si libuerit. Tinct. Myrrh. ʒʒ. f. mixtura contra Variolas & Morbillos.

℞. ∇ fœnicul. ʒiiij. Θ ʒri. gr. vij. ad ʒʒ. fol. fenn. ʒvj. f. infus. in loco calido, si lubet add. sacch. cand. par. si fortius expetatur add. rhabarb. ʒij.

℞. ∇ fœnicul. Euphras. ana q. v. add. fol. fenn. vitr. ʒij. vel croc. metallor. pone in loco calido utere ad Inflammationem, aliaque vitia Oculorum.

SEMINA

Fenchelsaamen / FENOUIL. Hac de planta supra jam dictum.

Fœniculum dulce majore & albo semine I. B. 3. 2. 4. Fœniculum dulce C. B. Pin. 147. Fœniculum sive Marathrum vulgatus dulce Lobel. Jc. 775. Süßer Fenchel / Römischer Fenchel / Florentinischer Fenchel / FENOUIL DOUX, FENOUIL DE
M m 2 Flo.

FLORENCE. Rarius autem hujus semen apud nos in usum trahitur.

Semen est ex quatuor seminibus calidis majoribus. Semen hoc stomachicum atque carminativum est, unde **SALERNITANI** canunt.

Semen Fœniculi pellit spiracul Culi:

&

Bis duo dat Marathrum, febres fugat atque venenum,

Et purgat stomachum, lumen quoque reddit acutum.

Et porro quoniam visum acuit

Fœniculum, verbena, Rosa, Chelidonica, Ruta,

Ex his confice aquam, quæ Lumina reddat acuta.

Halitus à masticato semine oculis inflatus mire eos confortare dicitur. Laudatur quoque ad memoriam roborandam, vertiginem, raucedinem, tussim, dyspnœam corrigendam.

Multorum ferculorum condimentum est, & ut semen anisi, in decoctis pro potu adhibetur. Quidam hoc semen saccharo incrustant ac bellariis annumerant.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua destillata, Fenchel-Wasser / Eau de Fenouil, quæ vel ex tota planta, vel communiter ex semine elicitor; quandoque exinde etiam destillatur

Oleum Fœniculi, Fenchel-öl / Huile de Fenouil, quod aperit, attenuat, discutit, flatus pellit, colicæ medetur, diuresin & diaphoresin promovet, lac auget, nec virtute opthalmica destituitur: fit exinde *Elæosaccharum*. Ingreditur linimenta & olea stomachica atque carminativa.

Celebris præprimis est tum pro usu Medico, tum pro gulæ blanditiis

Spiritus Fœniculi, Fenchel-Brandenwein / Esprit de Fenouil, paratus cum Spiritu Vini, qui stomachicus atque carminativus ad unum ad alterum cochleare datur. Cum saccharo edulcoratus gustui magis blanditur, & *Fenouillet* καὶ ἐξοχὴν dicitur.

R. Sem Fœniculi ℥iv, Spiritus Vini Gallici mens. ij. digere & post-

postmodum destilla atque edulcora ℥viij. Sacchari. Habebis liquorem Stomachicum atque carminativum.

SEMINA LEVISTICI.

Sunt Ligustici vulgaris C. B. P. semina oblonga, depressa, membranacea, striata, saporis subdulcis, aromatici nauseosi.

Conf. radix Levistici cum qua semina conveniunt.
℞. Sem. Levistic. 3℔. Castor. gr. x. Croc. or. gr. vij. L. O. gr. j. M. f. pulv. pro ij. dof. contra dolores & tormina colica.

Liebstockel. Samen / *Semence de Leveche*, in ore masticatum passionem hystericam sedare fertur, ad vermes quoque celebratur.

SEMINA SALE VOLATILI AROMATICO CUM BLANDA VISCOSITATE CONSTANTIA.

SEMEN ANETHI.

Sunt anethi hortensis C. B. P. semina foliacea & membranacea, orbicularia, compressa, in parte exteriori tribus striis vel sulcis notata ex atro virentia.

In ☉e volatili temperato quasque incluso, fovet quippiam anodynū & narcotici, & propterea in colica, singultu, cardialgia & ileo specificè commendatur. Semina recentia contusa & temporibus applicata puerorum, placidum somnum accersunt.

℞. Sem. aneth. 3℔. Castor. gr. iij. L. O gr. j. M. f. pulv. ad singultum.

Mm 3

℞. Summit

℞. Summit. aneth. Mj. coq. ex ▽ vel Cerevis. sit potus ordinarius in singultu.

℞. Summit. aneth. q. v. coq. ex ▽ papav. seu adde capita papaveris albi pro potu, ad somnum conciliandum.

℞. Oiei d. aneth. gt. v. ∞ amygd. dulc. rec. expr. ℥β. f. haustus ad singultum.

℞. Olei d. aneth. gt. iij. C. C. præpar. ℥j. L. O. gr. j. Cort. aurant. condit. cum proprio syrupo q. s. f. conditum contra tormina.

℞. Olei Papav. expr. ℥β. ∞ aneth. gt. xv. unḡ. popul. ℥ij. M. f. liniment. add. L. O. ℥β. ad somnum conciliandum.

SEMINA

Ἀνῆθον ab ἄνω θέν, quod cito crescat, Dyllen / Dyllkraut / Dill / Till / Garten-Dill / Anet.

Est plantæ genus flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis constante in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum compositum ex duobus seminibus ovatis, planis striatis & marginatis. Adde folia fœniculacea.

Anethum hortense C. B. Pin. 147. Anethum I. B. 3. p. 2. 6. & Dod. Pempt. 298.

Colitur in hortis, mensibus æstivis floret, In usu sunt folia cum floribus seu summitates & semen.

E præcipuis carminativis censetur, tussi medetur, lac auget. In passionibus hystericeis commendatur, Urinam atque calculum pellit mensesque ciet, & flatus uterinos dissipat. Venerem suppressere atque visui obesse dicitur. Ingreditur balnea pediluviaque, In agrypnia atque cephalalgia.

Cinis anethi laudatur ad ulcera sordida, & serpentina præsertim Venerea. Tanquam condimentum pluribus quoque ferculis admiscetur.

PROSTANT

Aqua Anethi ex integra planta, Dillkraut-Wasser / Eau d'Anet, do-

dolori capitis in febribus, flatibus discutiendis & singultui sistendo est dicata, sed raro usurpatur.

Oleum Anethi coctum, Dillen = öhl / Huile d'Anet, vires carminativas, discutientes, resolventes, anodynas & paregoricas huic oleo tribuunt, temporibus & abdomini inungitur.

Oleum Anethi destillatum, Destillirt Dillen = öhl / Huile d'Anet distillé. Convenit in Colica sedanda & flatibus discutiendis, cardialgia, singultu &c. ad aliquot guttas assumptum, vel in *Elæosaccharum* redactum. Externe commendatur in cephalalgia & pro somno conciliando, quo tamen in casu recens debet esse, non rancidum.

SEMINA CUMINI ET CARVI.

Sunt Cumini semine longiore C. B. P. semina striata, oblonga, ex cinereo spadicea, foeniculi seminibus longiora & crassiora. Sapore acri aromatico, ingrato. Carvi sunt Cumini pratensis seu Carvi officinarum C. B. P. semina striata, parva, oblonga, tenuia, paululum incurva seu falcata, fusca. Saporis acris aromatici, odoris fragrantis. Hoc testrum illud redolens cumini non habet.

Sale aromatico oleoso temperato admodum anodyno & carminante gaudent, & in tympanitide, flatulentia ventriculi, colica flatulenta tam interne quam externe laudantur.

Semen Carvi gratius est, quam Cumini. Hinc semen carvi felicius interne, cumini vero externe præscribitur.

℞. Sem. carv. saccharo incrust. q. v. datur ad flatulentiam ventriculi, add. Oleum proprium destillatum pro stimulo.

℞. Emplastr. d. cumin. malax. in f. q. Olei cumin. & carvi. in Doloribus ischiaticis, in inflationibus ventriculi & abdominis.

℞. Semin.

℞. Semin cumin. & carv. q. v. contunde, facculo involve, & applica abdomini contra tormina.

℞. Olei carv. dest. gt. iiij. — Menth. ziiij. vel iiij. L. O. gr. i. f. mixtura in cardialgia.

BAC-

Κύμινον, CYMINUM, CUMINUM SATIVUM, CUMIMUM HORTENSE aut ROMANUM, Kymmel / Kymnich / Garten oder Römisch - Kummel / Langer - Kummel / Pfeffer - Kummel / CUMIN.

Ad fœniculum à TOURNEFORTIO refertur.

Fœniculum Orientale, Cuminum dictum Tourn. I. R. H. cl. 7. S. 2. g. 1. Cuminum seminelongiore C. B. Pin. 146. Cuminum sive Cyminum sativum I. B. 3. 2. 22. Cuminum Dioscoridis Lob. Ic. 742. In regionibus calidioribus provenit, & ex Italia atque Insula Malta, ubi copiose feritur, advehitur Semen, quod ex hac planta in usu est.

CARVI, Κάριος, Κάριον, Κάριον, CARUM, à Caria Regione, in qua laudatissimum provenit, CUMINUM PRATENSE, Feld / Matten / Wiesen / Weg / Speiß - Kummel / CARVI.

Est plantæ genus flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis constante cordiformibus, inæqualibus, in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum exiguis, longiusculis, hinc gibbis & striatis, inde vero planis. Addenda sunt folia tenuiter laciniata costæ per conjugationes innascentia.

Carvi Cæsalp. 291. Cuminum pratense, Carvi Officinarum C. B. Pin. 158. Caros I. B. 3. p. 1. 69. Carum Dod. Pempt. 299.

In pinguibus ac lætis campis herbosis & pratis, quæ subinde rigantur frequens nascitur; à Majo mense usque ad Augustum & flores & semen proferens.

Ex utraque planta semina in usum veniunt, & ad quatuor calida majora referuntur. Ex mente ETTMULLERI, omnia, quæ de aniso dicuntur, ad cuminum quoque applicari possunt. Hoc tamen excepto, quod anisum lac promoveat, hoc vero intercipiat.

Applica-

Applicatur scilicet externe cum linteis ad lac arcendum. Menses promovet & tormina parturientium notha sistit jusculis incoctum. Sacculos quoque ingreditur ad tormina sedanda. Prodest in sugillatis & tumoribus frigidis discutiendis.

Semen Carvi ventriculum roborat, ructus compescit, graveolentiam oris corrigit, acidum temperat, in melancholia, vertigine, convulsivis intestinorum malis, herniis, cardialgia, torminibus stomachi à potu nimio ortis, usu tam interno quam externo se commendat. In jusculis sæpissime adhibetur, ad dolores parturientium nothos, quos mitigat, veros autem adauget, dolores quoque post partum mitigat. In mensium quoque negotio locum habet. Virtute diuretica gaudet, de cætero cum cumino coincidit. Cum aceto ad lac imminuendum applicatur.

Pani adjectum apprime conducit, caseis appositum jucundo illos commendat odore. In aliis quoque ferculis usurpatur. Semen hoc ut JOH. BAUHINUS loquitur, crassiuscule tritum, sacco exceptum, calenteque vino conspersum, exterius impositum, non tantum aurium doloribus, ex defluxu frigido ortis confert, verum etiam dentium cruciatus lenit.

EX HIS SEMINIBUS OFFICINÆ ALUNT

Oleum Cumini, Rûmmel ôhl / *Huile de Cumin*, prodest ad tormina & inflationes abdominis, præsertim infantum, adhibetur ad affectus Ventriculi in Balsamis & oleis stomachicis. Odorem suum Urinæ fortiter communicat.

Emplastrum de Cumino, Rûmmel Pflaster / *Emplâtre de Cumin*. Roborat, resolvit, flatus discutit, conducit ad fracturas & luxationes.

Oleum Carvi, Matten Rûmmel ôhl / *Huile de Carvi*. Conducit in stomachi & intestinorum affectibus, colicæ medetur, flatus pellit tum externe, tum interne. Externe miscetur oleis & linimentis. Interne ad aliquot guttas datur in vehiculo appropriato, aut cum Saccharo. Urinam quoque promovet, eamque suavis odoris reddit. Clysteribus quoque immiscetur carminativis.

BACCÆ JUNIPERI.

Sunt Juniperi vulgaris fruticosæ C. B. P. baccæ rotundæ

dæ per maturitatem nigricantes, includentes sub tenui pellicula pulpam, acinos tres oblongos triangulos, saporis subacris subdulcis & resinosi, odoris fragrantis. Vis consistit in pulpa interiore.

Harum Θ aromaticum oleosum & quodammodo Thebinthinatum, cæteris excellit in promovenda Urina, sudore, Ventriculi flatulentia, in mensium obstructione, præcavendo calculo, & ad resolvendas Catarrhofas obstructiones. Hydropicis singulariter conveniunt ob virtutem stomachicam & diureticam. Externe laudantur in suffitu ad Catarrhos & membra Paralytica. Dantur in substantia ad ʒj.

℞. Racc. Junip. ʒj. \circ d. junip. gt. iiij. rad. rub. tinct. gr. xv. f. p. capiendus ex convenienti liquore ex ∇ gramin. vel ∇ al. dest. propria, pro diuresi excitanda.

℞. Rad. Angelic. Levistic. ana ʒß. rorismar. Matricar. sabin. ana Mj. bacc. Junip. ʒiß. Cinam. ʒiiij. Croc. or. gr. xv. vel ʒj. Θ \square ri ʒj. affund. Vin. q. s. ad mensium obstructionem chronicam, adde si menses instant Rhabarb. ʒij. hell. n. ʒj. f. infusum.

℞. Roob. Junip. ʒiiij. rhabarb. ʒiiij. Cinam. ʒj. f. Elect. diureticum, hydropicis convenientissimum, add. roob. sambuci.

℞. Spiritus Junip. ʒiiij. bals. Peruv. ʒj. f. lavamentum ad dolores partium à Catharrhis ortos.

Olei destillati guttulæ aliquot pulveribus antifebrilibus adduntur.

℞. Olei Junip. gt. iiij. Ocul. 69. ʒj. Θ prunell. gr. xv. sacch. ʒn. ʒß. L. O. gr. ij. f. p. contra febres intermittentes.

℞. Vin. Junip. ʒiiij. Tinct. Nephritic. ʒj. \sim . Carmi. Sylvii ʒß. f. mixtura diuretica.

Vinum

Vinum Juniperinum paratur si musto baccae ejus contusae injiciantur & fermentent simul.

BAC.

Α'νγευθ'ης, α'νγευθ'ος, quod ejus odorem reptilia fugiant. JUNIPERUS, quod juniores semper baccas pariat, Weckholder/ Wachholder/ quasi Machalter/ Weckholder/ quasi Wegholder/ quoniam ad vias crescit. Genevrier. GENEVRE.

Est plantæ genus flore amentaceo pluribus nempe foliolis apicibus donatis constante, fructus autem seu baccae ossiculis turgent angulatis semine foetis oblongo. His notis addenda sunt folia simplicia & plana.

Sequentes duæ species potissimum in usu.

Juniperus vulgaris fruticosa C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis J. B. I. 293. Juniperus Dod. Pempt. 852. Weckholder, Staud/ Wachholder, Staud/ Krammet, Staud/ GENEVRE ORDINAIRE.

Juniperus vulgaris arbor C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris celsior & arborescens Clus. Hist. 38. Weckholder, oder Wachholder, Baum/ Krammet, Baum/ GRAND GENEVRE.

Sunt qui dicunt. Juniperum dividi in marem & foeminam, fructus ferentem & sterilem: florem habens Mas pulvisculum apicibus inclusum fundit, qui ex mente RAJI, foeminarum baccis aspersus, spermatis masculini modo foecundantis inservit.

Perpetuo viret Juniperus & quasvis fere aëris injurias spernit; floret Aprili & Majo. Juniperus frutex in omnibus fere occurrit Regionibus, Arbor paulo rarior est: frutex, si bene colatur, etiam in arborem excrescit. Ex utroque in usum trahuntur Lignum, Gummi & fungus. Ex frutice autem potissimum usurpantur baccae α'νγευθ'ιδες, Wacholder / Weckholder, Beeren / Krammet, Beeren / GRAINS OU BAYES DE GENEVRE. Cum Botanographis de his baccis notat SEBIZIUS, juniperum uno eodemque tempore triplicis generis baccas gerere, hornas, quæ virides plane immaturæ, anniculas, quæ semimaturæ, & bimulas, quæ nigrae & ad maturitatis perfectionem progressæ. Colliguntur baccae istæ tempore autumnii.

Lignum juniperi est compactum, albescens, & subinde rutilans, saporis nullius, nec manifesti odoris, nisi fricetur durius, aut accendatur. De umbra Juniperi quidam dicunt, quod sit noxia. Hoc lignum falso venenatum creditur, ut ANGELUS SALA docte in HYDROLOGIA differit, scribens. Vana est persuasio, lignum juniperinum esse venenum & hominibus necem inferre, per somnium scripsere & pro insanis habentur, qui hoc in Germania dicunt. Vires dicitur obtinere cephalicas, unde in Cucuphis adhibetur. Sunt, qui asserunt, hoc lignum succedaneum esse posse, imo præferendum Ligno Sassafras, & Quajaco, ob vim diaphoreticam & aperientem in Lue venerea. In Cineres redactum & in Vino infusum contra calculum & hydropem facit. Lixivium, si eo caput lavetur, visum acuit, & pediculos arcet. Alias ejus flamma pro aëre purificando, imprimis si Martio cadatur, adhibetur, cum bene oleat, præsertim tempore contagioso; quem in finem etiam farmenta seu folia cum Ligno & baccis, aut etiam baccæ ipsæ tantummodo usurpantur. Suffitus quoque hic serpentibus adversus esse fertur. Ne dicam quid de incantationibus. Parantur exinde quoque vina & cerevisiæ medicamentosæ. Tornantur exinde pocula ad catarrhos & articulorum dolores. An turiones seu teneræ juniperi summitates purgent æque ac turiones sambuci ulteriori experientiæ relinquitur. Fungus Juniperi qui Majo præsertim mense musci instar adnascitur, inservit aquis ophthalmicis sed raro est in usu. Dicunt hunc fungum mollem, instar pultis flavescentem vitro inditum in liquorem solvi ophthalmicum non solum, sed & membris paralyticis convenientem & omnem contracturam curantem. De Gummi vide infra sub Sandaracha.

Baccæ juniperi, quas quidam Aroma Germanorum appellant, revera polychrestæ sunt, & præter virtutes allegatas, alexipharmacæ, nervinæ, cephalicæ atque ophthalmicæ existunt; in affectibus Hystericis, mensium obstructione prosunt, prosunt & in scabie aliisque affectibus cutaneis. Lympham vitiosam corrigunt. Arillos baccarum in Lue Venerea commendant. In peste morbisque contagiosis jejuno ventriculo deglutuntur, æque ac ad calculum frangendum præcavendumque, præsertim si usus continuetur. Sunt tamen qui dicunt: Baccas has, si interne nimis sumantur, frequentius nocere & mictionem cruentam interdum ciere. Externe suffitus bacca-

rum

rum, quo pauperes præsertim utuntur, destituti aliis suffumigiis, in catarrhis etiam prodest. Hodiernis temporibus haud infrequenter hæ baccæ vel leviter attritæ vel tostæ instar Caffæ aut Thée infunduntur vel decoquuntur, & ad supra dictos scopos adhibentur. In usum diæteticum quoque cedunt tanquam egregium condimentum, cibis non ingratum conciliant saporem. Imprimis carnibus ferinis sapissime admiscuntur.

OFFICINÆ PLURA EX JUNIPERO ASSERVANT PRÆPARATA. PROSTANT VIDELICET SEQUENTIA.

Aqua Juniperi ex baccis, sine prævia fermentatione destillata, *Wachholder-Beer-Wasser/ Eau de bayes de Genevre.*

Oleum baccarum Juniperi, Wachholder-Beeren-Öel/ Huile de bayes de Genevre. Colicis & nephriticis utile est, urinam pellit & partes urinarias abstergit. Ventriculum roborat, flatus discutit, obstructions viscerum, imprimis hepatis reserat, in ictero, hydropse prodest, ad menses, secundinas & foetum pellendum inservit. Lumbricos necat, veneno etiam pestilentiali resistit, in febre quartana scorbuto, contracturis, pectoris affectibus, & nescio quibus aliis, deprædicatur. Datur ad aliquot guttas. Externe ingreditur unguenta nervina & antiparalytica & vulneraria. Ad tumores & concretiones duras resolvendos, ad ulcera manantia, fistulosa imo cancro-sa, ad perniones ariduram, contracturam paralytin, ulcera cacoëthea imprimis Venerea, dolores arthriticos varios, deprædicatur.

Oleum Ligni Juniperini, Wachholderholz-Öel/ Huile de bois de Genevre. Hoc usui potissimum externo est destinatum, in affectibus nervinis, ulceribus dysepuloticis, pernionibus, scabie aliisque ante dictis affectibus, imprimis in morbis à causa frigida, ut loquuntur, ortis.

Spiritus Juniperi per fermentationem ex baccis paratus, Wachholder-Spiritus Esprit de Genevre. Remedium est stomachicum, aperiens & diureticum, à calculo quoque præservare dicitur; in affectibus capitis partiumque nervosarum conducit. Datur cochleatim. Externe in affectibus colicis, ventriculo frigido affectibusque renum prodest, in articulorum & partium nervosarum doloribus, lationibus & contusionibus laudatur. Quod si ex baccis citra fermentationem, per Spiritus Vini ab iisdem abstractionem paretur, uti hoc

fieri consuevit, longe gravior evadit, appellatur *Spiritus Vini Juniperinus*, *Wachholder-Brandtentwein*/ *Eau de Vie de Genevre*.

Roob Juniperi, *Wachholder-Muß*/ *Rob de bayes de Genevre*. Sudorem movet, alexipharmacum est & Rusticorum Theriaca; commendatur etiam in stomachi morbis & flatibus pellendis, ut & in urina & calculo eliminando. Hydropicis quoque ut & in cachexia serosa datur ad $\text{zj. } \frac{3}{4}$. &c.

Elixyr Juniperinum sive *Malvaticum Juniperinum*, *Wachholder-Elixyr*/ *Elixyr de Genevre avec Malvoise*. Tuto ad aliquot drachmas, ad unciam dimidiam, sive ad cochleare unum ad aliquot dari potest pro scopo diuretico Lithonripticoque atque in hydrope, ubi multum conducit.

Sal Juniperi, *Wachholder-Salz*/ *Sel de Genevre*, sive jam ex ligno, sarmentis, vel baccis incineratis paretur, unum enim idemque est; nec ab aliis salibus vegetabilium per incinerationem paratis, ratione virtutum, quicquam discrepat.

Tandem mentio quoque facienda tantopere decantati *Vini Juniperini*, *Wachholder-Wein*/ *Vin de Genevre*, quod paratur imprimis infundendo in vino bono baccas, quoad partem leniter contusas, quoad partem autem integras, vel solas, vel cum uvis generosis, addendo etiam pro lubitu passulas majores, corticesque Citri. Sunt qui baccas cum musto fermentare sinunt. Vinum hoc diureticum est, calculus exturbat, conducit in hydrope, mensium suppressione, stomachicum quoque est & pectorale. Eodem modo parari potest *Cerevisia Juniperina*.

B A C C Æ L A U R I.

Sunt Lauri vulgaris C. B. P. baccæ oblongæ, rotundæ, nigricantes, sub pellicula tenui includentes nucleum geminum nigricantem, saporis acris amaricantis aromatici oleosi, odoris non ingrati.

Blandum suum oleosum aromaticum \ominus fovent in \circ crasso admodum, anodyno & hypnotico, virtute diuretica & Uterina conspirant cum baccis Juniperi, his tamen virtute carminativa & anodyna longe superiores sunt.

Hinc

Hinc specificè prædicantur in Colica, Paralyfi, doloribus & Uteri vitiis, in febribus malignis singulare & blandum sudoriferum constituunt, præcipue si camphora addatur. Externe applicatæ conveniunt in inflatione ventriculi, paralyfi, convulsione, ileo, ischuria, doloribus post partum, colicis doloribus, item in enecandis pediculis, nam odorem non ferunt, in sananda scabie & maculis faciei.

Cave ne nimia quantitate exhibeantur, quia ob sui oleositatem facile Vomitus causant.

℞. Raf. lign. sassafr. ℥ij. rorismar. Mj. bacc. laur. ℥j coq. in ∇ & vino ad Paralyfin.

℞. Bez. min. gr. xv. Θ volatil. C. C. gr. v. vel vij bacc. laur. 3℔. f. p. quietem concilians in doloribus.

℞. Flor. chamom. Mij. bacc. laur. 3ij. f. decoct. vase clauso leni Δe, adde colaturæ ∞ expr. bacc. laur 3j. f. Clyster in colica optimus.

℞. Bacc. laur. cort. aurant ana q. v. infunde vin. q. f. exprime fortiter, expressum exhibe in colica passione.

℞. Flor. Δis, † diaphoret. bacc. laur. ana 3℔. M. f. p. diaphoreticus de die usurpandus in febribus malignis, addi possunt Camphoræ gr. vij.

℞. Bacc. laur. 3j. borrac. gr. vj. cinam. ac. gr. xv. ∞ Mac. gt. ij. M. f. p. in mensium remora cum dolore.

℞. Flor. Cham. Mvj. fol. Malv. Mij. flor. sambuc. Mj. bacc. laur. ℥j coq. c. ∇ cui insideat iliacus.

℞. Olei bacc. laur. expr. 3℔. (si pluscula dosis exhibetur Vomitus sequitur ob oleositatem, non tamen molestus vel noxius) ∞ spicæ. thereb. anagt. v. ∞ succin. gt. j. camph. g. j. ∞ N. M. expr. gr. v. M. f. Balsamum pro ij. vel iij. dosibus, ex Cerevisia calida exhibent, idem balsamum applica partibus convulsis, præcipue infantum externe.

℞. Olei

℞. Olei laurin. expr. ℥℥. Castor. ʒj. ʒo dest. chamom. ʒ℥. f. liniment. ad dolorem iliacum, colicum aliove.

℞. Olei expr. bacc. laur ʒj. ung. Mart. ʒij. & f. ung. quo inungatur regio pubis infantum & subito fluet Urina suppressa.

℞. Olei expr. bacc. laur. ʒij. flor. ʒis. ʒij. sacch. ʒni. ʒj. Camph. ʒij. f. liniment ad scabiem: addi possunt ꝑ dulc. ʒij. Elect. ex bacc. laur. ad ʒj. datur cum camph. gr. v. & ʒis vol. succin. gr. xv. pro ij. vicibus, constituit bolum sudoriferum, anodynum & carminativum.

℞. Olei d. bacc. laur. gt. iij. L. O. g. j. cran. human. ʒ℥. M. f. p. anodynus in colica ab acido.

CAR-

LAURUS à laude, quasi laudea, seu Laurea, forsan dicta, quoniam coronæ ex Lauro laude dignis & victoribus olim imponebantur. Dicitur quoque Δάφνη, **DAPHNE**, à Daphne Penei Thesaliæ amnis filia, in arborem hanc, ut insequentis Apollinis æstus effugeret, mutata, ut fabulantur. Hinc etiam postea Apollini adamatam & sacratam esse voluerunt, quapropter poetæ coronis ex Lauro cinguntur. *Eoorbeer: Baum/ LAURIER.*

Est arbor flore monopetalo, pelvisiformi, multifido, è cujus fundo surgit pistillum, quod deinde abit in fructum plerumque ovatum, seu baccam, cujus cortici subest testa unicapularis semine foeta ejusdem pene formæ.

In usu præsertim est

Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. **Laurus I. B.** t. 409. **Laurus mas & foemina** Tabern. Icon. 950. **Laurier franc.**

Arbor est perpetui viroris. In Italia & Hispania sponte provenit. Colitur etiam ornatus & utilitatis gratia in plurimis hortis. Florere dicitur in Regionibus calidioribus Martio & Aprili, fructus autumno maturescunt, nisi que decerpantur, tota hyeme in arbore hærent. In usum cedunt arboris hujus folia, de quibus infra,
&

& Baccæ. Menses atque fœtum pellunt, hinc sex vel septem baccæ in partu difficili devorantur. Sunt, ait ERTMÜLLERUS, qui δοκίμασιαν instituunt pro cognoscenda fœmina si habeat tumidum abdomen, an gravida sit. vel non; propinant enim haustum vini infusum per diem & noctem super quatuor vel quinque baccas, & dicunt, quod si vomat, sit signum, quod sit gravida, quod si vero non vomat, illam non esse gravidam perhibent. In peste quoque laudantur vel solæ, vel cum granis juniperi. Renes abstergunt & urinam cient.

OFFICINÆ ASSERVANT

Oleum Laurinum expressum, Voorboonen-ôhl / Huile de bayes de Laurier. Rarefacit, aperit & emollit, convenit in affectibus uteri frigidis, in flatibus, spasmo flatulento gravidarum, in colica, paralyti, roborat nervos, resolvit tumores, in scabie sæpissime usurpatur, & quidem in hoc ultimo morbo est remedium triviale, si scilicet purgato aliquoties corpore & præmissis diaphoreticis sanguinemque mundificantibus, sulphur aut flores sulphuris admisceantur & externe corpori scabioso illinatur, cujus tamen tutior usus, si sal tartari admisceatur. Prodest quoque contra pediculos & furfures capitis, necnon maculas cutis.

Oleum baccarum Lauri destillatum, destilliertes Wachholder-ôhl / Huile de bayes de Laurier : Discutit, flatus pellit, contra colicam & passionem hystericam prodest, spasmo flatulento medetur, in paralyti, in doloribus post partum pubi & pectini muliebri illitum, conducit quoque ad mensium suppressionem, dolores aurium sistit & maculas cutis delet: Dosis guttæ tres, quatuor &c.

Electuarium de baccis Lauri, Voorbeeren-Electwerg / Electuaire de bayes de Laurier. Carminativum est, discutit, colicæ flatulentæ, urinæ difficultati & passioni Hystericæ medetur, laudatur quoque ad menses ciendos. Dosis est ad drachmam unam usque; sed vix amplius interne datur, potius autem Enematibus carminativis & laxantibus ad ℥j, & ultra admiscetur.

Emplastrum de baccis Lauri, Voorbonen-Pflaster / Voorbeeren-Pflaster / Emplatre de bayes de Laurier. Ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, vesicæ, uteri & partium aliarum dolorem à flatibus aut à frigida, uti loquuntur, intemperie ortum, sanat.

CARPOBALSAMUM.

Sunt Balsami Ægyptiaci Prosp. Alpini fructus oblongo rotundi, rugosi, pisominores, spadiceo fusci in parvum aculeum desinentes, includentes aliquando dum maturescunt exiguam medullam balsamicam oleosam albicantem, odoris grati, aliquando nullam medullam includunt, sed putamen tenerum est incassum.

[Conf. Prosp. Alpin. dialog. de Balsamo cap. 6. p. m. 75.]

Nascitur nullibi sua sponte, colitur in hortis magnatum, habet folia instar ligustri. Conveniunt cum Balsamo Ægyptiaco, vel Opobalsamo, quod vid. suo loco. Vis consistit in resina liquida seu succo balsamico fructuum cavitati incluso.

℞. Spec. diamb. ʒβ. lign. aloës, carpobalsami ana ʒij. affund. ℥. rosar. ardent. q. s. f. essentia, ejus gt. xx. ex syr. chermes pro cardiaco exhiberi possunt.

Commendatur in India ad gonorrhœam sistendam. ℞. Carpobals. ʒj. oss. sep. rhab. tost. ana ʒj. M.

℞. Carpobals. ʒj. affund. ʒo Hyperic succin. Junip. vel Therebinth f. balsamum Vulnerarium internum & externum.

SEMI-

BALSAMUM, βάλαμον, sunt qui hoc vocabulum Hebraicum esse volunt. Bal enim seu Baal Dominum significat, Samen pinguedinem, oleum, unguentum, quasi unguentorum Princeps seu Dominus. BALSAM Arabibus, Balsam-Baum.

ALPINI descriptio Arboris Balsamiferæ hæc est. Balsami planta ab antiquis Arabiæ Medicis Belossan vocata est arbusculum, quod crescit ad altitudinem Ligustri vel Cytisi, folia paucissima gerens

rutæ

rutæ proxima, non tamen iis candidiora, sed potius colore viridi subalbido perpetuoque virentia. Ejus lignum gummosum leneque apparet, colore exterius subrubro, cujus ramuli eodem colore conspicui sunt, longi, recti, graciles, paucis foliis inordinatim referti, foliaque simul terna, aut quina, aut septena alæ adnata, aliquo pacto etiam Lentisci foliorum æmula. Sunt ramuli odorati gummosi, digitisque contrectati eis tenaciter adherentes, flores fert parvos albos, Acaciæ proximos, ternos singulis alis appensos, quasi in umbellæ forma, summe odoratos, à quibus semina promanant flava, folliculis nigris subrubescens contenta, valde odorata intusque humorem flavum melli persimilem habentia, sapore sub-amaro parumque acri linguam ferientia, Opobalsamumque redolentia, Terebinthi fructuum figuræ & magnitudinis æmula, extreme aculeata & medium crassum obtinentia. Cum celeberrimus hic vir ipsam Ægyptum invisiverit plantamque ipsam non solum conspexerit, sed & ipse aluerit, insuperque hæc descriptio cum aliorum BELLONII, LOBELII, DAPPERI, relationibus concordet, aut saltem non multum discrepet, illam apponere è re esse judicavi.

De loco Natali quoque inter se authores certarunt, aliis in sola Judæa illam provenisse, adeoque nunc periisse asserentibus, aliis vero cum supra memorato ALPINO atque BELLONIO Arabiam felicem Balsami locum patrium semper fuisse, ac nunquam Ægyptum ac Judæam Balsamiterram patriam asserentibus, cum, JOSEPHO testante, Saba Regina primum ex Arabia Balsami plantam in Judæam dono Salomoni Regi tulerit, ex qua postea aliæ propagatæ fuerunt. De Balsamo Ægypti eadem dicenda sunt, cum eam plantam ibi in viridario prope locum el Mattharia vocato summa diligentia perpetuo custoditam vixisse, omnium Ægyptiorum relatione liquido constet: quod omnes antiqui ac juniores scriptores fatentur, minimeque in alio Ægypti loco inculto unquam vivere inventam fuisse, nonque semel ibi periisse atque ex Arabia, rursus asportatam, insertam ac renovatam fuisse, omnes Cayrini affirmant. Imprimis autem prope urbem Meccha & Medina in monte arenoso provenit, ubi quidem multum ligni & fructuum supeditat, parum autem Balsami. Quod cum vidissent Arabes, in loca fertiliora pinguioraque transplantarunt, ubi majorem copiam ob-

tinent. Ex hac arbore in usum Medicum veniunt Lignum, fructus & Lachryma. Lignum vocatur XYLOBALSAMUM, Balsam Holz/ Bois de Bume, & quod ex dictis locis transmittitur exiguis tantum constat ramusculis fragilibus rectis, nodis inæqualibus obsitis, cortice exteriori facile rubescente, interiori virescente, cui subjacet lignum subcandicans & medullosum, quod fractum odorem gratum emittit ad Opobalsami odorem accedentem. Plures ingreditur compositiones, imprimis Trochiscos Hedychroi in Theriaca. Substituitur autem Lignum Aloes aut Santalum Citrinum, aut juxta quosdam Lignum Lentiscinum. CARPOBALSAMUM sive fructus Balsami vix etiam usurpatur, nisi quod in Theriacam recipiatur, ejus loco assumuntur Cubebæ.

S E M I N A D A U C I.

Sunt vel Cretici vel vulgaris. Cretici sunt Dauci foliis foeniculi tenuissimis C. B. P. semina oblonga, incana, superiori in parte acutiora, villis restricta, saporis acris aromatici grati, odoris debilis.

Vulgaris sunt pastinacæ tenuifoliæ sylv. Diosc. seu Dauci officinarum C. B. P. semina compressa, cinerea, Dauco Cretico breviora, latiora, circa marginem utrinque villo obsita, saporis dauco cretico debilioris, odoris fragrantis.

Utriusque Dauci semina ob Θ blandum osum carminativum conveniunt in calculo, nephritide, mensium suppressione, doloribus post partum ut & in stranguria.

\mathcal{R} . Sem. Dauci $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. infunde in vino albo & exhibe hystericae.

\mathcal{R} . Bacc. Junip. laur. sem. Dauc. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. coq. in Cerevisia, ad nephritidem.

\mathcal{R} . Fol. ribes. nigr. Mj. sem. dauc. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. coq. ex vino rubro contra stranguriam.

[Singulariter contra calculum commendat semen dauci

ci Helmont. de Lithiasi c. 1. §. 19. p. m. 14. it. cap. 7. §. 14. p. m. 39. it. cap. 8. §. 23. p. 48.]

SEMEN

Δάυκος κρητικός, DAUCUS CANDIANUS, Candischer oder Cretischer Bogelnest / Möhren Rüssel / à Tournefortio ad Myrrhidem refertur,

Est enim plantæ genus flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis constante inæqualibus in orbem positis & calyci insidentibus, is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum rostri avium æmulis, striatis, hinc gibbis, inde vero planis. Est itaque

Myrrhis annua semine striato villosa incana Moris Umb. 67. Daucus foliis fœniculi tenuissimis C. B. Pin. 150. Daucus Creticus semine hirsuto I. B. 3. 2. 56. Daucus Creticus Tabern. Icon. 75.

In Insula Creta sive Candia sponte nascitur, colitur etiam in hortis. Solum semen est in usu.

DAUCUS VULGARIS, DAUCUS GERMANICUS, PASTINACA SYLVESTRIS.

Δάυκος ἄγριος, παστίναν ἄγριος, Wilde Pastinack / Wilde Pasteney / Wild Bogelnest / Wilde Möhren. PANAIIS, CAROTTE SAUVAGE, CHYROUIS.

Est planta flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis constante cordiformibus, inæqualibus, in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum subrotundum, ex duobus seminibus compositum, villis ciliorum æmulis instructum & cinctum.

Daucus vulgaris Clus. Hist. CXCVIII. Pastinaca tenuifolia, Sylvestris Dioscoridis vel Daucus Officinarum C. B. Pin. 151. Pastinaca sylvestris sive Staphylinus græcorum I. B. 3 part. 2. 62.

In pascuis & agris Junio floret. In umbellæ medio flosculus purpura rubet, qui ad epilepsiam commendatur. Sunt qui radicibus vescuntur. Alias solum semen in usum cedit & inter quatuor calida minora recensetur. Conducunt etiam hæc semina ad passionem

Hystericam. Semen Dauci Cretici tanquam alexipharmacum in Theriacam, Mithridatium aliasque compositiones recipitur.

SEMEN SESELIOS ET SILERIS.

Sunt Ligustici, quod Sefeli officinarum C. B. P. semina oblonga, striata, ex viridi spadicea, notata per marginem fimbria exigua foliosa, saporis acris amaricantis aromatici, quasi ex corticibus aurantium & cumino mixti.

Vulgaris sunt seselios pratensis C. B. P. semina oblonga striata, foeniculo proxima.

Utraque cum Dauci semine conspirant, sed virtutis sunt remissioris, interim in discutiendis flatibus & mensibus commendantur.

℞. Sem. sesel. dauci. siler. ana ziiij. flav. Cort. aurant. Citr. ana ʒj. infund. vino seu ▽ gramin. ☉ genistæ imprægnatæ f. infusum diureticum.

SEMEN

σέσέλι, SILER MONTANUM, LIGUSTICUM, quia in Liguria reperiēbatur, Sefel / Silermontan / Germontan / Röß Rumm SESELI, SEMONTAINE.

Est planta flore rosaceo & umbellato, pluribus scilicet petalis constante in orbem positis, & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum compositum ex duobus seminibus oblongis, hinc gibbis & sulcatis cum liris veluti foliaceis, inde vero planis.

Ligusticum quod Sefeli Officinarum C. B. Pin. 162. Sefeli sive Siler montanum vulgare L. B. 3. p. 2. 168. Siler montanum Dod. Pempt. 310. In Liguria, montibus Austriacis &c. sponte provenit, litur etiam in hortis Junio florens.

Sefeli pratense, juxta TOURCONFORTIUM pertinet ad Angelicam, & vocatur

Angelica pratensis apii folio Tourn. I. R. H. cl. 7. S. 2. g. 7. Sefeli pratense Silaus forte Plinio C. B. Pin. 162. Silaum quibusdam flore luteolo L. B. 3. p. 2. 170. Siler alterum pratense Dod. Pempt.

Pempt. 310. Wilder-Rosß • Fenchel. In pratis & nonnullis humidis locis provenit florens Junio. Utraque planta semen suppeditat, ultimæ tamen semen vix usurpatur. In usum potius trahitur.

SESELI MASSILIENSE seu MASSILIOTICUM, Massilischer • Sesel / quod ad fœniculum pertinet & dicitur

Fœniculum tortuosum I. B. 3. part. 2. 16. Seseli Massiliense fœniculi folio quod Dioscoridis censetur C. B. Pin. 161. Seseli Massiliense folio fœniculi crassiore Lob. Icon 785.

In Gallia Narbonensi & Provincia circa Massiliam, ut & in provinciis vicinis juxta vias nascitur, & in locis incultis, tum planitiis, tum montibus; floret circa æstatis finem. Colligitur semen circa festum omnium sanctorum, succi plenum, colore ex viridi pallescens. Depressum est quodammodo hoc semen angulosum & oblongum, admodum acre & aromaticum, non multum recedens à figura fœniculi sylvestris, uti CHARAS loquitur. Semen hoc calefacit, aperit & attenuat, in affectibus pectoris, asthmate, tussi, defluxionibus catarrhalibus convenit. Carminativum quoque est atque in calculo & nephritide laudatur, menses foetumque pellit. Remedium quoque est cephalicum & Alexipharmacum, Cicutæ antidotum. Ingreditur Theriacam &c.

SEMEN PETROSELINI.

Sunt apii hortensis Petroselini vulgo C. B. P. Semina parva, oblonga, striata, atrovirentia, saporis acris. Symbolizant cum radice propria, sed sunt præstantiora.

℞. Sem. petrosel. 3^{ss}. cape ex decocto propriæ radice vel affunde ▽ gramin. Ee genist. imprægn. & pone in digest.

Petersilien • Samen / Alexipharmacum censetur, ebrietatem remorari & arcere fertur.

SEMEN APII.

Sunt Apii palustris & Apii officinarum C. B. P. semina parva striata ex fusco spadicea.

Con-

Convenit cum semine petroselini & propria radice, qua tamen potentius est, præcipue in educendo calculo & Urina, commendatur una cum radice in Uteri affectibus.

℞. Sem. apii ʒß. Θ vol. C. C gr. v. cape ex ∇ chelid. maj. vel chærefol. contra calculum vel icterum.

Refertur inter semina quatuor carminativa minora.

SEMEN RUTÆ.

Sunt rutæ hortensis latifoliæ C. B. P. semina parva, recurva, semilunata, coloris modo glauci, modo nigricantis, saporis ingrati, odoris gravis. In capsulis seminalibus omnis vis, ex illis enim plus olei extrahitur quam ex integris feminibus & caulibus rutæ.

De rutæ insigni virtute quæ in feminali capsula concentrata v. cap. de herb. rutæ. Semen commendatur imprimis ad lumbricos, gonorrhœam & extinguendum semen ob nimiam sui siccitatem.

℞. Sem rut. lin. tanacet. ana ʒj. f. p. ad lumbricos add. ꝑ̄ dulc, ʒß.

Semen hoc drachmæ pondere assumptum medetur singultui a flatibus orto.

SEMEN TANACETI.

Sunt Tanaceti vulgaris lutei C. B. P. cum semine rutæ & santonici conspirant, sunt vero quoad amaritiam remissiora, quoad acredinem aromaticam vero intensiora, flatus egregie discutunt. Cum santonico ex ∇ graminis dantur

tur verminantibus pueris & cum ∇ artemisiæ contra Uteri obstructions.

℞. Sem. tanacet. fanton. ana ʒj. ꝯ dulc. ʒß. f. p. contra lumbricos, vel cum conserv. fl. persic. ad ʒj. f. bolus.

℞. Sem. tanacet. ʒß. castor. gr. xv. f. p. exhibendus ex syr. artemis. ʒiij. ∇ artemis. ʒiij. contra Uteri obstructions.

SALE AROMATICO BLANDO CONFORTANTE CONSTANTIA.

GRANA KERMES.

Sunt ilicis aculeatæ cocciglandiferæ C. B. P. Grana excrementitia rotunda, pisi magnitudine, rubicunda, ejusdem foliis adnata, dum recentia plena vermiculis & succo sanguineo, fatiscente in annosis in substantiam raram fungosam concolorem, saporis subacris subamaricantis, odoris non ingrati. Arbor fert glandes in calicibus, floret ut quercus nostrates, sunt igitur hæc grana ut gallæ quercuum excrementa, in trunco & ramis ejus majoribus excrecentia. Adsparguntur aceto, hinc intereunt vermiculi, solent vero illico hæc grana una cum vermibus in syrupum coqui & ad nos deferri ex agro Monspeliensi.

Sale aromatico blando Spiritus augente & confortante constant, unde decantatissima sunt in syncope, lypothymia, palpitatione cordis, Melancholiâ, præcavendo abortu, confortanda memoria, in singultu. Horum vis consistit in interiore pulpa seu in vermiculis inclusis.

℞. Gran. Kerm. ʒß. cap. ex ∇ borag. c. syr. borrag. ad præcavendum abortum.

℞. Ambr. gryf. ʒj. gran. Kerm. ʒij. affund. ʒc Meliss. q. f.

f. ad dissolvendam ambram, sacch. cand. q. s. f. p. dos. à ʒj. ad 3ʒ. ad præcavendum abortum ab Uteri debilitate.

℞ Gran. Kerm. ʒʒ flaved. Cort. Citr. ʒʒ. —us Cortic. Citr. q. s. f. infus vel Essent. dos. cochl. ʒ. pro dosi.

℞ Essent gran. Kerm. cum —u Meliss. fact. ʒiiij. extr. lign. aloës. ʒʒ. syr. flor tunic. vel cinam. ʒv. M. f. mixtura ad confortandam memoriam.

℞. Conf. alkerm. ʒʒ. L. O g. j. conf. flor. borrag. ʒj. M. f. bolus confortans & hypnoticus.

℞. Gran. Kerm. ʒj. Corall. r. præpar. ʒʒ. conf. alk. sin. mosch. ʒʒ. cape ex ovo forbili ad præcavendum abortum.

VAI-

**ILEX COCCIFERA, Scharlachbaum/ Kermesbaum/ Ferk-
Förnerbaum/ DUR CHENE à AIGUILLONS.**

Est arbor flore amentaceo, plurimis nempe staminibus constante, surgentibus è calyce infundibuliformi tenuique capillamento affixo. Glandes autem nascuntur in eadem arbore à floribus separatæ, cupula munitæ, & nucleo foetæ in duas partes fissili. Addantur folia denticulata quidem, sed longe minus sinuosa quam folia quercus.

Ilex aculeata cocciglandifera C B. Pin. 425. Coccus infectoria, Lob. Icon. 153. Ilex coccigera I. B. I 106.

In regionibus calidioribus provenit. In Gallia Narbonensi Languedocia, Provincia, Hispania, Portugallia, ubertim reperitur. In hac jam arbuscula reperiuntur GRANA KERMES, CHERMES, GRANA TINCTORIA, GRANA INFECTORIA, COCCI BAPHICÆ, QUISQUILIA, COCCUM INFECTORIUM, Kermesbeeren / Kermesinbeeren / Scharlachbeeren / Scharlachgrân / KERMES, GRAINE D'ECARLATTÉ.

Videntur nihil aliud esse, verba sunt ETTMÜLLERI, quam ovula vermiculorum circa ilicis folia præsertim deposita, quæ succo ex planta isto loco exesa exsudante involuta, hinc membrana vegetabili cincta granum Chermes constituunt. In ovo hoc successive exclu-

excluduntur vermiculi, nutriuntur succo contento tandemque in muscas transformantur, id quod etiam exinde confirmatur, quod, dum siccatur Kermes, tanta vermiculorum culicumque fere imperceptibilem copia erumpat, ut tota interna substantia in talia insecta conversa esse videatur, remanente sola pellicula. Quem in finem asperguntur aceto. Maturescunt Majo & Junio, & tunc ex iis exprimitur *Succus Kermes*. Magna autem quantitas exsiccatur pro usu præsertim Tinctorio. Colorem videlicet conciliat Chermesinum, atque Scarlatinum. Quare etiam pulpam granorum absque pellicula exsiccant, quam Galli *Pastel d'Ecarlatte* appellant. Cum virtute quoque adstrictoria gaudeant, in stomachi debilitate, diarrhœa, dysenteria, Hæmoptysi aliisque fluxibus commendantur.

ASSERVATUR IN OFFICINIS

Succus Granorum Chermes, *Koher Scharlachbeer* • *Safft* / *Suc de Chermes*. Inservit potissimum ut exinde paretur

Syrupus Chermes, *Scharlachbeer* • *Syrup* / *Syrop de Kermes*. Vires cordiales & alexipharmacas obtinet, abortum quoque præcavet, in hæmorrhagiis conducit. Datur ad unciam unam semis usque.

Confectio Alkermes, *Alkermes*, *Confection d'Alkermes*, quæ prostat completa & incompleta, mit und ohne Biesam und Umbra / complete & incomplete. Virtutes adscribuntur cordiales & omnium viscerum confortativæ atque latificantes & aphrodisiacæ. Dosis ad ʒj. ʒj &c. Quidam illam suspectam habent oblapidem Lazuli, qui tamen metus videtur esse supervacaneus, quamvis à Lapide Lazuli non magnæ possint expectari virtutes. Quidam vero tanti æstiment, ut scribere ausi fuerint, illam mortuos rursus loqui facere; ast ne quid nimis. Externæ cordi & pulsibus applicatur, imprimis in variolis & morbillis, præsertim cum frusto panni Scarlatini.

Trochisci de confectione Alkermes, *Alkermes* • *Täffelein* / *Trochisques* ou *Tablettes d'Alkermes*. Cordiales sunt atque Cephalici, anhelitus quoque suavitatem conciliant,

VAINIGLIA.

Planta est convolvulacea scandens. Fructus sunt instar vaginæ, habent subdulcem, subacrem aromaticam substantiam, in qua grana minutissima, odoris dum recentes gratissimi. Vid. Franc Hernandez.

Salem blandum aromaticum & confortantem in sua mucaginosa substantia fovet, virtute granis Kermes respondet, sed potentius est & simul menses & Urinam pellit, confortat memoriam & spiritus auget.

Datur ejus substantia, ingreditur chocolatam tanquam roborans.

℞. Vainigl. ʒj. infund. ▽ gramin. ferventiss. f. infus. ad ciendas Urinas.

℞. Vainigl. ʒß. conf. alkerm. ʒj. ambr. gryf. gr. iij. in ꝑo cardam. solut. add. syr. cinam. q. f. ad confortandam memoriam, addi potest conserva florum tunicæ.

SEMEN

Hunc fructum ferens planta folia plantaginis sed pinguiora & longiora obtinens, flores vero nigros, à RAJO ita denominatur.

Volubilis filiquosa Mexicana foliis plantagineis Raj. Hist. pl. 1330. Aracus Aromaticus Tlilxochitl seu flos niger Mexicanus dictus Hernand. 38. Vaynillas Hispanis à vaginarum similitudine Piso mant. Arom. 200.

Siliquæ hujus plantæ semipedem fere longæ, dimidium circiter digitum crassæ, utrinque acuminatæ, coloris obscuri, vocantur VANILIÆ, VANILLÆ, BAINILLÆ, Banillen/ Banillen/ VANILLE.

SEMEN CORIANDRI.

Sunt Coriandri majoris C. B. P. semina rotunda, striata,
ta,

ta, ex cinereo fusca, includentia sub cortice tenui medullam subscuam duriusculam, in medio quasi dissepimentis distincta, saporis subdulcis subacris, odoris aromatici.

Ratione Θ is blandi aromatici, & nonnihil oleosi temperati, laudatur tanquam carminativum & stomachicum singulare, tollit quoque cruditates acidas Ventriculi, & inde enatos ructus, flatus, unde in præcavenda vertigine & apoplexia ex vitio ventriculi orta laudatur. Externe in flatulentis herniis laudatur.

Vulgo commendatur coriandrum, quod maceratum in aceto, sed præstat leviter exsiccatum, non maceratum. [Dum recens est habet odorem gravem, virosum, caput tentantem, qui tamen per exsiccationem & progressu temporis evanescit.]

\mathcal{R} . Sem. coriandr. anis. foenicul. ana $\mathfrak{z}\beta$. Cinam. ac. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Mac. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. flav. Cort. Citr. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. pan. biscoct. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sacchar. q. v. f. p. apoplecticus, post pastum capiendus, addi potest aliquid ambrae & moschi.

\mathcal{R} . Sem. Coriandr. $\mathfrak{z}\beta$. sem. cumin. anis. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. \bigcirc crud. $\mathfrak{z}\beta$. Vin. & aq. $\mathfrak{f}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ coq. & applica decoct. hern. flatulentæ, addi potest sem. nasturt. q. f.

SEMEN

$\kappa\omicron\rho\iota\alpha\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon$, $\kappa\omicron\rho\iota\alpha\upsilon$, à cimicibus, quos $\kappa\omicron\rho\epsilon\iota\varsigma$ appellant, folia namque & caules cimices redolere videntur, **Coriander/ Coliander/ CORIANDRE.**

Est planta flore rosaceo & umbellato, plurimis scilicet petalis inæqualibus & cordiformibus constante, quandoque æqualibus, in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum, nunc semisphæricis, nunc sphaericis.

Coriandrum majus C.B. Pin. 158. Coriandrum Lob. Iconu 705. & l.B. 3. p. 2. 89. Colitur

Colitur in hortis & agris, floret Majo & Junio, Julio semen maturefcit, quod in usu præcipue est.

Falsum est, Coriandrum esse venenatum. Oris foetorem emendat & in vomitu multum valet. Antaphrodisiacum quoque esse dicitur. Torrefactum contra diarrhoeam atque dysenteriam laudatur. Commendatur quoque in peste. Sumitur à pastu, ut vapores, sicuti vulgus ait, ad caput ascendentes reprimantur. Menses movere dicitur. Singulare remedium esse ad quartanam E P H E M. N. C. afferunt.

Coriandri semina & pro bellariis offeruntur saccharo obducta, & sine saccharo aliis nonnunquam ferculis tanquam condimentum adduntur.

PROSTAT *Aqua Coriandri, Coriander-Wasser, Eau de Coriandre*, sed rarissimi est usus.

SEMEN NIGELLÆ.

Sunt nigellæ flore simplici minore candido C. B. P. semina angulosa, nigra, saporis subacris.

Ob blandum & aromaticum valde debile & crasso inclusum, commendatur in Catarrhis & coryza tum interne, tum externe, si naribus admoveatur, seu oleo ejus expresso nares inungantur.

Forestus commendat semen ad menses provocandos, præscribitur tam crudum, quam tostum, ut & & expressum.

℞. Sem. nigell. ʒij. & majoran. gt. iij. vel iiij. f. p. naribus admovendus in coryza.

℞. Sem. nigell. ʒij. fol. majoran. p. iij. & majoran. gt. ij. succin. anis. ana gt. j. f. nodulus contra coryzam, addi potest aliquid ambrae & moschi ut & styrac. calamit.

SEMINA

NIGELLA, quasi NIGRELLA, à Semine nigro. Μελάνθιον, MELANTHIUM,

LANTHIUM, CUMINUM NIGRUM, Schwarzer Coriander/
Römischer Kümmel / Nardenkraut / Schabab. NIELLE.

Est planta flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, & corolla donato, inter petala & stamina collocata, quam efformant corpora quædam corniformia. Ex floris medutullo surgit pistillum, quod deinde abit in fructum membranaceum, subrotundum vel oblongum, superne multicornem, multicapitularem, seminibusque foetum.

Ex pluribus Nigellæ speciebus in usum præprimis venit

Nigella flore minore simplici candido C. B. Pin. 145. Melanthium calyce & flore minore semine nigro & luteo I. B. 3. 208. Melanthium Dod Pempt. 303. Colitur in hortis & agris, floret Julio & Augusto. Semen solummodo in usum venit, quod recens præsertim odorem aliqualem aromaticum spirat.

Incidit, aperit, attenuat, Urinam & menses ciet. In affectibus pulmonum à pituita crassa viscida præsertim ortis conducit. In lumbricis necandis laudatur. Lac auget, in febribus quartanis & quotidianis specificum esse fertur. Imprimis autem adversus morbum animalium rabidorum & inde ortam Hydrophobiam per aliquot dies ad 3v. assumptum deprædicatur. Externe vel in suffitu, vel in facculis, vel etiam in cucuphis adhibetur. Radix nigellæ masticata hæmorrhagiam narium sistere dicitur.

SEMINA SALIBUS ACRIBUS FIXIS CONSTANTIA.

SEMEN SOPHIÆ CHIRURGORUM.

Sunt Nasturtii Sylvestris tenuissime divisi C. B. P. semina minuta subrubentia, saporis acris fervidi ad nasturtium accedentis.

Ratione Θ is acris & fixi acidum dysentericum infringunt, Urinam & calculum pellunt, externe ulcera sordida mundant, eorumque acidum corrosivum infringunt.

℞. Sem.

R. Sem. soph. ʒj. conserv. ros. r. ʒiʒ. L. O. gr. j. ʒo N. M. expr. gr. xv. f. bolus in Dysenteria.

R. Sem. soph. ʒʒ. cap. ex ▽ Petrosel. vel gram. vel chæref. ad pellendum calculum & Urinam.

R. Sem. soph. perfoliat. ana ʒj. M. f. p. exhibendus ex decocto symphyti in herniis à nimia humiditate ortis.

SEMEN

SISYMBRIUM ABSINTHII FOLIO, ABSINTHIUM SERYPHIUM, ACCIPITRINA TENUIFOLIA, Welsamen / Wurmsamen / Habichtstrauch.

Est Sisymbrii species, planta videlicet flore cruciformi, quatuor petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum, seu siliquam septo intermedio, cui valvæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque foetam ut plurimum subrotundis. Addenda facies propria totius plantæ.

Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio Tourn. I. R. H. cl. 5. S. 4. g. 8. Nasturtium Sylvestre tenuissime divisum C. B. Pin. 105. Seriphium Germanicum sive Sophia quibusdam L. B. 2. 886. Sophia Chirurgorum Lob. Ic. 738.

In locis incultis, ruderatis, lapidosis ac arenosis exit, à Junio in autumnum florens, & simul semen perficiens.

Non semen tantummodo, sed & herba atque flores quandoque in usum trahuntur. Traumatica est planta, adstringens atque anthelmintica.

SEMEN THLASPI.

Sunt Thlaspi arvensis Vaccariæ incano folio C. B. P. semina parva, oblonga, rufa, saporis acris & fervidi, respondent feminibus sophiæ sed potentiora & acriora sunt. Propterea in rumpendis abscessibus internis, in pellenda Urina & mensibus usurpantur. Cavendum vero ne facile gravidis

gravidis exhibeantur quia Uterum nimis commovent & abortum causantur. Externe ulceribus inspersa, ea mundificant & abstergunt.

℞. Sem. Thlaspi. 3℔. vel ʒij. Theriac. q. s. f. bolus ad rumpendos abcessus.

℞. Sem. Thlaspi. 3℔. cap. ex ▽ Puleg. vel Cinam. vel artemis. ad pellendos menses & Urinam.

SEMEN

Θλάσπι à Θλάω premo, quod fructum habeat planum & quasi compressum, NASTURTIIUM TECTORUM, SINAPI RUSTICUM, Bauren-Senff / Bauren-Kress. MOUTARDE OU SE-NEVE SAUVAGE.

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum subrotundum, planum, ora plerumque foliacea & suprema fissum: in duo loculamenta divisum septo intermedio, respectu valvarum, ad perpendiculum oblique posito, seminibus foetum ut plurimum planis. Addenda folia indivisa.

Thlaspi vulgatus I. B. 2. 921. Thlaspi arvense Vaccariae incano folio majus C. B. Pin. 106. Thlaspi alterum Dod. Pempt. 712. Nascitur in locis incultis, saxosis, apricis parietibus ac tectis, floret Majo, maturescit Junio.

Præter virtutes allegatas vim quoque ptarmicam obtinet.

SEMEN NASTURTII.

Sunt Nasturtii hortensis C. B. P. semina parva, oblonga, sublutea, aliquantum compressa, in cacumen pallidum desinentia, saporis acris amaricantis.

Horum Θ acre penetrantius subtilius & spirituosius quam in semine Thlaspi, respondent cochleariæ virtute, qua tamen paulo debiliora sunt. Singulari quadam proprietate conveniunt in herniis tam interne, quam externe.

Qq

℞. Sem.

℞. Sem. Nasturt. ʒj. cape ex vīno rubro adstringente singulis diebus. ℞. Sem nasturt. album. ovi q. s. f. f. massa applicanda parti herniosæ. Vel ℞. Sem. Nasturt. gumm. Carann. sagapen. M. c. album. ovi applica parti.

Variolas provocat, urinam ciet, lumbricos necat, venerem stimulat. Externe in apophlegmatismis, errhinis, phœnigmis usu venit. Furfures ac fœdam scabiem capitis aliarumque partium sanat tritum, aut frixum cum axungia porcina illitum.

SEMEN SAXIFRAGIÆ.

Sunt pimpinellæ saxifragæ majoris C. B. P. conveniunt cum radice, quo recentiora eo præstantiora sunt.

Semen hoc TRAGUS putat esse Semen Petroselini Macedonici Dioscoridis, unde quidam illud huic substituunt, raro tamen in usum cedit.

SEMINA SALE VOLATILI ACRI CUM OLEO CRASSO CON- STANTIA.

SEMEN SINAPI.

Sunt sinapi rapi folio C. B. P. semina rufa, rotunda, parva, saporis acris fervidi.

Ratione sui salis acris, acida, fixa, terrea crassa & mucaginosa incidunt, attenuant, exterminant, hinc cibis crassis, fumo induratis, sub specie embammatis tanquam appropriatum condimentum adduntur. In malo Hypochondriaco, inflationibus ventriculi, obstructionibus lienis aliisque morbis ab acido pendentibus tam interne quam externe

terne conveniunt. Huc spectant cachexia, scorbutus, affectus soporosi. Venerem quoque stimulant, diuresin promovent. Externe sub forma sinapismi applicantur cuti, ad rubefaciendum, ad excitandas pustulas.

Oleum expressum externe applicatur in Paralyfi & affectibus frigidis.

℞. Sem. sinap. masticetur leviter & volvatur sub lingua, ad præcavendum scorbutum.

℞. Sem. sinap. ʒvj. cardamom. ʒj. caric. ping. n. vj. vel vij. — Cochlear. q. s. f. Elect. contra Apoplexiam.

℞. Sem. sinap. ʒij. succi pastinac. ʒij. o. ovor. formicar. ʒj. f. ung. quo glans inungitur ad tollendam impotentiam. Interne ℞. Elect. diasatyr. ʒij. sem. sinap. ʒß. f. bolus.

℞. Sem. sinap. p. j. bacc. junip. p. ij. infund. — vin. camphorat. vel — C. C. succinat. q. s. applica membro paralytico.

SE-

Σινηπι, quod olfactum oculos lædat, νήπι, Genff / MOUTARDE.

Est planta flore cruciformi, quatuor petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu siliquam septo intermedio, (cui valvæ utrinque adhærescunt,) in duo loculamenta divisam, seminibus foetam ut plurimum subrotundis, & in cornu quoddam fungosum simili semine prægnans plerumque desinentem. Jungatur sapor acris & fervidus Sinapi proprius.

Sequentes species in usu.

Sinapi Rapi folio C. B. Pin. 99. Sinapi siliqua latiuscula glabra semine rufo, sive vulgare I. B. 2. 855. Sinapi sativum prius Dod. Pempt. 706.

&

Sinapi album siliqua hirsuta semine albo & rufo I. B. 2. 856. Sinapi Apii folio C. B. Pin. 99. & Sinapi hortense semine albo ejusdem. Sinapi sativum alterum Dod. Pempt. 707.

Qq 2

Colitur

Colitur in agris, floret Majo & Junio, Julio & Augusto semen maturefcit, quod frequentius est in re cibaria, quam in Medicatione.

Vulgaris illa compositio, verba sunt Sebizii, fit ex farina seminis sinapi, Vino & aceto. Hodie etiam paratur cum musto cocto seu sapa. Excitat appetitum, calefacit stomachum & concoctionem juvat.

SEMENT NAPI.

Sunt Napiativæ C. B. P. semina parva, rotunda, sub-rufa, saporis acris amaricantis.

Remissiore sunt acredine, quam semen sinapi, interne in Variolis & Morbillis pellendis commendantur, de cætero cum sinapi conveniunt.

℞. Sem. nap. aquileg. Card. B. ana ʒʒ. ▽ fœnic. f. chærefol. q. s. f. Emuls. ad Variolas & Morbillos, stimuli loco add. ☉ volatil. C. C. gr. viij. ad ʒʒ.

℞. Sem. nap. sinap. eruc. raphan. ana q. v. affund. ☞ vin. Camph. f. epithema antiparalyticum. ☉ expressum convenit cum ☉ sinapi.

Hoc ☉ in Paralyfi post dolores colicos & ischiaticos feliciter sæpe usus est Hermannus. ℞. ☉ Napi, eruc. sinap. oleris atri. raphan. ana ʒʒ. camph. ʒiij. f. liniment.

SE-

BUNIAS à tumente figura, radix namque ejus in amplitudinem excrescit & in rotundum extuberat. *Stectrüben / Sticrüben / Sticfelrüben / NAVET.*

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum seu siliquam, septo intermedio, cui valvæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibus foetam ut plurimum subrotundis, & in

CORNU

cornu quoddam fungosum consimili semine prægnans plerumque desinentem. Radix est carnosæ tuberosæque, cui addatur facies plantæ propria.

Napus sativa radice alba C. B. Pin. 95. Napus I. B. 2. 842. & Dod. Pempt. 674. Seritur in agris, floret à vere in æstatem.

Radices ad cibos assumuntur. Semen abstergit, attenuat, viscerum obstructions referat. Alexipharmacum quoque est.

SEMEN OLERIS ATRI.

Sunt brassicæ fimbriatæ C. B. P. semina rotunda, glabra, nigricantia, saporis acris aromatici, odoris grati sed debilis.

Convenit cum seminibus napi.

BRASSICA FIMBRIATA, Krauser, Köhl / CHOU CRE-SPE.

Est planta flore cruciformi, quatuor petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu siliquam teretem, longam, cylindraceam, septo intermedio, cui valvæ imbricatæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque fœtam subrotundis.

Brassica Fimbriata C. B. Pin. 112. Brassica Crispa laciniola L. B. 2. 832. Brassica Tophosa Tabern. Icon. 401.

SEMEN RAPHANI.

Sunt Raphani majoris orbicularis vel rotundi C. B. P. semina rotunda, rutila, parva, saporis acris.

Serum crassum incidunt, & ad Urinam deponunt, adeoque cum Napo conveniunt.

℞. Sem. raphan. ʒj. ∇ chærefol. q. s. f. Emuls. diuretica, quæ simul incidit mucum primarum viarum.

Qq 3

℞ Sem.

℞. Sem. raphan. cape ex proprio succo radicis, addito tantillo Θ is communis, pro diuretico & calculo pellendo.
 ℞. Sem. raphan. \mathfrak{z} ij. coq. ex ∇ f. apozema diureticum.

SE-

$\rho\alpha\phi\alpha\upsilon\alpha$, παρὰ τὴν ῥαδίαν φαίνεται, satus namque mature admodum pullulat. RADIX, RADICULA vocatur, quod cæteris radicibus usu sit frequentior, & palato gratior, vel quod cæteras radices vefcas magnitudine superet, aut saltem paucis admodum magnitudine cedat. *Nettich / Raifort.*

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu filiquam corniformem, crassam, spongiosam, duobus seminum subrotundorum ordinibus fœtam, mediastino tenui discretis. Colitur in hortis & agris. Sicuti diversis temporibus feritur, ita & diversis floret. Sequentes species potissimum sunt usuales.

Raphanus major orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. Raphanus sive radicula sativa Dod. Pempt. 676.

Raphanus niger C. B. Pin. 96. & Lob. Icon. 202. &

Raphanus minor oblongus C. B. Pin. 96. Raphanus I. B. 2. 846. Radicula sativa minor Dod. Pempt. 676.

Radix editur, ut SEBIZIUS loquitur, crudus cum sale aut secatur in orbiculos & sale, aceto, oleo & quandoque etiam pipere conditur. Alimentum præbet paucissimum, idque vitiosum, ægre concoquitur, flatus creat, ructus parit olidos, caput replet & gravitatem eidem inducit, menses & Urinam evocat, arenulas renum exturbat, aperiendo, incidendo, attenuando, lienosis prodest.

Succus radicis, item cortex vomitum quandoque movet. Succus etiam hic asthmaticis utilis ut & decoctum, laudatur etiam contra inveteratam tussim. Virtus quoque alexipharmaca adscribitur. Externe apponitur plantis pedum & cervici in capitis doloribus & febribus.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua raphani, Nettich-Wasser / Eau de Raifort.

SE-

SEMINA SALE FIXO AMARO
CONSTANTIA.

SEMEN FUMARIÆ.

Sunt semina rotunda, parva, ex nigro viridantia, saporis amari ingrati. Ob \ominus fixum cum paucis volatilibus laudantur in depurando sanguine ubi acido viscosa, scorbutica, ictericia & scabiosa dispositione laborat, potentior tamen est herba integra, quam vide.

\mathcal{R} . Sem. fumar. 3^{β} . exhibe ex ∇ chelid maj. contra acidas Cachexias.

\mathcal{R} . Sem. fumar. Nasturt. soph. ana \mathfrak{z} j. f. p. diaphoretic. contra scabiem & malum hypochondriacum.

\mathcal{R} . Sem. fumar. 3^{β} . croc. or. gr. vij. Camphor. gr. iij. cape ex conserv. borrag. f. fumar. f. hyperic. contra malum hypochondriacum.

Rarius in usum trahitur. A quibusdam ad alvi fluxus diuturnos celebratur.

SEMEN CINÆ.

Semen Cinæ vel Zinæ, Santonici, Zedoariæ, sanctum, it. sem. lumbricorum.

Sunt Absynthii santonici Alexandrini C. B. P. semina parva, oblonga, quasi ex squamosis funiculis compacta, flavescentia, saporis acris amari, odoris graviusculi.

Vermibus unice sunt dicata, tum quod vermes horum amaritiem ferre nesciant, tum quod horum \ominus ia fixa putridum acidumve vermium nidum destruant.

\mathcal{R} . Sem.

℞. Sem. Cinæ zij. Mannæ zij. solv. in ▽ gramin. cape contra vermes add. ꝑ̄ dulc. gr. vij. pro qualibet dosi, addito saccharo f. rotulæ f. morsuli.

℞. Sem. cin. tanacet. ana ʒj. ꝑ̄ dulc. gr. vij. M. f. p. contra vermes, exhibendus ex decocto radicis filicis, polypod.

℞. Summit absynth. sem. tanacet. Cinæ. ana q. v. f. c. in vini extractum, cujus inspissati cape ʒj. add. ꝑ̄ dulc. gr. vij fac. pilulas ☉ foliat. involvendas contra lumbricos & vermes.

SE-

SEMEN CONTRA VERMES, SEMEN CONTRA, SEMENZINA, SEMENTINA, Wurm-Saamen / Zitterwer-Saamen. POUDRE à VERS, SEMENCE CONTRE LES VERS, SEMENCINE, BARBOTINE, XANTOLINE.

De planta hoc semen generante nondum certo constat.

Semen, quod ex Persia atque Ægypto adfertur, virtute quoque gaudet stomachica & emmenagoga.

Datur ad scrupulum unum ad drachmam.

PROSTAT

Confectio seminis Cinæ seu Santonici; überzuckerter Wurm-Saamen / Confection de Semence contra, quæ admodum usualis.

SEMEN CARDUI BENEDICTI.

Sunt Cnici Sylvestris hirsutioris sive Cardui Benedicti C. B. P. semina oblonga crassiuscula, striata, ex fusco sublutea, saporis insigniter amari.

Salia fixa includunt in mucagine tenui, hinc blandos movent sudores & Urinas, relinquuntque in recessu vim anodynā, & propterea in pleuritide, peripnevmonia, variolis & morbillis commendantur.

℞. Sem.

R₂. Sem. Card. B. Card. Mar. bardan. pap. alb. ana ʒij. ▽ flor. pap. rhœad. q. s. f. Emuls. cum qua cape mandib. luc. pisc. l. dent. apri. l. ʒ diaph. ʒj. contra pleuritidem.

R₂. Sem. Card. B. ʒij. ▽ Cent. min. q. s. f. Emuls. add. Θ prunell. ʒj. exhibe contra febres intermittentes hora ante paroxysmum. add. tinct. Castor. s. Myrrh. s. Θ volat. C. C. exhibe contra Variolas & Morbillos.

Semen Carduibenedicti obstructions viscerum, imprimis jecoris referare fertur. Alias raro in usum trahitur.

SEMENT CARDUI MARIÆ.

Sunt Cardui albis maculis notati vulgaris C. B. P. cum Cardui Benedicti seminibus omnino conveniunt, verum ad fluorem album commendantur specificè.

R₂. Sem. Card. Mar. ʒij. exhibe ex vino saffr. s. ex ▽ foenicul. contra fluorem album.

SE-

CARDUUS MARIANUS, CARDUUS LEUCOGRA-
PHUS, CARDUUS LACTEUS, CARDUUS LACTARIUS,
CARDUUS LACTEIS MACULIS NOTATUS, SPINA ALBA
HORTENSIS, SILYBUM, Marien-Distel/ Margen-Distel/ Frau-
en-Distel / Behe-Distel / Silberne-Distel. CHARDON DE NO-
TRE DAME, CHARDON ARGENTIN, ARTICHAUT
SAUVAGE.

Est planta flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis constante multifidis, embryoni insidentibus & calyce squamato aculeato-
que comprehensis. Embryo abit in semen pappis instructum.

Carduus albis maculis notatus vulgaris C. B. Pin. 381. Carduus Marianus sive lacteis maculis notatus I. B. 3. 52. Carduus Leuco-
graphus Dod. Pempt. 722.

R r

In

In hortis provenit, non raro & secus vias locis incultis: floret à Junio in Augustum usque, altero à quo enatus est anno: interea & semen maturitatem assequitur, quo maturo perit, & ex semine deciduo repullulascit.

Ex hac planta semen præprimis, hinc herba & raro radix in usum trahitur. Pleuritidi dicata est planta ob signaturam. Herba quoque in fluore albo, ictero & hydrope aliisque hepatis affectibus commendatur. Succus herbæ ad ulcera cancrofa laudatur. Radix ad Hæmoptysin & ad dolores dentium prodest. Dosis seminis est ad ʒj.


P R O S T A T

Aqua Cardui Mariæ ex planta tenella, Marien oder Frauen-Distel-Wasser / Eau de Chardon Marie, coincidit cum aqua Cardui Benedicti, & in pectoris affectibus, præsertim pleuriticis, multum deprædicatur.

S E M E N B A R D A N Æ

Sunt Lappæ majoris. Arcii Dioscoridis C. B. P. semina oblonga, striata, fusca, crassiuscula, saporis subamari, subacris, odoris nullius, habent partes mucilaginosas includentes salem alcalinum. Radici respondent in omnibus.

℞. Sem. bardan. ʒij. violar. ʒj. Xanthii ʒʒ. f. Emuls. ex ▽ gramin. ad calculum.

℞. Sem. bardan. ʒij. Card. B. ʒj. f. Emuls. ex ▽ chærefol. cum qua exhibe  *ci. ʒj. contrahecticam & phthisin.

℞. Sem. bardan. violar. ana ʒij. f. ex aqu. gramin. petros. Emulsio diuretica.

S E-

Semen hoc insigne venditatur esse diureticum, ita ut radici etiam à quibusdam præferatur. Exhibetur vel in substantia, vel in infuso in vino albo. Dosis ad ʒʒ, ʒj. & ultra.

S E-

SEMEN URTICÆ.

Sunt urticæ vulgaris urentis maximæ C. B. P. semina parva, compressa, lubrica, spadicea, lævia, saporis subacris & tenuis.

Romanæ sunt urticæ urentis pilulas ferentis i. Diosc. semine lini C. B. P. semina pene orbicularia, compressa, lubrica, lævia, ex spadiceo nigricantia, saporis subacris, pinguis, cum quadam tenuitate.

Majoris, minoris & Romanæ gaudent Θ e diuretico o ϕ sa quasi mucagine temperato, unde non tantum in affectibus renum & vesicæ, sed etiam in phthisi, tussi, dum materiam peccantem ad Urinaria vasa deducunt, profunt. Laudantur specificè in qualibet interna hæmorrhagia, nempe hæmoptysi, vomitu sanguinis, mictu cruento, fluxu hæmorrhoidum.

\Re . Sem. urtic. test. ovor. N. M. tost. f. p. ad dysuriam, omissa N. M. pellit quoque Urinam, capiendus ex succo urticæ.

\Re . Sem. urtic. \mathfrak{z} ij. Carthami. \mathfrak{z} j. ∇ Hyssop. q. s. f. Emuls. contra tussim, addi quoque potest tantillum syrupi papav. l. violar.

\Re . Sem. urtic. \mathfrak{z} j. cape ex succo proprio seu decocto ad quamvis hæmorrhagiam.

\Re . Veron. Mij. heder. terr. Mj. rad. helen. $\mathfrak{z}\beta$. ir. florent. \mathfrak{z} iiij. coq. in ∇ addito hydromell. \Re . Hujus decoct. q. v. fac cum semine Carthami & urticæ Emuls. contra tussim.

SE-

URTICA ab urendo, quod pruritum & pustulas excitet. κνίδη παρὰ κνίζεν à pruriendo, ἀκαλύφη, Mesel / Brennefess.
ORTIE.

Est planta flore apetalò, plurimis scilicet staminibus calyci insidentibus constante & sterili: Embryones enim iis speciebus urticæ innasci solent, quæ flore carent, abeuntque deinde vel in capsulam bivalvem semine fœtam, in globulos quandoque congestam, vel abeunt in volsellam qua comprehenditur semen. Species sequentes usuales sunt.

Urtica urens maxima C. B. Pin. 232. Urtica vulgaris major I. B. 3. 445. Urtica urens altera Dod. Pempt. 151. **Große Brennessel / große gemeine Nessel / Brandnessel / Donnernessel / GRANDE ORTIE.**

Urtica urens minor C. B. Pin. 232. Urtica minor annua I. B. 3. 446. Urtica urens minima Dod. Pempt. 152. **Kleine Brennessel / Heiternessel / Habernessel / PETITE ORTIE.**

Urtica urens pilulas ferens I. Dioscoridis semine Lini C. B. Pin. 232. Urtica Romana sive mas cum globulis I. B. 3. 445. Urtica urens prior Dod. Pempt. 151. **Römische Nessel / Welsche Nessel / Spanischer Majoran. ORTIE ROMAINE.**

Duæ priores passim, locis præsertim arenosis, ad sepes & margines hortorum ac muros, item in sylvis, quandoque in hortis odioso reptatu crescunt, vigent æstate, semen Julio & Augusto maturescit. Ultima in hortis colitur.

Hanc plantam manus contrectantium acriter percellere & quasi adurere, res in vulgus notissima est, unde autem talis vis prodeat, non consentiunt. Quidam ad sal causticum provocant in urtica latitans, alii hanc herbam non urere, sed aculeis suis pungere volunt. In universa enim herba, imprimis in foliis, microscopii ope observantur aculeiformes imò & triscupides adeoque horridissimæ spinæ, quibus tota urticæ superficies abunde obsita est, unde aculeis suis evidenter pungit, & ex dolorifica hac compunctione postmodum suboritur læsæ cutis ardor. Malunt tamen alii ad succum quendam corrosivum propterea confugere, quoniam Hœckius in micrographia, in urticæ folio observavit, Spiculis acutissimis illud esse coopertum, cujus basis, quæ ex Sacculo aut vesica flexibilis substantiæ constat, & figuram fere cucumeris sylvestris refert, liquorem acrem & venenosum habeat inclusum, cuspidem autem ex substantia constare durissima & validissima, inque medio foramen habere aliquod, ex quo liquor ille venenosus in partem læsam se insinuet, & dolorem
ibi

ibi excitet. Id quod facillime observare licet per accuratum aliquod microscopium, siquidem extremitas illorum spiculorum contra basin prematur digito. Tunc enim per illos aculeos pellucidos manifesto ascendere & descendere apparebit liquor. His autem non obstantibus melius videntur facere ii, qui urticæ urendi vim cum BAUHINO aliisque, imprimis LANGIO, in Dissert. de morbillis, spiculis acutissimis in planta ista occurrentibus asserunt. His namque flaccescentibus aut tritura fractis & conquassatis, pungendi vis adimitur, sicque tuto ad compescendas narium hæmorrhagias adhibentur. Succus præterea ille, linguam si judicem admittamus, ab imputata acridinis culpa immunis omnino deprehenditur, lenemque potius aliqualem adstringendi, non corrodingi facultatem obtinet. In spiculis autem dictis, inquit idem LANGIUS, licet microscopiorum ope cavitas revera occurrat, succum tamen in eis, qui quidem in basi eorum vesicæ in modum ampliata stagnat, reperire non potui, uti neque foramen illud extremitati innatum microscopia mea, licet alioquin non contemnenda, detegere valuerunt, à melioribus forte manifestandum.

In usum Medicum veniunt urticæ maximæ radix, semen & folia, Minoris herba & Romanæ semen.

Radix urticæ ad ʒj. vel ʒij. ad calculi præservationem atque ad icterum laudatur. Cum vino cocta ad tusses, dyspnœas & uvulæ affectus commendatur, in scabie quoque conducit, decoctumque ejus odontalgiam sedat. Radix in hæmorrhagiis naribus immittitur, aut in manu detinetur. Radices urticæ majoris, si copiosius coquantur, annotante HOFFMANNO in SCHROEDERUM, rei immixtæ luteum colorem conciliant, quas & vulgus in ovis colore imbuendis adhibet, veluti eadem purpureo tingit colore per radices salicis rotundifoliæ. Turiones urticæ in brodio carniū cum sale, butyro ac pipere coquantur & comeduntur.

Folia ventrem molliunt, flatu discutiunt, calculum & arenulas expellunt, quem in finem etiam infusum turionum Thei forme celebratur, reserant obstructions lienis & hepatis, conducunt in suppressione mensium, in arthritide vaga & contractione nervorum, tum externe, tum interne. Foliis recentibus percutiuntur membra paralytica & aridura laborantia. Paralyticis certe urticationem cum CALSO multi suadent Medici.

Rr 3

Frigida

Frigida quoque genitalia à lascivis per ejusmodi urticationem excitantur, testantibus id EPHEM. NAT. CUR. BARTHO-
LINO de Usu FLAGRORUM &c.

Dolores ab urticis excitati mitigantur foliis Sambuci tritis & appositis, alii loca affecta terra fricant, alii inungunt oleum. Succus Urticæ interne & externe in fluxibus, hæmorrhagiis, ut & in fluore albo prodest naribuque attrahitur: folia quoque contusa fronti, collo, aut plantis pedum applicantur, naribus quoque induntur. Decoctum urticæ ad tineam, ulcera serpentia & sphacelum commendatur. In ulceribus ani & pudendorum quoque celebratur urtica. In semine vim aphrodisiacam, antihystericam, & alexipharmacam latitare tradunt, unde in variolis & morbillis prodesse & Hyoscyamo, cicutæ, fungis venenatis atque morsibus animalium rabidorum resistere fertur. Semen porro in infuso quoque Theiformi usurpatur. Nimio usu urtica Hecticam inducit & lente interficit juxta SCHYRONIUM.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua urticæ, Nessel-Wasser / Eau d'Ortie, quæ pectoralis est, antipleuritica & diuretica, & *Conserva Urticæ, Nessel-Zucker / conserve d'Ortie*.

SEMINA CONSTANTIA SALE
BLANDO DIURETICO.

SEMEN ALKEKENGI SEU
HALICACABI.

Sunt Solani vesicarii C. B. P. baccæ rotundæ, cerasi magnitudine, inclusæ folliculo folioso, per maturitatem rubente, continentes sub pellicula tenui pulpam flavescentem, in qua semina compressa, orbicularia, rugosa, saporis subacris, subamari, odoris nullius evidentis. [Fructus hi dulcacidi solo contactu digitorum levissimo amarescunt. conf. G. H. Welsch. obs. Med. Phys. Hecatost. 1. O. 9. p. 10.]

Fructuum

Fructuum horum virtus contra icterum, sanguinem con-
grumatum, arthritidem, stranguriam, Urinæque remo-
ram consistit in Θε diuretico, qui materiam morbificam
per vasa Urinaria excludit. Fumus seminum ore exceptus
mire prolicit vermiculos ex cavo dentis. Datur eorum sub-
stantia, trochisci, ∇ destillata cum corticibus Citri lauda-
tur ab Ettmullero. [Cum cort. Citri præbet ∇am Nephri-
ticam ab Hœfero in Hercule Medico l. 3. p. m. 167. descri-
ptam & laudatam.]

℞ Sem. alkek. ʒj exhib. in ℞u vel vino Junip.

℞. Sem. alk. ʒβ. cape ex ∇ chel. maj. contra icterum.

℞. Ocul. ⚥. sem. alkek. ana ʒj. sperm. Cet. ʒβ. Θε vol.
C. C. gr. v. f. p. cap. ex ∇ chæref. ad dissolvendum sangui-
nem congrumatum.

℞. Fruct. alk. q. v. Infund. ℞u Junip. facto per ferment.
f. essentia diuretica, quæ si exhibeatur cum Tinct. Casto-
rei valet, si Urina suppressa à causa quadam Paralytica.

[De virtute diuretica baccarum alkekengi seq. histo-
riam habet Arnold de Villanova in libro de vinis his verbis :
Fuit tempore meo Cardinalis quidam, qui jam per quatri-
dum Urinæ abnegationem passus est, & ut dicitur, despe-
ratus, nullis aliis proficientibus Medicinis, qui de consilio
parvi Medici per potum vini alkekengi liberatus est, &
soluta est Urina in quantitate, ut impleretur quasi concha
una. Ex eo solo experimento Medicus ille cum parva sci-
entia & pauper, factus est magnus & dives & multis qui-
dem Deus dat gratiam & affert utilitates & contra, & to-
tum est, quia judicia Dei abyssus multa.]

SE-

Ἀλικάκαβον, Φύσαλις, HALICACABUM, SOLANUM
VESICARIUM, VESICARIA, CERASA JUDÆORUM, Ju-
deno

den-Kirschen / Juden-Hüttlein / Schlutten / Blasen-Kirschen / Boberellen / COQUERET, BAGUENAUDES.

Est planta flore monopetalo rotato & multifido, ex cujus calyce campaniformi surgit pistillum, quod abit in fructum mollem Cerasiformem, seminibus foetum ut plurimum planis & involutum folliculo quodam membranaceo, qui aliud nihil est, quam calyx longe ampliatus.

Alkekengi Officinarum Tourn. I. R.H. cl. 2.S. 7.g. 3. Solanum vesicarium C. B. Pin. 166. Solanum Halicacabum vulgare I. B. 3. 609. Solanum vesicarium Dod. Pempt. 454.

Locis umbrosis aliquantulum humentibus provenit, Majo, Junio & Julio floret, autumnus fructus maturescit.

Baccæ in usu tantum, refrigerant, aperiunt, calculum imminuunt, virtute quoque anodyna gaudent.

IN OFFICINIS ASSERVATUR

Aqua Alkekengi, destillata ex baccis, *Judenkirschen-Wasser* / *Eau de Coqueret* ou *Alkekenge*, quam Ludovici languentem nominat,

SEMEN GENISTÆ.

Sunt genistæ angulosæ & scopariæ C. B. P. semina reniforma, compressa, fusca, saporis ex dulci amaricantis nauseosi & ingrati, dum annosa farinacei.

In substantia farinacea latet \ominus diureticum, quod per incinerationem copiosum elicitur, unde in movenda Urina usurpatur.

Semina recentia quippiam sapiunt nauseosi, unde quoque horum infusum ex ∇ fervente factum blandos Vomitus movet, ob quos in arthritide prædicantur. Cæterum quoque alvum nonnunquam movent, si cum hydromel. dantur.

\ominus genist. gr. vij. sem. genist. 3ß. f. p. diureticus, exhiben-

exhibendus ex ∇ chærefol. vel si alvus sit adstricta, ex emul-
sione Carthami.

℞. Sem. genist. ʒj. cap. c. hydrom. ad movendam alvum
& Urinam, in specie si adsit hydrops, icterus & tumor
lienis.

℞. Sem. genist. cont. ʒβ. vel ʒvj. infund. ∇ fervent. q.
s. cape infusum tepidum ad provocandum Vomitum.

Aliàs flores genistæ nondum expansi eadem ratione ut
cappares condiuntur, & a Nephriticis condimenti loco cum
fructu usurpantur.]

SE-

GENISTA à Genu dicta, vel quod geniculata sit, vel quod
instar genu flecti queat, vel quod genubus dolentibus medelam af-
ferat, SPARTIUM SCOPARIUM, CAPPARIS GERMANICA,
Genst/ Genster/ Ginst/ Pschimmmentkrauth/ Pschimmen/Rehkrath/
GENET commun.

A TOURNEFORTIO Genista de qua hic sermo, à Genista &
Cytiso distinguitur, quod foliis partim sit singularibus, partim ternis,
florem habet papilionaceum, cujus pistillum abit in siliquam pla-
nam, in duas partes dehiscentem, seminibus foetam quasi reni-
formibus.

Cytiso Genista Scoparia vulgaris flore luteo, Tourn. I. R. H.
cl. 22. S. 2. g. 3. Genista angulosa & scoparia C. B. Pin. 395. Ge-
nista angulosa trifolia I. B. 1. 388. Genista Dod. Pempt. 761.

Genista vulgaris est notitiæ, incultis agris campisque, in syl-
vis & juxta sylvas locis arenosis, nec non quibusdam montanis ar-
bustis gignitur. Floret vere & æstate.

In usum ex hac planta trahuntur imprimis flores lutei & semen.
Flores, si in decocto propinentur, per inferiora purgant. Si in sub-
stantia, vomitum cient. Vires obtinent spleneticas, hepaticas atque
diureticas & nephriticas; in ictero, hydrope, quartana, ar-
thritide atque scorbuto laudantur. Scrophulas quoque curant tum

externe, tum interne. Succus ex virgis genistæ in aqua maceratis expressus in angina & coxendicum dolore prodest.

Lixivium cinerum Genistæ in hydropes quam maxime commendatur, pediculos quoque & Lendes necat. Succus genistæ ulcera gingivarum sanare dicitur. Oleum florum obstructionibus Lienis mederi creditur. Arthriticis quoque affectibus medetur. Genista viridi fugantur erucæ, si arbores ea involvantur. Apes multum floribus hisce delectantur. Semina commendantur ad erysipelas ut & ad hæmorrhagias sistendas. Sunt, qui cum ROSENKREUZERO in cineribus genistæ verum stannum fuisse repertum asserunt, ET TMÜLLERUS autem vanum hoc esse & vel casu stannum simul commistum, vel totam historiam commentum esse pronunciat. Semen Scrophulis quoque medetur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Conserva florum Genistæ, Psrimmen-Zucker / Conserve de Genet. Lienosis, Hydropicis, cachecticis, nephriticis, ictericis, arthriticis utilis, per vomitum, alvum & urinam educit.

Sal Genistæ, Psrimmen-Salz / Sel de Genet, tanquam secretum à quibusdam in hydropes commendatur, sed præ aliis salibus fixis vegetabilium peculiare nil obtinet.

SEMEN MILII SOLIS.

Sunt Lithospermi erecti majores C. B. P. semina rotunda, glabra, lævia, splendentia, cinerea, durissima, saporis farinacei, odoris nullius.

Substantia horum in omnibus fere cum oculis ☿ convenit, hinc in urina & calculo expellendo exhibentur. Freitag. [in auror. Medic.] suo experimento laudat in movendo partu, ite in gonorrhoea sistenda.

℞. Sem. mil. sol. ʒj ☿ genist. ʒj. f. p. diureticus, vel ad de lap. prunell. ʒβ. Datur cum Rhabarbaro & moscho in sanguine congrumato.

℞. Sem. mil. Solis ʒij. exhibe cum lacte ad promovendum partum.

℞. Sem.

℞. Sem. mil. sol. ʒiʒ. pulv. ling. cervin. f. phillitidis. ʒʒ. fuccin. præpar ʒij. M. f. p. exhib. ʒj. singulis diebus contra gonorrhœam.

Λιθόσπερμον, LITHOSPERMUM à seminis duritie, Meerehirse/ Steinsaamen/ Steinhirß/ Perlhirse/ Perlen-Krauth/ GRÉMIL, HERBE AUX PERLES.

Est planta flore monopetalo infundibuliformi multifido, ex cujus calyce ad basin usque secto surgit pistillum quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina subrotunda, dura, expolita, nitida, in calyce longe ampliato maturefcentia.

Lithospermum majus erectum C. B. Pin. 28. Lithospermum sive Miliun Solis L. B. 3. 590. Lithospermum minus Dod. Pempt. 83.

Crescit in hortis & inter fruges incultum, floret Majo &c.

Semen cujus dosis est ad ʒj. &c. in febre quotidiana ante paroxysmum assumptum laudatur. Ex herba ut & semine semicupia parantur in affectibus renum & vesicæ utilia. Folia Lithospermi analysi chymica nullum sal volatile concretum, sed spiritum urinosum fortem, multum olei atque terræ suppeditant. Semina quoque tota quantalcalina Sal volatile concretum cum multo oleo atque terra exhibent.

SEMEN RUSCI.

Sunt Rusci C. B. P. baccæ rotundæ, asparagi baccis majores, rubentes, includentes sub pellicula tenui modo unum, modo binos acinos durissimos, fulvos, saporis subdulcis.

Conveniunt cum radice, quam vide.

Ad excrescentiam in ductu Urinario tollendam.

℞. Rad. rusc. ʒʒ. sem. rusc. ʒij. f. decoctum.

SE-

Semen Rusci vix in usum trahitur, nisi in sic dicta Bene-dicta laxativa.

SEMEN ASPARAGI.

Sunt Asparagi sativæ C. B. P. baccæ rotundæ , rubræ, pisi magnitudine, includentes tres acinos nigros corneæ duritiei, saporis subacris, & subdulcis, odoris nullius. Convenit cum radice.

℞. Sem. aspar. rusc. alkek. mil. sol. ana ʒj. Θ genist. ʒss. l. lap. prunell. gr. xv. f. p. diureticus, exhib. ex ∇ chære-folii.

Rarissime in usum trahitur semen asparagi.

SEMEN COFFEE.

Est Euonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis lauri simili C. B. P. sponte nascuntur arbores in Persia, Arabia felici, ad magnitudinem tilia. Sunt igitur hujus nuclei pallidi, faba paulo minores, altera parte convexi, altera plani, insigni sulco notati, bini, sibi invicem cohærentes, tecti folliculo membranaceo tenui, ex fusco nigricante.

Coffee crudum more leguminum in farinacea substantia fovet Θ fixum diureticum, quod in ustulato paululum extricatur, ut à superfusa ∇ fervente resorberi vel imbibi possit, hinc solum ustulatum Coffee usurpatur in infuso ∇æ ferventissimæ.

Sale quidem constat diuretico, sed admodum blando & nonnihil volatili & temperato, unde viscida dissolvit, & ad Urinam disponit, suppressos torpidosque spiritus suscitatur, & alacres ad obeunda munera reddit. Conducere videtur potius obesis & crassis, pituitosis, vel phlegmaticis, quam biliosis & macilentis, & quorum spiritus inquieti & nimis agiles.

In

In Persia uſtulantur cortices ſeu tegumenta granorum. Singulis diebus grana Coffee cremant pro uſu, procrastinare non ſiunt, optimum eſt infuſum, quod ex recenter uſtulatis granis eſt confectum. Cortices raro ad nos transferuntur, alias eorum infuſum multo præſtantius.

SE-

CAFFE', CAVE', Caffè/ Kaffe-Bohnen/ du CAFFE', ou COFFE'.

Arbor qui fructum hunc fert, juxta ALPINUM, Evonymo ſimilis eſt, foliis craſſioribus, durioribus, viridioribus perpetuoque virentibus, juxta Dn. FOUR autem, qui TRACTATUM DE COFFE' in lucem dedit, Ceraſos noſtrates minores proxime refert tum ramis & foliis, tum magnitudine. Flores ejus floribus jaſmini non abſimiles eſſe quidam cum TOURNEFORTIO tradunt. Sequentibus hæc arbor ab authoribus inſignitur appellationibus.

Caffè vel Coffee Offic. Evonymo ſimilis Ægyptiaca fructu baccis Lauri ſimile C. B. Pin. 428. Bon vel Ban arbor I. B. 1. 422. Coffee frutex ex cujus fructu fit potus Raji. Hiſt. 1691. Buna ex qua in Alexandria potio fit Cluſ. in Garz. Bon vel Ban ex cujus ſemine Ægyptii potum Coava conficiunt Alp. de plant. Ægypt. cap. 16.

Ex his nucleis toſtis, ut loquitur RAJUS, in pulverem redactis & aqua decoctis tum Arabes, tum Ægyptii quin & Turcæ (addantur etiam Perſæ, aliique Orientales populi) omnes per vaſtum illud imperium potionem parant, Coava ſeu Coffee dictum colore nigrum, non tamen, ut vult RAUWOLFFIUS, atramenti inſtar nigerrimum, quem pitiffando ſorbillant ex teſtis & porcellanis, quam poſſunt calidiſſimum, ſive, ut VESLINGIUS inquit, otii ſui oblectamentum, ſive bonæ valetudinis firmamentum quarant. Venditurque hic potus in publicis tabernis, quarum aliquot mille eodem teſte in una urbe Cayro habentur. Hujus decocti, quod COFFEE', CAFFE', CAFE', CAHUE, CAVEI, COPHE', COVE, COAVA ELLAVE appellatur; uſus non permanſit apud populos Orientales, ſed

superiore seculo in Europam transiit, ubi similis luxuries per omnes se expandit regiones, ita, ut non solummodo maxima thermopoliorum, in quibus potus cafe divenditur, reperitur copia, sed & in omnibus fere familiis sapissime usurpetur.

Modum torrendi grana & exinde parandi decoctum quod concernit, ille adeo in vulgus notus est, ut ei recensendo merito supersedere possimus. Fuere, qui pulverem cafe tosti adulterarunt pane tosto modice adusto, aut phaseolis fabisque &c. torrefactis. Hic potus non pleno haustu, aut continua serie bibitur, sed sorbillatur, seu minutatim paulatimque sorbetur. Edulcoratur saccharo vel etiam absque eo assumitur. Haud pauci Lac addunt, qua ratione potus cafe medicamentosus evadit quoque alimentosus. Hodie præsertim in Belgio, Anglia, Germania, in congregationibus & congressibus amicorum thermoposia Cafe & Thé multum viget. Sunt, qui sorbitioni matutinæ cibum aliquem præmittendum esse suadent, fundantes se in pronuntiato Turcarum sanitati suæ consulentium, hincque dicentium, si nulla esca suppetat, quæ sorbitioni præmittatur aut jungatur, globum vestiariæ ex toga deglutiendum aut à potu abstinendum esse. Et certe multos à potu cafe jejuno stomacho sumpto, & usu ejus continuato, male se habuisse emaciatosque fuisse constat.

Novi ipse quendam, qui ab uno aut altero minore quoque potus cafe, tempore matutino hauste vertigine stomachica imo scotomia corripitur, quæ non cessat nisi assumpto cibo. Interim ad consuetudinem quoque respiciendum, & si lac cafetatum seu virtutibus cafe imprægnatum hauriatur, talia accidentia non æque metuenda sunt. Spernendus tamen minime Gallorum, qui in aulis Principum magnatumque quoque receptus est, à pastu unum tantummodo aut alterum decocti Caffè poculum pro digestionem adjuvanda, sorbillandi mos.

Caffè per analysin Chymicam ex libra una phlegmatis atque spiritus volatilis ℥jv. circiter; Olei ℥j. & ultra relicto capite mortuo ℥jv. &c. præter propter exhibet, reliqua parte avolante.

Medicamentis polychrestis quidam annumerant potum Cafe, singulariterque ad sanitatem conferre, pluresque quam herba Thé possidere virtutes asserunt. Commendatur in Cephalalgia, vertigine, defluxionibus catarrhalibus. Narcosin pellit somnumque arcet,

arcet, & ebrietatem solvit, nisi vino plane sint sepulti. Pectori porro conducit, præsertim Lac casetatum. Concoctionem Ventriculi promovet, dolores ejusdem mitigat & in colica pituitosa laudatur. Usurpatur quoque ad viscerum obstructions, Scorbutum, suppressionem mensium & varia uteri vitia. Arthriticis quoque succurrit & Nephriticis. Plura qui legere & nosse cupit, adeat præter plures alios, celeberrimi Doctoris & Professoris Argentinensis MARCI MAPPI dissertationem de POTU CAFFÆ. Caffæ desiderium Veneris extinguere multi probare volunt testimonio Reginæ cujusdam Persarum. Notandum tandem, quod Caffæ tostum saccharo quoque incrustetur & mensis secundis inter bellaria inferatur, quodque mediante spiritu Vini elegans & gratissimus parari soleat liquor stomachalis, quem *Eau de Caffé* nominant.

℞. Caffæ tost \mathfrak{z} iiij. Spirit. Vin. Gallici mens. ij. digestionem facta fiat destillatio, edulcor, Sacch. quant. s.

SEMINA SALE PURGANTE ACERRIMO CONSTANTIA.

SEMEN MEZEREI SEU LAUREOLÆ.

Sunt Laureolæ folio deciduo seu flore purpureo C.B.P. baccæ rotundæ pipere majores, rubentes, per maturitatem nigricantes, includentes sub tenui pellicula nucleum rotundum saporis fervidi & nauseosi. Vocatur piper Germanicum.

Tam potenter purgante & caustico esse constant, ut earum usus non nisi robustissimis concedatur, licet plebei tribus integris granis deglutitis ad hydropem utantur. Extractum cum aqua vini seu aceto factum, mitius est & ad id cum caryophyllis aromaticis tanquam correctorio hydropicis propinari potest. Interim nonnulli hoc Mezereo eorumque extracto stimulant & quasi restituunt purgantia effocta.

℞. Gran.

℞. Gran. mezer. gr. iij. integræ, cape ex ▽ rosar. pallid.

℞. Conf. Hamech. 3℔. gran. mezer. gr. iij. f. bolus.

℞. Mezer. q. v. infund. vin. cydonior. exime grana & exsicca & exhibe pro dosi gr. iij. integræ vel in pulverem redacta.

℞. Mezer. q. v. macera in lixivio, fac turundam & inter auriculæ perforatæ ad oculorum inflammationem tollendam, exemplo Riverii. [Conf. G. H. Welsch. Mictomim. Cent. 2. obs. 63.]

SE-

LAUREOLA quasi Laurus humilis, CHAMÆDAPHNE, χαμελαία, CHAMELÆA, quasi humilis olea, THYMELÆA, COCCOGNIDIUM, Seidelbast/ Zeidelbast/ Wolffsbast/ Kellerhals/ Scheißloorbeeren/ Pfefferstaud/ LAUREOLE.

Est frutex flore monopetalo quodammodo infundibuliformi, quadripartito, è cujus fundo surgit pistillum, quod deinde abit in fructum ovatum nunc succi plenum, nunc siccum, semine foetum oblongo.

Thymelæa Lauri folio deciduo sive Laureola femina Tourn: I. R. H. cl. 20. S. i. g. 2. Thimelæa folio deciduo flore purpureo, officinis Laureola fœmina C. B. Pin. 462. Laureola folio deciduo sive Mesereon Germanicum J. B. 1566. Chamelæa Germanica Dod. Pempt. 364. In Montibus & collibus sylvestris, sylvisque opacis fruticat, primo vere floret antequam folia prodat, baccæ autumno maturescunt.

Flores quidam tutiores esse putant granis. Cortice quoque & radice adversus quartanæ, hydropem & venena nonnulli utuntur, vel per se, vel cum saccharo. Ejus virulentiam lacte vel aceto corrigere tentant nonnulli, ob vim drasticam autem merito rejicitur.

SE-

SEMEN STAPHISAGRIÆ.

Sunt Staphisagriæ C. B. P. semina rugosa, scabra, nigra, angulosa, triquetra, saporis fervidi.

Semina sunt plantæ quæ refertur ad angiospermas multifiliquas filiculis corniculatis oblongis, floribus cucullatis quæ vel purgantes vel venena sunt, ut aconita, napelli, heliborus. Est enim staphisagria species aconiti.

Sale purgant potius volatili quam fixo, verum ^{ἀνὰ κατὰ} purgante constant, sed cum ob violentam & molestam acredinem fauces exurant & metum suffocationis & strangu- lationis inferant, usus internus ideo rarissimus, interim masti- cata & sub lingua volutata salivam adeo copiose proliciunt, ut inter apophlegmatizantia referantur. Propterea Sylvius [Meth. Med. l. 2 c. 13. §. 59. & 60. p. m. 115.] pro ptyalismo excitando ad L ♀, commendat, sed præterquam, quod ob prædictam molestiam eorum usum ægri ferre recusent, insuf- ficientia & plane incongrua videntur ad Luem ♀eam. Li- cet enim ptyalismum inducant, non talem tamen, quæ ita serum fundit, veluti ♀ialia faciunt. Salivatio enim tamdiu adest, quamdiu sapor acris in lingua. Pediculis singulariter exitiosa sunt, & ob id unguentum pediculorum ingrediun- tur.

Vis purgans juvatur oxymelle. Saporis molestia corri- gitur cubebis & nuce moschata.

℞. Staphisagr. ʒj. oxymel. ʒj. M. pro sursum & deorsum purgante.

℞. Sem. staphisagr. sinap. ana ʒj. rad. pyrethr. ʒiβ. Cu- beb. ʒj. piper. alb. ʒj. N. M. ʒj. f. p. apophlegmatizans con- tra Catarrhos.

℞. Staphisagr. q. v. coq. cum ∇, tene decoctum in ore ad ptyalismum excitandum.

℞. Mucag. helen. ℥ij. staphisagr. ʒʒ. ʒ. laur. q. s. f. ung.
add. ʒis ʒj. & si videtur ʒii vivi ʒʒ. ad enecandum pedicu-
los.

SE-

Σταφίς ἄγρια, ἀκαφίς ἄγρια, ob foliorum cum viti sylvestri si-
militudinem, UVA TAMINEA, Φθειρόκτονον, Φθειρίον, ΠΗΘΙΟΚΤΟ-
NUM, *Herba pedicularis* ab effectu, Φθειρόκοκκον, GRANUM PEDI-
CULARIUM, PITUITARIA, Läusekraut/ Läusemörder/ Bismünz/
Speichelfraut/ Staphisander/ STAPHISAIGRE, HERBE AUX
POUX.

A TOURNEFORTIO ad Delphinium refertur, est enim plan-
ta flore polypetalo anomalo, ex plurimis nempe petalis dissimi-
libus constante, quorum superius in caudam tenuatur, excipitque
aliud petalum bifidum & pariter caudatum. Pistillum medium
occupans abit in fructum, in quo velut in capitulum colliguntur
vaginæ, secundum longitudinem dehiscences, seminibus foetæ an-
gulatis.

Delphinium Platani folio staphisagria dictum Tourn. I. R. H.
cl. 11. f. 2. g. 3. Staphisagria Matth. 1231. & I. B. 3. 641. Sta-
phisagria C. B. Pin. 324.

In Italia, Hispania, Languedocia &c. reperitur, colitur etiam
in hortis.

Semen, quod Läuse-Saamen oder Läuse-Körner/ Läusemörder/
Steffans Körner/ Mäuse- oder Ratten-Pfeffer/ PIPER MURIUM
aut GLIRIUM, Mäusewurk-Saamen/ appellatur, est in usu. Ad pe-
diculos arcendos & abigendos pulvis ejus capiti & vestibis insper-
gitur. Cum aceto contusum dentium dolores sedat; semen ut &
herba Staphidifagriæ muribus & gliribus non adeo amica; ad scabiem
quoque adhibetur & ad ulcera antiqua, ut & ad carnem luxurian-
tem absumendam.

SEMEN PSYLLII.

Sunt Psyllii majoris erecti C. B. P. semina parva oblon-
ga, puliciformia, lubrica, lucida, ex fusco punicea, saporis
pri-

primum mucilaginosi, postmodum acris & nauseosi.

In horum mucagine, acria quævis temperante, occultatur \ominus blandum, bilem expurgans.

Sal purgans volatile probant semina cocta & ustulata, quæ amissa virtute purgante adstringunt. Bilis expurgationem evincit usus, nam acres biliosos humores manifeste evacuant, eosque ob mulcentem mucaginem obtundunt & temperant. Cæterum ob eandem mucaginem prorsum in raucedine, angina, ardore & siccitate faucium & tussi. Exterius conveniunt ad ambusta.

Rarius usurpantur ob sui mucaginem, quæ ob tenacem adhæSIONem Ventriculo & Intestinis nonnunquam torminosa est. Datur substantia à ʒj. ad ʒij. Datur & Emuls. Elect. & syr. Vis purgans juvatur manna, hydromel. stimulator diagrydio. Vis temperans & refrigerans intenditur æquepollentibus nempe semine cydoniorum. Mucago seminum tostorum additur clysteribus ad dysenteriam & acredinem temperandam.

℞. Sem. Psyllii ʒiʒ. f. Emuls. c. hydromel. ad alvum laxandam.

℞. Sem. Psyllii ʒij. violar. ʒij. ∇ violar. ʒij. contunde & exprime, expresso add. Mann. ʒj. exhibe cochleatim infantibus per vices ad laxandam alvum, si robustis exhibendum add. gr. j. vel ij. diagrydii.

℞. Sem. Psyll. cydon. lini ana j. bulliant leviter in ∇ rosar. add. integrum ovum, $\circ\circ$ rosar. q. s. sacch. ʒn. ad fuscum colorem inducendum ꝯ viv. ʒʒ. quo Hermannus cum successu usus est in hæmorrhoidibus.

℞. Sem. psyll. cydon gum. tragac. ana ʒj. f. mucilago c. ∇ rosar. in inflammatione hæmorrhoidum.

℞. Sem. psyll. ʒʒ. sem. cydon. papav. ana ʒj. ∇ rosar. calid.

calid. ℥ij. f. mucago add. sacchar. penid. ℥j. ad raucedinem, ardorem faucium & tussim.

℞. Sem. psyll. ℥℞. ▽ Nymph. plantag. ana ℥ij. syr. violar. q. s. f. mixtura refrigerans vel temperans si adsit aridura linguæ.

℞. Mucaḡ. psyll. cydon. sacch. ℥. o lini q. v. f. linimentum contra ambusta.

PUR.

Ψύλλιον à ψύλλα, pulex, quod pulices fugare, vel potius quod semen ejus pulici simile existimetur. PULICARIS HERBA, Psyllien-Kraut / Flöh Kraut / Flöhsaamen-Kraut / HERBE AUX PUCES.

Est planta à Plantagine, ut & Coronopo diversa in eo, quod in caules assurgat foliatos & ramosos, dum Plantaginis & Coronopi flores & fructus simplici pediculo insident.

Psyllium majus erectum C. B. Pin. 191. & I. B. 3. 513. Psyllium Dod. Pempt. 115. HERBE AUX PUCES ANNUELLE.

&

Psyllium majus supinum C. B. Pin. 191. & I. B. 3. 513. Psyllium Plinianum forte, radice perenni supinum Lob. Icon. 437. HERBE AUX PUCES VIVACE.

In Italia præprimis atque Gallia sponte provenit. Colitur in hortis Julio & Augusto florens.

Semen, autumnno colligendum, solummodo pro usu Medico infervit. Herba pulices abigere & umbilico cocta imposita alvum laxare fertur.

Prostabat olim *Electuarium diapsyllii*, sed non amplius in usu.

PUR.

PURGANTIA CONSTANTIA SALE
ACRI PURGANTE TAM VOLATILI
QUAM FIXO.

COLOCYNTHIS SEU
ALHANDAL.

Sunt Colocynthidis fructu rotundo minoris C. B. P. fructus rotundi, pugni magnitudine, ex flavo virides, includentes sub cortice tenui coriaceo medullam candidam, fungosam, levem & semina parva compressa, oblonga, cucumeracea, quasi sordida, albicantia, saporis acris amari & nauseosi.

Inter purgantia vegetabilia validissima est, humores quoscunque viscido pituitosos & tenaces, qui cæterorum purgantium vim omnem eludunt, ex ultimis quasi articulis provocat, & per superiora, frequentius tamen per inferiora educit, hinc tanquam catholicum in morbis pertinacissimis, Ischiatico dolore, Lue & ea commendatur. Vermibus quoque tam interne quam externe contrariatur.

Ingreditur clysteres pro stimulo in specie contra morbos soporosos, sed cave ne pulpam injicias sed sindoni includas. Additur quoque pro stimulo fotibus vaporosis ad menses & foetum mortuum expellendum, jungitur & suppositoriis.

Vis consistit in substantia fungosa & resinosa. Semina ex usu proscribuntur.

In substantia pulpa per os raro datur, quia ob nimiam levitatem Ventriculo adhæret, & tormina & hypercatharsin causat, sed prius cum tragacanth bdell vel gummi Arabico formatur in trochiscos, qui à gr. vj. ad ʒß. ad summum exhiberi solent.

Externe applicata alvum solvit. Ita ꝑ colocynthis coctum externe applicatur.

Datur resin. ad gr. x. Extract. ad gr. xij.

Virulentia corrigitur ꝑ Tri, aceto, vel Urina in qua pulpa maceratur. [De hac re ita Laz. River. Prax. Med. l. i. c. 15. p. m. 191. Colocynthis ad cerebrum expurgandum efficacissima est, sed summo amarore infensa est, vehementique illius est operatio. Corrigitur utrumque infusione in Urina, sic enim amaritudinem deponit, & fere insipidum remedium evadit, tum vehementia illius infringitur ut ad 3j. tuto exhiberi valeat, fitque excellens ad omnes capitis morbos à causa frigida oriundos remedium.] Ast optima correctio fit ꝑ u vini, cujus quoque beneficio resina & extractum fit, quæ optima & tutissima colocynthis præparata sunt.

Vis tormentosa emendatur Mace, Nuce Moschata, cynam, &c. specificatur variis morbo appropriatis.

℞. Troch. alhand. ʒj. infund. vin. coq. par. f. cholagog.

℞. Pulp. Coloc. f. potius troch. alhand. gr. x. Mac. gr. v. conf. ros. pallid f. fl. persic. ʒj. M. f. bolus.

℞. Fol. salv. flor. chamom. summ. organ. ana Mj. rad. pyrethr. ʒj. pulp. Coloc. in pet. ligat. ʒj. coq. in f. q. ▽ ℞. Colatur. ʒx. add. El. hier. picr. ʒj. Mell anthos. ʒvj Extr. Castor. ʒj. ꝑ gemm. ʒj. f. Clyster contra morbos soporosos.

℞. Oleum Colocynth. M. c. ung. d. arthanita q. f. ad formam linimenti, hoc inunge totum abdomen in alvi adstrictione.

℞. Helleb. n. ʒβ. calam. ar. ʒij. pulp. colocynth. ʒj. bacc. laur. ʒj. sem. cumin. ʒij. ꝑ us vini ʒiiij. f. infusum, quod guttatim instilla auri ad surditatem tollendam.

℞. Extr.

℞ Extr. coloc. 3℔. extr. hell. n. gr. iij. ʒ d. caryoph. gt. j. Mastich. gr. vij. M. f. pil. purgantes.

℞. Pil. aloëph. gr. xv. Extr. coloc. gr. iij. ʒ Mac. gt. j. M. f. pil. cephalicæ, convenientes in Catarrhis.

℞. Pil. Mastichin. gr. xv. Extr. Coloc. gr. iij. ʒ succin. volat. gr. v. f. pil. cephalicæ anticatarrhales.

℞. MP. foetid. gr. xv. Extr. Coloc. gr. iij. Castor. gr. v. pil. Uterinæ.

Resina colligitur ex pulpa Colocynth. cum aqua vini, postea præcipitatur cum aqua communi.

℞. Resin. Coloc. gr. v. Diagr. gr. iij. ʒ ʒri. gr. iij. ʒ cinam. gt. j. conserv. ros. pallid. 3℔. M. f. bolus.

Olei destill. coloc. per ʒ am si abdomen eo inungatur juvat in foecibus durissimis vel etiam ʒ ejus coctum.

NUX

Κολοκύνθις, κολοκύνθη, CUCURBITA AMARA, FEL TER-
RÆ, ob summam amaritiam, MORS PLANTARUM, quod vi-
cinas plantas veneni instar interficere videatur. MORS IN OLLA,
HANDEL, HANDAL, Coloquinthen/ COLOQUINTE.

A cæteris Cucurbitaceis folio in profundas lacinias dissecto
& fructu amaro non eduli discrepat. Colocynthis fructu rotundo
major C. B. Pin. 313. Colocynthis I. B. 2, 232. & Dod. Pempt.
665.

& imprimis

Colocynthis fructu rotundo minor C. B. Pin. 313, Colocynthis
fungosa & lævis Cordi Hist. 118.

In Orientalibus & calidioribus locis imprimis provenit & exin-
de ad nos per Ægyptum advehuntur fructus, quos POMA seu CA-
PITA DIABOLICA, Teuffels, Köpff / Teuffels, Nepffel / SOLE-
NANDER appellitat. Et certe adeo drasticum & virosum est pur-
gans, ut non immerito à SEPTALIO aliisque vocetur mors ipsa.
Qui poma hæc manibus diutius tractant, aut in mortario terunt,
hypercatharsin inde contrahere solent, quod etiam fit sola inun-
ctione

ctione ventris. Ad menses pellendos mulierculis quibusdam & agyrtis in usu est Colocynthis, in ipsa præsertim substantia exhibita, sed haud raro sinistro cum eventu. Vidi nuper hypercatharsin enormem exinde excitatam. Suspectis mulierculis minime debet exhiberi aut vendi.

Dosis in substantia securissima est, si plane non exhibeatur. Corrigitur optime, juxta Dn. TAURY, Spiritu Salis Armoniaci. Corrigitur quoque trituratione, quo intestinis non tam facile adhæreat, adstringentium itidem, glutinantium & aromatum additione.

Author semina ab usu removet, quæ tamen ab aliis mitiora habentur, & à quibusdam in ictero commendantur, præsertim si statim desuper aqua mulsa hauriatur. Sunt, qui ad febres periodicas profligandas semina pari numero pro amuleto de collo suspendunt.

Extractum Colocythidos, Coloquinthen Extract / Extrait de Coloquinte, præstat hoc aliis purgantibus loco stimuli jungere.

Trochisci Albandali, Coloquinten-Zeltlein / Trochisques Albandal: præstat & hos tantum stimuli loco ad granum unum, ad grana duo & paulo ultra, aliis purgantibus addere.

Oleum Colocynthidos per coctionem paratum, *Coloquinten-Dehl / Huile de Coloquinte*. Vermes atque pediculos necat, ad casum capillorum & nigredinem capillis conciliandam adhibetur, tinnitum aurium sedat.

NUX VOMICA.

Nux Vomica in officinis C. B. P. sunt arboris Malabaricæ fructuum nuclei orbiculati, plani, compressi, cornea duritie, colore argenteo, foris parum lanuginosi, saporis amari. Arbor est nucifera, floribus monopetalis oblongis in quinque segmenta divisis, racematim dispositis, fructibus rotundis aurantiæ forma & magnitudine. Hi fructus includunt sub putamine tenui duriusculo, fragili, pulpam mucilaginosam involventem nucleos.

[Conf. supr. de ligno colubrino. Arbor hæc sub
nomi-

nomine Caniram describitur in Hort. Malabar. T. I. p. 67.]

Sale purgante emetico adeo hostili constant, ut citra convulsionis metum vix interne adhiberi queant. Veteres eas alexipharmacas pronunciarunt, & ad Electuarium de ovo dictum receperunt, ast consultius videtur eas ex hoc Electuario & ex alexipharmacorum numero proscribi. v. Zwelff. An. Ph. Aug p 250. Ast in tam parva quantitate ingreditur, ut vim suam minus exercere possit. Electuarii ʒj. vix ultra gr. j. ingreditur. [Nonnulli etiam exhibuerunt in febribus tertianis seu quartanis, sed in dubiis recte mitiorem & tutiorem sequimur viam conf. Wedel. Amœn. Mat. Med. l. 2. f. 2. c. 4. p. 337.]

D. Hermannus exhibuit integram nucem Vomicam aliquando cani, qui exinde mortuus est spumescensque sanguis in Pulmonibus fuit repertus, itaque dissolvit sanguinem. Canibus aliquot grana data omnino exitiosa sunt, dum spiritus in turbas concitant, spasmos, convulsiones & tetanos excitant, sanguinis nexum solvunt, & tandem spiritus extinguunt.

Pari modo infestæ sunt corvis & cornicibus; interim quibusdam avibus Indicis noxiæ non sunt, nam ex horum ventriculis sæpe integræ nucs eximuntur, & reperiuntur inter alvinas fæces ex iisdem rejectas. Indi cum aceto tritas imponunt capitis doloribus: quidam ex his infusum parant ad quartanam v. c.

℞. Rasur. Nuc. Vomic. ʒj. infund. vin. absynth. exhibe infusum contra quartanam, sumitur hora ante paroxysmum.

SALE

Nux Vomica dicitur, quod vomitum ciere credatur à quibusdam.

Neque radix est, uti quidam voluerunt, neque fungus, sed fructus; verum, an arboris an herbæ, incertum, ut **RAJUS** dicit. Plurimi tamen hodie cum authore nostro ex arbore provenire asserunt, circa quam tamen adhuc controversiæ occurrunt.

Supra ab authore dictum quod arbor **Ligni colubrini**, quæ describitur **HORT. MAL. T. 7. Tab. 2. & sq.** Noces vomicas majores ferat, à quibus discrepent hæ minores ex arbore **Caniram** provenientes. Author flores dicit esse monopetalos racematim dispositos, in horto vero **Malabarico** describuntur polypetali & umbellati. Nihil itaque adhuc certi. In pulverem hæ noces redigi nequeunt, nisi radula deteratur.

Virtute quoque anthelmintica & narcotica gaudere fertur, & à quibusdam in decocta vulneraria recipitur **Vomica**. **BARTOLETUS** asserit, hanc nucem homini lætam conciliare stupiditatem, ut hilaris, liberalisque evadat & omnia revelet, & ad quælibet præstanda promptum se exhibeat, sed forsan hæc melius ad **stramonei** semen referenda. Optime censent illi, qui nucem vomicam ablegandam, nec ad compositionis ullius usum admittendam esse volunt.

SALE PURGANTE TAM FIXO QUAM VOLATILI OLEO CRASSO INCLUSO CONSTANTIA.

GRANA TILLI.

Pinus indica nucleo purgante **C. B. P.** sunt ricini arborescentis femina, seu fructus oblongi, ovales, cataputia media paulo majores, una parte gibbi, altera paulo planiores, quatuor levioribus cingulis notati, includentes sub pellicula corticosa cinerea, nucleum albicantem, pinguem oleosum, saporis exurentis.

[Vid. supr. **Pavana** f. lign. **Moluccense**]

Adeo

Adeo potenter humores serosos, viscidos & tenaces incidunt, & per superiora & inferiora educunt, ut hoc nomine ipsam Colocynthidem superent, adeoque in morbis chronicis contumacibus, in specie in hydrope, tanquam catholicum propinantur, pro stimulo potius quam pro basi.

Vis concentrata est in foliolis istis seminalibus, quæ in media granorum substantia latent, ut & in oleo crasso quod prelo ex granis elicitur.

Ob excedentem sui acredinem, fauces, palatum & nonnunquam anum inflamat. Datur in forma pilularum, & corrigitur coctione, vel cum aceto vel in Urina puerorum. Corrigitur Zinzibere, succo glycyrrhizæ aliisve vel aromatis, vel dulcibus viscosis. Alii saccharum 5ni & opium pro correctorio addunt. Cortices blandius purgant, ac ipsa substantia interior.

Datur integra substantia nucleorum, rejecto cortice exteriori, licet purgativa virtute haud careat, à gr. iij. ad v. unumquodque granum, sedem molitur unam, si ∇ calida vel jusculum superbibatur, ita tamen ut iij. grana, communiter v. faciant secessus. Alvus vero in momento sistitur, si superbibitur haustus largior ∇æ frigida vel si pedes madefiant ∇, vel si manus laventur ∇ frigida & naribus admoveatur.

Dantur duo folia seminalia fructus medietati inclusa, vulgo germen dicta vel Cyma, quantitate ad j. vel ad summum gr. ij.

Datur 80 gran. til. expressum gr. j. robustissimo cum oleo ex ricino vulgari expresso. Datur & extractum beneficio spiritus vini factum à gr. iij. ad v.

℞. Gran. till. gr. iij. zz. gr. vij. M. f. pil. iij. vel iiij.

℞. Fol. seminal. gr. till. gr. ij. Zz. gr. v. succ. glycyrrh.

cyrth. in ∇ rosar. fol. q. f. f. pil. j. ad purgandum ferum.

℞. Extr. Cathol. gr. xv. gran. till. gr. j. vel. ij. fyr. ros. q. f. f. pil.

℞. Extr. gum. gutt. gr. iij. resin. Jalap. gr. vij. gr. till. gr. ij. Zinz. gr. v. M. f. pil. antihydopicæ.

℞. Fol. seminal. gran. till. gr. j. fol. fenn. 3ß. Zinz. gr. v. sacchar. q. f. scil. 3ß. vel j. f. pulv. l. sacchar. f. q. solv. in ∇ rosar. & ad consist. coq. f. rotulæ purgantes.

℞. Olei expr. gran. til. gt. j. exhibe c. \circ expr. semin. ricin. vulg. ad cochl. ß. vel. \circ amygd. dulc. rec. express. cochl. j. exhibe pro purgante. [Describit hoc Petr. Borellus sub titulo facilis purgationis C. 3. obs. 29. p. m. 221. si olei nuclei pinei indici expressi guttæ duæ potui infundantur, vel jusculo, & sic procurabit purgationem facilem. Addit: alii eo umbilicum fricant, & sic etiam incaute ægrum purgant.]

Olei hujus expressi usus frequentior est externus. I. In alvi retentione, si eo umbilicus inungatur. Scil. ℞. ung. d. arthanit. 3j. \circ Coloc. 3iß. \circ gran. till. expr. gt. xij. f. liniment quo inungatur abdomen. II. In inflammatis hæmorrhoidibus cæcis & carunculis exedendis. ℞. \circ expr. gran. till. gt. v. add. sach. 5ni par. f. linim. quo inungantur hæmorrhoides cæcæ inflammatae, & anicarunculæ, 3. vel 4. de die repetatur. III. In excitandis sedibus, dum ejus odor naribus excipitur. Hinc ex eo conficitur pomum regium catharticum sequenti modo. ℞. \circ expr. gran. till. q. f. huic immitte pomum aurantium seu Citreum & relinque per mensem integrum, post exime & asperge pulvere santali Citrini, admove naribus ad alvum movendam, vel frica hoc pomo fortiter manus & admove naribus, quotiescunque pomum naribus admoveatur, ejusque odor fortiter attrahitur, toties movebitur alvus.

Purgier - Müßlein / Pignons d'Inde ou graines de Tilli.
 Cum tutiora prostant, in nostris regionibus vix adhibentur.

RICINUS MEDIUS.

Sunt Ricini vulgaris C. B. P. seu Cataputiæ mediæ fructus oblongi, ovales, faba minores, includentes sub pellicula corticosa, livida & maculosa, nucleum bipartitum album, pinguem, saporis subdulcis, acris, nauseosi.

Vim purgantem inclusam habet oleo temperatiore, ita ut $\circ\circ$ expressum ex hoc ricino ad integrum cochleare exhiberi possit, pro laxanda alvo, in specie serum & aquam evacuat.

Dantur grana in Emulsione, ad 3β , vel j . ex ∇ fumar. vel Cichor. it. in substantia dantur à gr. x. ad xv. vel xx.

Oleum, vulgo infernale dictum à cohl. β . ad integrum exhibetur pro purgante, externe vero applicatum partibus paralyticis medetur.

\mathcal{R} . Ricin. gr. x. f. Emuls. ex ∇ Cichor. q. s. add. pro stimul. gr. ij. scammon.

\mathcal{R} . Olei ricin. expr. cochl. β . ad alvum laxandam. vel \mathcal{R} . $\circ\circ$ ricin. expr. inunge regioni umbilicali pro alvo laxanda.

\mathcal{R} . Olei ricin. med. expr. $3ij$. $\circ\circ$ Nuc. Mosch. expr. 3β . M. f. linim. contra pedes paralyti affectos, quem affectum Indi & Bontius Beriberi vocant. [De affectu hoc præter Bontium agit quoque Tulp. libr. 4. c. 5. p. m. 300. & Ol. Borrich. act. Hafn. Vol. 4. obs. 43. p. m. 144.]

RICI-

$\kappa\acute{\iota}\kappa\iota \ \eta \ \kappa\rho\acute{o}\tau\omega\kappa$, à similitudine Crotonis, vel Ricini animalis, quod

quod semen ejus refert. **GRANUM REGIUM, CERVA** aut **CATAPUTIA MAJOR, PALMA CHRISTI, MANUS CHRISTI, MIRABILIS ARBOR**, ob proceritatem, foliorum amplitudinem, florum suavitatem, seminum picturam & exsultationem, radicis parvitatem. **Wunder-Baum / Creuz-Baum / Zeecken-Baum / Türckischer-Hanff / Römischer-Hanff / RICIN, CHASSE TAUPE.**

Est planta flore apetalo, plurimis scilicet staminibus ex calyce surgentibus constante, sed sterili. Embryones enim à floribus sejunguntur in eadem planta, & deinde abeunt in fructum trigonum, ex tribus capsulis compositum, axi affixis, semineque foetis duriore cortice obducto.

Ricinus vulgaris C. B. Pin. 432. I. B. 3. 642. **Ricinus** Dod. Pempt. 367.

In Ægypto sponte nasci tradit J. BAUHINUS, colitur in hortis, ubi in quibusdam regionibus per duos aut plures annos perdurat, in aliis vero singulis annis perit. Pro diversitate etiam provinciarum magis minusve ascendit, & in tantam excrescit altitudinem, ut non nisi scalis ad motis conscendi possit.

In usu sunt sola semina, quæ dicuntur **Treib-Körner / Zeecken-Körner / Purgier-Körner / Wunder-Körner.** Oleum expressum usurpatur quoque ad Lampades, laudatur ad tumores resolvendos, obstructions lienis reserandas, tinnitum & susurrum aurium profligandum, varias cutis maculas delendas, tineam atque scabiem sanandam pediculosque necandos. Sunt, qui Ricinum adversus impotentiam & ligationem veneficam deprædicant. SIMON BAULI in pelliculis nucleum tegentibus etiam latitare vim purgandi asserit. Folia virtute vulneraria gaudere dicuntur, & ad erysipelas laudantur. Lac nunc provocare mammis imposita, nunc retrahere dorso applicata feruntur. Talpis admodum adversus esse creditur Ricinus, unde in hortis plantatur. Hoc & similibus remediis drasticis Medicus vix unquam utitur.

RICINUS AMERICANUS.

Sunt Ricini Americani majoris semine nigro C. B. P. seu **Cataputiæ majoris fructus oblongi, ovaes, fabæ magnitudine,**

dine, una parte convexi, altera depressi, includentes sub pellicula corticosa tenui duriuscula nucleum candidum bipartitum, saporis cum præcedente.

Validior est ricino medio & propterea in minori dosi præscribendus, cæteroquin utilissima Medicina purgans hydropicis.

Vis hujus consistit vel in nucleo, vel oleo, potissimum foliis seminalibus. Substantia datur à gr. v. ad vij. vel ix. datur in emulsione, datur & o ejus expressum.

℞. Ricin. americ. gr. vij. ▽ Cichor. q. s. f. Emuls.

Oleum express. etiam exhibetur ad quartanam vel per se, vel cum oleo expresso ricini medii.

[De ricino Americano conf. prolixè Sim. Pauli Quadr. Botan. Class. Quart. p. m. 549. & seqq.]

Hic à **TOURNEFORTIO** à Ricino separatur, & ad Ricinoidis species refertur, est namque

Planta flore rosaceo ex plurimis petalis in orbem positis constante, calyci multifolio insidentibus, sed sterili. Embryo enim in aliis plantæ partibus nascitur calyce obvolutus, abique deinde in fructum, in tres capsulas fissilem, semine foetas oblongo.

Ricinoides Americana Gossypii folio Tourn. I. R. H. ap. Ricinus Americanus major semine nigro C. B. Pin. 432. Ricinus major Americanus Curcas dictus & Faba purgatrix Indiæ Occid. I. B. 3. 643. *Pignon d'Inde*.

In multis Americæ locis, præsertim in Insula Barbados nascitur. Convenit cum Ricino & faciei & virtutum ratione.

CATAPUTIA MINOR.

Secundum quosdam species est Ricini, sed revera est species Tithymali. Sunt Lathyridis majoris C. B. P. grana oblonga, rotunda, ovalia, piso majora, includentia sub pellicula corticosa nucleum album pinguem. Sur-

Sursum & deorsum serum potentissime evacuat, hinc velut esula hydropicis robustioribus conducit. Folia seminalia etiam habent vim purgantem concentratam. Externe ꝑ expressum abdomini applicatum etiam alvum solvit. Datur in substantia à gr. v. ad vij. & x.

℞. Sem. Catap. min. gr. vij. Zinz. gr. v. contunde. fiant. pil. in hydropes exhibendæ. Non opus est, ut aliquid addatur ad formandas pilulas, nam ipsa substantia seminum contusa sat viscosa est.

℞. Catap. min. gr. vij. exhibe ex ovo sorbili vel oxymell.

℞. Ung. d. arthanit. ʒij. ꝑ Catap. expr. ʒj. ꝑ diacolocynth. ʒij. M. f. ung. ad solvendam alvum.

SE-

CATAPUTIA à catapotiis sive pilulis, vel κατὰ πίειν, deglutire, quoniam hæc grana instar pilularum deglutiuntur, λαθυρίς, Spring-Krauth / Spring-Körner / quia semen maturum diffilit, Treib-Krauth / Scheiß-Krauth / Treib-Körner / quoniam alvum fortiter movet. ESPURGE.

Est species Tithymali

Tithymalus latifolius Cataputia dictus H. L. Bat. Lathyris major C. B. Pin. 253. Lathyris sive Cataputia minor I. B. 3. app. 864. Lathyris Matth. 1259.

In hortis semel sata quotannis & cum incommodo se propagat, floret Julio, semina fert Augusto, quæ honesti viri remedium non videntur, cum facile ad excitandas internas inflammationes quadrent. Extrinsecus vesicatorium exhibet Cataputia & psilothrum, præcipue succus ejus lacteus, quo impudentes Mendici cutim descendere solent. Cataputiæ folia & fructus in stagnum aut lacum projectos, si pisces comederint, ventrem sursum vertent, quasi mortui sint, ita ut manu eos capere possis, qui, si eos in aliam aquam frigidam conjeceris, reviviscunt, HOLLERIO teste. Grana hæc menses quoque & urinam movent, adque philtrea laudantur. Sunt, qui

qui sibi persuadent, semina deorsum trahendo avulsa per inferiora purgare, sursum vero decerpta per superna evacuare.

SEMEN CNICI SEU CARTHAMI.

Optima transferuntur ex agris Argentoratensibus. Sunt Cnici sativi seu Carthami officinarum C. B. P. semina oblonga, angulosa, lævia, alba, includentia sub cortice duriusculo pulpam albicantem, saporis dulcis, postea acris & nauseosi.

Planta est capitata pappescens, floribus tinctorum utuntur; multæ aviculæ vescuntur his seminibus absque purgatione, hinc quia vis languida satis, raro usurpantur. Ob lentorem subdulcem cui vis purgans inclusa est conveniens est catharticum, seriducum, tussientibus aliisque vitiis Pulmonum laborantibus.

Datur in substantia, melius in Emulsione ad ʒij. in qua commode resinæ purgantes solent exhiberi. Extractum datur ad ʒj. Elect. diacarthami datur ad ʒvj.

℞. Sem. Cartham. ʒij. ▽ foenicul. q. s. f. Emuls. contra tussim & alvi adstrictionem.

℞. Sem. Carthami ʒij. Citr. ʒj. aq. fumar. ʒiiij. Cinam. ʒß. f. Emuls. add. Mann. ʒij.

℞. Extr. diacartham. ʒß. diagr. gr. iij. extr. troch. alhand. gr. j. ʘ d. foenic. gt. ij. f. bolus purgans.

BALA-

Κνήκη, κνίη παρά τῆς κνίζης, CNICUS SATIVUS, quod pungeret notat & mordere, CARTHAMUS, ἀπὸ τῆς καθαίρειν à purgare, quamvis ROLFINGIUS velit esse vocabulum Arabicum, & alii à voce Mauritanica Karten derivent, CROCUS SYLVESTRIS,

Xx

Wilders

*Wilder, Safran / Flor / Safflor / Cartham / CARTAME, SA-
FRAN BATARD.*

Est planta flore flosculofo plurimis scilicet flosculis constante, embryoni insidentibus, & calyce squammoso & foliato comprehensis. Embryo autem deinde abit in semen pappis nequaquam instructum.

Carthamus officinarum flore croceo Tourn. I. R. H. cl. 12. S. 3. g. 1. Carthamus sive Cnicus I. B. 3. 79. Cnicus sativus sive Carthamum Officinarum C. B. Pin. 378. Cnicus vulgaris Clus. Hist. CLII.

Apud nos in Alsatia copiose colitur, neque exiguum lucrum exinde trahunt tam mercatores, quam rustici; floret Julio & Augusto, semenque interea perficitur.

Flores inserviunt potissimum ad tingendos pannos & plumas; quidam his floribus crocum verum adulterare solent, pauperesque loco ejusdem cibos iis condiunt, alvum laxare & mensium negotium promoveri, icteroque mederi dicuntur.

Semen laudatur quoque in anasarca, colica, quartana, aliisque morbis chronicis. In decoctis, infusis ac emulsionibus ad ℥iij. ad 3vj. exhibetur.

OFFICINÆ EXHIBENT

Extractum Cnicopharmacum seu Diacarthami, Safflor, Extract / Extrait de Cartame, ou Safran Batard; Laudatur hoc non adeo concinnum extractum in Cachecticis & hydropicis, sique solum usurpetur, ad ʒß. ad ʒij. datur, si vero cum aliis, ad ʒj. ad ʒij. præscribitur.

Electuarium Diacarthami, Safflorsaamen, Lattweg / Electuaire de Cartame ou de Safran Sauvage. Commendatur ad bilem & pituitam educendam & ad omnes affectus exinde oriundos. Dosis ad ʒij. ad ʒß.

Oleum, species & Syrupus de Carthamo non amplius apud nos in usu.

BALANUS MIREPSICA SEU NUX BEEN.

[Sunt glandis unguentariæ C. B. P. fructus avellanæ magnitudine,

gnitudine, triquetri, continentes sub putamine corticoso cinereo & pellicula candida fungosa nucleum pinguem & oleosum veluti amygdalæ, saporis subacris amari & oleosi, odoris nullius.]

Ob vim purgantem, quæ in o acri & amaro consistit, referri quidem debet ad purgantia, sed ob vim purgantem tardam ut plurimum ex eorum censu proscribitur.

Hodie usurpari solet o expressum pro menstruo ad extrahendos florum odoratorum odores, nam neque facile rancorem contrahit, neque alio peregrino odore florum odores inficit.

℞. Vas vitreum in imo strictius, in summo latius, in hoc mediante crate ex setis equinis facta, & circulo ligneo formata, stratificentur flores & gossypium tenuissime carptum oleo balanino imbutum per quatuor horas, exprime ex gossipio oleum, & novis floribus prædicto modo reasfunde, donec oleum sufficienter sit imprægnatum florum odore. [Conf. ulterius Joh. Zwelffer. animadv. in Pharm. Augustan. p. 331.]

℞. Cerae albæ q. v. o balan. q. s. f. ungt. pro basi omnium balsamorum, cui instilla olea destillata pro arbitrio. Cera alba in officinis plerumque adipe est adulterata, ideoque rancorem contrahit. Si vero non adulteratam habemus, non rancescit, & præfertur o Nuc. Mosch. expresso pro balsamo conficiendo, nimis enim fragrans hoc existit.

MYRO.

Βαλανὸς μυρεποικὴ, NUX & GLANS UNGUENTARIA, BALANUS, seu GLANS ÆGYPTIA, GRANUM BEN, BEN PARVUM, Egyptische Nüßlein / Salb. Nüßlein.

Arbor hunc fructum ferens à BELLONIO, Betulam tum magnitudine, tum ramis similibus, tum trunco albo referre dicitur.

Alii folia myrtiformia esse, aut ad Heliotropium seu polygonum accedere afferunt.

Glans unguentaria C. B. Pin. 402. Nux Ben, sive Glans unguentaria Park. Balanus Myrepfica Cord. Balanus Myrepfica, Pharagon incolis ad montem Sinai Bellon. Nux unguentaria arbor I. B. I. 317. Prope montem Sinai, in Arabia, Syria, Æthiopia nascitur.

Fructus maturescit in siliqua eleganti. Sunt, qui duas species faciunt, majorem, de qua hic sermo, & minorem quæ perniciosa habetur.

Oleum Balaninum, quod etiam oleum Ben appellatur, emollit juxta SCHROEDERUM, discutit, neuriticum est, scabritiem, lentiginines aliaque cutis vitia delet, tinnitui aurium subvenit. Spiritui vini supernatat, nec cum eo miscetur; unde ad experimentum, quo situs quatuor elementorum demonstrari solet, adhibetur.

MYROBALANORUM QUINQUE SPECIES.

Belliricæ. Sunt Myrobalani rotundæ belliricæ C. B. P. arboris pruniferæ indicæ folio laurino subcinericeo fructus rotundi, sæpe angulosi, magnitudine majoris gallæ, in pedunculum crassum desinentes, ex rubigineo flavescentes, includentes officulum durum sub putamine carnosio duriusculo saporis adstringentis, post subdulcis. Arabibus Belleregi dicitur.

Chebulæ. Sunt Myrobolani maxime oblongi angulosi pituitam purgantes C. B. P. arboris folia persicæ similia, fructus oblongi, omnium maximi, rugosi, coloris obscuri fusci. Includentes sub putamine carnosio officulum oblongum, crassum & cavernosum. Arbor Quebuli dicitur.

Emblicæ. Sunt Myrobalani Emblicæ C. B. P. arboris palmæ magnitudine foliis minutim incis, fructus rotundi, sexan-

hexangulares, belliricis minores, ex cinereo nigricantes, includentes officulum leve, pallidum, avellanæ minoris magnitudine hexagonum, tribus cellulis insignitum, in quo nucleus pomaceus spadiceus triangularis. Arbor Embelli dicitur.

Citrinæ. Sunt Myrobalani teretes citrini bilem purgantes C. B. P. Arboris sorbi foliis, fructus oblongi, rotundi quinque angulis rugosi, chebulis minores, coloris citrini, includentes sub putamine carnosio officulum angulosum. Arabibus Azafar dicitur.

Indæ. Sunt Myrobalani nigræ octangulares C. B. P. arboris folio salicis, fructus oblongi reliquis graciliores & tenuiores, superficie octangulati, solidi & duri intus & extus, piceæ nigredinis instar bituminis jûdaici. Arabibus Asuar dicitur.

Constant Θ e purgante blando, cum terrea substantia adstringente. Purgativa vis consistit in substantia pulposa, quæ simul aliquid resinæ habet, adstrictiva vero in substantia duriore corticosa, hinc in dysenteria aliisque alvi fluxibus, ubi simul purgatione & adstrictione opus est, conducunt.

Infusum laxat alvum absque adstrictione, in substantia & decocto purgat & simul adstringit, tostorum pulvis potentius adstringit, & nihil vel parum purgat, præ cæteris in usum vocantur Chebulæ.

Dantur in infuso ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. in decoct. ad $\mathfrak{z}\text{iss}$. in substantia ad $\mathfrak{z}\text{j}$. & ultra.

\mathfrak{R} . Chebul. $\mathfrak{z}\text{ss}$. Rhabarb. $\mathfrak{z}\text{iss}$. f. p. pro ij . dos. in Lienteria & Dysenteria.

\mathfrak{R} . Chebul. $\mathfrak{z}\text{ij}$. passul. min. $\mathfrak{z}\text{j}$. Rhabarb. $\mathfrak{z}\text{iss}$. infund. ser. lactis, add. syr. d. Cich. c. Rhab.

\mathfrak{R} . Myrobal. tost. Rhab. tost. NM. tost. ana $\mathfrak{z}\text{j}$. L. O. gr. j . f. pulv. adstringens in quolibet fluxu alvi.

Μυροβάλανοι, Myrobalanen / MIROBOLANS. Diversas Myrobalanorum species ex una eademque arbore provenire quidam putabant, at falso, uti GARZIAS ostendit, nam quinque sunt diversa arborum genera, & quod magis, mireris in regionibus 60. aut 100. leucis inter se distantibus nascuntur.

Arbor ad prunum refertur, diciturque Prunus fructu rotundo, nigro purpureo, majori dulci, C. B. Pin. 444. Prunus Myrobalanus dicta I. B. I. 189. MYROBOLAN.

Quinque Myrobalanorum species una cum virtutibus, sequentibus exprimuntur versiculis.

*Myrobalanorum species sunt quinque bonorum,
Citrinus, Chebulus, Belliricus, Emblicus, Indus.
Primo trahit choleram Citrinus, Phlegma secundo
Chebulus, è contra Belliricus Emblicus æque
Illud, & in nigram choleram niger imperat Indus.*

In multis Indiæ reperiuntur regionibus, Goa, Malabar, Bengala, Cambaya, Java &c. Cum hodie vix amplius in usum trahantur, non opus esse videtur de harum nunc correctione verba facere. A MARSILIO FICINO ad vires visceraque roboranda & homines à senectutis squalore præservandos laudantur: à quibusdam saccharo condiuntur, sed sub hac forma apud nos non reperiuntur.

In plures olim recipiebantur compositiones, quarum tamen vix non omnes hodie exolvere.

VIGET TAMEN ADHUC IN OFFICINIS

Confectio Hamech, Confection Hamech, Medicamentum hoc nauseabundum est, tormina excitat & fortiter purgat, adhibetur præcipue in morbis Venereis. *Dosis à ʒj. ad ʒvj. ad ʒj. &c.*

FRUCTUS CASSIÆ.

Est Cassiæ fistulæ Alexandrinæ C. B. P. filiqua oblonga, rotunda, cylindracea, nigricans, includens sub putamine duriusculo corticoso in certis & ordine dispositis loculamentis
femina

femina depressa, nitida, fulva & pulpam nigricantem mel-
leam. Ægyptiaca est optima, corticem habet è nigro ru-
fescens. Pulpa Θ purgans blandum in substantia visco-
sa nonnihil dulcescente occultat, purgat bilem & serum,
cietque simul Urinam, unde gonorrhœa, stranguria & cal-
culo vexatis, si alvi adstrictione laborant, conducit. Quibus-
dam tanquam singulare antipleuriticum laudatur.

Sectis à calculo hujus usus est interdictus. Cæterum ob
viscositatem torminosa est & tardæ operationis, propterea
correctorio & stimulo eget. Hanc ob rationem hypochon-
driacis non conceditur.

Interstitia lignosa possidere vim purgantem experientia
Simiarum constat, quæ hæc devorantes fortiter purgantur.

Fallopious & Fabricius vim contra stranguriam impro-
bant facto experimento in pluribus.

Datur pulpa recenter ex fructibus extracta ab ℥j. ad ij.

℞. Pulp. Cass. ℥j. sacch. cand. ℥ss. succ. liquir. ʒiʒ. cape
ad vitia renum & expellendum sabulum & præcavendam ge-
nerationem calculi.

℞. Pulp. Cass. ℥j. detur in Pleuritide.

T A.

Κασία, καίσιος σιριγγώδης. CASSIA NIGRA, CASSIA SO-
LUTIVA, CASSIA PURGATRIX, SILIQUA PURGATRIX,
CASSIA CATHARTICA, Sissulcasien / Cassienfisteln / purgieren
de Cassien / CASSE.

Est arbor flore ex quinque ut plurimum petalis in orbem po-
sitis constante, cujus pistillum abit deinde in siliquam cylindra-
ceam, oblongam, in varia loculamenta divisam à dissepimentis
transversa positis, medulla ut plurimum nigricante obductis, semi-
nibusque foetam duris.

Cassia

Cassia fistula Alexandrina C. B. Pin. 403. *Cassia purgatrix* L. B. I. 416. *Cassia nigra* Dod. Pempt. 787. CASSE DE LEVANT.

Arbor hæc perelegans crescit in Ægypto, India ejusque variis locis. Insulæ quoque Americanæ Cassiam & quidem in copia proferunt. Siliquæ hujus arboris primum virentes sunt, deinde è fulvo nigricantes, sesquipedem & ultra quandoque longæ, diametri linearum 9. aut 10. nonnihil utrinque compressæ, fascia concolori per longum producta, quam percurrit exiguus nervus paulo elatior, sulcis insuper semicircularibus veluti undulatum, annulatum & transversim cingitur. Pulpa equidem melleum obtinet saporem, sed nonnihil tamen acrem & nauseosum. Siliqua debet eligi recens, plena, gravis & sonum mediocrem edens: quæ cum contraxit vel pulpam acescentem continet, rejicienda. In cellis vinariis, latebris aut cavernis asservari, vel etiam arena operiri solet, & aqua conspergi, ut plenior & recentior videatur. De siliquis referunt, quod maturæ in arboribus ipsis adhuc pendentes, à vento agitæ, & invicem concussæ maximum edant strepitum.

Optima est Cassia, quæ ex Oriente affertur, interim tamen Americana multum quoque, præsertim in Gallia, in usum trahitur.

Datur enim *Cassia fistula* Brasiliana C. B. P. 403. *Cassia siliqua* Brasiliana purgatrix compressa Lob. Pharm. Lond. 41. *Cassia fistula* Brasiliana flore incarnato Breyn. Cent. I. 58. CASSE DU BRESIL.

Hujus fructum longe crassiores, sed breviores, nonnihil compressum, durissimum, ut malleo frangi debeat, pulpam autem amaram priorique fortiores existere & ad ℥j. assumptam plus purgare, quam vulgaris uncias duas, se expertum esse in Lusitania tradit TOURNEFORTIUS.

Quod si sola & non diluta usurpetur, vel in bolis, vel cum oleo amygdalarum dulcium exhiberi potest. In gonorrhœa virulenta conducit, imprimis si Mercurius præcipitatus viridis & terebinthina addantur. Hæmorrhoidum ardorem mitigat, sitim sedat, fibras ventriculi & intestinorum exsiccatas laxat. Vim Emeticorum obtundit, eaque per inferiora evacuare cogit. Alvo pigra laborantes commode sugunt fistulas cassiæ. Conducit in febribus ardentibus & inflammationibus, tum internis, tum exter-

nis,

nis. Habet tamen hoc vitii, quod flatulenta & iusto humidior sit, hinc adjectis aromatibus, seminibus sale Volatili pollentibus, sale tartari &c. corrigitur. Non prodest in colica flatulenta, neque in languore ventriculi. Notant authores, Cassiam insignem habere stimulum in recessu, unde sæpius ardor Urinæ cum copioso ejus profluvio subsecutus est, adeoque caute procedendum esse suadent, neque facile in mictu cruento, diabete & similibus Urinæ vitiis ea utendum esse dicunt. Non conducit hystericis.

IN OFFICINIS PROSTANT

Pulpa Cassiæ, quæ flos quoque atque Medulla Cassiæ, Cassia extracta, Cassia cribrata, Cassiæ atramentum dicitur. *Casienmarck. Pulpe de Casse.* Dosis est ad ℥ij. ad ℥jss. & ultra.

Pulpa Cassiæ pro clysteribus, Cassia pro clysteribus, Clystier. Casien/ Pulpe de Casse pour les lavemens, immiscetur clysteribus ad ℥j. ad ℥ij.

Electuarium Diacassiae cum Manna, Lattweg von Casien und Manna/ Electuaire de Casse avec la Manne. Medicamentum est leniens & laxans, conducens iis, qui alvo sunt duriores. Dosis ad ℥j. ad ℥ij.

Plures præterea alias compositiones ingreditur Cassia. Quod si pulpa Cassiæ, quæ facile acescit, in quantitate aquæ sufficiente diluatur, & in doliolo per aliquot menses reponatur, sal essenziale Cremori Tartari simile præcipitabitur, quod si vero destilletur, in phlegma acidum & oleum mutabitur. Referente porro **TOURNEFORTIO**, ex duabus libris Cassiæ extrahitur libra dimidia pond. civilis phlegmatis acidi, phlegmatis insipidi uncia tres. Quod si ulterius liquor iste destilletur, dicit prodire uncias sex spiritus Urinosi volatilis, olei drachmas sex, unciam circiter salis fixi, remanente capite mortuo.

TAMARINDI.

Sunt filiquæ Arabicæ Tamarindus dictæ C. B. P. fructuum pulpa ex fusco nigricans, saporis subacidi, raris per longitudinem lignosis filamentis pertexta, distincta in membranacea locu-

loculamenta, in quibus inclusa latent officula dura quadrata, ex fusco rubicunda & splendentia.

Horum pulpa in substantia acido-vinosa possidet vim laxantem blandam ad morem \square ri, propterea appropriatissima est & tutissima, in æstu reprimendo, præcipue febrili, ubi opus est simul laxante, ejus temperato acido bilis mulcetur & sanguinis nimia effervescentia sedatur, stomachus quoque roboratur, ejusque fermentum restituitur. In nidorosa cruditate cum rhabarbaro valde commendatur. In nimio hæmorrhoidum fluxu à sanguine acriore & bilioso laudatur à Mercato pro laxante: \square us etiam ex horum pulpa paratur.

Datur substantia ab \mathfrak{z} j. ad ij. vel cruda, vel soluta cum ∇ appropriata. Decoctum ad \mathfrak{z} iiij. Pulpa ad \mathfrak{z} i β .

\mathfrak{R} . Pulp. tamarind \mathfrak{z} j. Rhabarb. \mathfrak{z} j. f. bolus in cruditate nidorosa.

\mathfrak{R} . Pulp. tamarind. $\mathfrak{z}\beta$. Crem. \square ri. \mathfrak{z} ij. syr. d. Rhabarb. \mathfrak{z} v. ∇ Cichor. q. f. pro diluenda pulpa M. f. potio purgans.

\mathfrak{R} . Pulp. tamarind. \mathfrak{z} ij. coq. in f. q. ∇ æ. \mathfrak{R} . Colat $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ j. add. Tinct. rosar. violar. ana \mathfrak{z} j. syr. rib. f. berber. \mathfrak{z} j. f. julapium ad Linguae ariditatem.

\mathfrak{R} . Pulp. tamarind. \mathfrak{z} ij. passul. min. \mathfrak{z} j. coq. cum sero lactis. f. decoctum ad sitim fallendam.

\mathfrak{R} . Decoct. hord. Corn. Cerv. ana $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ j. pulp. tamarind. \mathfrak{z} iiij. f. potus in febribus malignis usitatissimus. Add. tincturam bezoardicam quamcunque vel ω -um theriacalem camphoratum, vel aquam theriacalem camphoratam.

SE.

niam folia, sole Occidente sese contrahere, Oriente autem aperire solent, *Tamarin*.

Est arbor flore rosaceo, plurimis petalis in orbem dispositis constante, ex cujus calyce multifido surgit pistillum, quod deinde abit in siliquam compressam, aliam condentem, semine foetam plano ut plurimum angulato, intervallum autem, quod inter duas siliquas occurrit, pulpa turget plerumque nigra & acida.

Tamarindus Raji Hist. 1748. *Tamarindi* L. B. 1. 422. *Siliqua Arabica*, quæ *Tamarindus* C. B. Pin. 403. *Tamarindus* Derelside appellata P. Alp.

Crescit hæc arbor in Arabia felici, inque India Orientali & Occidentali, à R A J O semel in anno mense Novembri florere dicitur.

Fructus hujus arboris *TAMARINDI*, *Tamarinden*/ dicti, appellantur quoque *DACTYLI INDI*, *ACETOSI*, *ACIDI*, *PALMULÆ ACIDÆ*, *PALMULÆ NIGRÆ*, *Saurdattlen*/ *schwarze Dattlen*/ quamvis nullam cum dactylis habeant convenientiam. Afferuntur ad nos non integri, sed contusi, ut compactiores aërem externum non tam facile admittant.

In febribus biliosis, inflammationibus, ictero, renum affectibus & aliis morbis ab acrioribus humoribus oriundis, non solum laxandi, sed & alterandi gratia usurpantur tamarindi vinoso sapore se commendantes. Sitim sedant, appetitum excitant, nauseam & vomitum arcent, vermes necant, prosunt in scorbuto, in fluxu sanguinis narium & uteri conducunt, putredini resistunt & in gonorrhœa virulenta prosunt, in affectibus renum quoque laudantur. Quum *Tamarindi* ad nos impuri devehantur, ut liberentur à filamentis & seminibus, per cribrum trajiciuntur.

HINC IN OFFICINIS ASSERVATUR

Pulpa Tamarindorum, *durchgetriebene Tamarinden*/ *Pulpe de Tamarindes*, eodem modo extrahitur ac pulpa *Cassia*, & ab ea differt, quod magis sit acidula, & non tam laxitatem, quam constrictionem post se relinquit. Scopo laxandi ad unciam semis ad ʒjss. datur.

℞. Pulp. Tamar. rec. expr. Pulp. Cass. rec. expr. Diacyd. lucid. Gialap. ana ʒvj. Msc. d. ad ollam, dosis quantum 2, vel 3: cultri cu-

spidibus comprehendi potest, vel singulis, vel alternis diebus, pro obstructionibus alvinis referendis. Addi poterit tartarus solubilis & syrup. flor. persicorum aliusve.

Tamarindorum pulpa validiora purgantia, quæ fauces & ventriculum inflammare solent, corrigit, & radicem esulæ semenque Ricini probe emendat.

Ex Tamarindis, monente rursus **TOURNEFORTIO**, sal essentielle Cremori Tartari simile extrahitur. Elicitur quoque exinde spiritus ad acetum accedens. Majori itaque acidi copia gaudet quam Cassia, quæ copiosiore sulphure pollet.

SEMEN ATRIPLICIS.

Sunt atriplicis hortensis albæ, seu pallide virentis C. B. P. folliculi membranosi orbiculati ex binis folliculis conflati, includentes semen unicum compressum orbiculatum spadicum, saporis dum recens nidorosi.

Sale nidoroso emolliente & laxante pollent sed debili, adeo ut vix in usu sint. Interim Matthiolus [l. 2. c. 112. p. m. 364.] ex Serapione vim purgantem emeticam satis validam his attribuit, quæ vis tamen intelligenda est de recentioribus. Quibusdam commendantur in ictero, dum obtundunt & evacuant bilem.

℞. Sem. atriplic. ʒij. propina cum ▽ calida, ad laxandam alvum.

℞. Sem. atripl. cannab. ana ʒj. coq. in lacte, datur in ictero.

SE-

Α' τράφαξις παρὰ τὸ αἰθρώως αὐξεῖν, quod cito prodeat & crescat, χρυσολάχανον, OLUS AUREUM, Molten / Milten / Melten / Garten-Melten / ARROCHE, FOLETTES, BONNES DAMES.

Est planta flore apetalo, plurimis scilicet staminibus constante, ex calyce pentaphyllo surgentibus. Pistillum autem deinde abit in semen orbiculatum, planum, ipso calyce seu capsula obvolutum.

Atriplex

Atriplex hortensis alba sive pallide virens C. B. Pin. 119. Atriplex alba hortensis L. B. 2. 790. Atriplex sativa alba Lob. Ic. 253.

&
Atriplex hortensis rubra C. B. Pin. 119. Atriplex rubra hortensis L. B. 2. 97. Atriplex sativa altera folio & flore purpureo livens Lob. Ic. 253.

Satæ hæ species humore satiari amant, florent Junio & Julio.

Inter olera quæ ἀπορία, fatua, inertia, & insipida appellantur, recensentur, & à multis olim, & a quibusdam hodie adhuc in cibis, præsertim vere, usurpantur.

Atriplex quoque agrestis sive sylvestris annonæ caritate urgente in usum trahitur. Leve autem, ut pronunciat SEBIZIUS, nutrimentum vescentibus præbent, stomachoque ob humiditatem nocent, nisi aromatibus, sale aut aceto condiantur. Jubent quoque, ut non nisi aqua sæpius mutata coquantur, cum alias varias noxas cachexiam, hydropem &c. causentur. Recipiuntur sæpius in juscula refrigerantia & humectantia ut & decocta emollientia. Cataplasmatibus quoque immiscentur. Calidis & macris naturis conducunt.

SEMEN SAMBUCCI.

Sunt Sambuci fructu in umbella nigro C. B. P. acini exigui oblongi, plani, saporis subacris & nauseosi. Grana seu semina habent vim blandam laxantem & Urinas moventem simulque in recessu adstringentem. Vis purgans consistit in oleo, quod ex his exprimitur. Baccarum pulpa diaphoresin potius, quam Catharsin excitat.

℞. Sem. sambuc. coq. cum jusculo gallinaceo, add. rad. petrosel. q. v. f. apoz contra hydropem.

℞. Pulp. gran. actes, farin. secalin. f. pasta, exhibe cum decocto C. C. contra pleuritidem. Quercetanus laudat quoque in dysenteria.

℞. Olei expr. gran. actes ʒj. propina ex Cerevisia butyracea ad movendum Vomitus hydropico, quod ut arca-

num laudat Hoffmannus in Clave, dicitque ꝑ illud exprimi ex arillis baccarum post succi transcolationem in filtro relictis. Laudatur & sequens hoc:

℞. Olei expr. gran. act. q. v. inunge ventriculi regioni pro laxanda alvo in hydrope.

SEMI-

Ακλή, Ακλής, АСТЕ, quia littora & loca humida amat, S A M-
BUCUS à Sambyce, instrumento quodam Musico, ab inventore
suo nomen habente. Holunder / Holder / Holder, Baum / Hol-
der, Staud / Glieder. SUREAU.

Est planta flore monopetalo rotato multifido, cujus meditullium à mucrone calycis tanquam à clavo perfoditur, calyx autem deinde abit in baccam succi plenam & seminibus foetam oblongis. Sambucus flore fructuque carens foliis conjugatis & foetidis dignosci solet.

Sambucus fructu in umbella nigro C. B. Pin. 456. Sambucus vulgaris L. B. I. 544. Sambucus Dod. Pempt. 845.

Arbor admodum vulgaris, sine ullo negotio, humectis præfertim & tenebrosis locis, juxta sepes, muros aliisque incultis nascitur. Mature germinat, Majo floret, Autumno maturitate nigrescunt acini.

Virtutibus adeo excellit, ut non solummodo juxta quosdam rusticorum constituere possit pharmacopolium, sed & pronunciantem THOM. BARTHOLINO de MED. DAN. plus in ea arbore Medicinæ lateat & tutior omni tempore sit salubritas, quam in pomposis antidotis, patre Theriaca & matre Mithridatio. Omnes Sambuci partes in usum trahere licet, radicem, corticem, librum, medullam, turiones, flores, folia, baccas & spongiam. Succus RADICIS atque FOLIORUM purgat, & in hydrope conducit, id quod etiam præstant, dum in vino decoquuntur. CORTEX SAMBUCI & imprimis medianus, Mittlere Holder-Kind/ECORCE MEDIANE ou MOYENNE de SUREAU, viridescens, externum gryseum insequens, est remedium hydragogum insigne; obstructions hepatis referat, & negotium mensium promovet. Commendatur hinc in
hydrope,

hydrope, ita ut ℥ss. vel ℥j. vel plus corticis recentis in vino infundatur & postmodum vel per se, vel cum aliis exhibeatur.

Succus corticis præterea expressus ad ℥j. vel ℥iiss. hydropicos insigniter evacuat. Idem cortex Medianus imponitur erisypelati, & pedibus podagra affectis. Tomenta nempe corticis locis morbidis circumligantur, & iisdem exsiccatis renovantur. Specificus quoque dicitur hic cortex contra ambusta, si recenter coquatur in oleo veteri, vel oleo lini, addendo succum expressum corticis ad imprægnationem olei, postea coctio continetur & exprimatur. Cum cremore quoque lactis ad eundem conducit scopum. Succus hic præterea verrucas delet.

MEDULLA SAMBUCI, Holder-Marc/ MOELLE DE SUREAU, conveniens est in dilatandis vulneribus ulceribusque, ut & apertis servandis fontanellis. Laudatur quoque ad urinam & calculum pellendum, ut & in hydrope.

TURIONES, sive GEMMULÆ aut CYMÆ, die Holder-Sproßlein/ Holder-Reimen/ Holder oder Glieder-Spargen/ BOURGEONS DE SUREAU, vere prodeuntes adhibentur ad evacuationes per superiora & inferiora instituendas. Vel ita per se comeduntur, ubi tamen ingratiorem saporem habent, vel bulliti cum aceto & oleo instar acetarii usurpantur. Vulgus credit, turiones Sambuci sursum decerptos vomitum excitare, deorsum vero ablato per inferiora operari. Curiosius est, si verum, quod refertur in *ACTIS ERUD.* 1682. p. 150. Ubi *TILKOWSKY* verba hæc leguntur. Detrahebatur medius ex Sambuco cortex, & hydrope correpto cingulotenus supponebatur. Si detrahebatur deorsum cortex, descendebat, si deradebatur cortex sursum, ascendebat hydrops. De floribus vide infra. **BACCÆ, Holder-Beeren/ BAYES DE SUREAU,** sunt alexipharmacæ & sudoriferæ, atque diureticæ, hinc in febribus, passionibus hystericis, scorbuto aliisque morbis pluribus adhibentur. Obesitatem quoque conciliare dicuntur, crudæ autem vix usurpantur, cum Ventriculo molestiam creent. Oleum ex arillis baccarum Sambuci laudatur præsertim ad philtia. De spongia Sambuci supra actum.

Ex hætenus recensitis Sambuci partibus

IN OFFICINIS PROSTANT

Tragæa granorum actes, ex succo baccarum, Anhaltend Magen-Pulver/

Pulver / *Poudre stomachale adstringente.* Specificum dysentericum censetur. Dosis ad ʒj. ad ʒʒ. Commendatur quoque adversus venena varia.

Spiritus Sambuci ex baccis per fermentationem, Holderbeerens.
Spiritus / *Esprit de bayes de Sureau par fermentation.* Vires obtinet discutientes & diaphoreticas, interne & externe usurpatus, datur ad guttas viginti, triginta & ultra.

Rob Sambuci, Holder. Muß / Rob de Bayes de Sureau. Adeo præstans est, ut vulgus etiam Theriacæ adæquet; vocatur etiam à quibusdam Theriaca Germanorum. Insigne est diaphoreticum, totam massam sanguineam purificat, unde in omnibus morbis, ubi expulsione opus, usurpatur. Hydropicis conducit, & virtutem quoque habet antifebrilem. Sumitur ad dimidium, ad cochlear unum & ultra, vel per se, vel cum vino aut aqua quadam appropriata. Sunt, qui ex rob cum Spiritu Vini parant essentiam, interne sudoriferam, externe vero tumores discutientem, & suffocationibus uterinis succurrentem.

Unguentum Sambucinum è cortice mediano, *Holder. Sälbel / Onguent d'Ecorce de Sureau.* Medetur ambustis & dolores imprimis à vesicatoriis excitatos mire sedat, præsertim si commisceatur cum Balsamo Sulphuris Rulandi.

Nota tandem, quod, ut plures volunt, Sambucus super salice nascens tum interne exhibitus, tum externe tanquam amuletum, si appenditur, laudetur in epilepsia, monent autem superstitiosi ne manibus tangatur.

Folia Sambuci analysi Chymica multum phlegmatis acidi & urinosi, mediocrem quantitatem salis volatilis, magnam autem quantitatem terræ & olei suppeditant, flores iisdem fere gaudent principiis, excepta quantitate sulphuris narcotici, à quo odor Sambuci foetidus ad opium accedens provenire videtur.

SEMINA BLANDA VISCOSITATE CONSTANTIA.

SEMINA GOSSYPII SEU BOMBACIS

Sunt Gossypii frutescentis semine albo C. B. P. semina oblonga, rotunda, aliquantum compressa, magnitudine ciceris, quæ viscida lanugine candida includuntur, pericarpis corticosis in tres quasi carinas dehiscunt, saporis subdulcis, odoris nullius.

Planta in qua nascitur gossypium, est flore malvæ vel althææ.

Duæ sunt species, annua & perennis, annua adfertur ex India Occidentali, facile etiam hujus semina germinant in nostris terris. Perennis ex oriente. Tertia etiam datur species, quæ lanuginem sericam profert, quæ ex plantis perennibus præstantior.

Ratione subdulcis & blandi viscosi Pulmonibus dicata sunt & acria quævis temperant, conveniunt in phthisi, tussi & raucedine.

℞. Sem. bombac. Card. Ben. Mar. ana q. v. c. ▽ puleg. q. s. f. Emuls. in tussi vel ▽ fl. papav. contra Pleuritidem.

SEMEN

ξύλον, Γοσσίπιον, BOMBAX, BOMBACIUM, COTONEIFERA, VITIS LANIGERA, Baum-Wollstauden oder Baum/COTTON.

Est plantæ genus flore monopetalo campaniformi, patente & multifido, ex cujus fundo emergit tubus pyramidatus, staminibus plerumque onustus. Ex calyce vero surgit pistillum, infimæ floris patri tuboque ad instar clavi infixum, quod abit in fructum subrotundum

tundum, in quaterna aut plura loculamenta divisum, apice dehiscen-
tem seminibusque foetum obductis molli illa lanugine, in fila ducti-
li, quæ Xylon seu Gossypium appellatur.

Prima, ab authore nominata, Bombacis species est.

Xylon sive Gossypium herbaceum I. B. I. 343. Gossypium
frutescens semine albo 430. Bombax officinarum. Hæc species
in Insula Creta seu Candia, Lemno & in Syria reperitur. Mul-
tum quoque hodie colitur in Cypro, Melita & Sicilia, occurrit quo-
que in India tum Orientali, præsertim China, tum Occidentali; se-
ritur quotannis.

Altera species arborefcit, & dicitur Xylon arboreum I. B. I.
346. Gossypium arboreum caule lævi C. B. Pin. 430. Gossypi-
um arboreum Gotte M. Segiar Prosp. Alpin. Ægypt. 29. Flore est
atro purpureo; datur tamen etiam species flore flavo.

Ex harum plantarum fructibus obtinetur jam lanugo ista, quæ
GOSSYPIMUM, COTTONEUM, COTTON, COTTO, COTTUM, LA-
NA XYLINA, Baum-Woll / COTTON, appellatur. Quantis usibus
œconomicis inserviat, quantum reddituum imperantibus & merca-
toribus exinde proveniat, nostrum non est memorare, sicut quo-
que nobis non incumbit examinare, quodnam Gossypii genus altero
præstet.

Gossypium ustum sanguinis profluvium sistit, & accensum
Hystericas solatur; quidam eodem utuntur ad turundas. Alias in
cucuphis usurpatur. Sæpissime vero & frequentissime Medicamenta
Otica cum eodem applicantur; formantur & exinde poma sic dicta
ambrae sive odorifera.

Semina renibus quoque atque Hepati dicantur, & ob vim de-
mulcentem in dysenteria prodesse feruntur; ast cum non adeo stoma-
cho benefaciant, ideo rarissimi sunt usus. Oleum è seminibus
expressum cutis maculas fere quasvis delet.

Tertiam denique quod attinet ab authore citatam speciem, vi-
detur illa esse eadem, quæ suppeditat istam lanuginem, quam
HOuatTE, HOUE'TTE, Watt oder Seiden, Watt / appellitant,
de qua quidem quædam circumferuntur icones, sed nullæ certæ
descriptiones.

SEMEN HORDEI.

Viscositate adeo blanda & temperata constat, ut tam pro medicamento, quam alimento habeatur, tanquam anodynum & mulcens acria quævis, & ex his natos affectus, hinc in febribus ardentibus, in nimia sanguinis effervescencia, in compescenda siti, aliisque usurpatur. Externe quoque emollit, maturat, & anodynum est.

Datur hordei emulsio, cremor, semina etiam mundata vel ustulata, vel ad crepaturam cocta, datur etiam decoctum.

℞. Sem. hord. ad crep. coct. ℥ij. ▽ Card. B. q. f. f. emuls. temperans & refrigerans in febribus.

℞. Decoct. hord. ℥ij. ▽ Cinam. ℥j. syr. rosar. & violar. ana ℥ss. lap. prunell. ℥j. f. Julap. temperans & refrigerans in febribus ad sitim fallendam.

℞. Decoct. hord. ℥ij. syr. limon. ℥ij. — ⊕l. q. f. f. Jul. refrigerans.

℞. Hord ℥ij. liquir. ℥ss. passul min. ℥j. M. f. decoct.

℞. Ras. C. C. hord. ana ℥ij. coq. ex ▽ f. q. add. syr. Card. Ben. f. decoctum temperans in Variolis & Morbillis, in quo & specifica possunt exhiberi.

℞. Hord. mund. ℥ij. rad. chin. ℥ss. coq. in ▽ f. apoz. in febribus ardentibus.

℞. Decoct. hord. ▽ sperm. ranar. ana ℥ij. sem melon. cucum. ana ℥j. amygd. d. n. vij. f. Emuls. ad fluxum hæmorrhoidum nimium à sanguine acriori, in alvo adstricta potest addi Mannæ. ℥ss.

℞. Hord. ⊕commun. ana Mj. inde sacco & applica abdomini ad tormina & inflationes: de usu farinæ hordei v. cap. de lino & foenu-græco.

HORDEUM, vel a' oriendi celeritate, vel ab horrore obmordacem & pungentem aristam, vel quasi **FORDEUM** φέρω nutrio, dictum, Græcis κριθή, Germanis **Gersten** / Gallis **ORGE** audit.

Est planta flore apetalò, per fasciculos in spicam disposito. Singuli nempe flores plurimis staminibus constant ex calyce surgentibus. Pistillum autem abit in semen oblongum, farinaceum, utrinque acutum, ventre tumido, glumæ, quæ calyx floris fuit, arcte adhærescens. Singuli fasciculi axi dentatæ affixi spicam constituunt.

Hordeum polystichum hybernum C. B. Pin. 22. **Hordeum polystichum** I. B. 2. 429. **Hordeum polystichon Hybernum majus** Tabern. Ic. 274. κριθή πολυστήχη, **Winter-Gersten** / **Große Gersten** / **GROSSE ORGE**. &

Hordeum polystichum vernum C. B. Pin. 22. **Hordeum hexastychum pulchrum** I. B. 2. 329. **Hordeum polystichum æstivum** Tab. Ic. 275. &

Hordeum distichon quod spica binos ordines habeat Plinio C. B. Pin. 23. **Hordeum distichum** I. B. 2. 429. **Hordeum distichum æstivum trimestre minus** Tabern. Ic. 274. **Sommer-Gersten** / **Futter-Gersten** / **Kleine Gersten** / **PETIT ORGE**.

Hoc ultimum frigoris impatientissimum Martio, Aprili & Maio demum seritur. Alterum vero hybernum ante hyemem in terram conjicitur. Maturescit autem atque demetitur ante triticum & secale; Distichum postea demum colligitur; Usurpantur grana. **Hordeum** in cortice suo possidet vim abstergentem, temperantem vero & mitigantem in pulpa, quæ summe est leniens, nutriens, humectans.

Antiquissimum in cibis hordeum est, & in culinis etiam nostris temporibus frequentissimum. Usurpatur autem **HORDEUM EXCORTICATUM**, aut **DECORTICATUM**, **Gerölte Gersten** / **ORGE MONDE**, quod duplex est, **MAJUS** & totum fere nucleum continens excepto cortice, **große gerölte Gersten** / atque minus, **HORDEUM PERLATUM**, **HORDEUM ORBICULATUM**, **Klein gerölte Gerst** / **Ulmer Gerst** / **Perlen-Gerst** dictum, quod quidem palato abblanditur, sed tantum cremoris ac prius non suppeditat. Non opus hic est multa dicere de ptisana, pollenta, Maza &c. ex hordeo

deo olim parari solitis, de quibus videri potest celeberrimus MELCHIOR SEBIZIUS de alimentorum facultatibus. Sufficit exinde sequentia hic allegasse.

Nostræ mulierculæ ptisanæ genus faciunt gustu haud ingratum. Sumunt hordeum decorticatum, à sordibus repurgatum & aqua ablutum, idque in aqua tam diu coquunt, donec mucilaginem in aquam deponat, quam postea auferunt & cum brodiò carniū caponum aut Gallinarum denuo ad pulticulæ consistentiam percoquunt, adduntque in fine decoctionis tantum salis aut sacchari, quantum palato arridet. Addi possunt vitella ovi, amygdalæ dulces &c. ut hecicis, Phthisicis atque dysentericis magis profint.


Pulmenta etiam hordeacea, nostris mensis sunt usitatissima. Conficiuntur apud nos ex hordeo decorticato modo sequenti. Primum hordeum à quisquiliis & sordibus repurgant. Deinde calida aqua abluunt. Tum alia in aqua horis aliquot, dum diffiliat & mucilaginem reddat, coquunt. Quarto hac ratione coctum una cum mucilagine in vas foraminulentum conjiciunt, & aquam frigidam affundunt, ut omnis transcoletur mucus. Tandem hordeum denuo in carniū brodio ad justam consistentiam crassiorem tenuioremve pro voluntatis arbitrio elixant, saleque & petroselino, aliquando & aceto condiunt. Ejusmodi pulmenta, præsertim absque aceto, & ægris saluberrima sunt raroque nocent, larga licet manu exhibita.

Hordeum non decorticatum usurpatur præsertim ad decocta pro potu, ubi notandum, quod coctio solummodo ad crepaturam hordei debeat institui, ne potus nimis mucilaginosus & ingratus evadat. Decoctum hordei est vel simplex, vel compositum cum glycyrrhiza & passulis aliisque pro intentione Medici. Cum hoc decocto hordei simplici fiunt emulsionēs, quæ edulcoratæ & glacie refrigeratæ æstivis mensibus in regionibus calidioribus frequentissimi usus sunt, Gallis vocantur ORGEAT. Decoctum hordei inservit etiam pro gargarismate in ulceribus oris abstergendis, præsertim si mel rosatum addatur.

Ex farina hordei parari quidem possunt panes, sed non adeo præstans præbent alimentum. Pabulum sunt tenuioris fortunæ hominū & vigente caritate annonæ. Commendatur interim ejus-

modi panes catarrhosis, Hydropicis, Podagricis, & mensium nimis fluentium affectione laborantibus.

Viget hodie mos, cum hordeo tum non excorticato, tum decorticato, ustulato, decocta instar potus Caffé parandi & matutino præsertim tempore hauriendi.

De MALTO quod ex hordeo paratur, audiendus adhuc supra allegatus author. Maltum, inquit, AETIUS Βύνη vocare videtur. Germani Malz appellant. Conficitur ex hordei granis ad Beræ seu Cerevisiæ decoctionem, & quidem præstantissimum Martio & Aprili mensibus. In quibusdam locis ex tritico fieri solet. Frumentum per biduum triduumve in aqua maceratur, ut eluatur, humectetur & intumescat. Deinde in pavementum siccumve tabulatum transponitur, ut imbibitum humorem aliquatenus exuat, & germinet. Tum lento igne in officina maltaria quadantenus torrefit, aut mensibus æstivis vigente æstu loco eminentiore atque perflato tenuiter per tabulatum sparsum exsiccatur, sæpiusque per diem vertitur. Tandem in molendinum deducitur, & in crassiorem farinam, quam MALTUM COMMOLITUM nuncupant, confringitur. Ex hoc malto cum lupulo paratur atque excoquitur istud potulenti genus quod CEREVISIA, CERVISIA, BERA, BIERA, , VINUM HORDEACEUM, Bier / de la BIERRE, vocatur, de qua consulatur aliquoties jam citatus SEBIZIUS. Notandum hic solummodo, quod potus hic alimento Medicamentosus, de quo SALERNITANI canunt

*Crassos humores nutrit cerevisia, vires
Præstat & augmenta carnem generatque cruorem,*

non debeat eligi vel nimis recens, vel nimis vetustus, imprimis qui acescere incipit. Mediæ ætatis Cerevisia quæ deferbuit, & à fecibus liberata, mensibus hybernis Martio præsertim parata, cæteris paribus optima. SALERNITANI ita loquuntur.

*Non acidum sapiat cerevisia, sit bene clara,
Ex granis sit cocta bonis, satis ac veterata,
De qua potetur, stomachus non inde gravetur.*

Farina hordei externe cataplasmatibus immiscetur, pro scopo resolvendi, emolliendi & maturandi. Tan-

Tandem quoque vel verbo mentio facienda sacchari hordeati, *Sucre d'Orge*, de quo infra sub Saccharo.

SEMENT CANNABIS.

Sunt grana subrotunda parva, quæ sub tenui cortice ex cinereo spadiceo glabro includunt medullam albidam, saporis subdulcis.

Hujus mucago nonnihil olei conjunctum habens, acrem volatilemque bilem à qua icterus oritur, mire temperat & compefcit, obtinet quoque vim stupefactivam, quæ ex recentis plantæ odore gravi, idem exsiccatione manifeste percipiuntur, orgasmum genituræ maxime compefcit, & propterea tanquam antaphrodisiacum & specificum contra gonorrhœam laudatur.

Turcæ præparant suum Maslach seu Banque hoc modo. Recipiunt folia cannabis minoris recentissima, in pulverem terunt in olla, in qua butyrum fuit asservatum, torrent, madefaciunt, hocque aliquoties repetunt, & utuntur singulis diebus, quando sibi stuporem inducere volunt.

In India orientali alia est planta ex qua fit Banque, *Althæa gossypii* folio sapore acetosæ, terunt etiam in pulverem, miscent cum butyro & oryza [descripta est hæc planta ab Hermanno nostro Hort. Lugdun. Batav. p. 25. conf. etiam Garz. ab Horto l. 2. c. 25. p. 242. it. de Maslach. Turcarum Wedel. opiolog. l. 2. f. 4. p. 1. p. 168.]

Datur in Emulsione, decocto. it. ss expressum.

℞. Sem. cannab. ʒij . coque in lacte bubulo ad crepaturam usque, cape hujus decocti ʒv . bis vel ter in die, contra icterum ex acri & volatiliore bile.

℞. Sem. cannab. ʒij . sem. lactuc. portulac. ana ʒij f. Emuls.
ex

ex ▽ portulac. & Nymph. s. q ad extinguendam ♀em, adde si præstantiorem expetas ○ præpar. ὤβ. sacch. ὤn. gr. vij. sem. agn. cast. ʒj.

℞. Sem. cannab. ʒvj. 4. frig. maj. ana ʒj. f. Emuls. cum ▽ Menth. add. succin. præpar. oss. sepiæ ana ʒj. syr. nymph. q. s. ad gonorrhœam.

Oleum expressum inungitur regioni renum contra gonorrhœam.

FRU.

Κάναβις, Κάναβιον, quoniam ad fonticulos, scaturigines, lubens & sponte sata luxuriat, CANAPUS. ἀσέριον, χαϊνόλεον, à texendis ex ea funibus. Hanff / CHANVRE.

Est planta flore apetalò, plurimis scilicet staminibus calyce insidentibus constante, & sterili. Embryones enim iis speciebus Cannabis innasci solent, quæ flore carent, abeuntque deinde in capsulam semine foetam subrotundo.

Cannabis sativa C. B. Pin. 320. Cannabis mas I. B. 3. 477. Cannabis foecunda Dod. Pempt. 535. Zahner. Hanff / so Samen trägt. CHANVRE MALE OU FECOND. &

Cannabis erratica C. B. Pin. 320. Cannabis foemina I. B. 3. 447. Cannabis sterilis Dod. Pempt. 535. Wilder. Hanff / Femmel / Simmel / Simmel. Hanff / CHANVRE, CHANVRE FEMELLE.

Utraque species ex uno eodemque semine producitur. Vere in agris seritur & colitur, foemella prior maturescens meliorque ac præstantior ad pannos conficiendos, Julio matura vellitur, Mas Augusto vel etiam Septembri semen largitur.

De usu Cannabis œconomico, dum caules præparati ad fila, funes, linteamina &c. paranda inserviunt, cum is in vulgus sit notissimus, non opus ut multa verba fiant, id solummodo notandum esse censeo, quod aquæ, in quibus cannabis caules ut & Linum macerantur, evadant insaluberrimæ, & non tantum piscibus lethales, sed & hominibus exitiosæ. In usum Medicum venit

venit semen, sed raro. Olim semine Cannabis frixo cum tragema-
tibus aliis utebantur. Nostrum seculum, ut SEBIZIUS loquitur,
has delicias non curat, & semina Cannabis aviculis quibusdam pro-
jicit, inter alias etiam Gallinis, quæ exinde oviferaciores reddun-
tur. Ventriculum gravat caputque tentat. Sunt tamen, qui in tussi
illud commendant. Dosis seminis Cannabis est in substantia ad
ʒj. ad ʒj. Externe emulsiones Cannabinæ laudantur quoque ad
Cephalalgiam. Menses atque urinam in vino sumptum pellit. In
laxitate uvulæ semen Cannabis in posca parum coctum & colatum
pro gargarismate maximopere à SACHSIO in Ampelographia
laudatur. Curiosum quod dicunt de herba, equos nempe à mu-
scarum tabanorum & asilorum injuriis immunes reddi, si ea dor-
sum aliæque partes externæ fricentur.

IN OFFICINIS PROSTAT

*Oleum Cannabis, ausgepreß Hanffsaamen-Dehl / Huile de
Chenevis; emollit & resolvit, ad ambusta ut & ad dolores Ischia-
ticos conducit.*

FRUCTUS ET SEMINA SUBDULCIBUS
PARTICULIS ET OLEOSIS TEMPERATIS
CONSTANTIA.

AMYGDALÆ DULCES.

Hi nuclei terræ commissi facile progerminant, & citis-
sime in arbores excrescunt, aliquando vero ex dulcibus
fiunt arbores fructus amaros ferentes, & vice versa ex amaris,
in meliorem terram transplantatis.

Ob vim alimentosam conveniunt in phthisi, hæctica,
tabe, atrophia: ob vim medicamentosam conveniunt in
omnibus affectibus acrioribus, mulcendo & obtundendo,
tormina quoque tollunt.

Duplex parari potest ꝑꝑ, unum ex amygdalis parum cre-
matis

matris præloque commissis, quod optimum, si plane non cremarentur adhuc melius esset. Alterum fit evaporando emulsiones factas, tum \circ remanet, quod nullius momenti.

Ob oleum quo gaudent, fœces alvinas induratas emolliunt & alvum solvunt, Urinæ acridinem temperant, temperant quoque acidum, à quo sæpe inflammationes internæ, pleuritis nempe & nephritis oriuntur.

Datur eorum substantia, emulsio & \circ expressum: oleum interne datur, quando recens est expressum, nam inveteratum rancidum est & nauseosum.

℞. Amygd. d. excort. \mathfrak{z} ij. aq. rub. id. q. f. aq. rosar. par. f. Emuls. nutriens & confortans, conveniens imprimis in phthisi & tabe, add. Magist. perlar. \mathfrak{z} j. it. aq. Cinam tantill.

℞. Amygd. dulc. $\mathfrak{z}\beta$. sem. pap. alb. \mathfrak{z} ij. ∇ Nymph. q. f. f. Emuls. add. Ebor. $\mathfrak{z}\beta$. fyr. d. Nymph. $\mathfrak{z}\beta$. datur pro refrigerante & somnum inducente.

℞. Decoct. hord. aq. sperm. ranar. ana \mathfrak{z} iiij. sem. pap. alb. \mathfrak{z} ij. gland. immatur. num. ij. amygd. d. n. v. f. Emuls. add. Miv. Cydon. \mathfrak{z} vj. Magist. Corall. \mathfrak{z} j. Unicorn. fossil. gr. xv. L. O. gr. j. exhibe contra fluxum hæmorrhoidum.

℞. Olei amygd. dulc. \mathfrak{z} ii β , add. Mann. \mathfrak{z} i β . cape ex jusculo gallinæ contra colicam, docente ita Sennerto.

℞. Olei amygd. dulc. \mathfrak{z} ij. Ocul. $\mathfrak{z}\beta$. fyr. dialth. par. cape ad dysenteriam.

℞. Olei amygd. \mathfrak{z} i β . Vin. Malv. $\mathfrak{z}\beta$. fyr. papav. $\mathfrak{z}\beta$. M. f. haustus in colica passione, alii addunt saponem Venetum.

℞. Olei amygd. \mathfrak{z} vj. \circ laur. expr. \mathfrak{z} ij. f. Clyster in colica flatulenta. [De usu olei amygdal. dulc. in forma clysteris injecti conf. Sim. Paulli Quadr. Bot. Class. 2. p. m. 18.]

AMYGDALUS', Ἀμυγδαλίη, ἀμύγδαλον, Mandel-Baum /
AMANDIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum oblongum, osseum, callo pulvinato obductum, nucleo foetum oblongo.

Amygdalus sativa fructu majori C.B. Pin. 441. Amygdalus dulcis L.B. 1. 174. Amygdalus Tabern 1c. 996.

Arbor hæc regiones amat calidiores. In Italia notante J. BAUHINO familiaris est. In Gallo provincia Delphinatuque consitæ sunt planities patentissimæ, in tractu Rhenano non paucis locis, præsertim in agro Spirensi inveniuntur Amygdali. In Alsatia quoque haud infeliciter cultæ proveniunt. Floret vere, æstate & versus Autumnum maturescunt fructus, qui vocantur ἀμύγδαλοι, AMYGDALÆ, ita dictæ, quod sub virenti cortice illarum putamen πολλὰς ἀμυχὰς i. e. e multo scarificatu sit veluti discissum & fissum, AMYGDALÆ DULCES, Germanice Mandeln / Süße Mandlen / AMANDES, AMANDES DOUCES. Sunt autem fructus figuræ ovalis, depressæ, sub cuticula flavescente granum album tegentes, saporis dulcis, odore carentes. Includuntur hi fructus capsulæ lignæ & fere lapideæ cortice viridi tectæ. Probantur Amygdalæ flavissimæ, integræ, non confractæ nec erosæ, duræ & siccæ, quantum illis datum est, & ob id fragiles intusque albissimæ. Aliæ sunt majores, minores aliæ. Laudantur inter alias Landavienses. Præferuntur tamen Germanicis è Provincia Gallorum & Languedocia advectæ.

Ex, quæ reliquas saporis suavitate superant, AMBROSINÆ dicuntur. Dum Amygdalæ pro variis suadentur usibus, notandum, quod vetustiores sint rejiciendæ ob rancorem. Præterea pelliculæ rugiosiores factæ quandoque asperitatem & vocis raucedinem excitare putantur. Ob eandem rancoris suscepti aut facile suscipiendi causam in febribus à quibusdam rejiciuntur, cum facile noxam inferre queant. In affectibus etiam soporosis lethargicisque non adeo tutus ipsarum observatur usus. Cum involvendo & incrassando inserviant, in Catarrhis tenuibus, alvi fluxibus, diarrhœa atque dysenteria prodesse possunt. Quod ad usum Oeconomicum attinet, palato, ut cum SEBIZIO loquar, sapiunt, præsertim aqua ferventi maceratæ & delibratæ, post in aquam gelidam con-

jectæ indeque rursus extractæ, & vel ita comestæ, vel polline sacchari conspersæ. Cum rasura Casei Parmensis egregie sapiunt. Ingenia porro culinarum, ut idem author ait, amygdalas ad varios escarum usus adhibent; Similiter & ars pistorum dulciariorum. Elicitur exinde emulsio, quam *Lac Amygdalinum*, *Mandel-Milch* / *Emulsion ou Lait d'Amandes* appellant, cum aqua simplici, decocto hordei alioque liquido ad rem faciente. Adhibentur autem hunc in finem excorticatæ, cortex quippe colorem insigniter turbaret. Ex amygdalis porro hisce conficiuntur puliculæ, placentæ, & cum primis panes isti delicatissimi tum majores, tum minores, quos *Marcios* & *Marcipanes* appellant, emaciatis, tabidis, hæcticis, dysentericis & pleuriticis conducibiles. Hactenus *SEBIZIANA* verba ut plurimum. Cum gelatina cornu Cervi adhuc liquida, si amygdalæ dulces excorticatæ emulgeantur, paratur certe remedium alimentoso medicamento sum ad modo dictos affectus similesque & proficuum & elegans, quod vel per se cochleatim, vel quodam cum vehiculo sæpius assumi potest. Saccharo porro incrustantur & tanquam bellaria egregia usurpantur.

IN OFFICINIS ASSERVATUR

Oleum Amygdalarum dulcium, vel *cum*, vel *sine igne expressum*, *Süßmandel-Dehl* / mit und ohne Feuer ausgepreß / *Huile d'Amandes douces tirée sans feu ou avec du feu*. Prius usui interno, alterum externo dicatum est. Commendatur præter virtutes allégatas ad dolores pleuriticos nephriticosque, conducit in raucedine, tussi, aliisque pectoris affectibus, alvum laxat, partum faciliat, ad dolores post partum prodest & infantibus recens natis quoque propinatur. In pleuritide loco olei lini ad aliquot uncias hauritur, ubi expectorationem promovet. Puerperæ statim post partum vel cum jusculo, vel cum Syrupo violarum illud hauriunt, vel cum Syrupo de manna, vel cum Saccharo penidio ad educendum meconium infantibus propinatur. Datur ad ℥ß. ℥ij. ℥iij. &c. Inungitur in dolore nephritico, emolliat, laxat, anodynum est. Clysteribus immiscetur in facibus induratis, ad tumores tonsillarum illinitur, perniones cum Spiritu Vini camphorato sanat. Ad asperitatem cutis tollendam & molliorem reddendam laudatur.

Magma

Magma post expressionem olei residuum, die Mandel-Kleyen / *Pâte d'Amandes*, inservit ad detergendas manus & lavorem cuti conciliandum. Sunt, qui miscent cum mica panis albissimi, & aliquid vini aut succi limonum vel citri addunt.

℞. ∞ Amygd. dul. rec. sin. Δ express. ʒvj. Syrup. violar. ʒj. Spermat. Cet. rec. ʒj. Msc. f. potiuncula infantibus & adultis, in asperitate faucium & tussi atque asthmate, præsertim in variolis & morbillis, conveniens.

AMYGDALÆ AMARÆ.

Ob sui amarorem ad caliditatem inclinant, & minus temperatæ sunt ac dulces, harum ∞ expressum, in quo potior vis consistit, diuresin movet, calculum & nephritidem curat, est quoque antipleuriticum. Convenit externe in tinnitu aurium & surditate à sordibus auri impactis.

An amygdalæ amaræ comestæ ante potum ob sui oleositatem ebrietatem præcavent? experientia consulatur.

Dantur per se, harum Emulsio, ∞ expressum ut & elixir.

℞. Olei amygd. amar. ʒij. detur contra dolorem nephriticum, calculum & pleuritidem.

℞. Olei amygd. amar. q. v. adde sacch. q. s. ad consistentiam mellis, f. Electuar. applica ulceri vel vulneri faucium, œsophagi, quin & aurium.

℞. Amygd. amar. ʒij. — vin. rectific. ℥j. cinam. ʒ℥. digere, destilla ex cineribus: cape ʒ℥. vel ʒij. ad flatulentiam & pleuritidem.

Amygdalæ amaræ lethales sunt vulpibus, gallinis, sciuris &c. vid. C. N. C. Dec. 1. ann. 8. obs. 99. p. 183. & sqq. it. Dec. 2. ann. 8. obs. 154. p. 335.]

Hos fructus ferens arbor dicitur

Amygdalus amara C. B. Pin. 441. & I. B. I. 174. Fructu autem ab amygdalis dulcibus non nisi sapore discrepant, vocantur *Bittere Mandlen* / *AMANDES AMERES*. Non omnium gustui blandiuntur. Colliquant, resolvunt & in chronicis serosisque affectibus conducunt. Parantur etiam ex his amygdalis frontalia seu Emulsiones capiti externè applicandæ in doloribus capitis.

Oleum Amygdalarum amararum, Bitter Mandel-Oehl / Huile d'Amandes ameres. Præter virtutes allegatas conducit ad vermes necandos. In urinæ difficultate pubi inungitur. Menses quoque pellit. Sunt, qui illud usurpant ad nervorum dolores mitigandos & pudendorum fissuras sanandas cum melle illitum, frigidis uteri vitiis prodest, ad faciei nigredinem & ad maculas à Sole contractas commendatur. Insigne quoque dicitur esse vulnerarium; Manantia capitis ulcera, præsertim cum vino & furfure, detergit.

Ex arboribus Amygdaliferis quandoque extillat Gummi, quod vi incrassante gaudet, & non tam in calculo, quam in hæmoptysi & mictu cruento laudatur.

PISTACIA.

Sunt Pistaciæ peregrinæ fructu racemoso seu Therebinthi Indicæ Theophrasti C. B. P. fructus oblongi, angulosi, avellanæ magnitudine, altera parte elatiores, altera depressiores, costa notati, sub putamine tenui includitur nucleus ex albo virescens, saporis oleosi subdulcis.

Est vel major vel minor, ex Persia raro transfertur & multo sapidior est quam major, in nostris crescens etiam terris.

Nuclei, qui soli in usu sunt, conveniunt cum amygdalis dulcibus, sed potentius augent genituram, vis omnis consistit in oleo recenter expresso, dantur ut amygdalæ.

℞. Olei pistac. express. ℥i℥. vel ij. vitell. ovor. n. j. ambr. gryf. ʒ℥. sacch. cand. ʒij. redige ad ignem cinerum in formam Electuarii, propina seni ad augendam ♀em. ℞. Pi-

℞. Pistac. rec. amygd. dulc. nucl. pini f. Emuls. ex la-
cte contra phthisin, tabem & marasmm, add. sem. Eruc.
℥ss. mac. gr. v. Cubeb. gr. vij. f. Elect. aphrodisiacum.

NU-

PISTACEA, *πισάκια*, TEREBINTHUS INDICA, Pistacien - Baum / Syrisch oder Welsch Pimpernuß. Baum / PISTACHIER.

Ad Terebinthum à TOURNEFORTIO refertur. Terebinthus Indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridis Advers. 413. Pistacia I. B. I. 275. Pistacia peregrina fructu racemoso sive Terebinthus Indica Theophrasti C. B. Pin. 401. In Persia, Syria, Arabia, Ægypto, Africa, multum proveniunt. Coluntur quoque in Italia, Hispania & quibusdam Galliarum locis. Fructus ex hac arbore potissimum in usum trahuntur & vocantur *πισάκια*, *βισάκια*, *ψισάκια*, *φισάκια*, BISTACIA, PISTACIA, Pistacien / Pistacien - Nüßlein / Syrisch oder Welsche, Pimper - Nüßlein / PISTACHES. Cum saporis non ingrati sint præsertim recentes, nutrimentumque corpori non exiguum præbeant, hinc à coquis quorundam ferculorum præparationi immiscentur, saccharo etiam quandoque incrustantur & inter bellaria referuntur. Quoniam autem non adeo recentes apud nos habentur, ideoque hic fructus pro usu culinario frequens non est. Commendantur tabidis & hecticis, auxiliantur nephriticis. Ventriculo hepaticæ & pectori succurrunt. Compositiones confortativas ingrediuntur, imprimis morsulos.

NUCLEI PINI.

Sunt Pini fativæ C. B. P. nuclei oblongi, cándidi, pingues, inclusi mediante rutila tunica officulis crassis & duris, in turbinato & squamato cono dispositis, saporis subdulcis.

Virtute pistaceis accedunt, sed specificè commendantur in temperanda lymphæ acriore, stillante in pectus, ut & in mulcendo acido stranguriæ & dysuriæ. Vis omnis consistit in oleo.

℞. Pistac.

℞. Pistac. amygd. d. pinearum ana ʒss. sem. eruc. urtic. ana ʒj. spec. diamb. ʒss. Mell. q. s. f. f. conditum aphrodisiacum, add. diamosch. ʒij. Elect. diasatyr. ʒij.

℞. Olei rec. expr. nucl. pini ʒj. cape cum vino ad erigendam ʒem vel etiam ʒo Majoran. gt. iij.

NUC.

PINUS SATIVA, PINUS DOMESTICA, πένκη, male I. B. πίνος, Zahmer Fichten, Baum / Pinien = Baum / Zirbelbaum / PIN CULTIVE.

Est arbor flore amentaceo, plurimis staminibus constante sed sterili: embryo enim à flore separatim nascitur, abitque in fructum, inter cujus squamas duobus scrobibus excavatas, occurrunt duo officula sæpe alata nucleo foeta oblongo. His notis addenda sunt folia bina simul ex eadem vagina prodeuntia.

Pinus sativa C. B. Pin. 491. Pinus officulis duris foliis longis I. B. I. 248. Pinus Dod. Pempt. 859.

In multis Italiæ locis, præsertim in agro Ravenate, item in Gallia Narbonensi, circa Massiliam, in Hispania, item in aliis regionibus calidioribus Orientis provenit. Coluntur etiam in hortis & viridariis. In usum suppeditat hæc arbor nuces, quæ in CONIS, STROBILIS, CONARIIS, Zirbeln / Zapffen / Pin-Aepffel / POMMES DE PIN appellatis, nascuntur, & ut plurimum absque conis ad nos advehuntur. Vocantur NUCES PINEÆ, NUCLEI PINEI, Pinien / Pineolen / Pignolen / Krafft-Müßlein / Zirbeln-Müßlein / PIGNONS, PIGNOLAS, AMANDES DE PIN. Hæ nuces recentes Stomacho, ut cum SEBIZIO loquar, & palato arident. Inveteratæ oleosæ fiunt & rancorem contrahunt. Variis immiscentur ferulis, saccharoque incrustantur & inter bellaria referuntur: Magis tamen hodie, nostris saltem in regionibus, pro usu inserviunt Medico. Dum detergunt, humectant, reficiunt & alunt, non possunt non prodesse iis, qui tabe, phthisi, tussi similibusque affectibus laborant. In calculo & exulceratione renum & vesicæ profunt. Lac semenque augent. Resinæ cum his optime tractæ in vehiculo aqueo dissolvuntur, Sunt, qui in emulsiones eas recipiunt,

cipiant, sed non omnino gratum largiuntur colorem. Ingrediuntur Morculos aliasque formulas confortantes, Oleum apud nos non prostat.

NUCLEI CERASORUM.

In horum substantia mucaginosa & oleosa latet aliquid salis diuretici, in oleosa vero virtus anodyna, unde singulartiter laudantur in nephritide.

℞. Nucl. Ceras. ziiij. ▽ chæref. q. s. f. Emuls. diuretica.

℞. Olei expr. nucl. ceras. zij. exhib. ex ▽ chæref. contr. nephritidem.

NUC.

CERASUS ARBOR, Κέρασος, κεράσιον, à Cerasunte, Pontico municipio, unde Lucullus Mithridate debellato primum in Italiam arborem detulit, id quod alii negant, Kirsch-Baum/ Kirschen-Baum/ CERISIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum carnosum, subrotundum vel cordiformem, officulo fœtum ejusdem formæ, nucleum includente. Quibus notis addenda facies Ceraso propria.

Hujus arboris major est varietas, quam ut describi possit. Quotidiana enim cultura & insitione augeri solet, id quod suo tempore jam pronunciavit SEBIZIUS. Cerasus alia est sativa, alia sylvestris. Alia majores, minores aut mediocres, alia dulces, subdulces, acidos, amaricantes, vinosos fert fructus; alia arbor producit Cerasa rotunda, oblonga turbinata, cordiformia, alia dura, alia vero tenera, alia brevia, alia longidula promit, & quæ plures aliæ sunt differentiæ. Sequentes autem species frequentiores jam sunt.

Cerasus major ac Sylvestris fructu subdulci, nigro colore insciente C. B. Pin. 450. Cerasus Sylvestris fructu nigro I. B. 1. 220.

B b b

Cerasia

Cerasia nigra Tabern. Ic. 986. Schwarzer Kirsch-Baum / MERISIER, CERISIER SAUVAGE. Hujus fructus dicuntur Schwarze Wilde Kirschen / kleine Schwarze Kirschen / Vogel-Kirschen / CERISES SAUVAGES NOIRES, MERISES. Occurrit in Sylvis hinc inde.

Cerasus sativa rotundo rubro & acido fructu Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 4. *Cerasa sativa* rotunda rubra & acida, quæ nostris *Cerasa sativa* C. B. Pin. 449. *Cerasia acida* Tabern. Ic. 985. Kirsch-Baum / CERISIER, CERISIER DOMESTIQUE OU CULTIVE. Fructus dicuntur gemeine rothe Saure Kirschen. CERASA ACIDA & VULGARIA, CERASA AGRIOTTA, AIGRIOTTES. Colitur hinc inde. Hæc *Cerasa* ut & alia hortensia, urbana atque domestica, prioribus Sylvestribus sunt majora carnosioraque & succulentiora.

Cerasus sativa fructu majori Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 4. *Cerasa sativa* majora C. B. Pin. 449. *Cerasa acida* rubella I. B. I. 221. *Cerasia Hispanica* Tabern. Icon. 984. GRIOTIER. Zahmer Kirsch-Baum. Hujus fructus audiunt, Zahme Kirschen / des GRIOTTES.

Cerasus fructu acido, serotino, succi sanguinei Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 4. *Cerasa acidissima* sanguineo succo C. B. Pin. 450. *Cerasa acida nigricantia* solidiora tardius maturescentia I. B. I. 24. *Cerasiorum* primum genus Trag. 1027. dicuntur hujus fructus CERASA AMARENA, Amarellen / Weichpflen / Gallice etiam GRIOTTES appellantur.

Cerasus major fructu magno cordato Raji Hist. 1538. *Cerasa crassa* carne dura C. B. Pin. 450. *Cerasa duracena* oblonga I. B. 2. 221. *Cerasia Pliniana* Tabern. Icon. 985. BIGAROTIER, Gezweigte Große Kirschen / große Herk Kirschen / BIGARREAUX.

Cerasa fructu albo dulci Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 4. *Cerasa alba* dulcia C. B. Pin. 450. *Cerasia dulcia* Trag. 1028. Eyer-Kirschen / GUIGNES.

Cerasus fructu aquoso Tourn. I. R. H. cl. 20. S. 7. g. 4. *Cerasa* carne tenera & aquosa C. B. Pin. 450. *Cerasia aquea* Tabern. Icon. 986. GUIGNIER. Fructus vocantur Glas Kirschen.

Ut jam non dicam de plurimis aliis speciebus; *Ceraso* racemosa,

mosa, flore roseo pleno. Florent hæc arbores vere, fructus Majo, Junio & Julio habetur maturus. Debent autem Cerasa eligi bene matura & succulenta; continent plurimum phlegmatis, medicrem quantitatem olei & salis essentialis. Humectant atque refrigerant, humorum nimium motum compescunt, sitim sedant, alvumque lubricam reddunt. Acida cor ac stomachum roborant. Dulcia habentur magis cephalica, insalubriora tamen sunt, & citius putrescunt. Quo duriora sicciorave, acida item & paululum amara, præsertim si debito modo matura sint eo præstantiora. Possemus hac occasione de usu Cerasorum, quæ communiter cruda, tum in mensis secundis tum etiam matutino tempore ad refrigerandum & appetitum excitandum haud absque successu, modo moderate istud fiat, comeduntur, culinari, eorumque variis præparationibus conditurisque apud Pistores dulciarios consuetis sermonem facere: verum quoniam, ut ita loquar, Lippis hæc & tonsoribus mulierculisque notissima, ideoque potissimum usus Medicus hic considerandus, & quæ in officinis præparata exinde prostant, contemplanda.

De usu Cerasorum SALERNITANI ita canunt,
*Si Cerasum comedas, tibi confert grandia dona,
 Expurgat stomachum, nucleus lapidem tibi tollit,
 Hinc melior toto corpore sanguis inest.*

Nuclei contusi adhibentur in frontalibus ad demulcendam Cephalalgiam. Vermes quoque necant. Ex arboribus Cerasis quoque extillat Gummi figuræ ut plurimum globosæ, coloris flavescentis, substantiæ pellucidæ, saporis viscosi, omnis mordacitatis expers, odore carens. Commendatur pro verriculo sabuli & calculorum, ut & in crassatione humorum tenuium & acrium.

IN OFFICINIS OSTENDUNTUR

Aqua Cerasorum nigrorum, Schwarz-Kirschenwasser / Eau de Cerises noires, destillatur præsertim ex Sylvestribus nigris cum nucleis contusis, absque prævia fermentatione. Habetur cordialis, Cephalica, in Epilepsia, vertigine, paralyssi laudatur, ut & in lingua paralytica & aphonia.

Spiritus Cerasorum nigrorum, *Schwarz-Kirschenbrandtwein* / *Esprit de Cerises noires*, paratus ex modo dictis Cerasis per fermentationem, qui haud raro etiam καὶ ἐξοχήν, *Schwarz-Kirschenwasser* dicitur. Habetur quoque cephalicus, antasthmaticus, stomachicus atque carminativus. Adhibetur ad unum alterumve cochlear. Externe in aphonia & paralyti linguæ conducit, rectificatur etiam hic Spiritus, ut resinæ in eo possint dissolvi.

Cerasa præsertim acida condita, *eingelegte saure Kirschen* / *oder eingelegte Amarellen* / *Condit de Cerise aigres* ou *Aigriottes*, ou *Griottes*. Condiuntur autem vel in forma liquida, vel in forma sicca. Sanorum palatis egregie abblandiuntur, & ægrotorum, præcipue febris laborantium refocillationi & ad sitim æstumque mitigandum inserviunt. Hæc autem Cerasa condita merito distinguenda à sic dictis nostratibus *Säßelfirschen* / sive *Cerasis in doliolis conditis*, dum Cerasis Amarenis superfunditur saccharum liquatum depuratumque, sed non ulterius coctum. Hoc enim, dum doliolum præsertim commovetur, saccharum in liquorem spirituosum ardentem, Spiritus Vini æmulum convertitur. Unde quidem sanis ad roborandum stomachum coctionemque adjuvandam conducunt ejusmodi Cerasa cum suo liquore. Febricitantibus autem non sunt adæquata ut priora. Notandum hac occasione, quod *Cerasa Amarena siccata* quoque serventur & nunc sic comedantur, nunc cum aqua & vino atque saccharo decoquantur.

Rob Cerasorum acidorum, *Saur-Kirschensafft* / *Rob de Cerises aigres*, refrigerat, sitim sedat & bilem refrænât.

Syrupus Cerasorum acidorum, *Amarellen-Syrup* / *Syrop de Cerises aigres*. Gratissimus hic Syrupus mixturis julapiisque miscetur pro extinguenda siti, bile domanda & æstu extinguendo, unde & vires cordiales ei adscribuntur; Picæ & Malaciæ medetur.

Vulgus frequentissime parat *Spiritum vini Cerasorum*, *Kirschen-Brandtwein* / infundendo Cerasa cum Caryophyllis & Cinnamonomom in Spiritu Vini vel simplici, vel rectificato, digerendo ad calorem Solis per insigne spatium, addendo tandem si placet pro majori gratia, saccharum in quantitate sufficiente. Confortativus habetur, stomachicus, carminativus atque cordialis; assumitur cochlearim. Cerasa quoque infusa manducantur.

Notissimum etiam est, & vix non in omnibus cauponis prostat,
Vini

Vinum Cerasites, Kirschen oder Weichsel-Wein / quod vel cum vel sine aromatibus paratur. Bibitur magis jucunditatis & voluptatis, quam quidem sanitatis causa.

℞. Spiritus Vini Gallicani mensuras ij. Succi Cerasorum succo sanguineo mens. j. Succi fructuum rubi idæi mens. β. Cinnamonī ʒβ. Caryophyllorum, Piperis albi ana ʒij. Nucleorum Ceras. contus. manip. aliquot stent in digestionē vel ad fornacem, vel ad solem per aliquot septimanas. Adde postea Sacchari libras duas, vel quantum placet, filtra & serva pro liquore stomachico sat grato, qui gravior juxta quosdam fit, si succus fructuum rubi idæi omittatur, & quantitas succi cerasorum adaugeatur.

NUCLEI PERSICORUM.

Cum nucleis cerasorum conveniunt, sed amariores, acriores & potentiores sunt in pellenda Urina.

Oleum expressum & infusum propriis floribus singulare est in surditate, tinnitu & eliciendis vermibus ex aure. Dantur nuclei cerasorum.

℞. Nucl. Persicor. ʒij. ∇ gram. q. s. f. Emuls.

℞. Nucl. Persicor. ʒvj. sem melon. cucum. ana ʒij. papav. alb. ʒβ. ∇ veron. tussilag. farfar. ana ʒiiij. f. Emuls. in phthisi.

℞. Nucl. Persic. ∇ Nymph. verben. acet. q. s. f. Epith. ad capitis dolorem.

ANA-

PERSICA ARBOR, à Persia unde adducta, PERSICUS, MALUS PERSICA, Μηλέα περσική, Pserfich, Baum / Pserfing Baum / PESCHER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum carnosum ferè globosum, per longitudinem sulcatum, officulo foetum, profundis scrobiculis excavato, nucleum includente, oblongum. Adde faciem Persicæ propriam. Plurimæ dantur hu-

jus mali species, quarum fructus, qui dicuntur *Pfersich* / *Pfersing* / *μήλα πέρσικα* MALA PERSICA, PERSICA, PECHES, ratione magnitudinis, coloris, saporis, odoris, figura, tempore quomaturantur, pellicula, quateguntur, ut & ossibus differunt. Sequentes sunt frequentiores.

Perfica molli carne & vulgaris viridis & alba C. B. Pin. 440. Malus Perfica I. B. I. 157. & Dod. Pempt. 796. Hujus fructus vocantur *Gemeine Pfersing* / *PECHES DE MONTAGNE*.

Perfica succo quasi sanguineo C. B. Pin. 440. Perfica rubra Tabern. Icon. 995. *Rothe Pfersing* / *Blut Pfersing* / fructus dicuntur

Perfica dura carne buxea C. B. Pin. 440. Perfica Cydoniaria Tabern. Ic. 995. *Quitten Pfersing* / *MIRCOTIONS* ou *MIRLICOTIONS*, quasi *Gossypio* obducta audiunt fructus.

Perfica æstiva Armeniacis similia, sive Perfica S. Johannis C. B. Pin. 440. Perfica præcocia Tabern. Icon. 994. Trecacina Perfica Car. Steph. Præd. Rust. 155. Fructus vocantur *Früh oder Johannes Pfersing* / *PECHE DE TROYE*.

Perfica juglandina Elsholtz. Nuciperfica C. B. Pin. 440. Perfica nux Anguill : Fructus nominantur *Nuß Pfersing* / *Glatte Pfersing* / quod nucum juglandium faciem repræsentent, & nulla lanugine pubescant.

Perfica dura carne candida aliquando ex albo subrubente C. B. Pin. 440. Duracina alba Tabern. Icon. 996. *Harte oder Herz Pfersing*.

Perfica fructu magno globoso carne dura Saccharata Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 3. *PECHE ADMIRABLE*.

Perfica fructu magno globoso nigricante serotino. Tourn. loc. citat. *PECHE ROYALE*.

Perfica fructu globoso compresso rubro carne rubente Tourn. Loc. Cit. *PECHE MAGDELENE ROUGE*.

Perfica Amygdalina Elsholtz. Perfica Amygdaloides C. B. Pin. 440. Amygdalo Perficus Camer. *Mandel Pfersing* / pulpa nempe persicum, nucleus Amygdalam dulcem sapit. Ut jam silentio præteream plurimas alias species hodie usuales.

Coluntur hæ arbores in hortis & vinetis, florent Martio & Aprili, tardius aut citius, pro natura loci & tempestatis, fructus diversis tempo-

temporibus, Augusto plerumque & Septembri maturefcunt. Multa ex hac arbore in ufum cedunt. Fructus autem potius funt culinares, quam officinales, nec diu poffunt affervari, quia admodum funt fucculenti. Refrigerant & humectant, alvumque laxant. Melius eft, fi jejuno ventriculo, quam eo repleto comedantur, qua ratione etiam appetitum excitant. Eligenda autem, juxta SEBIZIUM, Perfica mala quæ odorata, bene colorata, probe matura, modico fucco prædita, fapida & quorum caro haud difficulter à nuce recedit. Facile tamen noxam, præfertim abufu inferunt, quia putrefcunt, ansamque fua corruptione diarrhæis, cholæræ febrisque putridis præbent. Sunt, qui venenata qualitate hæc mala fugacia imbuta effe cenfent, adeoque vinum, in quo infufa comeduntur, abjiciendum effe fuadent. Sed metus eft vanus. Quod enim vinum quafi infipidum reddatur, provenit exinde, quòd caro perficorum laxa & porofa facile vinum imbibat relicta humiditate aquea. Condiuntur faccharo quoque tum in forma ficca, tum in forma humida. Hæc mala tum matura, tum ut plurimum autem affumuntur immatura, quorum nucleus nondum induruit. Affervantur quoque in Spiritu Vini cum faccharo.

Ad solem porro & in fornacibus piftoriis in frufta diffecta exficari folent. Flores alvum laxant, in obftructionibus viscerum & mefenterii laudantur, ferum educunt & vermes necant. Tempore verno frequentiffime in fero lactis infunduntur, ad alvum fucceffive expurgandam.

Folia iisdem fere viribus gaudent & externe ulceribus ferpentibus & cancrofis pulvis ipforum infpergitur, ob amarorem quoque contra febres & icterum laudantur.

Nuclei aperiunt & extergunt, commendanturque in obftructionibus Hepatis atque Lienis. Specialiter ad exturbandum fabulum & calculum laudantur, fi vel comedantur fingulis mane, vel in pulverem redigantur, & de hoc pulvere per plures dies ʒj affumantur. Vim porro poffident anodynâ, unde emulfiones frontales exinde fiunt ad Cephalalgiam & Agrypniâ. Gummi Perficæ arboris ad alvi fluxum, afperitatem faucium, hæmoptifin, mictum cruentum &c. deprædicatur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Perficorum florum, Pfirsichblüth-Waffer / Eau de fleurs de

de Pêches, quæ interne ad vermes præsertim, externe autem ad cephalalgiam & maculas faciei delendas adhibetur.

Conserva florum Persicorum, Pfirsingblüth, Zucker / Conserve de fleurs de Pêche Vermibus adversatur hydropicisque conducit,

Syrupus Persicorum florum, Pfirsichblüth, Syrup / Syrop de fleurs de Pêcher. Laxat & serum bilemque evacuat, vermibusque adversari creditur, datur ad unciam dimidiam ad unicas duas usque.

Oleum nucleorum persicorum expressum, ausgepreßt Pfersingker-nen, Dehl / Huile de noyaux de Pêches tirée par expression. In affectibus aurium, dolore, tinnitu, surditate & vermibus laudatur, temporibus illitum in agrypnia & cephalalgia commendatur. Sedathæmorrhoidum dolores.

Ex nucleis cum Spiritu Vini paratur elegans liquor stomachicus, qui Gallis καὶ ἐξοχόν, PERSICO audit.

℞. Nucleor. Persic. ℥ss. Cinam. acut. ℥iij. Caryophyll. semin. Coriandr. ana ʒj. Spir. Vin. Gall. mens. j. Stent in digestionem, postea filtretur liquor & edulcoretur Sacch. libr. j. Potest etiam talis liquor gratus ex ipsis foliis parari.

Huc referenda merito *Aqua diuretica Schræderi correctæ, Harn-treibendes Wasser von Kernen / Eau diuretique de noyaux*, hanc aquam laudant ad abstergendas vias urinarias, urinam ciendam calculumque præservandum & imminuendum: cochleatim datur. Non diu autem durat, facile namque ob ingredientium oleosam substantiam rancorem contrahit.

A N A C A R D I U M.

Est arboris Malabaricæ Oepata dictæ, fructus compressus aviculæ cordis figura, nigricans, includens sub duplici involucro, exteriori tenui rufescente, nucleum solidum albicantem, saporis subdulcis & intra illud duplex involucrum quasi in poris favis apum similibus, liquorem melleum glutinosum rufum, saporis acris & exurentis, qui ab Indis habetur venenatus, à Chirurgis scirrhis etiam durissimis impositus eos miraculi instar dissipat.

Hujus

Hujus nuclei pistaciorum vices supplere possunt. Tosti horum nuclei sub cineribus ab Indis avide comeduntur.

Veteres integro fructui adscribere vim memoriam confortandi, & in hunc usum prostat, an vis cerebri confortandi consistat in nucleis his innocentibus, an in muco oleoso acerrimæ exedentis & volatilis Naturæ, qui intra corticis duplicaturam reperitur, aliis judicandum relinquo.

Hoc mucoso acri oleo utuntur Indi ad absumenda condylomata, ficus, carunculas, scrophulas aliasque excrescentias carnosas.

℞. Confect. anacard. ʒj. cape pro confortando cerebro justo humidiores.

CA-

Ανανάρδιον, à cordis figura, LUSITANIS FAVA MALAGUA dicitur, quod viridis & in arbore pendens similis sit Majori nostrati Fabæ, PEDICULUS ELEPHANTIS, Anacardien / Elefanten-
Eauß / ANACARDE.

De arbore hunc fructum ferente nondum omnino constat inter Authores. Arborem enim Oepata Hort. Mal. RAJUS quidem fructum anacardio similem gerere asserit atq. diversam facit, unde decisio adhuc expectanda. Vocatur interim

Anacardium C. B. Pin. 511. & I. B. I. 335. In multis Indiæ locis nascitur, Malabar Campaja Decan &c.

Vix amplius imo plane non usurpantur in nostris saltem regionibus. Oleum exinde conficiebatur. *Confectio Anacardina*, quam quidam magnifico confectionis Sapientum & Salomonis titulo insigniebant, alii vero confectionem stultorum & Morionum appellarunt, quoniam, teste C. HOFFMANNO, incauto usu mania atque fatuitas fuit inducta exolevit. Quod si quis illam in usum trahere velit, non nisi subjectis humidioris constitutionis & in affectibus serosis frigidisque usurpetur, ne febris aliaque mala exinde proveniant. Laudatur à quibusdam in paralyfi linguæ, si affricetur, quem in finem etiam adhibebant MEL ANACARDINUM, quod tamen
Ccc
etiam

etiam exolevit. Solent, ut ex A C O S T A refert R A J U S, Indi hunc fructum cuspidi cultelli infixum candelæ ardenti imponere, qui dum uritur, mirum quos strepitus edat, quas ignis scintillas quasi fulmina ejiciat variorum colorum, eaque ratione impostores mulierculis & rudioribus imponunt.

C A C A O.

Sponte sua nascitur in India occidentali non orientali, ut quidam perperam scripsere.

Sunt arboris Cacaiferæ Americanæ nuclei, amygdalis magnitudine forma & consistentia similes, inclusi copioso numero in involucri corticoso, duro, rugoso, fusco oblongo peponem imitante. Saporis subpinguis oleosi & subamari, odoris nullius.

Virtutem amygdalarum pinearum & pistaciarum æmulantur, vim habent nutriendi potentem adeo, ut ex quorundam sententia carnibus omnibusque aliis alimentis sint anteponendi. Vis omnis consistit in mucosa blanda & oleosa substantia, qua totus fructus scatet.

Si ex retorta debite destilletur suppetit phlegma instar jusculi carnis, cujus spiritus & oleum redolet pinguedinem ex assata carne destillantem. Hinc emaciatis tabidis & qui pinguescere cupiunt valde convenit. Datur ustulatum in emulsione cum saccharo, lacte seu vino, additis vitellis ovorum, & si lubet aromatibus.

Indi & nunc Europæi ex hoc componunt massam Chocolatam dictam, quam in lacte, aqua & etiam vino fervente dissolvunt, eamque sorbillant.

℞. Cacao. tost. ℥ij. farin. tritic. turcic. ℥vj. sacchar. ℔ss. solut. in ∇ rosac. contund. invicem & agitetur super ignem continuo ne aduratur, redigatur in massam.

Modus

Modus quomodo in Hispania à ditioribus conficitur.
 ꝓ. Cacao excortic. mundi & tosti lbvj. Cinam. lbß. Vainigliæ
 n. vij. in syrupo solut. caryoph. arom. n. vj. vel vij. farin.
 frumenti indici lbß. piper hispanic. 3j. orleanæ, quæ suppetit
 colorem rubellum, in ▽ rosac. seu syr. solut. 3ij. sacchar. q.
 v. circiter lbij. vel iij. contunde & misce in cacabo super
 Δe leni, agita continuo, dum omnia exacte invicem mixta
 sint, redige in massam & sub finem adde essent. ambr. & mosch.
 si velis.

FRU.

CACAO, rarius CACAVATE, CACAVI, CACAVAL,
 AVELLANA MEXICANA, FRUCTUS PERUVIANUS CACAO
 DICTUS, Cacao. Russ. / CACAO, CARAQUE.

Arbor hunc fructum ferens, inagnitudine & trunco Pruno
 similis, folia autem majora obtinens, nondum omnimode descri-
 pta est. His autem insignitur nominibus.

Cacao Acoſtæ: Cacao sive Cacavate. Park. Amygdalis similis
 Guatimalensis C. B. Pin. 442. Cacao Americæ sive Avellana Me-
 xicana L. B. I. 291. Cacahuase vulgo Cacao Pis. Mant. arom. 198.
 Cacava Quahuatl sive arbor Cacari Cacavifera Hern. 79.

Quatuor ejus species recensent, quæ in America Insulisque
 vicinis proveniunt, unde & quatuor species fructus recensentur. Le
 Cacao gros noir & petit noir, quæ species nobiliores appellantur,
 Gros & petit Caraque, & le Cacao gros rouge & petit rouge, species
 ignobiliores. Præsertim pro confectione Chocolatæ prima species
 adhibetur, fructus Cacao annosi licet facti rancidi tamen non fiunt.

Indi varia edulia & potulenta exinde parant, utuntur quoque iis
 loco monetæ. Apud nos vix aliter usurpatur hic fructus quam ad
 confectionem Chocolatæ, quæ etiam Succolada dicitur. A. DN. MAR-
 CO MAPPO, qui dissertationem de Chocolatæ potu edidit, ita
 definitur, Cocholata est massa ex tostis Cacao nucleis, additis inter-
 dum, quæ ad hos virtute accedere videntur, Saccharo & aromaticis
 quibusdam interdum etiam pretiosis fragrantibus adornata, saturate

Ccc 2

rubra

rubra in aqua lacte & simili liquore solubilis, & potabilis ad nutritionem, voluptatem, recuperationem sanitatis comparata. Plures Chocolatam parandi circumferuntur modi. Authoris descriptioni placet adjungere Lemeryanam. R. Cacao decorticati tosti & in massam redacti libr. jv. Sacchar. finissimi lbij. misce exacte adde sub finem pulverem compositum ex octodecim siliquis Vanillæ Cinamomi zib. Caryophyll. No. X. Ambrae gryseæ gran. ij. Moschi gr. j. quæ duo ultima ingredientia pro lubitu omitti possunt, sicuti etiam omitti solent Piper Indicum sive Capsicum & frumentum Indicum &c. Formantur panes variæ figuræ, ut plurimum tamen quadratæ oblongæ.

Modum præparandi potum Chocolatæ ex Dn. du Four sequentibus verbis proponit supra citatus Mappus. Ex communi more in Cucumam vel ollam Chocolatæ destinatam tot pocula aquæ profundunt, quot sunt personæ, quæ Chocolatam haurire constituerunt, hinc curant ut bulliat aqua & quam primum incipit bullire, injiciunt Chocolatæ instrumento aspero comminutæ unciam unam cum quadrante pro singulis poculis. Sine more agitur in Cucuma baccillo ad hoc rite adaptato, ad dissolutionem, retracta ab igne cucuma agitatio continuatur donec probe spumescat; spumæ pars cratere excipitur, qui decocto liquore repletur: hinc iteratur agitatio, donec iterum spumescat idemque labore repetitur donec exhausta sit Cucuma & Crateres sint repleti omnes. Hinc sorbetur quantum fieri potest calide. Sunt, qui antequam assumant, hauriunt poculum aquæ frigida, alii panem intinctum in craterem præmittunt. Voluptuosi adjiciunt aliquot guttas essentia ambrae aut Crateri injiciunt pastillos ex ambra paratos. Sunt qui loco aquæ lac assumunt addentes insuper vitella ovorum, ut magis nutriat potus fortiusque spumescat. Sunt etiam qui cum farina Caffè tosti miscent & decoquunt, unde Caffè Chocolaté oritur: in hoc potu autem minime excedendum, cum nimis nutriat, variasque noxas producere possit. Unum aut alterum poculum per diem sufficere potest. Cum Succolada ex ingredientibus constet alimentosis & aromaticis, facile judicare est, quod obtineat vim stomachicam carminativam analepticam, aphrodisiacamque. Senibus, prægnantibus, Hypochondriacis, Phthisicis, Hecticisque cæteris paribus convenientem. Chocolada refertur alias etiam inter bellaria, mensis secundis inferenda, potest enim commode manducari.

FRUCTUS PARTICULIS DULCIBUS
VISCOSIS CONSTANTES.

DACTYLI.

Sunt Palmæ majoris C. B. P. dactyliferæ fructus oblongo rotundi, glandium magnitudine & forma sed paulo majores, includentes sub pellicula fulva & tenui pulpa mellem subdulcem, & sub hac nucleum oblongum durum, per longitudinem sulco notatum. Ob vim mulcentem & temperantem acria quævis eorum caro commendatur in tussi, asperitate faucium, raucedine vocis, catarrhis ab acriore lymphæ oriundis, ut & in dysuria & ardore Urinæ tanquam specificum. Nucleus terreis constat, & in dysuria pro acido imbibendo datur.

Præscribuntur ut ficus & passulæ.

℞ Carn. dactylor. ficu. ana n. xx. passul. min. ℥ij. rad. helen. 3. x. f. c. ∇ decoct. add. fyr. violar. q. f.

FICUS

Hos fructus ferens arbor dicitur PALMA ἀπ' ἀλαμῆ, manus, à foliis instar manus apertæ dispositis, φοῖνιξ Palm-Baum / Dattel-Baum / PALMIER.

Arbor hæc, quæ in Ægypto, Arabia, Syria, Indæa, Persia &c. provenit, vocatur

Palma major C. B. Pin. 506. Palma Raji Hist. 1252. Palmæ Dactylifera major Ionst. Palma sive Dachel Alp. Ægypt, 28. Phœnicobalanus quorundam.

Onerum, ut SEBIZIUS loquitur, dicitur impatiens, onerata enim contra pondera eluctatur, ut neque incurvetur neque subsidat, sed onera secum sustollat in altum, & rami eos sursum elevant qui se deorsum trahere nituntur; unde in Hieroglyphicis Victoriæ est emblemata.

Hujus arboris descriptionem nullus authorum melius exhibuit, quam ENGELBERTUS KÆMPFERUS IN AMOEN. EXOTIC. POLIT. PHYS. MEC. fasc. 4. ubi diffuse de Palma agit. Sequentia inde desumpta hoc loco sufficiant de ejus fœtu. Primitias suas edit, quarto aut quinto transplantationis anno, (falsum itaque post centesimum demum annum frugiferam hanc existere arborem.) Fœtus suos haud arborum ceterarum ritu parte gignit promiscua, sed eos in summo tantum caudicis fastigio è frondium axillis egerit, racemis instar scoparum ingentibus confitos, cum quibus adhuc tenelli vagina quasi coriacea arcte compacte obvolutique reconduntur. Amant Romani racemos sive termites hos appellare Spadices thecas eorum ob romphææ similitudinem spathas, (Vagina hæc vocatur Ε'λα'η & σπά'θη,) propriis sed ex Græcia translatis vocabulis. In ortu suo fœtus palmæ maris à fœmina externa facie non est discretus, quin utraque palma spathas fert simillimæ prorsus figuræ, & in utrisque prolem, dum sectione eximitur, intus & extrinsecus candidissimam, facie utraque glabram, nitidam & in unius quasi tuberis soliditatem, strictura thecæ compactam, gemmulis nimirum una cum virgulis, quibus adhærent, adhuc tenerioribus molliculis & edulibus. Principio mensis Februarii arbores intra sinus frondium rudimenta partus sui concipiunt, nimirum Spathas surrectas, compressa sui facie caudici accumbentes, sed adhuc intra texturas & involucria frondium reconditas. E quibus emersæ & postea in omnem dimensionem perpetuo augmento accrescunt, & ex prolis quam ferunt copia, sic intumescunt, ut Martio in longum dehiscant & per fissuram alterutro latererarius utroque factam inclusum tuber excludant, quod ipsum claustro solutum paucos intra dies Spadicis habitum induit, in virgulas resolutum numerosissimas, flosculis in mare in fœmina prunulis refertas secundum longitudinem in ordinate & sigillatim confitis; illis usum pro imprægnandis palmis fœmineis ex tempore præstantibus, his à tardiori incremento demum mense abhinc quinto maturefcentibus. Spathas usu suo defunctas natura nutrimento prorsus destituit, ita ut brevi deformes extabescant.

Spathæ masculi recens in lucem nascenti exempta flosculorum moles, integro mense quo ejus habetur copia exquisitum præbet tam liguritoribus obsonium, quam socordibus remedium excitandæ

tandæ libidinis, si ejus buccellæ aliquot comedantur. Extrahitur eum in finem Spathe, vix dum è fasciis suis prominens cui in longum incisæ embryo ille eximitur & in virgulas vel buccellas divisus dono distribuitur petentibus. Exscissus hic partus saporem habet vapidè dulcem, & prout omnis pars palmæ esculenta, nucis castaneæ æmulum sed cum subamara cruditate quadam, & humiditate nitorem præbente spermaticum. Ejus gemmæ rudimenta sunt flosculorum proxime explicandorum tenerrima candidissimæque, vinaceorum magnitudinis & mutua compressione multilateralia, mox figuram acceptura trigonam, quæ petalorum numero & situi respondeat. Hæc intemerato relicta domicilio perfectionem mense Martio consequuntur, cujus calore promota carceris angustiam facto impetu disrumpunt, prodeunte per Spathæ hiatus incluso spadice cum racemosa oscitantium flosculorum Schola. Flosculi Liliis convallium sunt minores, oblongi, tripetali, coloris albi in luteum pallescentis & ingrati, staminum tribus ad numerum, donati vestigiis, nituntur non petiolis, sed herbei coloris carnosio quodam principio, respondente magnitudini seminis coriandri & in petioli modum emarcente. Petala flosculorum surrecta sunt, oblonga, concava, obtuse mucronata, succosa, carnosæ, rigida, stamina sunt lanuginosa, rigida, brevissima, albicantia, multo referta polline, in luteum pallescente, levissimo & subtilissimo, qui etiam floris umbilicum copiose obsidet. Pollis drachmæ unius pondere assumptus dicitur, ad ciendam libidinem majorem præstare efficaciam quam ipse embryo, quod vel ex seminali halitu conficias, quem exspirat prægravem. Colligitur à granis, concussionem spadicum recens natorum, & pyxide reconditur probe operculata, vel immiscetur electuariis, ut eo melius a situ conservetur. Flosculorum uni spadici numerosa est congeries. Spadix namque unus mediocriter magnus virgulas ducentas continet.

Spadix foemineus termes palmeus est, sine prodromis floribus agmen plurimorum fructuum exhibens, cum quibus dum uterino adhuc cortice obvolvitur, gulosæ plebi salivam quoque movet, ferculum ventri ac Veneri expetitur, sed quod masculo haud melius quidem sed eo rarius habetur, quo majus nefas est, id gravidæ arbori eximere. Vergente Februario, ac ineunte Martio spathis rumpentibus primum emicant Spadices claustroque non mul-

tis post diebus relicto nudi in lucem prodeunt. Rudimenta fructuum, in Spadice magnitudinem æque ac rotunditatem obtinent granorum piperis, superficiem nitentem albam, saporem subausterum: subtus duplici induta membranula sive calyculo uno exteriori, qui brevior est altero interiori, qui fructum proxime & pene integrum involvit utroque oram habente inæqualem, & superficiem subasperam. Copiosissima uni Spadici insident, sed quorum vel medius vel major numerus per tot incrementi & mutationum gradus, quos ad maturitatem usque subeunt, defluit. Aprili mense invalescens Spadix extensis ultra maris vigorem virgulis fructus extra caliculos exhibet proVectos, vergentes in figuram turbinatam coloris una cum virgulis in luteum languentis, saporis paulo quam antea austerioris. Mense Majo fructus, parum figura nil sapore mutati, cerasorum adipiscuntur magnitudinem colore in herbeum virente, subnato intus officuli rudimento molliculo, virgulis interim longius quoque productis ac quodammodo lutescentibus. Junio ineunte vel citius olivas figura & magnitudine exprimunt, dum officula indurescunt & caro imminuta humiditate fit solidior, sapore & colore nihil mutatis. Appetente Julio plenum adeptis, qui dactylis competit, habitum viridissimus nitor est, figura turbinata, officulum induratum, caro ut cunque mollior, sed pene exsucca, duriuscula & acerba. Hos tamen vulgus tam difficiles ventriculo & austeros fructus cum voluptate esitat, expectationis dum maturescant impatiens. Maturitatem accelerant Circii æstivi venti supra fidem ardentes, & frequentissime spirantes circa Caniculam. Mense Augusto citius tardius maturescunt Dactyli. Maturescunt vero non more ceterorum prunorum, quæ sensim tota simul substantia mollescunt, sed primo acquirunt putrescentis instar pomi maculam mollem, ut plurimum in extremitate, quæ sensim proripiens omnem substantiam crudiorum paucis diebus in dulcem pulpam convertit. Legendi tamen sunt citius, ne producta ad umbilicum molliæ suo caliculo excidant, lapsuque spontaneo conquassentur. Hos fructus *Dumbasios* gula popularis maturis dactylis longe anteponit, fortasse, quod mixta partis crudioris durities cum pulpa bolum reddat commordenti gratiorem, vel quod primi expleant pruritum appetitus, quem in has annonæ primitias vulgus dudum acue-

rat.

rat. Quin & convivii ingeruntur virorum illustrium inter antecæ-
nii mensæve secundæ tragemata loco non postremo proponendi.
Eorum pars cruda superficiem habet, cum nitore quadantenus fla-
ventem, carnem ex austero dulciculam, albam, duriusculam, quo-
dammmodo farinulentam siccam & friabilem, pars matura pellucida
est, mollis, dulcissima, pro speciei varietate, in rubeum lan-
guens vel rufa. Hac facie, qua ad maturitatem vergunt, excussi
in cumulos partiendi & solaribus radiis exponendi sunt, ut reliqua
cruditate deposita, insolatione penitus emolliantur & dulcescant;
quo modo omni graduum numero absoluti & excocti **DACTYLO-**
RUM nomen subeunt.

Vocantur alias **PALMULÆ** Græci eas *Δακτυλόν* à figura digi-
torum, quos tamen minime referunt, appellitant, **Dattlen / DAT-**
TES. Sunt vero Phœnico balani, Caryotæ &c. Palmæ pruna utplu-
rimum glandium quercinarum figura, sed iis fere majora, pellicu-
la vestita tenui pellucida, nitida, coloris in aliis speciebus pal-
lentis in aliis lutei, rufi vel rubri, pro diverso colore carnis trans-
lucentis. Caro eis multa est pinguis, pulposa saporis vinosi, dul-
cissimi, ossiculo suo laxè inhærens intercedente membranula albi-
cante, tenera molli & quasi bombycina in plures pelliculas di-
vidua. Ossiculum solidum est, cornu instar tenax ac durum su-
perficie granis uvarum concolori, vel ex cinereo magis minusve
diluta, interiori substantia ad similitudinem nucis myristicæ varie-
gata, figura ejus quodammodo est turbinata, incurva una facie
gibba & æqualis, altera insigni pulvinatæ figuræ sulco in longum
divisa. Facies gibba notabili cælatur lineola tenui, per mediam
longitudinem decurrente, cujus in medio punctum quasi umbilici
conspicitur, albam fovens cartilaginem, quæ ad mediam ossiculi
substantiam penetrans futuri germinis rudimentum est.

Ossiculi magnitudo plerumque ea est, ut tertiam totius sub-
stantiæ partem exhibeat. In ossium visceribus medulla talis non
reperitur, qualem inesse ac terra emollitis eximi posse persua-
sum est **RAJO.**

Palmicolis incumbit, ut imprægnandis arboribus fœminis
quotannis impendant operam. Spathæ videlicet masculæ incluso-
tumentes flore & ad thalami consortium maturo sub finem Februarii
ex arboris fastigio extrahuntur, quibus in longum dissectis exi-
muntur

muntur spadices, flosculis nondum oscitantibus sed in unam massam compactis conserti. Hos protinus in surculos sive bacillos spadicebus foemineis inferendos divellunt, quantum quidem fieri potest in bifurcos, quoniam hac forma commodius usui venire possunt. Bacillos alii amant recentes, alii eos prius exsiccant & in Martium usque mensem custodiunt, quo hiantibus uteris ad unum omnibus, infusionem uno actu & opera instituant. Fœcundandi efficacia in eo posita est, ut rudimenta fructuum seminali flosculorum polline vel ejusdem subtilissimis & insensibilibus particulis perfundantur, quod, ut eveniat, furca una floridæ medio spadiceis foeminei racemo per transversum infigitur vel intexitur, ita ut evelli procellis non possit, sed aliquandiu infixaretineri, dum omni deposita virtute, embryonum rudimenta requisitum vigorem adepta sunt. Imprægnatio quoque ultronea contingit sine studio & manu cultoris, translato per aërem polline ex palma florida non procul extante à foeminea. Videmus, cum toti palmeto virgas distribuunt, eas omnes haberi insuper, quæ marem proxime circumstant ex floribus halitum ultro suscepturæ. Quid quod orbem curatore nemus fœcundari universum possit ab unica Phœnice florida, si duntaxat vario flatu seminale pollen juste circumferatur; nam perinde quomodo pertingat, seu vento appulsum seu manu immissum sive etiam ore afflatum.

Palmulæ dicuntur esse optimæ, quas Regias vocant, cum magnitudine, tum virtute.

Restat ut de usu quem palma præstat verba quoque pauca faciamus. Nolumus autem inhærere multum usui œconomico, dum tenella partium principia, medulla, comæ, frondes palmæ adolescentis, novelli spadiceis principium, foetus tum masculini tum foeminini excisi manducari possunt, & quidem omnes hæ partes tum crudæ tum coctæ aut in bellaria redactæ. Omnem vero palmeas inter cupedias absolvunt paginam ipsa pruna sive fructus, qui varietatem ferculorum non contemnendam suppeditant. Alimentum etiam quod præstant nec pondere aliquo, nec mora longiori gravat ventriculum, nec etiam, quod alii auctores scribunt, inebriante vapore turbat, sed aquæ bibulis perquam salutare & maxime temperatum existit. Exsiccati autem fructus duritie compagem nacti sunt firmiorem, stypticam & concoctu difficilem. Elicitur quoque

que exinde Syrupus & vinum, quæ potulenta in nostris regionibus non conspiciuntur. Inservit porro palma ad ædificia variaque suppellectilia &c. conficienda.

Caryotæ sive Dactyli moderate adstringunt, cohibent alvi fluxiones, intestina uterum & fœtum roborant. Ingrediuntur varias compositiones pectorales, Decoctum pectorale, Decoctum pro potu infantum &c.

PROSTAT IN OFFICINIS

Electuarium Diaphœnicum, sive de Dactylis, *Purgierende Dattlen - Lattwerg* / *Electuaire Diaphœnic*, pituitam & humores serosos evacuat, convenit in Hydrope, Lethargo, Apoplexia, morbisque soporosis, menses quoque ciet. Datur à ʒj ad ʒj. usque.

Emplastrum Diapalmæ, *Palmen - Pflaster* / *oder Sticht - Pflaster* / *Emplatre Diapalme*; polychrestum est in quibusvis fere affectibus externis, vulneribus & ulceribus, ambustis, ossium fracturis & luxationibus. Cicatrices egregie exsiccant. Prolixius quidem videri posset me hæc ex KÆMPFFERO excerpisse, ast quoniam curiosa admodum sunt & a teste oculato prolata, ideo non spero nauseam motura dicta, remittens simul Lectorem ad prædictum authorem, ubi plura alia lectu haud indigna haudque injucunda adinventientur.

FICUS seu CARICÆ.

Sunt ficus communis C. B. P. fructus pyriformes, figuræ p. m. rotundæ ac depressæ, coloris ex flavo fusci, intus copiosissimis granulis per pulpam infarcti, saporis dulcis, odoris debilis non ingrati.] Variæ sunt species & tot ferme ficus quot pyrorum.

Acria quævis mulcent potius quam dactyli, hinc in tussi, asthmate, raucedine, nephritide, ardore urinæ, mictu cruento & ischuria, mire commendantur. Urinam adeo potenter pellere dicuntur, ut tam eorum decoctum quam

arilli manifestè à quibusdam conspecti fuerint. In specie temperant acidum Variolarum & morbillorum, temperando sanguinis ebullitionem & præcavendo ne acidum profundas foveas faciat.

Externe impositi maturant, emolliunt, leniunt & tollunt tumores gingivarum, uvulæ & faucium ut & horum omnium inflammationem. Nimium eorum usum generare pediculos experientia tam veterum, quam recentiorum confirmat. [Conf. Sebiz. d. alim. fac. l. 5. probl. 169. p. m. 1538. cujus sententiam & nostram facimus.]

Datur in substantia, decocto, gargarismate &c.

℞. Hord. mund. passul. min. ana ʒj. liquir. zij. ficu. n. vj. herb. capill. ʒis, hyssop. ana M^{ss}. sem. brassic. zij. pin. recent. ʒβ. f. c. ▽ dec. ad. raucedinem.

℞. Ficus q. v. macera in ℥u vini anisato, deflagra, cape residuum pro tussi, raucedine & asperitate.

℞. Ficus n. xv. fol. millefol. summit. hyperic. ana Mj. coq. in ▽ contra mictum cruentum.

Cum successu adhibetur in bubonibus ʒeis pulpa ficum cum ʒio maritata, loco emplastri de ranis cum ʒio.

℞. Caric. ping n. iiij. vel v. herb bellid. Mj. coq. in ▽ add. tantill. ʒis prunellæ, f. gargarisma contra inflammationes quævis oris.

JU-

Ficus arbor Græce vocatur συκή Feigen = Baum / FIGUIER.

Est plantæ genus floribus, authore VALERIO CORDO, in ipsius fructus cavitate nascentibus, capillamentis scilicet tenuibus ex involucri quodam prodeuntibus, quod semen complectitur, ut plurimum subrotundum. Fructus autem plerumque turbinatus est vel globosus, quandoque ovatus, sensibilis carnosus & mollis.

Ficus

Ficus dividitur in sativam συκὴν ἡμερὸν & sylvestrem συκὴν αἰγίαν καὶ ἐρίων. Hic autem sermo est de priori. Ex diversis speciebus, quæ figura, magnitudine, colore, sapore fructus præsertim ratione discrepant, sequentes potissimum sunt in usu.

Ficus sativa fructu oblongo albo mellifluo Tourn. App. I. R. H. p. 662. Ficus Uttata vulgo dicta suavi fructu albo scissurato oblongo medio, delicatis micis albis constante H. Cathol. LA GROSSE BLANCHE LONGUE.

Ficus sativa fructu globoso albo mellifluo Tourn. l. c. LA GROSSE BLANCHE RONDE.

Ficus sativa fructu majori violaceo oblongo cute lacera Tourn. l. c. Ficus nitide purpureo, casio fructu majori seu magnitudine & forma Melongenensis propinguo scarificato cortice H. Cath. GROSSE VIOLETTE LONGUE.

Ficus sativa fructu violaceo longo intus rubente Tourn. l. c. Ficus longo fructu medio nigro rubente cortice duro, intus rubro non contemnendi saporis H. Cathol. FIGUE ANGELIQUE.

Ficus sativa fructu parvo serotino albido intus roseo, mellifluo cute lacera Tourn. l. c. FIGUE DE MARSEILLE.

Ut de plurimis aliis Ficus speciebus nunc taceam. In regionibus calidioribus Italia, Hispania, Gallia, imprimis Languedocia, & Provincia uberrime reperiuntur. Coluntur quoque vix non in omnibus hortis.

Ex hac arbore vix quicquam aliud in usum Medicum cedit quam fructus, excepto quod succus lacteus, quo scatet, verrucas tollat, impetigines maculasque cutis deleat. Fructus hi nondum maturi vocantur GROSSULI & GROSSI, quando autem maturere dicuntur FICUS, Feigen / FIGUES, cujus grana vocantur καρχαμίσες frumenta, ficaria. Quando autem siccati sunt, CARICÆ, Dürre-Feigen / FICUS PASSÆ audiunt, ubi notandum, quod quoties in formulis quis præscribere velit Ficus, non debeat præscribere ficus exsiccatas sed CARICAS & quidem PINGUES. Caricæ advehuntur ad nos ut plurimum ex Gallia, vel in corbis & vocantur Korb-Feigen / vel in cistis commistæ cum foliis laurinis & dicuntur Laub-Feigen. Inter omnes autem CARICÆ parvæ in minutis & turbinatis è Sparto confectis corbis

but allatæ, suavitate saporis præstantes, quæque MASSILIENSES appellantur.

Ficus recentes in esum cedunt, non autem adeo bonum chylum generant, sæpius flatus, colicam diarrhœam, aliaque mala producant, præsertim si non adeo moderate usurpentur. Vermes insuper & foetor alarum, ut & scabies exinde possunt oriri. Sunt, qui venenis adversari ficus asserunt.

Ficubus recentibus præferuntur Caricæ, utpote humiditate minus scatentes, Vim attenuandi & abstergendi obtinent alvumque subducunt. Abusu tamen superius allegata mala inferre possunt. Decoctum ficuum saturatissimum in affectibus pectoris, tussi præsertim ferina minime spernendum. Ingrediuntur decoctum pro potu infantum, florum & fructuum ut & pectorale. Sunt qui Caricas ad partum facilitandum commendant, alii vero iis præsertim in versis loco suppositorii utuntur. Applicantur quoque hæmorrhoidibus dolentibus. Usus ad bubones pestilenciales ex Hisciæ per Jesaiam mediante ficu curatione confirmare conantur.

Curiosum est, quod litteræ, quæ lacte seu succo ficus exarantur in charta omnino inconspiciuntur, donec charta igni admota vehementer incalescat, tunc autem velut ustulatæ se manifestant. Quod etiam aceto succo limonum aliisque acidis commune est. Lac quoque succo isto coagulatur in caseum.

Analyfi Chymica exhibent spiritum ardentem phlegma acidum oleumque crassum.

JUJUBÆ seu ZIZIPHI.

Sunt species prunorum, deferuntur ex Ægypto, Hispania, Mauritania. Sunt jujubæ majoris oblongæ C. B. P. pruna seu fructus olivæ magnitudine & forma, punicei seu rutili, involventes sub pellicula crassiuscula officulum oblongum, utrinque acuminatum, inclusum pulpæ molli fungosæ, saporis mellei & vinosi.

Symbolizant cum dactylis & ficubus, ingrediunturque decocta pectoralia & nephritica.

℞. Flor.

℞. Flor. Malv. Mj. junip. sebest. ana n. xv. coq. in ▽
ad ardorem Urinæ.

℞. Syr. jujub. violar. liquir. ana ꝑ℔. syr. pap. zij. f. lin-
ctus contra tussim.

ZIZYPHUS, ZIZYPHA, Rothe Brustbeerlein-Baum /
Zieserlein-Baum / JUJUBIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis constante,
ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum olivæ æmu-
lum, carnosum officulum includens.

Ziziphus Dod. Pempt. 807. Jujubæ majores oblongæ C.
B. Pin. 446. Zizipha sativa L. B. 1. 40.

Hæc Arbor in regionibus calidioribus etiam ipsius Europæ,
Hispania, Italia, Gallia, imprimis Galloprovincia versus Te-
lonis potum nascitur; colitur quoque in hortis sed in nostro cli-
mate fructus rarius maturescunt.

In usum hæc arbor suppeditat fructus, qui vocantur
Ζιζυφα, Ζιζιφα, Ζιζιφα, ZIZYPHA ZIZIPHI, Jujuben / Brustbeer-
lein / rothe Brustbeerlein / JUJUBES.

Circa decoctum Jujubarum notandum ne nimis iis saturatum
sit, quoniam ægro non solum nauseam movet, sed & inflationem
abdominis, qua respirationis difficultas adaugetur, parit.

OFFICINIS NOTUS EST

Syrupus Jujubinus, aut Jujubarum, Brustbeer-Syrup / Syrop
de Jujubes, pectori dicatus est, convenit in tussi & asthma, ubi
serum tenue & acre peccat, incrassat enim & demulcet.

SEBESTEN.

Sunt Sebestenæ domesticæ C. B. P. fructus prunis do-
mesticis similes, nigricantes in plicas sive rugas contracti,
includentes in substantia carnosâ mellea officulum tribus an-
gulis vel costis notatum, in quo nucleus conditur exilis.

Virtu-

Virtute cum jujubis conveniunt.

℞. Elect. diasebesten. ℥℔. cape ad mulcendos quosvis æstus sanguinis.

SEBESTEN, quasi σεβαστὸς quod ob fructum arbor sit venerabilis, aut quod in honorem Augusti Cæsaris ita fuerit vocata, vel à Sebastà, Sarmatiæ Metropoli, ΜΥΧΑ. ἀπὸ τῆς μύξης à mucore lento, quem fructus habent. PRUNUS SEBESTENA. Sebesten: Baum / Brust-Pflaumlein / Schwarze Brustbeerlein: Baum / PRUNIER SEBESTEN.

Arboris hujus, quæ in Syria, Ægypto &c. frequens est, & curiositatis causa etiam in quibusdam hortis Italiæ alitur, accuratissima descriptio nondum suppetit. Refertur interim ad prunum flores albos parvos geranii proximos ferentem. Sequentibus ab authoribus insignitur nominibus.

Sebestena Domestica C. B. Pin. 446. Myxa sive Sebesten I. B. T. I. par. I. 197. Sebesten Trag. 1021. Myxa Dod. 806.

Hujus arboris fructus, qui ΜΥΧΑ, ΜΥΧÆ, ΜΥΧΑΡΙΑ, SEBESTEN, Schwarze Brustbeerlein / Sebestes appellantur, vix aliter quam pro usu pectorali inserviunt, leniunt fauces exasperatas, sedant sitim, ventrem laxant, viscera autem facile obstruunt, & inflationes pariunt, ut cum SEBIZIO loquar. *Electuarium diasebesten* non amplius in usu.

PRUNA DAMASCENA.

Sunt pruna magna dulcia atrocoerulea C. B. P. recentia ficcis longe præferenda, præter virtutes mulcentes & temperantes quas cum superioribus, sebesten & ficubus habent communes, laxant simul alvum, & cum facile sint fermentescibilia, excitant quoque fermentationem in sanguine, unde nimis comesta dysenteriam & alvi fluxus atque febres causant.

Viscositas eorum, quæ aliquando justo diutius intestinis adhæret & tormina facit, corrigitur cinamomo, aniso, fœniculo.

Datur

Datur horum decoctum, pruna laxativa, electuarium, pulpa.

℞. Prunor. damasc. passul. major. ana ℥j coq. in ▽ add. fol. fenn. ℥j. cinam. ʒj. sem. foenic. ʒiij. ad laxand. alvum pro aliquot dosibus.

℞. Prun. damasc. ʒiij. coq. in ▽ simpl. colatur. add. fol. fenn. ʒvj. Crem. ꝑri ʒij. cinam. ʒij. mane ebulliant leniter, colaturam reaffunde prioribus prunis, serva in vase ut humiditas paulatim exhalet, dantur pro laxante pruna v. vj. vel etiam plura.

℞. Prun. damascen. n. xv. coq. in ▽ ad ℔j. colatur. infund. fol. fenn. ℥j. sem. foenicul. ʒ℔. flor. bugloss. violar. ana p. j. add. Mannæ ʒij. sicca leniter super △ cape pruna vij. vel plura pro laxante.

℞. Elect. diaprun. ʒ℔. ad alvum laxand. add. diagryd. gr. v. pro stimulo & troch. alhand. gr. iij. ad purgandum.

PAS.

PRUNUS, Κοκκυμηλέα, Pflaumen • Baum / PRUNIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum ovatum vel globosum, carnosum mollem, officulo foetum utrinque plerumque acuminato, nucleumque includente.

Distinguitur Prunus in sativam & sylvestrem, hæc hujus loci non est, altera vero præcipue ratione fructuum maxime discrepat. Quæ in usum Medicum cedunt species sunt

Prunus fructu magno dulci atro cœruleo Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 7. g. 1. Pruna magna dulcia atro cœrulea C. B. Pin. 443. Pruna Damascena Lugd. 314.

Prunus fructu magno crasso subacido Tourn. l. c. Pruna magna crassa subacida C. B. Pin. 443. Pruna Hungarica præstantissima Damascena forte Gesn.

Prunus Brignoniensis fructu suavissimo Tourn. l. c. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis gratissima C. B. Pin. 443.

E e e

Fructu

Fructus duarum priorum specierum vocantur PRUNA DAMASCENA, Zwetschen/ Quetschen/ Damascener oder Ungarische Pflaumen/ PRUNES DAMAS, tertia vero speciei PRUNEOIA, BRIGNOLÆ, PRUNA BRIGNOLENSIA, Prineolen/ Brigniolen/ Pronolien/ BRIGNOLES audiunt.

Hæc ultima Pruna sunt minora exacinata & à cute libera siccata, in febribus gratum præbent refrigerium, sitim sedant, refrænant bilem linguam humectant, ægrumque refocillant, è causo & hectica febris emaciatis conducunt, vel in vino, vel in aqua decocta, vel etiam absque præparatione comesta.

Quod ipsa pruna attinet, recentia, ut SEBIZIUS loquitur, refrigerant, humectant minimumque corpori alimentum subministrant. Siccata stomacho sunt meliora plus alimenti probioris nec adeo facile corruptibilis conferunt. Mensis & primis & secundis apponuntur, coquuntur in vino & saccharo consperguntur. Conveniunt juvenibus biliosis & sanguineis. Pro vehiculo purgantium Decoctum prunorum sæpius usurpatur. Solum etiam decoctum ex prunis exacinatis in frusta scissis cum aqua coctis hincque expressis pro alvo laxanda inservit, si successive hauriatur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Pulpa Prunorum, Durchgetriebene Quetschen / *Pulpe de pruneaux*. Refrigerat sitim sedat alvumque laxat, datur ad ℥j. ℥ij. & ultra; pro scopo vero laxandi ad ℥j. ad ℥ij.

Electuarium diaprunis lenitivum, Erweichende Quetschen-*Lattwerg* / *Electuaire Diaprun lenitif*; ad alvum humectandam datur etiam in febribus ardentibus & hecticis ad ℥j. ℥ij. & ultra.

Electuarium diaprunis laxativum, Purgierende Quetschen-*Lattwerg* / *Electuaire diaprun laxatif*. Confert morbis à bile genitis, sed in febribus, ubi calidiora purgantia suspecta, ab eo debemus abstinere, datur ad ℥j. ad ℥vj.

PASSULÆ MAJORES ET MINORES sive CORINTHIACÆ.

Est uva passa major βέρας Græcis C. B. P. sunt baccæ
exsiccatæ

exsiccatæ depressæ, rugosæ ex obscuro rufescentes, continentes sub pellicula tenui acinos angulosos, involutos pulpæ melleæ subrufæ.

Harum substantiam temperatam subacrem, subdulcem lenientem & alvum blande laxantem constare in particulis *Eno* volatilibus & *Quosis* docet vinum quod ex fermentatis conficitur ut & earum fermentescibilitas.

Ob substantiam viscosam subdulcem & temperatam emolliunt, leniunt, temperant, & propterea in tussi, raucedine, asperitate conveniunt & partibus nutriendis alimentum apponunt, quem in finem decoctis infusis acrioribus, tanquam temperans adjunguntur, ob sui fermentescibilitatem alvum solvunt, eamque apertam detinent, ut proinde in alvi retentione & fœcibus induratis mire profint. Ob salia vero volatilia aperiunt & deobstruunt, adeoque scorbuticis, cachecticis & hypochondriacis singulari proprietate conducunt.

Datur earum substantia, pulpa, infusum, decoctum.

Minores sunt uvæ passæ minores sive passulæ Corinthiacæ C. B. P. quæ præferuntur majoribus. Si majores præscribuntur signentur passulæ majores exacinatæ, quia in acinis consistit vis adstrictoria. [Acinos exemptos & tostos in pulverem redigit subtilissimum & à ʒj. ad ʒj. alvi fluxu laborantibus cum *Evφopία* adhibet propter singularem vim stegnoticam Joh. Ægidius Euth. C. N. C. Dec. III. ann. 7. & 8. obs. 5. p. m. 8. imo ex iis beneficio *Quis* vini rectificati tincturam extrahit saturate tinctam quæ mirificam cum marte vel terra Japonica habet analogiam.]

℞. Passul. cum pyris moschatellin. q. v. contunde, sine succum effervesce ut fiat vinum, quo in cachexia utere, seu loco pyrorum cape poma redolentia contra hypochondriacam passionem.

℞. Pulp. passul. lbss. rhabarb. zij. sacchar. zij. M. cape cochl. j. ante mensam ad dyscrasiam sanguinis, aromatisa etiam cinamomo.

℞. Pulp. passul. tamarind. ana zij. cape in sanguinis æstu cum adstrictione alvi.

℞. Passul. min. zij. coq. in ∇ simpl. add. colatur. adhuc ferventi fol. senn. ʒss. Crem. Fri ʒi ss. f. laxans.

℞. Pulp. passul. min. syr. d. cich. c. rh. ana zij. corall. r. Oc. ʒ ana ʒss. M. datur infantibus ad expurgandum meconium, etiam in febribus in alvo adstricta.

℞. Pulp. passular. cape c. — u vini anisato contra tussim & raucedinem.

℞. Passular. amygd. dulc. ana q. v. cape singulis diebus pro corpore pinguefaciendo.

℞. Passul. minor. hord. mund. ana zij. rad. liquirit zij. caric. ping. n. vj. herb. capil. ʒis Mj. pinear. recent. ʒj. M. f. decoct. ad tussim & raucedinem.

SILL

Occasione harum passularum imprimis majorum possemus sermonem de Vite vinifera ejusque productis imprimis Vino facere, verum quoniam commentatio isthæc longius excurreret, insuper animus sit, ea ad materiam Medicam pertinentia, quæ ab authore non fuere pertractata, peculiari in tractatu sistere, ideoque de ipsis uvis passis tantummodo tractabimus.

PASSULÆ MAJORES vocantur alias UVÆ PASSÆ, σαφίδες aut αἰσαφίδες, ZIBEBÆ, UVÆ MARINÆ, Zibeben / große Rosinen / Meertrauben / RAISINS SECS, RAISINS PASSES. Quæ ex vitibus Damascenis ex Syria adferuntur reliquis præferuntur, hodiæ autem Uvæ Passæ ex Hispania, Gallia, Italia, ad nos perveniunt.

DALE sequenti modo exsiccari docet, Botrorum seu racemorum, quos adhuc usum destinant, pediculos ad mediam partem transversim incidunt, adeoque succi nutritii magnam partem interci-

intercipientes impediunt, ne ad uvas copiose affluat, sed parce admodum derivetur. Racemos semiseptos in vite pendentes relinquunt, donec paulatim calore solis & alimenti inopia exsiccentur: cum sufficienter exsiccatos senserint demetunt & in vase recondunt. Juxta Dn. TOURNEFORTIUM parantur racemos uvarum sæpius in aquam bullientem immergendo & ad solem siccando. Comeduntur uvæ passæ tum crudæ, tum elixæ extra & in pastibus ordinariis. Ingeruntur enim, ut SEBIZIUS ait, mensis secundis una cum amygdalis aut bellariis aliis. Adduntur etiam cibis aliis, carnibus maxime, artocreatibus gustus gratia.

Passulis majoribus virtutes quoque cordiales atque cephalicæ adscribuntur. Vias urinarias abstergunt & urinæ acrimoniam mitigant. Lienem autem non admodum convenire dicuntur.

Juxta illud SCHOLÆ SALERNITANÆ, Passula non spleni, tussi valet, est bona reni.

Aliis è contra tota substantiæ suæ familiaritate convenire dicuntur. Ob acinos alvum haud raro adstringere asserunt, unde sæpissime passulæ exacinatæ præscribuntur. LEMNIUS puerorum lumbricos uvarum passarum esu expurgari asserit, si jejunis, nullo alio admixto edulio illas exhibeas. In decoctis pro potu & pectoralibus solent usurpari. Uva passa inversa clavis pedum imponitur, ut dolores mitigentur & præcaveantur.

UVÆ PASSÆ MINORES, PASSULÆ MINORES, PASSULÆ CORINTHIACÆ, PASSULÆ SINE GRANIS, PASSULÆ APYRENÆ, *Kleine Rosinen / Rosinlein / Corinthen / Corinth / Träublein /* RAISINS DE CORINTHE, proveniunt ex viteaque dicitur

Vitis Corinthiaca sive Apyrina I. B. 2. 72. Uvæ passæ minore, vel passulæ Corinthiæ C. B. Pin. 299. Passulæ Trag. 1054.

Olim circa Corinthum, unde & nomen habent, reperiébantur in copia. Hodie ex Insulis Ægei Maris imprimis Zante, Cephalonia ad nos devehuntur, curiositatis quoque gratia in hortis coluntur. Mense scilicet Augusto, cum maturuerunt, decerpuntur & exsiccantur, siccata postmodum doliis committuntur, arctissime illas comprimendo ut aer & per consequens corruptio arceatur.

Passulæ minores comeduntur vel crudæ, vel aliis quoque edulis sæpissime admiscuntur. Crudæ comestæ ad hæmorrhagiam narium copiosiore a fluxilitate & acrimonia sanguinis scorbutici præsertim oriundam conducunt, commendantur ad atrophiam ab acrimonia sanguinis dependentem & certe egregium constituunt nutriendum & humectans in phthisicis atque hecticis, modo non adsit diarrhœa. Sitim sedant atque refrigerant, affectibus pectoris medentur, hepati & renibus prosunt, in scabie & lue venerea usurpantur, & ad alvum emolliendam faciunt. Communius nihil est, quam ut adhibeantur in decoctis pro potu ordinario. Passulæ aqua fervente emollitæ & tumefactæ ad sitim extinguendam etiam in ipsis febribus egregie prosunt. ZORNIIUS laudat ad tussim cum sibilo infantum, si passulæ minores in aqua Scabiosæ decoquantur, postea per linteum exprimantur, & infanti successive exhibeantur.

PROSTANT IN OFFICINIS

Pulpa passulorum, Durchgetriebene Rosinlein / Pulpe de raisins de Corinthe, refrigerat sitimque sedat & alvum laxat, datur ad ℥ij. 3℥. 3j. ad 3ij.

Passulæ purgantes cum brodio, Purgier Rosinlein mit der Brüß / Raisins de Corinthe laxatifs avec le jus, ut & *passulæ purgantes sine brodio, Purgier Rosinlein ohne Brüß / Raisins de Corinthe laxatifs sans jus*. Alvum laxant & expurgant. Dantur ad 3℥. ad 3j. &c.

Loboch de passulis, Rosinlein Lattweg / Looch de Raisins de Corinthe, ad affectus pectoris difficilem respirationem, pituitam crassam incidendam, præsertim in infantibus adhibetur.

Tandem notandum quod ex passulis minoribus quoque aqua fermentatis liquor vinosus dulcis prodeat.

SILIQVA DULCIS seu CERATONIA.

Sunt Siliquæ edulis C. B. P. fructus oblongi, compressi, paululum intorti, crassi, digito longiores, pollice latiores,

res, fusci splendentes, dorso elatiore includentes pulpam carnosam, rufam, dulcem, sub qua intra membranaceos loculos latitant nuclei plani, compressi, orbiculati, lucidi, fusci. Habent dulcedinem majorem in pulpa, quam in cortice. Hujus dulcis & viscosa substantia in specie temperat sodam, ardorem Ventriculi & urinæ. Datur integra cum pulpa & cortice.

℞. Siliq. dulcis 3j. cape cum ∇ Nymph. contra sodam & ardorem ventriculi.

SEMI-

κεράϊον, κεράϊώνια, à fructu quasi cornuto & falcato, ξυλονέρατον, XYLOCARACTA, CERATIA, CAROBA, SILIQUA ARBOR, CERAUNIA, SILIQUA, St. Johannisbrodt, Baum/Horn, Baum. CAROUGE.

Est planta flore apetalò, plurimis staminibus constante exdivisuris calycis nascentibus, cujus meditullium occupat pistillum, quod deinde abit in fructum seu siliquam planam, veluti carnosam, seminibus foetam planis pariter & subrotundis.

Siliqua edulis C.B. Pin. 402. Siliquæ arbor sive Ceratia I. B. I. 413. Ceratonia Dod. Pempt. 787.

In regionibus orientalibus, India, Syria, Judæa, Palæstina, item porro in Candia aliisque regionibus calidioribus, Regno Neapolitano, Campania, Apulia, item in Hispania provenit, colitur quoque in hortis. In Syria atque Judæa, adeo familiarem esse hanc perhibent, ut fructibus porcos pinguefaciant. Floret mox soluta hyeme, vere appetente fructus autumnò maturescunt. Ante duos annos in horto nostro Academico tres quoque perfecte maturos obtinui. Sunt autem hi soli ex hac arbore in usu; dicuntur SILIQUÆ, SILIQUÆ DULCES à sapore, CERATIA, Johanne Brod / quasi Joh. Bapt. iis usus fuerit, Good-Brod / ab effectu contra ardorem stomachi.

Recentes siliquæ adeo grati saporis non sunt, siccatae autem temporis progressu dulces evadunt & gustu suaves. Edulium præbent

bent non adeo boni succi. Recentes & humidæ adhuc alvum laxare possunt, siccæ remorantur. Orientales populi succum melleum, quo utuntur ad condituras, ex his exprimunt. Cum ratione huius succi præsertim demulceant & involvant humores acres, siliquæ tussientibus, asthmaticis & orthopnoicis in decocto commendantur. Ingrediuntur species pro potu ordinario.

IN OFFICINIS CELEBRIS EST

Syrupus de Siliquis, sive Syrupus Diacodii pectoralis seu Diacodion Johannis Baptistæ Montani, Diacodium / oder componirter Magsaamen oder Schotten. Syrup / Syrop de Diacode, de Carouge ou pavot blanc composé, commendatur in tenuibus & acribus defluxionibus pulmones & asperam arteriam vellicantibus item in tussi continua & ferina, datur cochleatim.

SEMINA PARTICULIS AQUOSIS ET CRASSIS CUM OLEO PAUCO CONSTANTIA.

SEMINA QUATUOR FRIGIDA MAJORA.

Sunt Citrulli, melonum, cucurbitæ, cucumeris. Vocantur majora, quia majorem habent vim refrigerantem.

Citrulli semen. Sunt Anguriæ Citrullus dictæ C. B. P. Semina oblonga plana, rhomboidea, ad margines æqualia absque eminentia, modo nigra, modo nigricantia, sub cortice duriusculo includentia medullam albam, saporis aquei.

Planta est pomifera scandens monopetalâ.

Melonum sunt semina oblonga ex flavo albicantia, ad semen cucumeris accedentia.

Cucurbitæ sunt semina thyroidea, oblonga, plana pallida,

lida, parte superiore cornuta, seu auriculata duabus apophysibus quasi angulosis eminentibus, & duabus lineis per longitudinem excurrentibus notata.

Cucumeris sunt semina oblonga, plana, in medio paululum tumida seu convexa, candicantia, seminibus melonum angustiora, pusillo subtus apiculo protenso.

Semina hæc, inter quæ præstantiora sunt semina melonum, constant particulis viscosis, aquosis, crassis, cum blando & paucò oo, propterea temperant & obtundunt Θ ia acria quævis, eaque ad renes præcipitant & per urinam expellunt, hoc nomine profunt etiam in supprimendo orgasmo genituræ, conveniunt etiam in linguæ ariditate, & mulcendis doloribus intestinorum à bile acri. Dantur horum pulpæ excorticatæ vel per se, vel in Emulsione.

℞. Sem. 4. frig. maj. ana ʒij. amygd. dulc. ʒj. decoct. hord. ʒvj. ∇ rosar. ʒj. f. Emuls. temperans & refrigerans, add. syr. papav. alb. q. v.

℞. Sem. 4. frig. maj. ana ʒij. sem. cannab. ʒij. f. Emuls. ex ∇ lactuc. nymph. portulac. q. s. add. \odot tr. præpar. ʒj. sacch. ʒni ʒß. contra nimiam salacitatem.

Semina Citrulli specificè in mensibus decoloratis laudantur si xij. excorticata simul deglutiantur & haustus lactis superbibatur.

SEMI-

Ἀγγυρῶν, ANGURIA, CITRULLUS à citreo colore, CUCUMIS CITRULLUS, Citrullen / Angurien / CITROUILLE.

Anguria differt à reliquis cucurbitaceis folio in profundas lacinias dissecto & fructu eduli.

Anguria Citrullus dicta C. B. Pin. 312. Citrullus folio Colocynthis secto semine nigro quibusdam Anguria I. B. 2, 135. Anguria Cucumis Citrullus Dod. Pempt. 664.

In regionibus calidioribus, Apulia, Calabria, Sicilia & Hispania præsertim provenit, floret Junio & Julio. Caro fructus comeditur tum cruda tum cocta, parum alimenti præbet, semen in usum medicum cedit, ast semper recens desideratur.

Melo à voce Græca μήλον, à malo sive pomo, nam & majus malum refert, & fragrantis mali odorem spirat, vocatur à quibusdam quoque ΜΕΛΟΠΕΡΟ, Melon / Melonen / MELON.

Est planta floribus monopetalis, campaniformibus, patentibus, multifidis, cucumeris flores omnino referentibus, ex iis autem alii steriles sunt, nulli embryoni adhærescentes, alii vero fecundi insidentes embryoni, qui deinde abit in fructum ut plurimum ovatum, glabrum aut rugosum in terna loculamenta divisum, quæ bifariam secari videntur, seminibus foetum oblongis. Etiam si Melo à Cucumere foliis rotundioribus & fructu suavi distinguatur, plus tamen faciei externæ tribuendum est.

Felicissime in Italia, Hispania, Gallia, aliisque siccis regionibus proveniunt, Fructus tum carnis, tum corticis ratione, differentes odore, sapore, colore &c. Julio præsertim & Augusto crudi vel soli vel cum Saccharo, vel cum Saccharo & Pipere, vel cum Sale & pipere esitantur.

Melo vulgaris C. B. Pin. 310. Melones I. B. 2. 242, Melo sive Melopepo vulgo Cucumis Galeni Dod. Pempt. 663.

Melo rotundus parvus C. B. Pin. 311. Melo Moschatellinus rotundus parvus & pyriformis I. B. 2. 244. Melo Saccharinus Tabern, Ic. 469,

Melo reticulatus I. B. 2. 244.

Fructus refrigerant & humectant, sed paulo difficilioris sunt digestionis, nutrimenti non omnimodo boni, sed putrescibilis, febribus ac torminibus generandis apti. Unde, (quod quasi in proverbio dicitur) Melones si plus justo comederis opus habebis eorum seminibus, h. e. febres exinde excitatæ emulsionibus ex seminibus indigebunt.

CUCURBITA à concurvatu dicta putatur, facile enim si quid obstiterit, quo minus extendatur, incurvescit, ut loquitur SEBIZIUS; Græce vocatur κολοκύνθη ὕμερς καὶ ἐδάδιμα, sativa & edulis ad differentiam κολοκύνθη δαΐμα, quæ non vesca, sed vehementer purgatoria juxta eundem authorem. Kürbis / Kürbse / CAlEBASSE, COURGE. Est

Est planta floribus campaniformibus, patentibus, & plerumque ita sectis, ut ex quinque petalis constare videantur, ex floribus autem alii steriles sunt, nulli embryoni adhærescentes, alii vero fœcundi seu insidentes embryoni, qui abit in fructum in quibusdam speciebus teretem & longum, in aliis lageniformem, in sex loculamenta plerumque divisum seminibus fœtum planis, oblongis hinc obtusis inde latioribus & quasi introrsum emarginatis.

Ex cucurbitæ speciebus pluribus, ex quibus quædam ad Peponem & Melopeponem cum **TOURNEFORTIO** referendæ, in usum præsertim veniunt

Cucurbita latior folio molli flore albo I. B. 2. 215. Cucurbita major sessilis flore albo C. B. Pin. 312. Cucurbita latior Dod. Pempt. 669. **Großer Plat runder Kürbis mit Weissen Blumen.**

Cucurbita longa folio molli flore albo I. B. 2. 214. Cucurbita oblonga. flore albo folio molli C. B. Pin. 313. Cucurbita longior Dod. Pempt. 669. **Lange oder trompeter Kürbis.**

Ad **PEPONEM**, qui fructum oblongum vel rotundum, carnosum, cortice nonnunquam duro tuberosum, cavum in tres partes sæpe divisum, seminibus fœtum planis annulo quodam veluti cinctis & placentæ spongiosæ affixis, obtinet, refertur

Pepo vulgaris Raji. Hist. 639. Cucurbita foliis asperis sive Zuccha flore luteo I. B. 2. 218. Cucurbita major rotunda flore luteo folio aspero C. B. Pin. 312. **Großer runder Kürbis mit gelben Blumen und rauchen Blättern.**

Cucurbitæ feruntur & coluntur in hortis agris & vinetis. Autumno fructus maturescit.

Fatua est, inquit **SEBIZIUS**, atque insipida succumque gignit improbum gelidum & humidum. Elixatur, assatur, frigitur, variis additis condimentis, ut sapidior evadat.

Folia Cucurbitæ recentia puerperarum mammis applicata lac minuunt.

CUCUMIS, **CUCUMER**, à curvure vocatur, *σίκυς καὶ σίκυς ἡμερῶν*, *ἡὸν ὠδύμη*, **CUCUMIS SATIVUS** & esculentus, **Gurken / Cucumern / CONCOMBRE.**

Est planta floribus monopetalis, campaniformibus, patentibus & multifidis, ex quibus alii steriles sunt, nulli embryoni adhærescentes, alii fœcundi insidentes embryoni, qui deinde abit in fructum

Fructum carnosum plerumque teretem in terna vel quaterna locula-
menta divisum & seminibus foetum oblongis.

Cucumis sativus vulgaris maturo fructu subluteo C. B. Pin.
310. Cucumis vulgaris viridis I. B. 2. 245. Cucumis vulgaris
Dod. Pempt. 662. &

Cucumis sativus vulgaris maturo fructu albo C. B. Pin. 310,
Cucumis vulgaris albus I. B. 2. 245.

Seritur Cucumis non tam in hortis quam etiam in agris. Julio,
Augusto & Septembri sunt edules.

Fructus imprimis sunt culinares, refrigerant, succumque hu-
midum & alimentum humidius frigidiusque suppeditant. Cortex
cartilagineus refecatur, verba rursus sunt SEBIZIANA, reliquum
secatur in taleolas, quæ consperguntur sale: Salsugo postea abjici-
tur, & taleolæ pipere oleo atque aceto conditæ mensis condimenti
loco apponuntur. Coquuntur quoque cum succo ex carne ver-
vecina præsertim assa extillante & cum eadem carne apponuntur.
Vulgus præfert in cibo Cucumeres, qui sunt adultiores & maturi-
tati proximi, qui flavent. Ast Apiciis magis sapiunt, qui virides
nondumque maturi. Cum infantes adhuc sunt parumque ventrosi,
apices avelluntur, horam unam circiter atque alteram in aqua ma-
cerantur tandem siccati, sale anetho, fœniculo, Dracunculo &c. & ace-
to condiuntur & pro condimento asservantur. Gallis dicuntur Cor-
nichons.

Modo dicta semina frigida majora nunc simpliciter usurpantur,
nunc etiam excorticantur,

SEMINA QUATUOR FRIGIDA MINORA.

Sunt Lactucæ, Scariolæ, Portulacæ, Plantaginis.

Lactucæ sativæ C. B. P. sunt semina parva oblonga,
compressa, pallida, utrinque acuminata, saporis aquei.

Scariolæ sunt Intybi sativæ angustifoliæ C. B. P. semina
Cichorii seminibus simillima, colore pallidiora.

Portulacæ latifoliæ seu sativæ C. B. P. sunt semina exi-
gua nigra. Planta-

Plantaginis latifoliae sinuatae C. B. P. sunt semina parva oblonga, puliciformia, coloris obsoleti ac ferruginei.

Endiviae vulgaris C. B. P. sunt semina parva oblonga angulosa spadicea, in summo acetabulo instar coronae notata.

Coincidunt cum seminibus frigidis majoribus, excellent vero semina lactucae, semen vero plantaginis habet simul virtutem adstringentem, ut proinde forsitan rectius ad terrea quam ad aquosa amandari possit. Dantur in Emuls. ut frigida majora.

℞. Sem. frig. min. ana ʒij. f. Emuls. ex decoct. hord. add. syr. pap. alb. q. s.

℞. Sem. plantag. portulac. corall. præpar. borrac. calcinat. ana ʒj. sacch. ʒn. gr. v. L. O. gr. ij. f. pulv. ad ij. doses exhibendus in nimis alvi & mensium fluxibus.

SEMI-

LACTUCA, à lacteo, quem fundit, succo, ὀψίδαξ ὀψιδανίμ, Lattich / Lactucfe / LAITUE.

Est planta flore semiflosculoso, plurimis semiflosculis constante, embryoni insidentibus & calyce squammoso oblongo tenui comprehensis. Embryo autem deinde abit in semen pappis instructum. Quibus notis addatur facies propria.

Lactuca sativa C. B. Pin. 122. Lactuca sativa vulgaris non capitata I. B. 2. 997. Lactuca sativa folio scariolæ Lob. Icon. 241. Gemeiner Lattich. LAITUE NON POMME.

Lactuca foliis endiviae C. B. Pin. 122. Lactuca Intybacea Tabern. Icon. 423. Weißer Sommer Endivien / Endivien Lattich.

Lactuca maculosa C. B. Pin. 123. Lactuca fusci ac veluti purpurei coloris Dod. Pempt. 644. Lactuca rubra, Brauner oder Spanischer Lattich.

Lactuca Romana longa dulcis I. B. 2. 998. Lactuca folio obscurius virente semine nigro, C. B. Pin. 123. Lactuca folio obscurius

scurius virente Dod. Pempt. 644. Brauner Sommer-Endivien
oder Lattich / Florentiner Salat / LAITUE ROMAINE.

Lactuca capitata C. B. Pin. 123. Lactuca sativa vulgaris capi-
tata I. B. 2. 997. Lactuca sativa sessilis sive capitata Lob. Icon.
242. Kopff- Lattich / Köpffel- Lattich / LAITUE POMME'E.

Lactuca Crispa laciniata I. B. 2. 999. Lactuca Crispa C. B.
Pin. 123. Lactuca Crispa non capitata Lob. Icon. 242. Krauser-
Lattich / LAITUE CRESPE'E.

Lactuca folio oblongo acuto C. B. Pin. 123, Prodr. 60, La-
ctuca longo & valde angusto folio I. B. 2. 999. &

Lactuca Crispa altera C. B. Pin. 123. Lactuca Crispa & te-
nuer diffecta I. B. 2. 999. Lactuca Crispa ij. Tabern. Icon. 423.

Ex his species prima præsertim toto anno feritur ad
usum acetariorum, aliæ vero sua certa requirunt tempora hortula-
nis & olitoribus notissima.

Lactuca comeditur cruda tum tenella adhuc, tum etiam adul-
tior, condita oleo aceto sale & pipere, placet imprimis capitata &
crispa. Coquitur quoque cum jusculis & sic in usum trahitur. Ali-
mentum humidum & frigidum equidem suppeditat, sed non adeo
pravum. Ob vim somnum indulcendi olim sumere ultimo in
cœna, recentiores vero de appetitu magis solliciti ab ea dapes in-
choant, hinc MARTIALI quærenti,

*Claudere quæ cœnas lactuca solebat avorum,
Dic mihi, cur nostras inchoat illa dapes?*

Respondet FRID. HOFFMANNUS,

*Vim vini reprimens affert lactuca saporem,
Humiditate sua, frigiditate sua.*

*Ferventis stomachi Lactuca refrigerat æstum,
Et facit ut positas appetat ille dapes.*

Alvi laxitatem Lactucam inducere vel modo dicti Poëtæ ver-
bis confirmatur, dum canit

*Prima tibi dabitur ventri Lactuca movendo
utilis. &*

*Utere Lactucis & mollibus utere malvis;
Nam faciem durum, Phœbe, cacantis habes.*

Lactuca

Lactuca biliosis & sanguineis convenit, sitim sedat, acrimoniam humorum reprimat, gonorrhœam sistit, venerem refrœnat, Lac auget præsertim in subjectis calidioribus. Somnum inducit unde veteres post cœnam assumebant. Quidam folia lactucæ ebullire sinunt in jussulo, quod deinde contra agrypniam propinant, immiscetur quoque Lactuca pediluviiis ad vigilias arcendas.

Semen Lactucæ valet ad gonorrhœam, & ad ea, ad quæ ipsa Lactuca prodest. Venerem porro quoque extinguit, & alvi fluxum sistit. Juxta illud Poëtæ,

*Semen Lactucæ Veneris ludibria tollit,
Cum vino bibitum fluxum quoque comprimit alvi.*

Succum Lactucæ expressum venenatum esse quidam asserunt.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua Lactucæ ex foliis, *Lattich-Wasser* / *Eau de Laitûe*, quantum interne, tum externe adhibent, ad acrimoniam humorum demulcendam, æstum sedandum, vigilias arcendas capitisque dolorem mitigandum. Ad hæmorrhagias narium multorum e vulgo est remedium, assumendum dum cubitum itur.

Conditum Lactucæ, *Eingelegter-Lattich* / *Condit de Laitûe*; in febribus ad refrigerium ut & in affectibus hepatis celebratur.

Scariola cum concordet cum Endivia vulgari, cujus etiam author meminit, utramque plantam simul lustrare lubet. ENDIVIA vocatur σέλις, INTYBUM SCARIOLA, Endivien / Scariol / ENDIVE, SCARIOLE.

Est species Cichorei, de quo supra, in usu sunt sequentes species.

Cichorium latifolium sive Endivia vulgaris Tourn. I. R. H. cl. 13. S. 2. g. 3. Intybus sativa latifolia sive Endivia vulgaris C. B. Pin. 125. Intybum sativum latifolium I. B. 2. 1011. Intybus major sativa. Cichoreum domesticum Tabern. Ic. 173. Endivien mit breiten Blättern oder Winter-Endivien.

Cichorium angustifolium sive Endivia vulgaris Tourn. l. c. Intybus sativa angustifolia C. B. Pin. 125. Intybum sativum angustifolium I. B. 2. 1011. Serium Cichorium Sativum minus Tabern. Ic.

IC. 174. Seriola aut Endiviola adv. Scariola Officin. **Schmale Endivien.**

Cichorium Crispum Tourn l. c. Intybus Crispa C. B. Pin. 125. Intybum sativum crispum l. B. 2. 1011. Intybus crispa, Endivia crispa Tabern. Ic. 173. Krause • Endivien / ENDIVE ou SCARIOLE CRESPEE.

Seritur Intybum in hortis & agris & quod vere satum (verba sunt J. BAUHINI) celeriter adolescit, ac ipsa æstate florens semina profert ac deinde intercidit. Julio vero satum in Hyemem restat, Septembri ac Octobri terra obrutum, colligatis prius foliis, nivis instar candidum redditur ac deinde mensibus hybernis aliorum acetariorum loco mensis infertur. Coquitur quoque in jusculis variarum carniū & ipsis etiam ægrotis gratum præbet edulium.

Olus istud refrigerat extergit & aperit leniter insuper adstringit, sitim sedat, stomachi, ut SEBIZIUS loquitur, ardores compescit, appetitum conciliat, ictericos juvat, Hepati prodest ut & affectibus sic dictis calidis laborantibus. In ipsis quoque febribus continuis agris conceditur. Saluberrimum Cholericis, sanguineis, juvenibus & quibus viscera ventriculusque æstuant. Conducit hinc hecticis atque phthisicis. A quibusdam quoque contra sterilitatem in mulieribus celebratur, dum alii Venerem extinguere dicunt.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua destillata Endiviæ sive Intybi, Endivien • Wasser / Eau d'Endive ou de Scariole; quæ interne in emulsionibus & potionibus refrigerantibus, externe in Epithematibus & frontalibus usurpatur. Olim prostabant *Syrupus de Endivia, Syrupus Byzantinus & Syrupus diasereos* Andernaci, sed vix amplius usurpantur.

Ανδράχνη, ANDRACHNE, PORTULATA, PORCELLANA, quod porcis prodest, *Burzel / Burzel-Krauth / Börzel / Porzel-Krauth / POURPIER, POURCELLANE.*

Est planta flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce monophyllo & bifido surgit pistillum, quod deinde simul cum calyce abit in fructum, plerumque ovatum, seminibus foetum exiguis & duabus testis in summo donatum, quarum exterior, quæ calycis pars fuit bifida primo, interior vero, quæ aliud nihil est, quam pistillum ampliatus postremo transversa bifa-

bifariam dehiscunt, inferiori seu calycis altera parte pediculo affixa. His notis adde folia crassa, carnosae alternatim posita.

Portulaca latifolia sativa C. B. Pin. 288. Portulaca hortensis latifolia I. B. 3. 678. Portulaca sativa Dod. Pempt. 661.

Portulaca sativa, latifolia, flavescentes sive foliis aureis H. R. Par. Portulaca hortensis folio flavo Moris. H. R. Bles. POURPIER DORE.

Portulaca angustifolia sive Sylvestris C. B. Pin. 288. Portulaca Sylvestris minor sive Spontanea I. B. 3. 678. Portulaca Sylvestris Dodon. Pempt. 661.

Hæc ultima autem species non æque bona ac sativa, quæ fertur Martio & Aprili, deinde vero in autumnum usque viget & viret. In usum suppeditat folia & semen. Refrigerat, æstum mitigat, vermibus resistit, in febribus, urinæ ardore & scorbuto convenit. Largius comesta Venerem extinguere fertur. Masticata stuporem dentium tollit. Externe quoque folia applicantur, in inflammationibus mammillarum, dolore & rubore. In culinis multi quoque usus, adhibetur in acetariis ut & jusculis refrigerantibus, pauci tamen est nutrimenti.

IN OFFICINIS EXTAT

Aqua portulacæ destillata ex herba, *Burzel-Wasser / Eau de Pourpier*, quæ refrigerat & humectat inque allegatis morbis conducit.

PLANTAGO, quod plantam pedis æmuletur, aut quod sit planta κατ' ἐξοχήν MULTINERVIA, CENTUMNERVIA, à foliis, quæ multis quasi nervis gaudent ἀντογλώσσον, LINGUA AGNINA ob similitudinem, OLUS AGNINUM Wegerich, quia secus vias crescit, PLANTAIN.

Est planta flore monopetalo, hippocrateriformi, plerumque quadripartito, ex cujus fundo surgit pistillum, staminibus ut plurimum longioribus stipatum, quod deinde abit in fructum seu testam fere ovatam, aut conicam, per maturitatem in duas partes, quarum altera alteri incumbit, transversa dehiscens, septo intermedio in duo loculamenta divisam, & seminibus foetam oblongis placenta affixis.

Duæ sequentes species potissimum in usum cedunt:

Ggg

Plantago

Plantago latifolia sinuata C. B. Pin. 189. *Plantago major* folio glabro non laciniato ut plurimum I. B. 3. 502. *Plantago major* Dod. Pempt. 107. *Breit. Wegerich* / PLANTAIN à LARGE FEUILLE.

Plantago angustifolia major C. B. Pin. 189. *Plantago lanceolata* I. B. 3. 505. *Plantago minor* Dod. Pempt. 107. *Epiz. Wegerich* / PLANTAIN à FEUILLE ETROITE.

Crescunt fere ubique in locis herbosis, florent Majo, Junio &c. semen Augusto maturescit. Ex hac planta in usu sunt non solum semen, sed radix, quæ pusilla, tenera, fibris multis constans, albicans; atque folia saporem insipidum & adstringentium possidentia.

Planta est polychresta. Abstergit, incrassat, vim temperandi & acrimoniam demulcendi obtinet, conducit hinc in affectibus hepatis. Vulneraria insuper est & adstringens. Hinc in omnibus fluxibus, imprimis alvi, diarrhœa, dysenteria, Hæmoptysi, vomitu & mictu cruento, mensium & Lochiorum fluxu nimio, gonorrhœa quavis laudatur. Conducit quoque ad febres intermittentes, ubi decoctum radicum, numero videlicet trium in tertiana, quatuor vero in quartana à Dioscoride aliisque commendatur. Febribus quoque symptomaticis medetur. Cum ad læsiones internas æque ac externas quam plurimum valeat, ingrediens potionum vulnerariarum constituit. Virtus quoque Alexipharmaca ad morsus canis rabidi serpentum & insectorum variorum adtribuitur. Externe folia vel contusa vel non contusa vulneribus & ulceribus variarum partium, ad ficos condylomata hæmorrhoides dolentes & nimium fluentes, ulcera oris, tonsillarum & uvulæ applicantur. Conducunt sugillatis & ambustis, item inflammationibus oculorum & eorundem doloribus folia æque ac radix, cujus decoctum in odontalgia quoque celebratur. SIMONE PAULI teste, radix lota recens ex terra extracta, cultro rasa & auris meatui indita dolorem dentium incantamenti instar mitigat. Semen quoque plantaginis ad calculum & herniam laudatur & in fluxibus alvi & sanguinis præsertim mensium nimio item ad abortum præcavendum celebratur. Meretur hoc de semine audiri DAN. LUDOVICI, semen iniquiens, commendatum quidem est, vique simul leniendi Lapathi, consimiliaque stypticorum semina nonnunquam superant, dum tot tamen

tamen æquivalentibus circumscribatur, & in dysenteriis præcipue promissis haud adeo stet, quandam ejus necessitatem non videmus.

Plantago immiscetur quoque clysteribus. Ad tumorem & læsionem pedum exitinere plantaginem cum aceto impositam suadet **TABERNÆM**. Succus plantaginis vermes necat, ictero, hydropi & phthisi conducit & ad singultum illico tollendum facit. Succus plantaginis si inungatur papillis lac egregie imminuit, porro in mortario plumbeo ad mutationem coloris cum axungia anatis mixtus ad rhagades uteri prodest. Folia plantaginis trita & cum modico salis imposita ad podagram & omnem tumorem nervorum faciunt.

IN OFFICINIS CONSPICIUNTUR

Aqua plantaginis destillata ex herba, *Wegerich*, *Wasser*, *Eau de plantain*; quæ in omnibus affectibus hepatis, præcipue autem ejus inflammationibus prodest; æstum mitigat, fluxiones quasvis sistit, sodam minuit, lumbricos necat, in ictero, hydrope & peste laudatur. Gargarismata ingreditur ad anginam & oris ulcera, oculorum inflammationes tollit, & lac è mammis abigit. Frequentissime assumitur ad injectiones in membrum virile ad gonorrhœam.

SEMINA ET FRUCTUS PARTICULIS CRASSIS AQUOSIS SEU MUCAGINOSIS ABSQUE OLEO SE TAM SUBITO MANIFESTANTE CONSTANTIA.

SEMEN ALTHEÆ.

Sunt Altheæ Dioscoridis & Plinii C. B. P. seu Malvæ palustris semina semicircularia semilunam exprimentia, ex dorso crassiori in acutiorem aciem desinentia, saporis viscosi. Sua mucaginositate conspirant cum radice, nisi quod mucago seminum sit paulo tenuior.

Ggg 2

℞. Sem.

℞. Sem. alth. ʒʒ. sacch. ʒj. f. pulv. in dysūria, si potentio-
riorem velis, add. Oc. ʒ. ʒj. ① stip. fabar. ʒʒ.

℞. Sem. alth. ʒij. ▽ rosar. q. v. f. Emuls. f. mucago ad
dolores ex ambustione ortos.

Eibisch, Saamen / Semence de Guimauve.

Ad calculum frangendum, arenulas educendas & dolores
nephriticos minuendos commendatur. Dosis ʒʒ.

SEMEN MALVÆ.

Sunt Malvæ folio sinuato & rotundo C. B. P. semina
in rotulæ aut caseoli formam circumacta &c. inferiora sunt
& debiliora semine altheæ.

℞. Sem. Malv. Alth. ana ʒij. ▽ chærefol. f. Emuls. vel
mucilag. diuretica & simul. anodyna.

Semina Malvæ rarissime in usum trahuntur.

SEMEN AQUILEGIÆ.

Sunt aquilegiæ sylvestris & hortensis simpl. C. B. P. se-
mina nigra lucida. In mulcente sua mucagine habent ali-
quid salis, quod simul movet blandos sudores, hinc in aci-
do Variolarum & Morbillorum expellendo, & in nimia san-
guinis effervescencia tollenda laudantur.

℞. Sem aquileg. ʒj. nasturt. ʒʒ. ▽ Card. Bened. f. E-
muls. temperans fervorem sanguinis in variolis & mor-
billis.

AQUILEGIA, AQUILEIA, quia folia nondum expansa facile aquam seu pluviam legunt, vel colligunt. Alii aquilegiam dictam putant, quasi **AQUILINAM** ab aquila; cujus unguis petalis cucullatis & aduncis referre existimatur, *Agley / Alceley / Aquiley / ANCHOLIE*.

Est planta flore polypetalo anomalo ex pluribus petalis dissimilibus ut plurimum constante, horum enim nonnulla plana sunt, cætera vero cucullata, utraque simul alterno ordine posita. E floris meditullio surgit pistillum staminibus stipatum, quod abit in fructum, in quo velut in capitulum colliguntur vaginæ membranaceæ, seminibus foetæ ut plurimum ovatis planisque. Addantur folia glauca ad **Thalictrum** accedentia.

Plures **Aquilegiæ** reperiuntur species, sequentes tamen quoad maximam partem in usum cedunt.

Aquilegia sylvestris C. B. Pin. 144. **Aquilegia flore simplici** I. B. 3. 484. **Aquilegia** Dod. Pempt. 181.

Aquilegia hortensis simplex C. B. Pin. 144. **Aquilina rubra** Lob. Icon. 761.

Aquilegia flore albo simplici Eyft. &c.

Crescit in locis sylvestribus incultis ut & sata in horto, floret Majo, Junio, Julio &c. In usu folia, quæ semen virile spirant, si conterantur. Vim obtinent aperitivam & diureticam atque diaphoreticam, menses pellunt, virtutemque possident alexipharmacam æque ac semen, quod seminibus expulsivis accensetur. Externe ad anginam, putredinem gingivarum, vacillationem dentium & ulcera oris consolidanda semen hoc ut & flores commendantur.

IN PHARMACOPOLIO EXTAT

Aqua Aquilegiæ ex floribus imo tota herba destillata, *Agley / Wasser / Eau d'Ancolie*, rarius autem præscribitur.

FOENUM GRÆCUM.

Sunt **Fœnugræci** sativi C. B. P. semina oblonga flavescencia sesamacea, compressa, angulosa, saporis mucilaginosi odoris jucundi, cum quadam gravedine.

Ggg 3

Horum

Horum mucago in farinacea substantia consistens, includit quidpiam *Θις* volatilis, quod odor indicat, unde non tantum emolliunt & leniunt, sed etiam discutunt, incidunt.

Horum usus potior externus est in cataplasmatibus emollientibus & maturantibus, ut & in clysteribus anodynis, dantur etiam in fotibus, infessibus. Usurpatur farina, mucago, ipsa substantia, rarius interne, frequentius externe datur.

℞. Fœn. græc. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ferment. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. sterc. columb. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. \odot chamom. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{\beta}$. Mell. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. contund. misc. f. catapl. in maturandis abscessibus.

℞. Fœn. græc. sem. lin. herb. chamom. chæref. coq. c. ∇ ad form. Catapl. ad tumorem lienis.

℞. Mucag. sem. lin. fœn. græc. alth. \odot amygd. d. lilior. alb. ana q. v. applica tumoribus emolliendis.

℞. Sem. fœn. græc. psyll. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. flor. verbasc. $\mathfrak{M}\mathfrak{j}$. rofar. pallid. $\mathfrak{M}\mathfrak{\beta}$. lumbric. terr. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$. coq. omnia c. lacte f. clyster. in tenesmo add. sebi cervin. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

SEMEN

FOENU GRÆCUM, quia semen è Græcia primum allatum, *Τῆλὺς Βέκερας*, CORNU BOVINUM, *Αἰγίκερας*, CORNU CAPRÆ, *κεραίτης*. SILIQUA, SILICULA SILICIA, FOENACIA HERBA, *Ῥόνη* / Grec / Grünschau / quasi Griechisch / hau / Ziegenhorn / Bockshorn / Rühhorn / FOENUGREC.

Est planta flore papilionaceo, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in siliquam nonnihil planam corniformem, seminibus foetam plerumque rhomboidiformibus aut reniformibus. Addantur folia terna singulis pediculis insidentia.

Usuale potissimum est

Fœnum Græcum sativum C. B. Pin. 348. Fœnu Græcum I. B. 2. 363. & Dod. Pempt. 536.

Fœnum Græcum seritur, floret Aprili Majoque, semen Augusto

Augusto mātūrescit, dicitur de eo, quod quo pejus tractetur, eo melius proveniat. In usu tantummodo est semen, quod olim culinis quoque inserviebat, hodie non item. E farina seminis Fœnu Græci parant cataplasma ad dolores podagricos & malum ischiaticum. Mucilago seminis expectorationem promovere & ad asthma arenulas calculum & ulcera renum conferre fertur. Rubedinem insuper oculorum, fugillationes atque dolores eorundem curat. Decoctum Fœnigræci pediculos capillorum necat, si caput illo abluatur, capillos auget & maculas faciei delet. CRATO laudat in scirrhusa mesenterii dispositione; ab aliis vero hoc decoctum celebratur ad affectus spleneticos, glandulas induratas, scirrhos atque scrophulas; ad quas strumas quoque ut & ad tumores duros frigidolque oleum ex hoc semine expressum commendatur. Veterinarii Fœnum Græcum cum avena exhibent equis tussientibus & asthmaticis.

SEMEN OROBI.

Sunt Orobi filiquis articulatis semine majore C. B. P. femina seu grana angulosa, subrotunda, fusca, spadicea, saporis amaricantis & ingrati paululum.

Ob farinaceam mucaginem respondet fœnu græco in emolliendis & maturandis abscessibus, sed quoniam more omnium leguminum gaudet & diuretico ideo medetur Urinæ & calculo pellendo. Datur ut fœnum græcum.

℞. Sem. Orob. Cicer. ana ℥ij. rad. gramin. ℥j. f. decoct. cui add. syr. dialth. Fern. q. s. contra calculum.

SEMEN

OROBUS, ὄροβος παρὰ τὸ ἐρεπλεῖσθαι ἀπὸ τῶν βοῶν, quod boves eo pascantur & saginentur, ERVUM ab eruendo, Erven / Orobus / Ers.

Est planta flore papilionaceo; ex cujus calyce surgit pistillum, quod

quod abit in siliquam utrinque undulatam, veluti nodosam, seminibus foetam subrotundis. Addantur folia bina quasi conjugata costæ innascentia.

Ervum verum Camer. Hort. Orobus siliquis articulatis semine majore C. B. Pin. 346. Orobus sive Ervum multis I. B. 2. 321. Mochus sive Cicer sativum Dod. Pempt, 524. &

Ervum semine minore Tourn. I. R. H. cl. 10. S. 2. g. 9. Orobus semine minore C. B. Pin. 346. Orobus Creticus Lugd. 469.

Seruntur in agris & hortis. Semen tantummodo in usu, pro usu alimentari non nisi in fame magna adhibitum fuit, nam vomitiones movere, capiti stomachoque onerosum esse, genuaque degravare jam Plinius asseruit.

Sunt tamen qui juscula ex farina Orobi Nephriticis calculosis, cachecticis, cacochymicis pituitosisque commendant.

SEMEN CICERIS.

Est vel rubrum vel album, rubrum officinale, album culinarium. Cicer rubrum sunt Ciceris sativi C. B. P. semina rotunda angulosa, piso majora, unico angulo acuto prædita, coloris ex fusco rubentis, saporis viscosi & leguminosi.

Symbolizant cum semine orobi, ast temperatiora sunt & gratiora, provocant urinam, menses lochia & foetum. Dantur ut semina foenugræci.

℞. Sem. Cicer. q. v. coq. cum brodio vel jusculo carnis ad menses & urinam provocandam ut & ad lochia expellenda.

℞. Sem. Cicer. ʒß. stipit. fabar. cremat. Mj. rad. gramin. petrosel. ana ʒij. f. decoct. diuretic. cui add. syr. dialth. Fern.

℞. Farin. Cicer. lupin. fabar. ana ʒij. f. Catapl. in tumoribus duris leniendis.

℞. Cicer.

℞. Cicer. rubr. ʒj. flor. verbasco. Mij. coq. in ▽ colatur.
add. sevi hircin. ʒβ. f. Clyster. in tenesmo.

SEMEN

CICER forsan à κύκλω, ut SEBIZIUS loquitur, nomen accepit, circularis enim & rotunda illi figura, ἐγγύς, Richern / Zisern / Rücher, Erbs / POIS CHICHE.

Est planta flore papilionaceo, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in siliquam brevem vesicæ inflatæ æmulam, seminibusque foetam caput Arietinum quodammodo referentibus.

Cicer sativum flore candido C. B. Pin. 347. Cicer Arietinum I. B. 2. 292. & Dod. Pempt. 525. Vocatur etiam Columbinum, quod Columbæ eo alantur.

Cicer sativum flore ex purpura rubescente semine rubro C. B. Pin. 347. Dicitur etiam Venereum, quod Venerem stimulet.

Cicer sativum semine rufo C. B. Pin. 347.

Cicer sativum semine ex saturo rubente C. B. Pin. 347.

Cicer sativum semine nigro C. B. Pin. 347. Cicer Arietinum fructu nigro Mor. H. R. Bles.

Seruntur vere, Junio Julioque florent & postmodum semen in siliquis producant, citius tardiusque, pro diverso sationis tempore.

Legumen hoc rarius in culinis usurpatur, nisi quod viridia quandoque adhuc & instar fabarum præparata adhibeantur, aperiant, abstergant, discutiant. Nigrum Cicer præ cæteris urinam ciere & calculum frangere, rubrum autem ad excitandam Venerem aptius esse cum multis asserit SEBIZIUS. Decoctum Cicerum commendatur quoque ad Lienem & jecur expurgandum, Ictericis, Hydropicis atque cachecticis prodest. Lac quoque auget, & sunt, qui cicer cum lacte coctum summum analepticum esse pronunciant. Hoc habet vitii, quod flatus excitet in copia. Farina seminis Orobi in cataplasmatibus emollientibus ad testium præsertim tumores laudatur, convenit quoque contra scabiem. Dioscorides tradit, quod nonnulli in verrucarum curatione tradant, prima Luna singulis granis singulas verrucas esse tangendas, eaque grana linteo deligata post se esse abjicienda, ita eas decidere arbitantes

erantes. Huic jungendus SIMON PAULI QUADRIP. BOT. vulgus nostras, inquiens, pisces idem molitur, quæ postea verrucosi jubentur à tergo in puteum dejicere ac taciturni ab eo celerrime profugere, ne exaudiant, ut pisa fundum petant.

SEMEN LUPINI.

Sunt Lupini sativi flore albo C. B. P. semina orbicularia plana, compressa, saporis leguminosi ingrati.

Coincidunt cum orobo & ob sui amaritiam lumbricos pellunt, tum interne in decocto data, tum externe. Datur decoctum & farina.

℞. Farin. lupinor. ꝑ. amygd. amar. applica umbilico contra vermes.

℞. Sem. lupinor. ℥j. f. dec. contra vermes.

SEMEN

LUPINUS ita dictus videtur, juxta J. BAUHINUM, quod sicut Lupus terram appetit, & in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem, ut PLINIUS ait, adeo amat, ut quamvis fructuoso solo conjectum inter folia vepresque ad terram tamen radice perveniat, vel quod velut Lupus expositus impune jaceat, vel derelictus, si non protinus secuti imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua, tutus sit. *ῥέπων, ῥέπων ἡμερῶν, λυπαράριον*, Lupinen / Wicf Bohnen / Feig Bohnen / Wolff Schotten / Wolff Sackbohnen / LUPIN.

Est planta flore papilionaceo, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in siliquam seminibus foetam nunc planis nunc sphaericis; adde folia flabelliformia seu digitatim pediculo innascentia.

Lupinus sativus flore albo C. B. Pin. 347. Lupinus vulgaris semine & flore albo sativus I. B. 2. 288. Lupinus sativus Dod. Pempt. 529.

Lupinus sylvestris purpureo flore semine rotundo vario majore Bot. Monsp. App. Lupinus Sylvestris purpureo flore semine rotundo

rotundo vario I. B. 2, 290. Lupinus Sylvestris C. B. Pin. 348. Lupinus minor Tab. Icon. 494. Plures dantur adhuc species, quæ ornatus gratia coluntur in hortis, æst usualis maxime est primo loco allegata. Multum coli non vult Lupinus. Junio circiter floret, Augusto, Septembri, Octobri, semen maturefcit.

Legumen hoc in ufum cibarium recipiebatur & decoctione fuam amaritiem deponit, fed cum dyspeptum admodum & alimentum malæ notæ producat, melioraque proftent, non amplius hodie ufurpatur. Juxta SCHWENCKFELDT si in aqua decoquatur, donec in cremorem lentefcat, faciem abftergit, fcabiem & livores tollit. Farina Lupinorum cum aceto strumas ac tubercula diffipat & carbunculos rumpit. Cum pulvere Myrrhæ & melle mixta ventri calide impofita menses provocat.

SEMEN FABARUM.

Sunr Fabæ vulgaris C. B. P. femina oblonga, elata, ovalia, coloris varii, cum ciceribus conveniunt, tum ratione virtutis diureticæ, tum emollientis, ufurpantur ut cicera, proftant etiam ftipites fabarum uftulati, ut & Θ ē ftipitibus paratum.

Farina eft abfterforia, unde Cosmeticum. Exterior cortex fabarum habet vim adstrictoriam.

℞. Farin. Fabar. ℥iij. sem. Cumin. ʒß. f. Catapl. ad inflammationem fcroti & testium, add. flor. cham. Mj.

℞. Θ ftipit. fabar. gr. vij. Oc. ʒj. M. f. pulv. diureticus.

SEMEN

FABA à fructu eduli, Κίανθ, quod fecunditatem adjuvet, BOONA, Bonen/ FEVE.

Est planta flore papilionaceo, vexillo alis & carina constante ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in siliquam longam, se-

minibus foetam planis & quasi reniformibus. Addantur stipites firmi & folia bina veluti conjugata, costæ innascentia in mucronem abeunti.

Faba flore candido lituris nigris conspicuo C. B. Pin. 338. Faba Cyamos I. B. 2. 278. Faba major recentiorum Lob. Ic. 57.

Faba flore ex purpura nigrescente C. B. Pin. 338. Flos vel ex purpureo nigricat vel candidus est, sed nigris lituris, quas literas vocant lugubres, notatis.

Variat, ut C. BAUHINUS ait, flore & fructu. Sunt enim Fabæ magnæ, longæ, latæ, sunt etiam parvæ: sunt itidem pleræque veluti compressæ, quædam tamen orbiculatæ. Candicant aliæ, vel in candido pallent, visuntur vero & nigrae & rubrae, & purpureæ, viridive colore tinctæ. Fructus magnitudine figura & colore differunt. Seritur in agris Faba post hyemen, floret Majo, Julio, fructus maturescunt. Juxta MATTHIOLUM seritur à nonnullis solum ad impinguanda arva. Nam cum florere incipit totaque stirps est succulenta, terram arare solent Agricola, ita ut Faba in illam quasi defodiatur & contabescat. Tabida facta planeque consumpta latissimum pinguiissimumque agrum reddit.

De Fabis agentes disputant, an Fabæ hodiernæ convenient cum Bonis veterum, & quam ob rationem PYTHAGORAS Fabarum esum interdixerit. Priorem quæstionem decedit cum aliis affirmative SEBIZIUS, alterius causam quidam esse dicunt, vel quod somnia turbulenta excitent Fabæ, vel quod animas mortuorum in iis habitare creditum fuerit, quidam vero PYTHAGORAM per *κνέμους*, non Fabas sed generationis organa intellexisse, adeoque abstinentiam à Venere injunxisse aasserunt. Nonnulli plures alias examinant quæstiunculas & proverbia à Fabis desumpta, quibus nunc superse-
demus, conferatur laudatissimus SEBIZIUS, qui de usu Fabarum cibario ita porro loquitur. Virides gratiam in mensis habent majorem. Aride enim æstivo tempore à gulæ proceribus expectuntur. Arida destinantur saginæ porcorum, unde & Fabæ dicuntur Suillæ Gau. Bohnen. Offeruntur tamen etiam tenuioris fortunæ hominibus, variis modis præparatæ. Virides Fabas delibrant, delibratas in butyro frigunt, tum porrum sectile vel cepas petroselinum, saturejam, piper & quandoque lac, vel jusculum addunt, tandem denuo, dum prorsus tenerescant aliquandiu coquunt. Edu-
lium

lium sapidum magis est & gulæ placens, quam valetudini conducens. Coquuntur quoque cum frustis lardi, rediguntur in pulmentum instar pisorum addendo convenientia aromata.

Fabæ flatus pariunt, insomnia turbulenta causantur, caput gravant, visum debilitant, ingenium gravant, nec laudabile admodum præbent nutrimentum. Conveniunt tantummodo ventriculo valido præditi, corpusque labore exagitantibus. Fabas siccas, antequam in usum trahantur, quidam leviter mola confringunt, & dicuntur à Plinio Fabæ fressæ.

Fabis crudis præmansis maculæ faciei præsertim à variolis relictæ tolli dicuntur, si iis vesperi ante lecti introitum facies illinatur, mane vero iterum abluatur vel frigida, vel ipsarum fabarum aqua. Vapor fabarum coctarum auribus exceptus in auditus difficultate laudatur. Farina fabarum non solum inservit pani tempore annonæ exinde conficiendo, sed & maculas cutis imprimis à sole contractas abstergit nitoremque ei conciliat, ad diarrhœam hæmoptysin aliosque fluxus adhibetur, insuper usurpatur ad tumores inflationes & inflammationes pudendarum in primis partium genitalium, ut & mammarum.

Cineres stipitum Fabarum, Bohnen, Strohasch / Cendres de Feves ut & Sal stipitum fabarum, Bohnenstroh = Salt / Sel de tiges de Feves, tanquam remedium diureticum, in asthmate, hydrope, urina suppressa, calculo &c. extollitur. Ex priori fit cum aqua vel cum vino lixivium, posterius per se datur ad ʒß. ʒj. &c. Præter modo allegata

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua florum fabarum, Bohnenblüth = Wasser / Eau de fleurs de Feves, quæ tanquam diuretica & ophthalmica celebratur non tantum, sed imprimis tanquam insignis cosmetica ad maculas cutis delendas & cutis nitorem conservandum dicatur.

SEMEN LINI.

Sunt Lini sativi C. B. P. semina oblongo-rotunda compressa, lubrica lucida, in medio tumida, ex fusco punicea.

Hhh 3

Est

Est planta multicapularis non leguminosa.

Ex mucagine farina & oleo constructa sunt, unde leniunt, molliunt & suppurant.

Oleum recenter expressum per os sumtum specificum est in Pleuritide & tussi pro juvanda expectoratione, per clysteres injectum in fœcibus alvi induratis, à quibus colica & iliaca passio oritur. Oleum lini cum terra japonica & sigillata exhibitum in dysenteria arcanum. Externe applicatum valet ad ambusta & dolores hæmorrhoidum. Oleum lini cum Ψa destillatum mire medetur Paralyfi.

Mucago & farina applicantur tumoribus emolliendis & abscessibus maturandis.

Decoctum seminis vim habet singularem ad foetum mortuum expellendum [conf. Dav. Herlicius de cura gravidar. c. xi. p, 57. & ex eo Sim. Pauli Quadr. Bot. p. m. 77.]

Datur mucago & oleum.

℞. ∞ lini rec. expr. ℥iij. amygd. dulc. 3j. cape ex jusculo ad pleuritidem.

℞. ∞ lini ℥iij. dent. apri præpar. 3j. cape ex ∇ chærefol. calide ad pleuritidem.

℞. ∞ lini ℥viij. infund. troch. alhand. 3℔. f. clyster. injiciendus ad fœces emolliendas.

℞. ∞ lini, rapar. ana ℥iiij. f. Clyster. ad iliacam passionem.

SEMEN

LINUM, λίνον & λιναρίον à mollitie & lævitate, Flachß / Glasß / Lein / Lien / LIN.

Est planta flore caryophyllæo, plurimis petalis constante in orbem positis, ex calyce polyphylo & quasi tubulato emergentibus. Pistillum autem ex eodem calyce surgit, abique deinde in fructum fere globosum, plerumque acuminatum, ex pluribus capsulis

capsulis compositum, introrsum dehiscentibus, semine foetis plano fere ovato hinc obtuso, inde vero ut plurimum acuto.

Linum sativum C. B. Pin. 214. Linum I. B. 3. 450. Linum sativum vulgare caruleum Lob. Ic. 412.

Seritur Linum Vere, Majo & Junio floret. Colligitur Linum (verba sunt JOH. BAUHINI) cum maturo colore flavescit, & eodem die ne rore tangatur, sub tecto ponitur in fascibus, deinde malleolis ligneis excutiuntur semina & ipsum Linum ad maturandum in aqua ponitur, in qua quatuor vel quinque diebus si putrida sit, stetisse sufficit, si autem aqua non sit corrupta septem dies stare in eadem oportet, ut putrefiat caro herbalis & cortex, ex quo fit stuppa, cujus præparandi modum optime ex rusticis addisces. Quantum usum œconomicum habeat, in suppeditandis filis linteaminibus, charta &c. Linum, omnibus est notissimum. In usum Medicum præsertim cedit semen, *Lein-Saat / Lein-Saamen / SEMENCE DE LIN*, quod vel per se vel in decocto erosiones ventriculi à Cantharidibus factas, ut & mictum cruentum corrigit, & pro earum antidoto habetur. Recens comestum cum passulis minoribus commendatur phthificis, cum melle vero assumptum respirationem liberam reddit, pulmones detergit, & ad asthma raucedinem & tussim laudatur. Semen quoque hoc virtute foetum & secundinas pellendi pollet, si vel ejus decoctum potetur vel in partes genitales infundatur, vel in balneis adhibeatur, unde gravidis neque interne neque externe debet adhiberi. Mucilago seminis Lini ad affectus oris, ad ambusta, ad dolores podagricos & ad hæmorrhoides dolentes celebratur. Cum aceto fronti impositum hæmorrhagiæ narium obviam it, & dolores quosvis compescit atque scrophulas discutit.

Oleum Lini, Lein-Dehl / Huile de Lin; præter virtutes allegatas, vi quoque gaudet anodyna, convulsionem articulorum curat, musculorum, nervorum atque cervicis duritiem mitigat, prodest ad pterygium seu unguem oculorum. Abdomini illitum lochia remorantia & secundinas pellit, auribus immixtum vermes necat. Imprimis in pleuritide lateri dolenti illinitur vel per se, vel in eo friguntur poma nostratibus dicta *die Francken-Aepffel* / vel recentia, vel quod melius putant semiputrida, & cataplasmatibus instar applicantur. Veterinarii hoc oleo utuntur in canibus & equis

equis ad pilos adaugendos. Quod si hoc oleum inveteratum sit & rancidum, quale pro usu interno plane non convenit, sequenti modo corrigi potest. \mathcal{R} . Olei Lini, Aquæ tepidæ ana seu partes æquales, concute bene invicem, quantum possibile est, ut commisceantur, postmodum expone Soli, relinquendo ibidem per tempus, & semper quod in fundo est removendo, idque tamdiu continuatur, donec oleum Lini optime sit depuratum. Poterit etiam quis hoc modo procedere: Oleum Lini cum Spiritu Vini coquatur, donec spiritus fuerit consumptus, hoc enim modo Spiritus Vini acidum in oleo Lini existens secum aufert, aut potius mitigat.

Inservit porro oleum Lini variis artificibus, Pictoribus, fabris Scriniariis &c. Residuum seminis post expressionem olei, si decoquatur in aqua pluviali, vel tantummodo in eadem mace-retur, & facies ea aqua aliquoties abluatur, cutis nitida redditur, rugæque quadantenus obliterantur. Confert quoque talis aqua scabiosis.

Sunt qui decoctum Lini recentis cum radice in vino factum, & calide potum, præstantissimum dicunt esse remedium ad diuturnam urinæ suppressionem. Denique illud notandum, quod oleum ex Lino aut Linteaminibus vel charta combustis productum, ad odontalgiam & maculas cutis præsertim Lichenes delendas conducatur.

SEMEN HYPERICI.

Sunt Hyperici vulgaris C. B. P. semina exigua, oblonga ex fusco nigricantia, saporis subamari & resinosi, odoris picei. Planta est tricapsularis polysperma.

Ob resinam cui Θ blandum diureticum conjunctum convenit in calculo, ut & in vulneribus tam internis quam externis. Specificè laudatur in mania, melancholia, delirio atque in vermibus, unde si herbam inspergis caseo, omnes vermes exiliunt.

Datur substantia, essentia seu tinctura \odot dlat. decoct. & balsam. \mathcal{R} . Sem.

℞. Sem. hyperic. 3j. sacch. q. f. f. conserv. l. a. contra nephritidem.

℞. Sem. hyperic 3j. conserv. rosar. fl. malv. ana 3j. f. bolus diuret.

℞. Sem. hyperic. 3j. conserv. fl. nymph 3ij. f. bolus contra maniam & deliria.

℞. Sem. hyperic. affund. — vin. q. v. f. tinctura Vulneraria, vel affund. ∞ thereb. — uos. l. Balf. ʒis & fac balsamum vulnerarium.

Quidam ad vulnera consolidanda & cicatrifanda capiebat Hyperic. recent. Mij. affundebat vinum, idem vinum bis vel ter seminibus affundebat, & sic destillabat, usque dum — us vini prodiens per alembicum totus resinofus apparebat, hoc penicilla tingeat & vulneribus applicabat.

SEMI.

Υπερίκον, PERFORATA, MILLEFORA, quod folia obversa foli innumeris fere poris acu quasi trajectis aciem tum nostram, tum Solis transmittant radios. FUGA DÆMONUM, quoniam spectra & dæmones fugare superstitiosi credunt, juxta versiculos istos,

Dost / Harthau und Wesse, Heidt
Thut dem Teuffel viel leid.

HERBA ST. JOHANNIS, à tempore, quo reperitur, Johannes Krauth / Harthau / Wald, Hopff / Teuffels • Glucht / MILLE PERTUIS.

Est planta flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce polyphylo surgit pistillum, quod abit in fructum plerumque trigonum, & tricuspide, tricapsularem, seminibusque fœtum ut plurimum exiguis. Addantur folia bina è regione in caulis geniculis nascentia.

Hypericum vulgare C. B. Pin. 279. Hypericum vulgare sive per-

perforata caule rotundo foliis glabris I. B. 3. 381. *Hypericum* Dod. Pempt. 76.

Planta est ubique vulgatissima & usu tritissima, margines sat-
rum areas desitas & ruinosas sectans etiamque latiora loca floret
æstate. In usu ex *Hyperico*, quod manibus confectum thuris odo-
rem refert, sunt folia flores & semen. Duo priora constituunt re-
medium vulnerarium insigne. Conducit in vulneribus tum exter-
nis, glutinat vulnera, medetur ruptis, convulsis, contusis,ambu-
stis, aperit præterea, attenuat, sanguinem coagulatum resolvit,
putredinique resistit. Usurpatur in calculo, urina & mensibus ci-
endis. Roborat porro systema nervosum, vertiginem abigit, Me-
lancholicos juvat, unde forsitan, quoniam Melancholia balneum
Diaboli dicitur, vis ista Dæmonifuga derivata fuit, quæ tamen
virtus æque vera videtur ac altera, qua non solummodo incanta-
menta & fascinationes arcere, sed & tempestates præcavere toni-
truaque ac fulmina pellerè superstitiose satis creditum fuit. Recen-
setur quoque *Hypericum* inter alexipharmaca pestis. Commen-
datur insuper ad fluxus alvi, item fluxus sanguineos hæmoptysin,
mictum cruentum, febres imprimis quartanam &c. Suffitus Hy-
perici celebratur ad accelerandum partum. Virtutes anthelmin-
ticæ *Hyperici* tum externe, tum interne usurpati magni quoque
fiunt. Herba devorata, ut SCHWENCKFELDT dicit haustaque,
tum vulnere illita venenosorum moribus resistit. Miscetur in fessi-
bus & decoctis ad articulorum & uteri affectus.

Semen quoque in fluxibus sanguineis deprædicatur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Hyperici ex foliis & floribus destillata, *Johannes-
Krauthwasser* / *Eau de Millepertuis* ou d'*Hypericum*, contra sangui-
nem congrumatum vulnera & ulcera externa & interna prodest, va-
let quoque contra spasmus, nervos roborat, caputque con-
fortat.

Oleum Hyperici, *JohannesKrauth-Dehl* / *Huile de Millepertuis*
ou d'*Hypericum*, per infusionem florum in oleo communi paratum.
Egregium est vulnerarium & anodynum, in doloribus articulo-
rum, in affectibus nervorum & contusionibus luxationibusque
in colica & verminatione infantum conducens.

Balsamum Magicum Pforzheimensium, Zauberbalsam / Beume de Pfortzheim. Vires hujus Balsami cujus principale fere ingrediens est Hypericum, prædicantur insignes ad incantamenta; præterea pellit calculum necat vermes, curat hæmoptysin ac doloribus colicis arthriticis & nervinis medetur, interne & externe

Tinctura Hyperici, Johanneskrauth-Tinctur / Teinture de Mil-lepertuis. Convenit in maniacis melancholicis in affectibus nephriticis in vulneribus & ulceribus &c. Dosis est ad drachmam semis & ultra.

℞. Sem. Hyperici in umbra exsiccati ℥iij. Conserv. ros. rubr. ℥bj. Julep. rosac. q. S. Msc. f. elect. quod ad ℥ss. per tempus assumptum à calculo arenulisque præservare & liberare dicitur.

SEMINA MUCAGINE VOLATILI PRÆDITA.

SEMEN HYOSCYAMI.

Sunt Hyoscyami albi majoris C. B. P. semina exigua rotunda, compressa, ex cinereo spadicea, saporis aliquantum viscosi, odoris narcotici & ingrati. Semen tostum ad Δem omni virtute anodyna expers est, unde probatur in volatilitate illam consistere.

Horum oleum crassum quod per expressionem elicitur, includit quoque volatilem quandam mucaginem —us involventem eorumque ferociam sistentem velut opium, unde inter anodyna & hypnotica refertur.

Suffitus tetri odoris est & vermibus exosus, si dentibus cavis & auribus excipiatur elicit vermes. Cave tamen ne nimis utaris suffitu vel seminibus ipsis nam stuporem & amentiam inducunt.

℞. Sem. hyosc. 3j. infund. vin hispan. relinq. per 24. horas, cape hora j. ante decubitum, ad somnum conciliandum.

℞. Sem. hyosc. ʒj. conserv. fl. violar. vel pap. rh. ʒj. f. bolus ad sputum sanguinis.

℞. Sem. hyosc. papav. ana ʒʒ. Coriandr. ʒj. thur. gr. ij. mastich. gr. iiij. hirund. præpar. ʒʒ. sacch. ʒiiij. f. pulv. ad sput. sanguinis dos. ad ʒj.

℞. hyosc. expr. ʒʒ. extract. verben. ʒj. f. liniment. ad cephalalgiam.

℞. ℞. hyosc. gt. vij. nucl. persic. ungt. alabastr. ʒj. f. linim. ad leniendos dolores capitis.

℞. ℞. hyosc. inunge inguina & lumbos ad gonorrhæam & mensium nimium fluxum, inunge tempora ad compe-
scendum sanguinem.

SE-

SEMEN HYOSCYAMI Ὡσκούριον ab ὤς sus & κύριον fa-
ba, JUSQUIAMUS, FABA SUILLA vel PORCINA, quibus
lethalis existit, HERBA CANICULARIS, DENS CABAL-
LINUS, HERBA APOLLINARIS, Bilsen-Krauth / Toll oder
Schlaff-Krauth ab effectu, Sau-Krauth / Sau-Bohn // Zigel-
ner-Krauth / Kind-Wurzel / Naase-Krauth / JUSQUIAME,
HANNEBANE.

Est planta flore monopetalo, infundibuliformi & multifido,
ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum in ipso calyce
reconditum, ollæ similem operculo instructum, in duo loculamenta
divisum septo intermedio, cui adhærescunt plurima semina.

Hyoscyamus vulgaris vel niger. C. B. Pin. 169. Hyoscyamus
vulgaris I. B. 3. 627. Hyoscyamus niger Dod. Pempt. 450.
Jusquiamе noir &

Hyoscyamus albus major vel tertius Dioscoridis & quartus Pli-
nii C. B. Pin. 169. Hyoscyamus albus I. B. 3. 627. & Dod. Pempt.
451.

Niger crescit incultus secus vias, & in locis sabulosis ubi-
que fere gignitur, floret Junio & Julio, Augusto & Septembri se-
men obtinetur. Albus apud nos colitur in hortis. Distinguuntur
autem

autem potissimum ratione floris & imprimis seminis. Albus Hyoscyamus præfertur nigro, qui ob virulentiam quadantenus suspectus videtur. In usum autem venit radix folia & semen. Radix Julio collecta & collo appensa pro amuleto in Epilepsia venditur. Hyoscyamus emollit, somnum ciet, stupefacitque. Folia ob vim anodynam in scorbuto laudantur. Cataplasma exinde cum lacte præsertim paratum ad dolores Ventriculi scorbuticos conducit. Prodest quoque ad alios dolores atque tumores, etiam ad podagricos ex mente quorundam. Succus Hyoscyami cum gummi ammoniaco commixtus & dentibus illitus sponte & absque dolore dentes cadere facit, ut ajunt. Idem succus partibus inunctus pilos demit; atque non permittit ut renascantur, parietibus porro conclavium illitus cimices abigit, sicut & suffitus Hyoscyami glires necare creditur. Sunt, qui Hyoscyamum ad incantationes prodesse, præprimis si toto corpore excipiatur fumus, persuadere volunt. In exhibitione seminis contra hæmoptysin caute mercandum.

IN OFFICINIS ASSERVANTUR

Oleum Hyoscyami ex semine imprimis albo, expressum, außgeprestes Bilsensaamen = Dehl / Huile de Jusquiame tirée de la Semence par expression. Anodynum est, somnum conciliat, ad odontalgiam, dolores scorbuticos, cephalalgiam scorbuticam &c. laudatur. &

Emplastrum de Hyoscyamo Ludovici, Bilsen = Krauth = Pflaster / Emplatre de Jusquiame. insigniter resolvit & simul dolores quoque mitigat. Ab autore omnibus solventibus & spleneticis, imo ipsi Emplastro de Cicuta præfertur. Huic ultimo Emplastro etiam haud raro jungitur.

Noxæ à semine Hyoscyami illatæ vel haustu lactis aut mulsæ, vel assumptione seminis urticæ, sinapi cepearum atque allii &c. tolluntur.

SEMEN PÆONIÆ.

Sunt Pæoniæ folio nigricante splendido maris C. B. P. semina seu grana oblongo rotunda, nigra, lucida, sub cortice

tice crassiusculo membranaceo includentia pulpam albam saporis subdulcis, odoris nullius.

Emulsiones Epilepticæ cum aquis appropriatis nonnullis inde parantur.

Colligi debent juxta quosdam, ita ut manibus non contrectentur, cum instrumento aureo in vas aureum. Sicuti de radice ita & de semine multa superstitiosa finguntur. Adhibentur in variolis & morbillis; puerorum pavoribus & terroribus nocturnis, qui prodromi solent esse Epilepsiæ; In Incubo specificum quoque esse dicuntur. Laudantur etiam interne ad loquelam amissam & hepar nimis magnum imminuendum. Externe quoque collo & brachiis ad eundem scopum à mulierculis appenduntur. Ob oleositatem, virtute quadam anodyna, aliquid præstare possunt. Dubium autem maxime adhuc est an tantas mereatur laudes.

SEMEN PAPAVERIS.

Sunt papaveris hortensis semine albo seu fativi C. B. P. femina minuta rotunda, rugosa, candicantia, saporis subdulcis. Nigri sunt ejusdem descriptionis.

Utrumque opii succedaneum est, constans oleo crasso cum mucagine — uum motum compefcente, acria quævis mulcente, sanguinis fermentationem compefcit, hinc tanquam anodynum, hypnoticum & lenitivum in catarrhis à lymphâ acri, in tussi, raucedine, hæmoptisi, cephalalgia convenit.

Dantur substantia, emulsio, syrupus & ☉ expressum tam interne quam externe.

℞. Sem. papav. alb. ʒij. ▽ pap. rhœad. q. s. f. Emuls. cui adde syr. scabios. q. s. ad tussim & lympham acrem.

℞. Sem. papav. alb. ʒij. decoct. hord. cum liquirit. fact. q. s. f. Emuls. ℞. ☉

℞. ꝑꝑav. expr. ʒj. ꝑꝑ N. M. expr. ʒß. opii g. v. f. liniment. temporibus applicandum.

℞. ꝑꝑav. expr. ʒj. ꝑꝑ nucl. persic. ʒiß ꝑꝑ hyosc. aneth. ana ʒj. ceræ q. s. vel potius ꝑꝑ N. M. express. q. s. f. f. unguentum anodynum & hypnoticum.

S E.

PAPAYER ita dictum à pappapultis specie, cui papaver olim immiscebatur, *μύκων ἀπὸ τοῦ μὴ κνέειν*, à non ministrando, eo quod vescentes muniis suis fungi nequeant. Mag. Samen / Mohn / Mohn, Saat / Mohn, Saamen / Dehl = Magen / PAVOT.

Est planta flore rosaceo, quatuor plerumque petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce bifolio surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu testam ovatam vel oblongam, capitello ornatam, sub quo in quibusdam speciebus series spiraculorum in circuitu aperitur in fructus cavitatem, variis per longitudinem foliis munitam seu lamellis, quibus tanquam placentis adhærent semina rotunda ut plurimum & minutissima.

Papaver hortense, semine albo sativum Dioscoridis, album Plinio C. B. Pin. 170. Papaver album L. B. 3. 390. Papaver album sativum Lob. Icon. 272. Weisser Mag. Saamen / PAVOT BLANC.

Papaver hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170. Papaver nigrum sativum Dod. Pempt. 445. Schwarzer Mag. Saamen / PAVOT NOIR.

Plures dantur adhuc species, sed hæ, quarum differentia in feminis colore consistit, quam maxime sunt usuales. Coluntur in hortis imo in ipsis arvis; florent æstate.

In usu flores atque semen tum album tum nigrum, tum & capita cum vel sine semine. Tota planta scatet lacte, succo nonnihil pingui & oleoso. Laudatur in deliriis, diarrhœis, dysenteriis, &c. motus elasticos sistit, confert in febribus. Sunt qui vim narcoticam in codiis seu capitibus potissimum consistere, minus in seminibus, autumant. Olim semen tanquam condimentum usur-

usurpabatur. Incrustatur quoque saccharo & inter bellaria à quibusdam adhibetur. Capita papaveris à mulierculis decoquuntur, & decoctum infantibus, qui vigiliis nimis & torminibus vexantur, exhibetur. Prostant autem exempla funesti exinde inducti somni. In pediluviiis ut & frontalibus alias pro sistenda Cephalalgia & somno leni inducendo adhibentur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Syrupus Papaveris albi, Weiß Magsaamen-Syrup / Syrop de Pavot blanc; quemadmodum quælibet ex papavere parata virtute anodyna pollent, & blandum conciliant somnum, ita quoque Syrupus his viribus instructus est; commendatur in catarrhis tenuibus & acribus, tussi aliisque pectoris affectibus. Conducit in colica diarrhoeis, dysenteriis &c. Datur ad unciam unam.

Syrupus Diacodii pectoralis, sive Diacodium liquidum, de quo jam sub siliqua dulci dictum.

Diacodium solidum. Magsaamen-Täffelein / Tablettes de Pavot blanc. Conducunt in tussi ab acredine orta &c. ubi in ore liquantur & successive deglutiuntur, demulcent & irritationem sistunt.

Oleum papaveris albi, Weiß Magsaamen-Dehl / Huile de Pavot blanc. Anodynum est. Adhibetur externe ad ardorem febrilem mitigandum, somnum conciliandum & capitis dolores tollendos, fronti & temporibus inungitur.

Oleum tum ex albo tum ex nigro semine expressum, non solum ad lampades usurpatur, sed & multis è plebe gratum præbet edulium, præsertim in acetariis.

SEMINA TERREIS CONSTANTIA.

GALLÆ.

Gallæ & glandes cum cortice & foliis quercus conveniunt. Cæterum in glandibus est vis alimentosa, unde tempore annonæ caritatis vices alimentorum supplent, in gallis vero major vis adstrictoria cum austeritate. ℞. Rad.

℞. Rad. torment. bistort. ana ʒj. sem. papav. alb. ʒij. coq. in ∇ colatur. add. gall. ʒij. f. gargarism. ad gingivas cruentas.

℞. Gallar. malicor. ana ʒj. fol. salv. laur. chamom. summit. aneth. flor. balauft. ana p. ij. coq. in vino & ∇ chalybeata, applica pro fotu ad procidentiam ani ex sphinctere resoluta.

Βάλανοι τῆς δρυὸς, Eichen/ GLANDS. Glandes, ut JOHANNES BAUHINUS inquit, in calycibus suis seu cupulis sessiles vel surculo proxime adhærent, & longis tenuibusque pediculis appenduntur; atque etsi magnitudine varient, unciam tamen communiter longæ sunt, corticosa membrana tectæ punicea, nucleo calloso acerbo & austero, quemadmodum & cupula exterius asperiuscula, interius lævis, prædicto cortice multo densior, vix tertiam glandis partem capiens.

Glandes olim fuere victus, hodie non amplius, cum frugibus inventis glandes edere insipientis sit.

Pulverem glandium siccatarum etiam nonnulli interne ad alvi fluxus varios, mictum cruentum, & fluorem album, suadent, æque ac *Capulas* seu *Cupulas*, die Eichen. Köpfflein / oder Eichen-Hütlein / Eichen-Häuslein / *Ecorce ou Calyce de glands*, *Calotes de glands*; laudantur quoque in urina calculoque pellendo, ut & ad stranguriam curandam. Cautè autem utique mercandum.

Cupulæ quandoque adhuc usurpantur in fonticulis excitandis, supponendo illis cauterium, ne serpat ulterius.

Sæpe glandibus pinguescere & duram solidamque carnem exinde obtinere res est notissima.

GALLÆ, Gall. Aepffel / GALLES ou NOIX DE GALLES. In regionibus præsertim calidioribus quercubus adnascuntur & præsertim sequentibus speciebus, quæ vocantur

Quercus Gallam exiguae nucis magnitudine ferens C. B. Pin. 420. Robur iij. Clus. Hist. 18.

Quercus foliis muricatis non lanuginosis Galla superiori simili C. B. Pin. 420. Robur iiij. Clus. Hist. 18.

Quercus foliis muricatis minor C. B. Pin. 420. Robur. v. Clus. Hist. 19. &c.

De Gallarum natura insignis authorum est differentia, sunt qui pro fructu sed male habent, sunt qui pro excremento venditant. Et certe Illustris MALPIGHIUS haud male judicat, gallas esse excrescentias morbosas, à puncturis insectorum præsertim muscarum ova deponentium ortas. Nidus quippe sunt ejecti illuc ovi vel vermiculi è parente animali, nequaquam vero a planta ortus. Dum namque futuri surculi alimonia circa ovum vel plura etiam affunditur, & utriculorum ordines surculum composituri immutata via circa ovum contorquentur, Galla fit. Hinc recte à LANGIO definiuntur, quod sint quercus tubercula excrementitia, rotunda, (seu morbosæ excrescentiæ in superficie inæqualitatibus pluribus ornata) admodum lævia, ut plurimum foramine pertusa, intus fungosa, saporis acerbi admodum adstringentis, nata è compage folii vel rami turbata, ob vitiatum humorum nutritionum motum, quem excitant ovula muscarum pullitiesque inde orta, quæ veluti in utero intra hos folliculos foventur, donec manifestis firmatisque partibus, novum exoptantes aerem, vias sibi parant, exitumque ex hoc ergastulo quærunt. Hinc Gallæ sæpe sæpius & ut plurimum perforatæ reperiuntur. Plures equidem Gallarum sunt differentiæ, sed potissimum quæ in usum veniunt dividuntur in Turcicas & vulgares. Illæ Aleppo, Tripoli, Smirna &c. ad nos allatæ minores sunt nigrioresque, verrucisque pluribus oblitæ, hæ quæ ex Gallia &c. asportantur majores sunt magisque albicantes. Gallæ interne in usum non trahuntur, externe autem in ulceribus quoque putridis usurpantur. Laudatur pro hoc scopo decoctum nigrum MYSICHTI, in armamentario descriptum, quod etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas curare dicitur.

Communiter Gallæ ad atramentum conficiendum adhibentur.

℞. Gallar. ℥iij. Oli ℥ij. Gummi Arab. ℥j. affunde aquam, vinum vel Cerevisiam.

Optimum atramentum admodum nigrum corruptioni non obnoxium describitur ab Euthio in Eph. N. C. hoc modo.

℞. Aceti ℔j, Aqu. pluvial. ℥xiiij. ebullitis adde ℞l. calcinat. ℔ss.

℞. stent per 24. horas deinde adde Gall. ℞j. ꝑiv. Gumm. Arab. ℥j. agitentur sæpius.

Ob hanc rationem Tinctoribus quoque multum inserviunt.

Curiosum est, quod de Gallis quidam prælagium circumferunt. Perhibent nempe, quod si vermis in medio Gallæ situs sit, futuram hyemem asperiores designet, levem autem si circa margines. Porro dicunt illas quotannis annonæ fertilitatem aut sterilitatem aut pestilentem auram prælagire. Si scilicet è perforata evolet musca futuri belli, si prorepat vermiculus, annonæ penuriam, si currat araneus pestilentium morborum omen adesse volunt.

Plures adhuc alias excrescentias habet quercus, pilulas, uvas quercinas &c. verum quoniam non multum in usum trahuntur, ideo non opus est verba de iis facere.

SEMEN SUMACH.

Rhus folio Ulmi C. B. P. sunt baccae seu grana orbiculata, villosa, parva, rubentia seu coccinea, includentia nucleum seu semen orbiculatum spadiceum, saporis adstringentis & terrestris.

Terreis & acido-austeris constant, hinc conveniunt in fluxu alvi, uteri, seminis, sanguinisque ob vim summe adstringentem. Pro sunt etiam in procidentia ani, dum firman sphincterem, conveniunt etiam in dentium vacillatione, laudantur singulariter ad præcavendos oculos à variolis & morbillis.

Datur substantia, decoctum.

℞. Sumach. ℥j. cape ex ∇ plantag. ad fluxum alvi.

℞. Cort. granator. ℥iiij. sumach. ℥ij. Mastich. ℥j. coq. in vino rubro ad procidentiam ani.

℞. Sumach. ℥j. infund. c. ∇ foenicul. ad præservandos oculos à variolis & morbillis.

Rhus, ῥῆς, quod fluxus sistat, ῥῆς ἐνθρὸς à semine rubente, **RHOE** ῥόϙ, **Rhus CULINARIA**, **Rhus CULINARIUM**, quod olim inter obsonia referebatur, **Rhus OBSONIORUM**, **Rhus CORIARIORUM**, ῥῆς βυρσοδεψικῆ, quia Coriarii ad desiccandum & adstringendum coria utuntur hoc frutice **RHOE SUTORIA**, **CORIORUM** enim infectoribus inservit, **SUMACH**, **Gerber-Baum** / **Järber-Baum** / **Schling-Baum** / **SUMAC**.

Est arbuscula flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in capsulam subrotundam, quasi reniformem semine foetam ejusdem formæ.

Rhus folio ulmi C. B. Pin. 414. **Rhus sive Sumach**. I. B. I. 555. **Rhus Coriaria** Dod Pempt. 779.

In regionibus calidioribus, Italia, Hispania, Gallia Narbonensi, Provincia &c. provenit. Colitur in hortis. Fructus Autumno maturescit.

Olim semen ferculis inspergebatur, hodie ex culinis exulat. Decoctum foliorum capillos denigrare fertur. **Gummi Sumach** ad odontalgiam celebratur.

MESPILUM.

Immaturum ob austerum terreum potenter adstringit in quovis alvi fluxu, vomitu, diarrhæa, dysenteria. Matura facile fermentescunt, & ventriculo debili & intestinis nocent.

℞. **Mespil** immatur. crud. utere frequenter ad fluxus alvi, vel coque cum ▽ contra fluxus alvi.

NUX

Μέσπιλ ϙ, μεσπίλη, ἐπιμηλὶς, **Mespel-Baum** / **Mespel-Baum** / **NEFLIER**.

Est arbor flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, cujus calyx foliatus abit in fructum fere globosum, coronatum, mollem unicapularem officula condentem nucleo foeta oblongo.

Mespilus

Mespilus Germanica folio Laurino non serrato, sive Mespi-
lus sylvestris C. B. Pin. 453. Mespilus vulgaris L. B. 1. 69. Mespi-
lus Dod. 801. &

Mespilus folio Laurino major C. B. Pin. 453. Mespilus do-
mestica Lob. Ic. 166.

Illa Colitur in hortis, hæc sponte provenit, & malum agre-
stem plerumque habet vicinam. Floret Mespilus Aprili & Majo :
fructus seu poma μέσπιλα, MESPILA Mesplen / Mesplen dicuntur,
& quinque officula raro plura aut pauciora continent, Autumno
maturescunt.

Immatura Mespila prædura, ut SEBIZIUS loquitur, sunt,
valdeque acerba; quocirca esui inepta. Paleis instrata mollia mi-
tiaque evadunt, quod fit mense Octobri.

In pica gravidarum conducere dicuntur, ut & ebrietatem arcere,
Urinam quoque ciere feruntur. Imprimis autem officulis seu la-
pillis aut acinis virtus Lithonriptica adscribitur. Foliis Mespili
tribuitur quoque vis adstringens. Usurpantur in Gargarismis, Bal-
neis uterinis &c. Lignum appensum contra abortum, hæmor-
rhagiam mictionemque cruentam celebratur.

Quidam Mespila dura atque acerba melle cinamomo & caryo-
phyllis condiunt, & pro remedio confortante tonicoque usur-
pant.

NUX CUPRESSI.

Terreis adstringentibus cum pauca resina gaudet, & of-
ficium adstringendi cum blanda vi anodyna absolvit.

℞. Nuc. cupress. n. vij. fol. ebul Miiij. Cort. aurant Mac.
Cinam. rad. Zedoar. galang. destilla ex cerevisia Brunsvi-
censi vel alia generosa, cape ad crebrum vomitum ex cra-
pula.

BAC-

Κυπάρισσος, CYPARISSUS, à Cyparo in hanc arborem mu-
tato

K k k 3

tato, ut fabulæ ferunt, CUPRESSUS, Cypresen-Baum / CYPRESS.

Est arbor flore amentaceo, plurimis nempe foliolis seu squamis constante, sed sterili; in earum alis adsunt apices pulverem tenuissimum effundentes. Embryo autem ab infructum subrotundum, in plures veluti clavos dehiscensem, seminibusque foetum plerumque angulatis.

Cupressus meta in fastigium convoluta quæ fœmina Plinii Tourn. l. R. H. cl. 19. S. 3. g. 5. Cupressus Dod. Pempt. 856. Cypres femelle. &

Cupressus Ramos extra se spargens, quæ mas Plinii Tourn. l. c. Cuprêssus Matth. 119. Cyprès Mâle.

In Insula Creta sive Candiâ in copia proveniunt. In Italia frequens est. Colitur multum in hortis ornatus gratia. Perpetuo viret, funebris arbor olim habebatur, unde funesta, moesta, funerea, atra, feralis, invisa arbor audit.

Lignum odore non admodum ingrato fragrans, diu absque corruptione perdurat, Tineis adversatur, & calefactum in gravitate auditus & surditate commendatur. Folia, quæ tamen raro usurpantur, cum fructibus symbolizant. Hi autem CONI, NUCES, PILULÆ, GLOBULI GALBULI, GALBULÆ, Cypress-Nußlein / Noix de Cyprès appellantur. Commendantur ut in aliis fluxibus ita & in incontinentia urinæ & herniis tum interne tum externe. Juxta EUSTACHIUM RUDIIUM pulvis harum nucum ad polypum est præstantissimus.

BACCÆ MYRTI.

In specie stomachi fibras roborant, hinc quibusdam stomachicæ audiunt, laudantur in gingivarum laxitate, præcipue scorbutica, junctis specificis.

℞. Bacc. Myrt. ℥ij. nuc. cupress. ℥i℥. coq. in ▽ f. apoz. add. syr. menth. q. s. ad ventriculum debilitatum.

MYRTUS, MURTUS, *Μυρσίνη*, *μυρτίλη*, à Myrsine Atheniensi puella in hanc arbusculam mutata, nominatur. Aliis sic dicitur propter æmulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, quæ in ejus baccis recentioribus observatur. *Myrten / Myrten-Baum / Myrrhen / MIRTE, MYRTE, MEURTE.*

Est arbuscula flore rosaceo plurimis petalis in orbem positis constante, cujus calyx abit in baccam olivæformem, coronatam, in tria loculamenta divisam, seminibusque foetam ut plurimum reniformibus.

Myrtus communis Italica C. B. Pin. 468. Myrtus vulgaris sylvestris I. B. I. 510. & Camer Hort. &

Myrtus minor vulgaris C. B. Pin. 469. & Lob. Icon. 127. Myrtus Tarentina Clus. Hist. 67. & I. B. I. 512.

Coluntur hæ aliæque species in hortis decoris & deliciarum causa. Crescunt in regionibus calidis Italia, Gallia &c. Perpetuo virent, florent Majo sequentibusque mensibus, quos flores excipiunt baccæ primo virescentes, postmodum rubentes maturæque nigrescentes.

Olim ad varios usus tum tristes tum hilares, imprimis vero ad coronamenta usurpabatur Myrtus. In usum Medicum trahuntur folia & Baccæ. Illa refrigerant & adstringunt, inque fluxibus variis commendantur, polypo medentur, putredinem oris sanant, & imprimis ad foetorem atque sudorem sub axillis in inguinibus & pedibus sistendum tollendumque deprædicantur. Caute autem in hoc casu versandum. Baccæ, quæ MYRTI, MYRTILLI, MURTA, MYRTA, , *Myrtlen oder Myrten - Beerlein* / dicuntur, præter virtutes assignatas mitigant oculorum inflammationem, ut SCHROEDERUS ait, juvant luxatos articulos ac ossa fracta, subveniunt procidentiaæ uteri ac ani, capitis tineas furfuraceaque excrementa abigunt. Sunt qui exinde oleum adstringens parant, alii vero Syrupum ex iis conficiunt.

In ramis Myrti, præsertim annosæ, excrementum nascitur inæquale, tuberosum colore vario, quod manus instar arborem complectitur vocaturque *Myrtidanon*, Myrtidanum, virtute gaudens adstringente.

SEMEN

SEMEN CYDONIORUM.

Austeras & terreas particulas obtinent in mucagine, in quam resolvuntur semina, hinc in fluxu alvi, sistendo vomitu, in temperando æstu, ardore linguæ, faucium, cæteris mucaginosi præstantiora sunt, conveniunt etiam partibus ambustis & inflammatis oculis.

Datur eorum substantia, emulsio & mucago.

℞. Sem. cydon. ʒiβ. Cort. granat. ʒj. add. conserv. rosar. r. ʒβ. f. bolus in alvi fluxu & in sistendo vomitu add. L. O. gr. ij. cum syr. cydon. f. q.

℞. Sem. Cydonior. ʒβ. ∇ semperviv. plantag. nymph. q. f. f. mucago add. Otri ʒj. phlegm. Oli par. & syr. papav. q. f. detine in ore ad ariduram siccitatem & æstum.

℞. Sem. cydon. fœnicul. hormin. f. mucilag. c. ∇ flor. cyan. add. sacch. ʒni ʒβ. impone oculis inflammatis.

℞. Pulp. pomor. redolent. ʒiiij. mucag. sem. cydon. sperm ranar. ana ʒiβ. camph. ʒiβ. sacch. ʒn. ʒβ. f. cataplasma ad ambusta & oculorum contusiones.

℞. Mucag. cydonior. fact. c. decoct. linariæ, applica hæmorrhoidibus dolentibus.

℞. Mucag. sem. cydon. cape ad faucium præclusiones ex ∇ forti factas.

CAPUT

CYDONIA, Μηλέα κυδονία, à Cydone Cretæ oppido, κυδών. & μηλέα, COTONEA. Quitten, Baum/ Rütten-Baum/ COIGNIER, COIGNASSIER.

Est arbor flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, cujus calyx abit in fructum turbinatum, carnosum in loculamenta divisum, seminibus fœta oblongis & callosis. Addatur simul facies propria.

Cydonia

Cydonia fructu oblongo læviori Tourn. I. R. H. cl. 21. S. 8. g. 2. *Malus Cydonia fructu oblongo & læviori* H. R. Par. *Mala Cotonea majora* C. B. Pin. 434. *Cydonia majora* Raji Hist. 1453. *Cotonea malus* I. B. I. 27. *Struthia & Pyra Cotonea* Cast. *Bieren = Quitten / COIGNIER FEMELLE, COIGNASSIER ou POIRIER DE COING.*

Cydonia fructui brevior & rotundior Tourn. l. c. *Malus Cydonia fructu brevior & rotundior* H. R. Par. *Mala Cotonea minora* C. B. Pin. 434. *Cydonia minora* Raji Hist. 1453. *Quitten = Aepffel / Aepffel = Quitten / COIGNIER ou POMMIER DE COING.*

Hæ arbores frequentissime coluntur in hortis, pratis & vineis, florent Aprili & Majo, fructus Septembri & Octobri maturefcunt.

Fructus hic vocatur *μῆλον κυδώνιον*, MALUM aut PYRUM COTONEUM, eo quod cortex tenui lanugine, Xylo, Gossypio seu bombace obducitur. De usu horum fructuum ita differit SEBIZIUS. *Cydoniorum crudorum nullus est in mensis usus. Graviora sunt assa & cocta. Venter firmant, vomitiones arcent, alvi profluvia sistunt, ac ob id cæliacis, lentericis, dysentericis, diarrhœa conflictatis & cholera affectis utilia. Cordi præterea robur addunt, à cibo stomachum claudunt, appetitum excitant, foetum roborant. Apponuntur mensis cocta eaque aut integra aut in partes dissecta. Condiuntur quoque vel cum melle, vel cum Saccharo & aromatibus.*

Lanugo corticis in pulverem redacta celebratur ad hæmorrhagias. Quod si malum cotoneum excavatum oleo mastichino repleatur, assumque postea & contusum ventriculo imponatur, singultum vomitum ac choleram sistit.

IN OFFICINIS VARIA EX CYDONIIS PROSTANT,

Aqua Cydoniorum, Quitten = Wasser / Eau de Coins.

Aqua Cinamomi Cydoniata, de qua sub Cinamomo.

Cydonia condita, Eingelegte Quitten / Condit de Coings.

Diacydoniatum lucidum simplex, gemeine helle Quitten = Lattberg / Cotignac simple. Conducit pro roborando stomacho alvique fluxibus sedandis. Sumitur drachma una aut altera pro dosi.

Diacydoniatum aromatizatum, gewürzte Quitten • Lattberg / *Cognac aromatise*, iisdem ac prius virtutibus gaudet. Datur ad Drachmam & ultra.

Diacydoniatum lucidum Gialappinum, de quo sub Gial app
Miva Cydoniorum, Flüßige Rütten • Lattberg / *cognac liquide* ;
adstringit & roborat.

Panis Cydoniorum cum & sine aromatibus, gewürzt und ohnge-
würzt Quitten • Brod / *Pain de Coins simple & aromatise*.

Succus Cydoniorum, Hoher Rütten • Safft / *Suc de Coins*, & ex-
inde paratum cum Saccharo

Vinum Cydoniorum, Quitten Wein / *Vin de Coins*, quod cor-
diale roborans & adstringens existit, foetumque confortat.

Syrupus Cydoniorum, Rütten • Safft oder Syrup / *Syrop de Coins*. Gratus ventriculo syrupus eundem roborat, appetitum ex-
citat, nauseam vomitum & fluxus alvi sedat, bilem reprimat & ob-
vim suam adstringentem abortui præcavendo destinatus est, ita ut
mulierculæ sæpius eundem in usum trahant, & amygdala à pellicula
liberatas ex eo comedant. Datur per se ad unciam unam semis
usque.

Oleum Cydoniorum coctum, Quitten • Oehl / *Huile de Coins*.
Stomachicum est, conducit in ventriculi imbecillitate, vomitu, al-
vique fluxibus nimis, sudores quoque spinæ illitum cohibere fertur.

Unguentum Cydoniorum, Rütten • Salb / *Onguent de Coins*; con-
ducit ad roborandum ventriculum & fluxus alvinos sistendos, abor-
tum præcavendum & mensium atque lochiorum fluxum nimium
cohibendum.

Tandem quoque mentio facienda *Vini* ex cydoniis in Vino
infusis parati, quod *Vinum cydonites* vel *Melites*, Quitten • Wein
audit. Adstringit, ventriculum roborat, hepaticis & diarrhoea
conflictatis prodest. Habet etiam vim cardiacam.



CAPUT SEXTUM.

DE HERBIS, FOLIIS
ET GERMINIBUS.

PLANTÆ CONSTANTES
SALE VOLATILI OLEOSO
seu AROMATICO.

ORIGANUM.

CReticum & Hispanicum vulgari longe præferendum, inter plantas Θ e aromatico $\circ\circ$ so volatili constantes penetrantissimum & spirituosissimum, propterea in obstructione contumacissima, in morbis soporosis, catarrhosis, hystericis specificum est.

Datur infus. ∇ decoct. $\circ\circ$ dest. ingreditur clysteres.

\mathcal{R} . Summit. organ. fol. thym. serpill. ana p. ij. flor. organ. $\mathcal{M}\mathcal{S}$. infund. vino ad pint. ij. f. infusum anticatarrhale vel apoplecticum, addita radice pyrethri ad \mathfrak{z} j. f. infusum antiparalyticum tam internum quam externum.

\mathcal{R} . ∇ organ. dest. c. vino, instilla auribus ad auditum amissum, ex cruditate tympanum obsidente.

\mathcal{R} . $\circ\circ$ d. organ. gt. iij. excipe gossypio & inde cavo dentis.

Ὠρίγανον ab ὄρεῳ mons & γάνω latitia, quasi dicatur planta, quæ montibus delectetur, alii ab ὄρεῳ videre & γάνω clarifico, quod visum acuat, dici volunt. AGRIORIGANUM, ONITIS MAJOR, MAJORANA SYLVESTRIS, ORIGANUM VULGARE, ORIGANUM SYLVESTRE, CUNILA BUBULA, Dosten / Wohlgemuth / Berg-Münz / Costenz / ORIGAN.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est, subrotundum bifidum, inferius vero tripartitum. Ex calyce surgit pistillum, posticæ floris parti adinstar clavi infixum. ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt, in totidem semina subrotunda, in capsula, quæ floris calyx fuit recondita. His notis addendum est flores Origani in Spicis squamosis & Muscarii æmulis nasci.

Origanum sylvestre Cunila bubula Plinii C. B. Pin. 23. Origanum vulgare spontaneum L. B. 3. 236. Origanum sylvestre Dod. Pempt. 285.

Nascitur in inculto solo, secus itinera, in collibus & apricis, in locis campestribus etiam opacis, floret mensibus æstivis.

Species allegata apud nos unice usualis, in usum suppeditat folia cum floribus seu summitates.

Origanum aperit, abstergit, discutit. Vires obtinet stomachicas & uterinas; Laudatur in singultu, asthma, stranguria, tussi ictero, urinam & sudorem movet, lac auget mensesque pellit. Poterit infundi instar Théæ. Externe in balneis uterinis nervinisque celebratur, in partibus tumentibus & sugillatis à casu, contra scabiem item adhibetur. Pectini ad urinam movendam imponitur, conducit in uvulæ prolongatione. Aurium dolorem mitigat succus origani, cum lacte præsertim muliebri mixtus, quem in finem etiam prodest suffitus Origani in Vino decocti.

OFFICINÆ ASSERVANT SOLUM

Aquam Origani destillatam, ex integra planta cum floribus, Wohlgemuth-Wasser / Eau d'Origan.

Sunt qui exinde destillant oleum, quod tanquam uterinum, Cephalicum & stomachicum & à quibusdam tanquam arcanum odontalgicum laudatur.

MAJO.

MAJORANA.

Mitior est origano, specifica in catarrhis, obstructio-
nibus, doloribus capitis, vertigine & morbis soporosis.

Datur infus. ∇ \circ d. ingreditur quoque clysteres.

\mathcal{R} . Majoran. serpill. thym. ana Mj. infund. vino q. f. f.
infusum anticatarrhale.

SER-

MAJORANA, ἀμάραντος, σάμψυχον, AMARACUS, SAM-
PSUCHUS, Majoran / MARJOLAINE. Differt ab origano ca-
pitulis rotundioribus densioribus & brevioribus, ex quaterno or-
dine foliorum squamatim positorum conflatis.

Majorana vulgaris C. B. Pin. 224. Majorana majori folio ex
semine nata I. B. 3. p. 2. 241. Majorana sive Marum Dod. Pempt.
270. &

Majorana tenuifolia C. B. Pin. 224. Majorana tenuior I. B. 3.
p. 2. 241.

Est planta hortensis, floret Julio & Augusto. In usu sunt folia
& semen. Vires obtinet Majorana cephalicas, digerentes, attenu-
antes & incidentes, in affectibus nervorum prodest, flatus discutit,
præsertim à causa, uti loquuntur, frigida ortis. Conducit in uteri
& stomachi morbis. Menses promovet & Urinam, commendatur
ad sterilitatem. Externe adhibetur in pessariis uterinis, in cucuphis
cephalicis & in fomentis. In ictibus araneorum & serpentum cum
sale & aceto imponitur. Suffitus decocti Majoranæ præsertim in
vino laudatur ad auditum roborandum & tinnitum atque susurrum
tollendum. Errhina est planta & apophlegmatizans. Usurpatur vel
recens vel sicca in pulvere. Additur etiam hæc herba ferculis mul-
tis, præcipue vero jussulis, quibus gratiam in sapore conciliat.

IN OFFICINIS REPERIUNTUR

Aqua Majoranæ ex foliis recentibus destillata, Majoran-Wasser/
Eau de Marjolaine. Errhina est & coryzam abigens, si ore aqua re-
pleto ex vola manus naribus hauriatur.

LII 3 Con.

Conserua Majoranae, Majoran-Zucker / Conserve de Marjolaine, quæ cephalica est & uterina, & imprimis mulieres fluxu albo laborantes solatur.

Butyrum Majoranae, Majoran-Butter / Beurre de Marjolaine, conducit in affectibus narium, earumdem scilicet obstructione, præsertim in infantibus; illinitur radici dorso & cavitatibus narium.

Oleum Majoranae coctum, Majoran-Dehl / Huile de Marjolaine, resolvit & nervos roborat, errhinum est & in catarrhis & coryza infantum prodest.

Oleum Majoranae destillatum, destillirt Majoran-Dehl / Huile destillé de Marjolaine, ad eosdem usus celebre, stomachicum insuper est & carminativum atque uterinum. Facile exinde potest parari Balsamum.

SERPILLUM.

Coincidit cum majorana & datur ut majorana.

℞. Lign. sassaf. ℥iij. rad. helen. ʒβ. Zedoar. ℥iij. Majoran. fol. serpill. ana Mj. cort. Winteran. ʒj. affund. vin. generos. Mij. f. infusum anticatarrhale.

℞. Majoran. Thym. serpill. satirej. ana q. v. affunde unum proprium harum plantarum, f. tinct. f. essent. contra catarrhos.

℞. ∇ serpill. ʒij. cape pro cienda urina, it. in mensibus obstructis & pro Catarrhis.

℞. ∇ serpill. infund. rad. pyretr. f. infus. ad aphoniam.

℞. ∞ Nucist. expr. ʒj. ∞ serpill. gt. vj. vel. viij. f. balsam. ad vertiginem.

TYH.

Ἐρπυλλὸν ἀπὸ τοῦ ἔρπειν, à serpendo, SERPYLLUM. Quendel /
Seldquendel / Seld · Rümme / Wilder · Tymian / Hüner · Krauth /
Hünere

Hüner, Kohl / Hüner, Serb / quoniam Gallinis morbidis auxilio est; SERPOLET.

Differt tantum à Thymo caulibus humilioribus & minus duris ac lignosis.

Serpillum vulgare minus C. B. Pin. 220. Serpillum vulgare I. B. 3. 2. 269. & Dod. Pempt. 277.

Serpillum vulgare majus flore purpureo C. B. Pin. 220.

Serpillum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. Serpillum Citri odore I. B. 3. p. 2. 270. Serpillum Citratum Tabern. Ic 360. Vulgare crescit locis sabulosis, apricis & siccis, Citratum colitur in hortis; floret æstate.

Herba cum floribus est in usu. Planta est cephalica, stomachica, hysterica, attenuat, aperit, convenit in obstructione mensium & urinæ, sudores ciet. Externe cucuphas, pediluvia, blanea, gargarismata, fomenta ingreditur, cephalalgia atque vertigini medetur.

IN OFFICINIS NON EXTAT NISI.

Aqua Serpilli, Quendel-Wasser / Eau de Serpolet, ex planta cum floribus collecta. Quidam eam cum vino destillant. &

Aqua Serpilli composita, vermischtes Quendel-Wasser / Eau de Serpolet composée, quæ vires obtinet cephalicas, cordiales, stomachicas atque carminativas, dolores colicos compescit, menses quoque atque partum promovet. Dosis cochlear unum duo & ultra.

THYMUS.

Gratior est serpillo, & tanquam aroma cibis crudioribus adjungitur.

R. Thym. infunde Δ propriæ dest. & spirituosæ, fac essentiam & detine in ore ad læsam deglutitionem, it. ad odontalgiam ex catarrhis.

SATU-

θύμος, THYMUM, ἀπὸ τοῦ θυμῆ, quod animum addat, vel à suffitu,

suffitu, quoniam in sacris olim ad suffimenta recipiebatur, SERPILLUM HORTENSE, Thymian / Welscher Römischer Quendel / Rummich / THYN, THYM, THIM.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est plerumque bifidum inferius vero tripartitum. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti adinstar clavi infixum ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addendi sunt caules duri lignosi & flores in capitula collecti.

Thymus vulgaris folio latiore C. B. Pin. 219. Thymum durius Dod. Pempt. 276. &

Thymus vulgaris folio tenuiore C. B. Pin. 219. Thymum vulgare rigidius folio cinereo I. B. 3. p. 2. 263.

Coluntur Thymi species in hortis, florent Majo & tota æstate.

Incidit, discutit, appetitum excitat digestionem juvat, flatus pellit, egregium est anticatarrhale, vim habet diaphoreticam & alexipharmonicam, usurpatur in affectibus capitis pulmonum & artuum. Sacculos ingreditur carminativos, sanguinem coagulatum resolvit, omnia viscera reserat, menses partum & secundinas pellit, hebetibus oculis prodesse dicitur in cibo.

OFFICINÆ DESTILLANT

Aquam Thymi, ex herba cum floribus, Thymian oder Rummich / Wasser / *Eau de Thym*.

Oleum Thymi, Thymian-Dehl / Rummich-Dehl / *Huile de Thym*, Quod morbis capitis stomachi & uteri dicatum.

SATUREJA.

Thymo respondet, & fabis additur, quarum flatulentiam præcavet, cæterum ♀ stimulat. Datur ut Thymus.

℞. Saturei. q. v. affunde aquam suam propriam f. essentia contra odontalgiam & catarrhos.

℞. Essent. saturej. ∇ Magnanim. f. us formicar. ana q. v. exhibe cum. tinct. ambr. & elect. diasatyr. ad excitandam ♀.

MELIS-

SATUREJA nomen habere videtur à saturando, quod cibis condimenti loco addatur, alii juxta SEBIZIUM à Satyris denominatam autumant, quod coitus marcescentes stimulet, Saturey / Garten. Eysop / Garten. Psop / Bohnen. Krauth / Råse. Krauth / Sengen. Krauth / SARIETTE.

à Thymo differt floribus sparsim in foliorum alis nascentibus, non vero in capitulum collectis, à Calamintha floribus pediculis non ramosis insidentibus, à Thymbra vero floribus non verticillatim dispositis.

Satureja sativa L. B. 3. 272. Satureja hortensis sive Cunila sativa Plinii C. B. Pin. 218. Satureja Dod. Pempt. 289. Colitur in hortis, floret fere integra æstate, eodem anno quo seritur rursus perit.

Attenuat, aperit, discutit, convenit in affectibus uteri, menses ciet, cruditates ventriculi corrigit, prodest in anorexia, in affectibus pectoris cephalicisque. Visum acuit. Externe discutit tumores & ad dolores aurium laudatur. Pulices necare dicitur strata in cubili aut accensa.

IN OFFICINIS EXTAT

Oleum Saturejæ destillatum, Saturey. Dehl / Huile de Sariette, roborat nervos, eorumdemque obstructions tollit, habetur etiam anodynum in doloribus dentium & aurium.

MELISSA.

Ob Sĩa sua aromatica valde spirituosam, analogiam quandam cum spiritibus nostris habentia summum cardiacum & analepticum est. Hinc in subitanea virium prostratione & amissa memoria, in palpitatione cordis specificum est. Commendatur & ad epilepsiam, maniam & sterilitatem.

Febure primum ens Melissæ, mire prædicat, quo aniculam iuventuti restituisse affirmat. [si credere fas est vid.

M m m

ejus

ejus Chym. part. 2. p. m. 221. seqq. ubi plura de renovatione & restauratione habet.]

Vis analeptica intenditur flavedine Corticum citri.

℞. Herb. Meliss. Mj. ▽ Meliss. c. v. ℥j. flaved. Cort. Citr. ʒβ. f. infusum ad palpitationem cordis.

℞. Fol. Meliss. Mj. incidantur minutim & infundantur in ℥ vini ʒij. deind. add. marg. præpar. ʒβ. dos. cochl. ij. ex mente Riverii [l. i. prax. Med c. 13. p. m. 187. qui addit hoc in Illustr. quadam familia Monspeliensi pro secreto gentilitio & hæreditario habitum.]

℞. ▽ Meliss. rub. id. vel fœnicul ana ʒij. ℥ Theriac. ʒβ. syr. flor. tunic. ʒvj Ess. Citr. ʒβ. M. f. mixtura ad tremorem & palpitationem cordis.

℞. Aq. Meliss. spirituos. ʒj. Cinam. ʒiiij. borrac. ʒj. f. mixtura ad mensium remoram.

℞. ▽ Meliss. rub. id. ana ʒij. Cinam. ʒβ. Conf. alk. ʒiiij. syr. rub. id. f. cinam ʒβ. Julep. rosar. ʒβ. M. f. mixtura analeptica.

HOR.

Μελισσόφυλλον, μελίφυλλον, MELIPHYLLUM, MELLIFOLIUM, MELISSA quasi folium melleum, quod mellis materiam hinc exugant apes, vel à Cretensium Regis Melissi filia, quæ una cum sorore Amalthæa Jovem caprino lacte aluisse in fabulis dicitur. APIASTRUM, quod apes ea delectentur, CITRARIA vel CITRAGO, CITRONELLA, CEDRONELLA ab odore, cum malum Citreum vulgaris Melissa redoleat. Melissen / Mutter, Krauth / Citronen-Krauth / Bienen-Krauth / MELISSE.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius vero tripartitum. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. Adde flores

Melissa

Melissæ in foliorum quidem alis nasci, non tamen omnino verticillatos esse.

Melissa hortensis C. B. Pin. 229. Melissa vulgaris odore Citri I. B. 3. p. 2. 232. Melissa Dod. Pempt. 91.

Colitur in hortis, floret mensibus æstivis & semina perficit, perit postmodum, radice solummodo restibili.

Melissa vires quoque stomachicas, carminativas atque uterinas obtinet. Notanda vero in ultimo casu idiosyncrasia. Valet contra malum Hypochondriacum & exinde dependentem Melancholiam. In balneis uterinis & pediluviiis in mensibus deficientibus prodest, quo in casu non tantum interne in infuso sumitur, sed tibialibus quoque recens immittitur. Sacculis quoque cordialibus immiscetur. Visum clarificat.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Melissæ, ex herba integra destillata, *Melissen-Wasser* / *Eau de Melisse*, quæ vel cum aqua vel cum vino destillatur. In palpitatione cordis & symptomatibus uterinis multum celebratur. In affectibus quoque capitis locum habet.

Oleum Melissæ destillatum, *Melissen-Dehl* / *Haile de Melisse*, quod tanquam cephalicum, cordiale atque uterinum externe potissimum usurpatur.

Sunt qui exinde conservam, essentiam, extractum, spiritum atque sal parant, sed in usum vix amplius veniunt. Celebratur hodierno tempore multum *AQUA* sic dicta *CARMELITARUM*, cujus primarium ingrediens quidam Melissam esse putant. *LEMERY* Aquæ Melissæ compositæ descriptionem hanc tradit.

℞. Melissæ viridis m. vj. flavedinis Cortic. Aurant. ℥ij. Nuc. Mosch. semin. Coriandr. ana ℥j. Cinam. Caryophyll. ana ℥ss. infundantur in vini albi generosi & Spiritus Vini analibris duabus, digerantur invicem per aliquot dies, postea fiat destillatio. Aqua hæc spirituosâ in morbis uteri, capitis, stomachi, cordis, imprimis ejus palpitatione &c. interne conducit, externe membris paralyticis, debilibus, contusis, sugillatisque prodest. Dosis pro usu interno à drachma ad unciam unam.

Tandem nec omitti debet ex Melissa parata aqua antihysterica egregia & usu multiplici comprobata, ab Hochbergio descripta, quæ hæc est.

℞. Folior. Meliss. rec. man. x. vel xij. concisis intersperge bac-
carum Lauri contusarum & seminis Cumin. ana man. j. Myrrh.
elect. pulv. ʒß. castor. zij. superaffunde Vini gener. mens. ij. vel iij.
stent in digestionem per 24. horas in vase bene clauso, postea destilla-
tione proliciatur dimidia pars, quæ multum conducit.

Tandem vel verbo quoque tangendum Arcanum seu primum ens
aut quinta essentia Melissæ, de quo remedio cum Paracelso, le Febure
aliique præsertim ad rejuvenescentiam conciliandam mira fabu-
lantur.

HORMINUM SCLAREA DICTUM.

In colica & hysterica passione ut & in fluxu albo mu-
lierum & ʒe stimulanda singulariter prædest, ast cave ne ni-
mis utaris, quia ob nimiam sui fragrantiam capiti inducit
gravedinem. Datur ut Melissa.

℞. Hormin. rorismar. ana Mij. Vin. generos. Mens. ij. f.
decoct. leni igne vel infusum in cineribus contra fluorem
album & hystericam passionem.

℞. Horminum, ova conquassata & flores lactis q. s. f. f.
c. butyro placentæ pro stimulanda ʒe, addi potest aliquid
essentiæ ambrae.

PLAN-

Οἶνον, quoniam venerem stimulat, SCLAREA à caule du-
riore nec admodum succulento, SCARLEA, GALLITRICUM,
ORVALA, TOTA BONA. Scharlach/ Gemein-Scharlach/
Muscateller, Krauth/ quoniam vino conciliat saporem moscha-
tellinum. TOUTEBONNE, ORVALE.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius
falcatum est, inferius vero in tres partes divisum, media cochlearis
instar excavata. Ex calyce surgit pistillum floris parti posteriori in-
star clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui
abeunt

abeunt in semina subrotunda, in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita.

Sclarea Tabern. Icon. 373. Horminum Sclarea dictum C. B. Pin. 238. Gallitricum sativum L. B. 3, 309. Orvala Dod. Pempt. 292. In hortis & viridariis colitur, floret æstate.

Notandum de Sclarea, quod vina, in quibus vel per se, vel cum floribus sambuci fuit infusa, cito inebrient, capitisque dolores insignes excitent.

PLANTÆ SALE AROMATICO VOLATILI CUM QUIBUSDAM FIXIS CONSTANTES,

ROSMARINUS.

Præter vires analepticas vim etiam habet in uteri capitis & nervorum obstructionibus, ut & in colica, fluore albo, memoriæ debilitate, ingreditur quoque cum majorana, hormino satureja & mentha infusus & balnea contra sterilitatem.

℞. Rorismarin. matricar. sabin. ana Mj. bacc. junip. ʒiʒ. Cinam. ʒij. Croc. ʒj. Θ ʒri ʒʒ. infunde vini q. s. ad remoram mensium. Si alvus sit adstricta add. helleb. n. ʒj. fol. fenn. ʒj. exhibe per vices.

℞. Fol. rorismar. ʒʒ. rad. caryophyllat. ʒj. lign. sassafr. ʒij. affund. vin. generos. q. s. coque leniter in vase clauso, cape haustum subinde inter cibandum ad catarrhos.

℞. Rorismar. salv. absynth. ana q. v. coque in vino chalybeato & applica utero contra procidentiam.

SAL-

ROSMARINUM, quoniam prope mare provenit, & rorem
M m m 3 marinum

marinum recipit, λιβανωθός, λιβανός, quia thus accensum redo-
leat, LIBANOTIS, σεφανωτική, LIBANARIA, ROSMARI-
NUM CORONARIUM, quod coronis inflectatur. HYSSOPUS
HEBRÆORUM, CASIA NIGRA. Per excellentiam quoque
vocatur ἀνθος, ANTHOS, quasi totus floridus sit hic frutex,
Rosmarin / ROMARIN.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius bifi-
dum & sursum versus posteriora revolutum est, cum staminibus
aduncis, inferius vero in tres partes divisum, media cochlearis in-
star excavata. Ex calyce autem bidentato vel tridentato surgit pi-
stillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuorve-
luti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina
subrotunda, in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita.

Rosmarinus hortensis angustiore folio C. B. Pin. 217. Ros-
marinus Coronarius fruticosus sive nobilior angustiore folio I. B.
2. 25. Rosmarinum Coronarium Dod. Pempt 272. &

Rosmarinus spontaneus latiore folio C. B. Pin. 217. Ros-
marinus Coronarius fruticosus ignobilior I. B. 2. 25.

Apud nos colitur in hortis. Sponte nascitur in Gallia præser-
tim Languedocia, locis etiam incultis, Hispania &c. floret Ma-
jo & Junio.

Usurpantur folia & flores, Vires obtinent attenuantes, abster-
sivas, incidentes, aperientes & obstructions reserantes. In af-
fectibus quoque pectoris, asthmate, & catarrhis, ut & inflatio-
ne ventriculi, sterilitate, chlorosi, ictero, arthritide conducunt.

Externe nervos & articulos roborant, ingrediuntur
fomentationes. Recipiuntur quoque in pulveres Ptarmicos; in Epi-
lepsia à LINDANO multum commendatur Rosmarinus, in apo-
plexia aliisque affectibus soporosis atque paralyticis, Melancholia
itidem palpitatione cordis &c. celebratur. Visum & auditum acuit,
& tum externe tum interne usurpatus à quibusdam vix non propa-
nacea habetur.

IN OFFICINIS ASSERVANTUR

Aqua Rosmarini ex integra planta cum aqua vel vino destillata,
Rosmarin • Wasser / Eau de Romarin.

Aqua Regina Hungariae, Ungerisch • Wasser / Eau de la Reine,
d'Hongrie

A Hongrie, quæ nihil aliud est quam Spiritus Vini rectificatissimus super folia seu, quod melius flores aliquoties cohobatus. Optima ex Languedocia habetur ob majorem plantæ ibidem fragrantiam.

Aqua hæc spirituosæ, verba sunt Dn. CHARAS, præstantissima est adversus quosvis affectus cerebri frigidos, utilissime etiam in usum venit in nervorum & artuum morbis, contra Rheumatismum & arthritidem frigidam. Cephalalgiam sanat, vertiginem dissipat surditati auriumque tinnitui medetur. In capitis contusionibus cunctarum corporis partium sanguinem à concretionem præservando & coagulatum resolvendo utilis est. Virtutes quoque stomachicas, carminativas atque Hystricas possidet. Interne assumitur ad drachmam & ultra ex vino vel aqua cephalica, externe pro refocillatione naribus admovetur & partes eadem fovetur.

Aqua Cephalica Bæcleri, Bäcklers Haupt-Wasser / Eau Cephalique de Bæcler. Sale volatili oleoso sexui quoque sequiori non adverso turget, convenit in affectibus capitis, Cephalalgia, clavo, affectibus soporosis, &c. nec in passionibus hystricis ultimum locum occupat; cochleatim, ab uno ad duo &c. datur cochlearia.

Conserva Anthos, sive florum Rorismarini, Rosmarin-Zucker / Conserve de Romarin, quæ præter virtutes cephalicas memoriam singulariter confortare dicitur.

Oleum Rorismarini destillatum, Rosmarin-Öehl / Huile de Romarin. Interne commendatur in affectibus capitis, apoplexia, paralyti ut & in affectibus uterinis ad aliquot guttas. Externe ingreditur Balsama Cephalica. Facili quoque negotio exinde conficitur

Balsamum Rorismarini, Rosmarin-Balsam / Beaume de Romarin.

Mel Anthosatum, Rosmarin-Honig / Miel de Romarin. In colica, affectibus soporosis, imprimis apoplexia clysteribus inditur.

Olim præstabant species dianthos & Sal Rorismarini, sed hodie non amplius usurpantur

Tandem merito mentio injicienda remedii contra gravem auditum non omnimodo spernendi, quod consistit in axungia, quæ ex anguilla surculis Rorismarini confixa & ad ignem lentum affata extillat & calide auribus instillatur. Quidam etiam per infusionem

tionem exinde parant *Vinum Rosmarinatum*, *Rosmarin-Wein*/ *Vin de Romarin*, quod cephalicum cardiacum stomachicum atque Hystericum habetur.

SALVIA.

Virtute rorimarino respondet, sed in epilepsia, vertigine, paralyfi, virginum cachexia & leucophlegmatia consensum cum Utero habente, ut & podagræ & arthriditi medetur.

℞. Fol. salv. serpill. ana Mij. rorismar. Mij. vel iij. bacc. Junip. ℥ss. coq. in aq. f. pediluvium contra podagram.

℞. Fol. salv. q. v. infund. — vini fac essentiam, quam cape cochleatim ad podagram.

℞. Conserv. salv. 3vj. Zinz. chin. cond. 3℔. sem. sinap. l. eruc. 3ij. cardam. cubeb. galang. ana ʒi. Θ vol. succ. 3℔. — Ceras. nigr. & syr. flor. tunic. q. s. f. Elect. ad vertiginem ex cruditate ventriculi.

℞. Salv. menth. absynth. ana q. v. destilla c. vino & destillatum cape ad famem caninam.

MEN-

SALVIA à salute, vel sanitate, quam inducit & conservat, dicta; Alii à Saliva, quam masticata elicit, dictam putant, ἐλελισφάκη, quoniam retorrída quasi visitur & exsucca, *Salbey*/ *SAUGE*.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius modo fornicatum est modo falcatum, inferius vero tripartitum extuberans, nec cochlearis instar excavatum ut in hormino & sclarea. Ex calyce surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac veluti quatuor embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina subrotunda, in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addenda sunt stamina os Hyoides quo-

quodammodo referentia. *Salvia* species flore fructuque carentes facile dignoscuntur odore quodam proprio, aromatico, graveolente, & foliis rugosis quales esse solent usu detritæ vestes.

Ex pluribus *Salvia* speciebus duæ sequentes in usum culinarem atque Medicum potissimum veniunt

Salvia major an *Sphacelus* Theophrasti C. B. Pin. 237. *Salvia* latifolia L. B. 3. 304. *Salvia* major Dod. Pempt. 290. *Grosfe-Brente-Salbey*. SAUGE.

Salvia minor aurita & non aurita C. B. Pin. 237. *Salvia* minor Auriculata L. B. 3. 305. *Salvia* minor Dod. Pempt. 290. *Epis-Salbey* / *Edle-Salbey* / *Kreuz-Salbey* / SAUGE FRAN-
CHE, PETITE SAUGE.

Utraque colitur in hortis, floret æstate. Folia & flores in usu sunt. Surculi *Salvia* haud raro carni vervecinæ ad gratiorem saporem conciliandum infiguntur. Miscentur quoque cum ovis frixis, aut cum certa massa farinacea in lagana coquantur. Vires obtinet *Salvia* abstergendi, incidendi, mentes movendi; urinam ciendi & partum pellendi. Cerebro nervis & articulis quam maxime convenit, unde illud SALERNITANORUM,

*Salvia confortat nervos manuumque tremorem
Tollit.*

Ad fecunditatem uterum calefaciendo roborandoque conferre dicitur; qua ex causa, quoniam multos curat morbos, hæce pronunciant verba SALERNITANI,

Salvia Salvatrix, Naturæ conciliatrix.

Sunt qui contra febres intermittentes per novem dies folia *Salvia* comedunt, & quidem primo die novem, secundo octo & sic porro descendendo ad unum diem: Memoria confortandæ & sensuum vi adaugendæ consecrata est *Salvia*, tussim mitigat aliisque pectoris morbis medetur. Valere quoque fertur contra pestem venena & pocula suspecta, unde rursus SALERNITANI canunt,

Salvia cum Ruta faciunt Tibi pocula ruta.

Externe *Salvia* commendatur in balneis, cucuphis, fomentis & suffitu. Ingreditur pulveres sternutatorios. Serpignes & lentigines delet, in oris Scorbuto, aphthis & ulceribus oris convenit. In

odontalgia laudatur decoctum salviæ cum vino, item in vulneribus mundandis atque curandis. Quidam adeo extollunt ob virtutes Salviam, ut cum Schola SALERNITANA exclament

Cur moritur homo cui crescit Salvia in horto?

Quibus tamen cum ejusdem Scholæ Medicis facile respondere est dicendo

Contra vim mortis non est Medicamen in hortis.

Circa usum autem Salviæ monent, ne in usum trahatur antequam optime lotionem sit depurata, quoniam bufonum præsertim veneno aut saliva venenata facile illam infici asserunt. Hinc reperiuntur qui hoc metu inducti salviæ & rutam alterno ordine plantant.

IN OFFICINIS INVENIUNTUR

Aqua Salviæ, Galben-Wasser / Eau de Sauge destillata ex herba cum floribus.

Aqua Salviæ composita, vermischtes Galben-Wasser / Eau de Sauge composée. Calefacit, siccant, cephalica, arthritica & penetrantissima est, conveniens tam interne quam externe. Hystericas quoque solatur debito tempore adhibita. Dosis cochlear unum ad duo &c.

Conserva Salviæ ex floribus, Galben-Zucker / Consève de Sauge.

Oleum Salviæ coctum, Galben Oehl / Huile de Sauge, partibus nervosis, quas roborat, amicum est, & virtute discutiente gaudet.

Oleum Salviæ destillatum, destillirt Galben-Oehl / Huile de Sauge distillé, partibus quoque nervosis dicatum est.

Extractum Salviæ, Galben Extract / Extrait de Sauge, quod ut reliqua ex Salvia præparata capitis affectibus medetur.

De Salvia Franc. PAULNI peculiarem edidit tractatum, qui insignitur SACRA HERBA seu NOBILIS SALVIA.

Nec silentio prætereundum tantopere celebratum & adamatum *Vinum Salviatum, der Galben-Wein / Vin de Sauge,* per infusionem in vino vel cum uvis recentibus vel cum uvis passis, & aromatibus paratum, in vulgus notissimum, quod, ut cum SEBIZIO loquar, nervis potissimum cerebro & ventriculo salutare est, confert

fert tremulis, convulsis, paralyticis. Adversatur venenis. Bibendum est mulieribus, quæ ob frigiditatem & lubricitatem matricis infœcundæ sunt.

MENTHA CRISPA.

Hujus Θ aromaticum ventriculum ejusque fermentum auget & confortat, ut specifica audiat in cholera, vomitu, colica, anorexia, singultu & vertigine, ob sui penetrantiam etiam uterina est. Externe commendatur ad lactis concrescientiam, it. ad vomitum & dolorem ventriculi. Datur decoct. conserv. infus. aq. dest. ω -us, \circ o dest. Elix.

\mathcal{R} . Menth. q. v. affund. ω vin. f. Elix. stomachic.

\mathcal{R} . Menth. summit. absynth. ana Mj. acori rec. \mathfrak{z} ij. Cinnamon. ac. $\mathfrak{z}\beta$. f. nodulus in vino ad vitia Ventriculi.

\mathcal{R} . Aq. Menth. \mathfrak{z} ijj Essent. Castor. \mathfrak{z} ijj. Laud. op. gr. iij. Elix. Citr. q. f. M. exhibe in colica convulsiva.

\mathcal{R} . Aq. Menth. $\mathfrak{z}\beta$. ω theriac. \mathfrak{z} ijj. Conf. alk. \mathfrak{z} j. L. O. gr. ij. syr. menth. \mathfrak{z} vj. f. mixtura ad singultum.

\mathcal{R} \circ o Menth. dest. gt. ij. L. O. gr. ij. aq. Menth \mathfrak{z} j. Cinnamon. \mathfrak{z} ij. M. contra vomitum præcipue ex hypercatharsi.

\mathcal{R} . \circ o Menth. tacamahac. q. v. cum \circ o Nucist. expr. f. liniment. ad vomitum & cardialgiam add. L. O.

MEN-

$\text{M}\iota\text{ν}\theta\eta$, $\eta\delta\upsilon\sigma\mu\Theta$, MENTHA, ab odore dicta, quod eo mentem excitet, BALSAMUM olitoribus audit, $\text{M}\ddot{\text{u}}\text{n}\ddot{\text{t}} / \text{Balsam} / \text{MENTHE, BEAUME.}$

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius fornicatum est, inferius vero tripartitum, sic tamen ambo secantur, ut flos quadripartitus primo aspectu videatur, observante R. J. O. Ex calyce autem surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde

N a n 2

abeunt

abest in totidem semina, in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. Mentha species flore fructuque carentes odore quodam proprio aromatico dignosci solent. Plures autem reperiuntur, hic vero de crispa sermo est, quæ iterum duplex in usum trahitur nempe

Mentha rotundifolia crispa spicata C. B. Pin. 227. Mentha spicata rotundifolia crispa L. B. 3. p. 2. 218. Mentha altera Dod. Pempt. 95. Krause, Münz / Krauß-Balsam / MENTHE ou BEAUME CRESPEE &

Mentha crispa verticillata C. B. Pin. 227. Mentha crispa verticillata folio rotundiore L. B. 3. p. 2. 215. Mentha prima Dod. Pempt. 95. Garten-Münz / Krauß-Balsam / x.

Coluntur in hortis, sponte etiam nascuntur, florent Julio præsertim.

Mentha, cujus usus olim etiam fuit culinaris, attenuat, subadstringit. Inter remedia stomachica vix non principatum obtinet. Contra lactis coagulationem mulierculæ viridem mentham contundunt & mammis applicant vel etiam ejusdem decoctum cum linteis adhibent. Juxta HORSTIUM furculi Mentha in lac immissi ejus coagulationem impediunt.

Semen. Mentha venereum extinguere appetitum & sterilitatem inducere dicunt, unde ab ARISTOTELE jam quæsitum fuit, cur in proverbio quærat, Mentham belli tempore neque edito neque ferito. Alii vero Mentham Venerem stimulare autumant. Nonnulli media incedunt via. Mentham recentem Venerem stimulare siccam vero inhibere asserentes. Laudatur semen ad gonorrhœam. Succus Mentha fluxibus sanguineis conducit. In doloribus post partum & in fluore albo atque chlorosi commendatur. Laudatur in sacculis carminativis, anticolicis & antihysterics, tinnitum & sibilum aurium tollit, moribus animalium medetur, ut & rheumatismis. Nondum experientia sufficienter comprobatum est, vulneratos, quibus Mentha exhibetur, aut qui solummodo mentham secum gestant, difficilius curari.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Mentha, Krauß-Münz oder Kraußbalsam-Wasser / Eau de Menthe, quæ stomachica & antihysterica est insignis, passiones hyste-

hystericas & præcavens & arcens, mulieres ad tormina ventris in infantibus compescenda adhibent, commendatur quoque in tumore testium ex hernia & fecibus retentis in scroto.

Oleum Menthae coctum, Kraufmünz-Dehl / Huile de Menthe, stomachicum est & uterinum.

Oleum Menthae destillatum, destilliertes Kraußbalsam-Dehl / Huile de Menthe distillé, datur ad aliquot guttas.

Syrupus Menthae, Kraußbalsam-Syrup / Syrop de Menthe. Non admodum quidem gratus est, ventriculo tamen dicatus, eundem roborat & calefacit singultum & vomitum inhibet, flatusque dissipat, sicuti quoque in affectibus uterinis haud inutiliter adhibetur.

MENTHA AQUATICA.

Cum Mentha omnino conspirat, sed recipitur hodie inter balnea uterina & nervina.

MENTHA AQUATICA vocatur quoque *σιρύμψιον*, SISMYRIUM, BALSAMUM PALUSTRE, Wasser-Münz/Bach-Münz / Fisch-Münz / Wildkragen-Krauth / Ros-Münz / MENTHE AQUATIQUE OU SAUVAGE. Character plantæ sub Mentha crispa cerni potest.

Mentha rotundifolia palustris seu aquatica major C. B. Pin. 227. Mentha aquatica sive Sisymbrium L. B. 3. p. 2. 223. Sisymbrium Dod. Pempt. 97.

Rignorum ac humentium alumna est hæc Mentha, floret Julio.

Præterquam quod cum Mentha coincidat urinas quoque & calculos pellit cum vino pota, dicente SCHWENCKFELDIO. Folia ad cephalalgiam & apum vesparumque ictus laudantur. Postponitur semper Mentha crispa ob odorem insuaviorem.

MENTHASTRUM.

Nil differt à *Mentha aquatica*, nisi quod odor sit paulo gravior, ingreditur etiam balnea uterina & nervina.

MENTASTRUM, MENTHA EQUINA, MENTHA CABBALLINA, Wilde Krauß Münß / Ros-Münß / Wilde-Münß / MENTHE SAUVAGE: à *Mentha* ratione characteris non differt; vocatur

Mentha sylvestris folio longiore C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum* folio longiore candicante I. B. 3. 2. 221. *Menthastrum* Dod. Pempt. 96.

Humidis locis provenit, ad fluviorum ripas, gravem odorem exhalat, floret Julio.

Virtute anthelmintica gaudet, in asthmate conducit & menses pellit, laudatur in auditus difficultate.

NEPETA.

In Uteri affectibus, in mensium & lochiorum remora tam interne quam externe specificè usurpatur, ingreditur quoque balnea & clysteres uterinos.

℞. Nepeth. puleg. sabin. matricar. ana q. v. f. infusum uterinum ex vino ad mensium remoram.

CA-

MENTHA CATARIA, MENTHA FELINA, CATARIA dicitur quod Cati seu feles mire ea planta delectentur, HERBA FELIS, HERBA CATI, CALAMINTHA CATARIA, NEPETA, Nept / Ragen-Münß / Ragen-Nept / Ragen-Krauth / Stein-Münß / HERBE AUX CHATS.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est, subrotundum bifidum, inferius vero in tres partes divi-

divisum, media cochlearis instar excavata, cæteris tanquam alio orificio insigni inter duo labia positum cingentibus. Ex calyce autem surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. Catariæ species flore fructuque carentes odore quodam proprio acri & aromatico, foliisque canescentibus dignosci solent.

Cataria major vulgaris Tourn. l. R. H. cl. 4. S. 3. g. 18. Mentha Cataria vulgaris & major C. B. Pin. 228. Mentha Cataria l. B. 3. p. 2. 225. Cataria herba Dod. Pempt. 99.

Circa margines hortorum, secus aggeres, scrobes ac vias humido & uliginoso solo nascitur: Floret mensibus æstivis.

Partium est tenuium, attenuat atque aperit. Commendatur in obstructionibus Hepatis & Lienis, ictero, tussi, asthma & pulmonum tartaro. Usurpatur infusa vel in aqua vel in vino. Succus inditus naribus pituitam extrahit & visum acuere dicitur. Adversus veneficia à vulgo commendatur. Dicitur etiam præsertim ejus radix masticata & comesta homines mites reddere iracundos & truculentos.

OFFICINÆ SERVANT

Aquam Nepetæ, Nept oder Katzenmünz • Wasser / Eau de l'herbe aux Chats.

CALAMINTHA.

Cum mentha conspirat, sed in flatibus dissipandis & mensibus ciendis potens est, adeo ut & foetum excludere dicatur, in artuum doloribus & orthopnoea appropriatum medicamentum est.

Externe pubi ad inflammationem uteri, ut & capiti ad vertiginem, & ventriculo ad vomitum applicatur. Præterea ingreditur catapl. fomenta infusus & balnea.

καλαμίνθη, quasi pulchra Mentha, Calamenth/ Alfermüñg/
 Gemeine Bergmüñg / Wild-Mutterkrauth / Berg-Poley / CA-
 LAMENT.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius
 surrectum est subrotundum bifidum, interius vero tripartitum. Ex
 calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum,
 ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem
 semina subrotunda in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita.
 His notis addendum est flores Calaminthæ in foliorum alis nasci,
 pediculis ramosis insidentes.

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228.
 Calamintha flore magno vulgaris L. B. 3. p. 2. 228. Calamintha
 montana Dod. Pempt 98.

Crescit in arvis, montes amat umbrosos & saxosos clivos.
 Viget æstate ac fere toto anni tempore, à Junio in autumnum flores
 semenque perficit.

Calamintha aperit, attenuat, abstergit viscera atque corrigit,
 tussi medetur & asthmæ. Blandum quoque est diureticum, ulcera
 renum abstergit & mictum cruentum sanât.

Syrupus atque species Diacalaminthæ ut & Aqua destillata, ob in-
 gratiorem paulo saporem non amplius in usu.

PULEGIUM.

Menthæ vel calaminthæ analogum est, ast præstantius,
 & in tussi clamosa, in mensibus & lochiis pellendis nulli se-
 cundum. Externe in ischuria renali singulare est.

℞. Puleg. Mij. infund. vino dulci, add. syr. puleg. vel
 scabios. contra tussim, clamosam, vel loco vini affundatur
 aqua dest. — uosa.

℞. Decoct. puleg. ℥iiij. Tinct. Castor. ʒj. syr. puleg. q. s.
 ad gratiam. M. exhibe contra ischuriam. it. injice in vesicam
 ad eundem affectum.

℞. Puleg. flor. chamom. sabin. ana Mj. pulp. colocynth.
 ʒß. f. decoct. injiciendum ad provocandos menses.

℞. Decoct.

℞. Decoct. Puleg. vel aq. ℥uof. ℥iiij. ex quo cape bor-
rac. Venet. ℥j. pulv. Cinam. ʒβ. ʒo d. cinam. gt. j. f. pulv.
ad mensium remoram, si dolores adsunt add. L. O. gr. j.

℞. Aq. puleg. ℥ij. hysteric. ʒij. Essent. Castor. ʒβ. liq. C.
C. succinat. ʒj. M. mixtura in paroxysmo apoplexiæ.

℞. Aq. puleg. ℥iiij. Cinam. ʒiiij. M. pro vehiculo in quo
medicamenta contra obstructions uteri exhibentur.

℞. Gumm. animæ ʒβ. aq. Puleg. ℥uof. q. f. redige in
formam Emuls. add. syr. puleg contra tussim & asthma.

Γλήχων, γλίχων, βλήχων, πλίχων, quia à pecoribus comestum
balatum excitat, PULEJUM, PULEGIUM REGALE vel RE-
GIUM, Poley / Herk-Poley / POULIOT.

Ad Mentham pertinet, & est

Mentha aquatica seu Pulegium vulgare Tourn. I. R. H. cl. 4.
S. 2. g. 10. Pulegium latifolium C. B. Pin. 222. Pulegium I. B. 3.
p. 256. & Dod. Pempt. 282.

Locis gaudet palustribus incultis tamen, Julio & Augusto
floret, & tunc quidem colligendum.

Pulegium aperit, attenuat, resolvit, refertur inter plantas
nervinas & cephalicas, uterinas stomachicas atque pectorales icteri-
cis atque hydropicis conducit. Externe quoque dolores mitigat,
vertiginem discutit & ingreditur pediluvia ad ciendos menses.
Pulegium ex aceto tepido potum & appositum naribus loquelam
amissam statim restituit ex mente SCHWENCKFELDTI.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua pulegii, Poley-Wasser / Eau de Pouliot &
Oleum destillatum Pulegii, Poley-Dehl / Huile de Pouliot, æque
ac aqua utero est dicatum.

EUPATORIUM.

Salia aromatica obtinet cæteris rigidiora, propterea
O o o convenit

convenit in obstructionibus & morbis chronicis ortis à crassa, terrestri acida viscosa materia. Datur decoctum & infusum.

℞. Eupator. Mij. agrimon. summit. absynth. ana p. ij. f. infusum ex vino ad affectus melancholicos.

℞. Eupator. Mij. coq. c. vino, adde camphoram & applica tumoribus hydropicis.

HYS-

EUPATORIUM, Eupatoria, à Rege Eupatore, unde regiam auctoritatem habere dicitur à PLINIO. Triplex potissimum recensetur, Eupatorium veterum, de quo infra; Eupatorium Mesues quod est Ageratum, & Eupatorium Avicennæ sive Cannabinum.

Ultimum vocatur alias EUPATORIUM ADULTERINUM PSEUDO EUPATORIUM, CANNABINA AQUATICA, HERBA ST. CUNIGUNDIS, TRIFOLIUM CORVINUM, CONSOLIDA CERVINA, Waßer-Dosten / Waßer-Hanff / Rünigs-Krauth / Rünigunden-Krauth / Alb-Krauth / Hirs-Künigel / Hirsch-Klee / Hirschwund-Krauth / EUPATOIRE.

Est planta flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis (ex quibus longa capillamenta plerumque surgunt) constante multifidis, embryoni insidentibus & calyce longo, tereti, ac squamoso comprehensis. Embryo autem abit in semen pappis instructum.

Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. Eupatorium adulterinum I. B. 2. 1065. Vulgare Hepatorium Dod. Pempt. 28.

Ad scrobes rivulorum, stagnantium aquarum margines, fluviorumque ripas Julio & Augusto viget.

Planta hæc hepati & Lienis est dicata, in ictero & hydrope prodect, item in febribus tertianis & quartanis, urinam pellit & in tussi aliisque pectoris affectibus conducit. Remedium præterea constituit insigniter vulnerarium imprimis externum; Detergit cutim scabiei que medetur. Balneis & infusibus uterinis ad menses præsertim ciendos immiscetur. Ad Cephalæam in lixiviis adhibetur. Animalia venenata fugare dicitur, si in suffitu usurpetur.

EUPATORIUM MESUÆ vocatur alias AGERATIUM,
 ἄγριον

Α'γ'η'α'λ'ον, quod non senescat seu flores diu servet. HERBA JULIA à mense, quo floret, BALSAMITA MINOR, COSTUS HORTENSIS MINOR, HERBA DIVÆ MARIAE, Leber oder Fleiner Costen-Balsam / Frembd Leber-Krauth / Klein Welsch Frauen-Krauth. EUPATOIRE DE MESUE.

Est species Ptarmicæ, planta scilicet flore radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, corona vero ex semi flosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Embryones autem abeunt in semina tenuia. His notis addenda sunt folia vel denticulata, vel in amplas lacinias divisa & à millefolii incisuris aliena.

Ptarmica lutea suaveolens Tourn. I. R. H. cl. 14. S. 3. g. 9. Ageratum foliis ferratis C. B. Pin. 221. Ageratum plerisque, Herba Julia quibusdam I. B. 3. 142. Balsamita minor Dod. Pempt. 295.

In Gallia Narbonensi & Italia sponte nascitur, colitur in hortis floret Julio & Augusto.

Calefacit, attenuat, abstergit, aperit, resolvit, bilemque evacuat, ut SCHWENCKFELDT loquitur. Hepatica est planta atque splenetica, ictero medetur, atque Hydropi; laudatur contra febres inveteratas præsertim quartanam. Vi stomachica quoque gaudet, colicæ conducit & passioni hystericæ. Vermes necat tum interne tum externe,

HYSSOPUS.

Ob vim aromaticam temperatiorem in specie pectori dicatur, tussi & pleuritidi medetur. Datur decoctum infusum syr. simpl. & comp. aq. dest.

℞. Hyssop. Mij. coq. in vino, add. colatur. syr. propr. contra tussim.

℞. Aq. Hyssop. Menth ana ʒij. asthmatic. ʒvj. — gumm. ammom. ʒiʒ. syr. Nicot. ʒiiij. M. cape cochleatim. ad asthma.

℞. Aq. Hyssop. applica oculis ad sugillata, add aq. puleg.

Υσσωπός, a madefaciendo faciem, *Hyssopus*, *Isop* / *Eisop* / *Kloster oder Kirch* . *Hyssop* / *Eisewig* / *Hisope*.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est subrotundum, bifidum, inferius vero in tres partes divisum, media cochlearis instar excavata, bicuspide & quodammodo alata. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina oblonga in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. *Hyssopus* flore fructuque carens foliis longis angustis & odore grato dignosci solet.

Hyssopus *Officinarum* cærulea seu spicata C. B. Pin. 217. *Hyssopus* vulgaris spicatus, angustifolius flore cæruleo L. B. 3. 274. *Hyssopus* vulgaris Dod. Pempt. 287.

Colitur in hortis. Floret Junio Julioque. In usum veniunt folia cum floribus Augusto collecta. Magnas habere vires in apoplexia & epilepsia tum curatorie tum præservatorie fertur. Aperit præterea, obstructions viscerum reserat, in ictero, Hydrope calculo prodest, menses secundinas ut & urinam pellit. Ob vim balsamicam refocillat. Oculorum sugillationibus, uteri impuritatibus, auriumque tinnitui medetur. Odontalgia quoque conducit. In febribus, Balneis, fomentis, clysteribus ad colicam & uteri affectus immiscetur.

IN OFFICINIS EXTAT

Aqua Hyssopi ex herba & floribus destillata, *Hyssop* . *Wasser* / *Eau d'Hisope*.

Syrupus Hyssopi, *Hyssop* . *Syrup* / *Sirop d'Hisope*. Pectoralis est & in asthma commendatur, præsertim ubi pituita & serum crassum peccat.

Tabulæ de Hyssopo, *Hyssop* oder *Kirch* . *Hyssop* . *Täfflein* / *Tablettes d'Hisope*, ad incidendam pituitam crassam ad tussim & ad asthma commendantur, expectorationem promovent. Dosis ad drachmam, drachmas duas &c.

POLIUM.

Celebre est in Uteri vitiis ab obstructionibus. Sylvius adscribit vim antepilepticam [Prax. Med. l. 2. c. 20. §. 148. p. m. 427. ubi inter celebratissima medicamenta antepileptica post rutam, polio montano secundum locum tribuit] veteres vero vim contra maniam & noctambulationem.

℞. Summit. polij. q. v. affund. vin. f. infus. uterinum.

℞. Polij q. v. f. cucupha imponenda capiti.

Πολιδόν, quasi canum, nam ex DIOSCORIDE corymbos habet cæsariei canæ similes. POLIUM MONTANUM, Berg. Polium / Berg. Poley. POLIUM.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labii superioris locum occupant stamina; Labium vero inferius in quinque partes dividitur. Ex calyce autem surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addendum est flores polii in capitulum collectos summis ramulis & caulibus innasce.

Polium montanum luteum C. B. Pin. 220. Tabern. Ic. 364. Polium luteum Lob. Ic. 487.

Crescit in montibus regionum calidiorum, Languedocia, Provincia, Delphinatū &c. colitur in hortis, floret Julio & Augusto.

Polium rarius in usum trahitur, commendatur in obstructionibus, catarrhis, affectibus pectoris, menses & urinam ciet, in Hydrope & Ictero conducit. Recipitur in Theriacam, sunt qui illud quod ex Creta sive Candia affertur, præferunt; sed discrimen vix adest.

DICTAMNUS CRETICUS.

Polio accedit & cum pulegio ad partum promovendum commendatur.

O o o 3

℞. Dictamn.

℞. Dictamn. Cretic. 3℔. borrac. ʒj. f. pulv. dandus ex vino rutaceo ad partum promovendum.

℞. Dictamn. Cretic. puleg. polij. fabin. f. ex vino infus. ad part. promovendum.

℞. Fol. dictamn. p. j. infund. ▽ fervent, infusum forbillando cape ad mensium remoram.

Δίκταμνον, δίκταμνον, quidam hanc vocem ἀπὸ τῆ τίκλειν, alii ἀπὸ τῆ δίκλειν parere, JOH. BAUHINUS vero à monte Cretæ δίκλῆς & δάμνον deducit. Cretischer oder Candianischer Dictamn / Dictame de Candie, Dictame de Crete.

Inter Origani species refertur.

Origanum Creticum latifolium tomentosum seu Dictamnus Creticus Tourn. I. R. H. cl. 4. S. 3. g. 12. Dictamnus Creticus C. B. Pin. 222. Dictamnus Cretica seu vera I. B. 3. p. 2. 253. Dictamnium verum Dod. Pempt. 281.

In Creta provenit, Julio floret, colitur etiam in hortis.

In usu folia tomentosa & odorata. Vires obtinet attenuantes, aperientes, uterinas & Alexipharmacas, unde in Theriacam & Mithridatium recipitur. Externe ad spicula & res heterogeneas ex vulneribus extrahendas conducere dicitur, ea præsertim de causa, quod cervos sagittis ictos ad Dictamnium recurrere sicque spicula extrahere narretur.

MATRICARIA SEU PARTHENIUM.

Cæteris rigidior & penetrante Θ præfertur, & propterea ratione virtutis uterinæ polium & dictamnium superat, habet quoque blandam vim anodynam, quæ ex odore ad chamomillam nonnihil accedente cognoscitur. Succus in pluscula dosi datus alvum laxat.

℞. Matricar. artemis. flor. chamom. fabin. ana Mj. f. de

coct. ex ∇ & vino ad Uteri affectus. Ex eodem decocto f. etiam clyster carminans. Etiam cataplasomatis forma abdomini applicari potest post partum.

AR.

Παρθένιον, HERBA VIRGINEA, quod virginum morbis medeatur, MATRICARIA, MATRONELLA, MATRONARIA HERBA UTERINA à virtutibus, Mettram / Metram / Meter / Metter - Krauth / Matron - Krauth / Mutter - Krauth / Magd - Blum / Meyd - Blum / Sonnen - Uug / MATRICAIRE.

Est planta flore plerumque radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, Corona vero ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce semisphærico & quasi squamoso comprehensis. Embryones autem abeunt in semina oblonga thalamo affixa. His notis addendum flores quasi per fasciculos nasci & folia multifariam ac veluti per conjugationes secari.

Matricaria vulgaris seu sativa C. B. Pin. 133. Matricaria vulgo minus Parthenium L. B. 3. 129. Artemisia tenuifolia Tab. Ic. 8.

Nascitur in sepibus, hortis, secus veteres muros, locis gaudet ruderatis, floret æstivis mensibus.

Folia cum floribus in usu sunt. Vires obtinet Matricaria attenuantes, aperientes, incidentes & diureticas. Menses & secundinas atque lochia pellit, in passione Hysterica conducit. Colicos quoque dolores sedat, & flatus discutit. Rustici adversus nauseam, anorexiamque & dolores ventriculi folia recentia vel per se vel cum sale assumunt.

Succus matricariæ laudatur in quartana Hydrope & juxta quosdam in impotentia. Valet etiam in arthritide & vertigine. Externe ingreditur sacculos & clysteres carminativos contra colicam & tormina hysterica. In infantum morbis præsertim torminibus multum usurpatur. Imponitur mammis ad lac discutiendum, ad dolores capitis quoque usurpatur. Pessarium exinde factum menses ciet.

IN

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Matricariæ, Mettram oder Mutterkrauth • Waser / Eau de Matricaire.

Oleum Matricariæ, Mettram • Oehl / Huile de Matricaire, per coctionem paratum, in colica flatibus & uteri affectibus ut & doloribus post partum conducit.

ARTEMISIA

Virtutibus uterinis remissior est, quam matricaria. Carbo ad radicem repertus neque productum radice est, neque antepilepticus, ex observatione propria.

℞. Artemis. Mij. sem. cicer. r. ʒj. coq. cum ▽ propria destillata, exhibe contra dolores post partum, adde tantillum cinamomi si adsit virium prostratio.

℞. ⊖ artemis. ʒβ. exhibe ex decocto ficuum ad sudores movendos, præcipue in variolis & morbillis.

PLAN.

Ἀρτεμισία vel ab Artemi Mausoli Cariæ Regis uxore, vel ab Artemide Diana, quia succurrit parturientibus, *παρθένις, παρθένιον; PARTHENIUM, HERBA REGIA, OLUS REGIUM, MATER HERBARUM, CINGULUM ST. JOHANNIS, St. Johannes • Gürtel* / faciunt enim inde coronas & cingula, quibus corpus cingunt, inde nescio quæ carmina recitant, & vesperi in ignem St. Johannis conjiciunt, & sic ab omnibus malis se tutos putant; qua de re conferatur FUCHSIUS. Germanice vocatur etiam *Beyfuß* / quia lassitudinem præcavere fertur. Quidam autem id in jocum trahunt dicentes, non facile fatigatur, qui habet *Beyfuß* / hoc est quatuor pedes equi validi, videatur HOFFMANNUS de medicamentis officinalibus; *Buch / ARMOISE.*

Est planta flore flosculoso plurimis flosculis constante multifidis, embryoni insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Inter

Hosculos vero occurrunt, & embryones nudi in capillamentum bifidum desinentes, qui perinde ac embryo abeunt in semina Absinthii æmula: ab absinthio autem differt sola facie externa, nam florum discrimen oculos pene fugit.

Artemisia vulgaris major caule & flore purpurascens C. B. Pin. 137. Artemisia vulgaris l. B. 3. 184. Artemisia rubra Tabern. Icon. 7. Koster Buch. &

Artemisia vulgaris major caule ex viridi albicante Tourn. l. R. H. cl. 12. S. 3. g. 4. Artemisia alba Tabern. Icon. 8. Weiser Buch.

Differunt inter se ratione potissimum caulis ut & floris. Passim circa urbes, pagos, arces, muros in convallibus & montibus proveniunt florentes Julio & Augusto.

Utraque Artemisia in usum venit, frequentius tamen rubra & quidem tum summitates tum tota herba.

Attenuat artemisia, aperit & penetrat, Menses & Lochia promovet. Smuck & alii putant quod si artemisia ab inferiore parte sursum versus decidatur Artemisia menses supprimat, sin vero à parte superiori deorsum versus, eosdem promoveat: fides sit penes authores. Ex uterinis plantis est celeberrima, tam interne quam externe usurpata. In utero purificando sterilitateque corrigenda, mola, partu difficili, foetu mortuo exturbandis conducit, item in chlorosi & pallidis virginum coloribus. Laudatur quoque ad affectus urinarios ad obstructions viscerum, icterum & Hydropem. A TABERNÆMONTANO inter plantas vulnerarias ex propria experientia recensetur & præsertim in vulneribus Sclopetorum ejus decoctum tum externe tum interne usurpandum celebratur. In doloribus podagricis & arthriticis laudem obtinet, sunt enim, qui dicunt, radicem comestam subito intolerabiles lenire dolores. In contracturis & paralyfi artuum locum habere potest. Depradicatur à quibusdam in affectibus pectoris. Ingreditur Balnea & pediluvia uterina in mensibus ciendis & sterilitate arcenda. Commendantur Balnea Artemisiæ ad lassitudinem & imbecillitatem membrorum, vel ex itinere vel ex morbis contractam. Ingreditur quoque sacculos carminativos & antihystericos.

De CARBONIBUS ARTEMISIÆ, quæ nihil aliud sunt quam radices Artemisiæ annosæ, demortuæ atque ita exsiccatæ &

nigricantes, multa inter Authores disceptatio est. Quidam hos carbones colligendos esse ipso S. Johannis Baptistæ festo hora 12. meridiana suadent, alii ante solis ortum effodiendos & imprimis sub Artemisia rubra reperiundos censent. Hos jam tanquam antepilepticum mirum deprædicant, cum JOELE, PATÆO, ETTMÜLLERO &c. Reclamant autem alii & rem superstitionem anilem sapere asserunt, ita ut stultorum lapides Narren-Kohlen / hos carbones appellitent. Quod si aliquid etiam præstiterit, certe tamen non tantis laudibus virtus ipsorum celebranda carbonum, qui circa festum Joh. Baptistæ per aliquod reperiuntur tempus. Usurpantur autem tum interne tum etiam externe collo instar amuleti appensi. Reperiuntur etiam qui hanc plantam contra incantationes & veneficia facere sibi persuadent. Usus quoque Artemisiæ est culinaris dum summitatibus infarciuntur imprimis anseres tum jucunditatis, tum melioris digestionis gratia.

IN OFFICINIS ASSERVANTUR

Aqua Artemisiæ, Beyfuß-Wasser / Eau d'Armoise.

Syrupus Artemisiæ, Beyfuß-Syrup / Syrop d'Armoise, qui mensium obstructionibus, partui difficili & uteri suffocationibus medetur; communiter miscetur aliis remediis uterinis.

Sal. Artemisiæ, Beyfuß-Salz / Sel d'Armoise, quod nil peculiare obtinet.

PLANTÆ SALE AROMATICO VOLATILI OLEOSO CUM MULTO FIXO CONSTANTES.

SHOENANTHUS seu JUNCUS ODORATUS.

[Juncus odoratus aromaticus C. B. P. seu Gramen dactylon aromaticum, multiplici pannicula, spicis brevibus tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis. Plucken. Phyt.

Phyt. Est saporis acris amaricantis & suavis odoris fragrantis.] Dicitur etiam fœnum seu gramen camelorum.

Gratius est acoro & cum hoc felici successu præscribitur, additur quoque tanquam confortans infusis & decoctis diureticis contra hydropem v. c.

℞. Rad. gramin. ʒij. vincetoxic. ʒj. schoenanth. Mij. f. decoctum ex ∇ cui adhuc ferventi pro stimulo si opus sit add. rhabarb. ʒiij. colatur. edulcor. syr. ʒ. rad. aperient.

℞. Schoenanth. Mj. fantal. citr. ʒβ. rad. acori ʒj. f. infusum diureticum & stomachicum.

Σχοίνον, χοϊνάνθον, SCHOENANTHUM, PALEA DE METCHA, SQUINANTHUM, FOENUM CAMELORUM, STRAMEN CAMELORUM, quoniam ab Arabibus Camelis non tantummodo substernitur, sed & pro pabulo exhibetur. Camel-Hen/ Cameel-Stroh/ Squinanth/ SCHÆNANTHE OU JONC ODO-RANT.

Refertur ad Juncos, hos tamen & semen nondum omnimode descripti sunt. Appellatur interim

Juncus odoratus aromaticus C. B. Pin. II. Schoenanthos five Juncus odoratus L. B.

Ex Africa imprimis Arabia ejusque Provincia Nabathea & Ægypto præprimis adfertur.

Vix usurpatur quam ad confectiorem Theriacæ, ubi quidem flores solummodo aut summitates deberent adhiberi, sed Juncus ipse haud raro, & quidem quandoque absque floribus assumitur. Bene interim observandum ut genuina obtineatur. Virtutes cordiales alias ipsi cephalicæque adscribuntur & in referendis obstru-ctionibus confortandisque visceribus, flatibus discutiendis & men-sibus pellendis commendatur.

ABROTANUM MAS.

Hujus acredo aromatica graveolens pronunciat vim
Ppp 2 uteri-

uterinam, fragrantia vero camphorata sudoriferam in malignis, ob amaritiem vermes quoque expellit. Externe quoque laudatur ad alopeciam; junctum cum floribus chamomillæ & seminibus calidis vim acquirit anodynâ & uterinam.

℞. Abrotan. Matricar. fabin. ana Mj. rad. galang. ʒß. flor. chamom. p. ij. f. dec. Uterin.

℞. Θ abrot. ʒß. Camph gr. v. C. C. phil. præpar. ʒj. f. pulv. exhibendus ex decocto abrotani in febribus malignis.

RU.

Ἀβρότανον, ab ἄβρο & mollis quod aspectu tenerum, molle ac delicatum appareat, & τένω tendo, extendo, quod molle sit & longum vel extensum, vel quod gravem acremque odorem spiret, ἀπρότανον, ἀβήτανον. ABROTANUM alii dictum putant à βροτός mortalis, quasi diceret plantam immortalem, vel à βρώσκω comedo, quod comedi ob saporem ingratum nequeat. ABROTANUM MAS, Stab. Wurk / Schof. Wurk / ab effectu Gert / Gert. Wurk / Girt. Wurk / Garten. Heyl / AURONNE, GARDE ROBBE.

Est planta floribus & fructibus Absinthii à quo sola facie externa differt.

Abrotanum mas vulgare angustifolium majus C. B. Pin. 136. Abrotanum vulgare I. B. 3. 129. Abrotanum mas Dod. Pempt. 21.

Colitur in hortis, floret Augusto, folia atque summitates potissimum in usu.

Cum Absinthio multum conspirat. Incidit, aperit, abstergit, discutit putredini resistit. Celebratur tanquam remedium Hepaticum, convenit asthmaticis, convulsis, & Ischiadicis. Venenorum habetur antidotum præsertim eorum quibus coitus inhibetur. In affectibus renum & vesicæ quoque commendatur, item in ictero & quartana. Extrinsecus in ossibus exsiccandis roborandisque item in Alopecia. In culinâ usurpatur ad farcimina, quam-

vis

vis sint qui ejus usum ventriculo infestum & molestum esse asferant.

IN OFFICINIS REPERITUR

Aqua Abrotani, Stabmurg-Wasser / Eau d'Auronne, ex foliis atque summitatibus destillata, quæ præter alias virtutes etiam ad passionem cardiacam infantum laudatur. &

Oleum Abrotani coctum, Stabmurg-Dehl / Huile d'Auronne, quod ad dolores abdominis & intestinorum placandos commendatur membris paralyticis conducit & in alopecia sive defluvio capillorum laudatur.

R U T A.

Vim aromaticam penetrantem & ruosam obtinent, cui quoque Θ ia fixa sunt associata, unde in morbis chronicis contumacissimis & malignis indubitatum promittit effectum. Præ cæteris laudatur in peste, variolis, morbillis, epilepsia, passione hysterica & affectibus soporosis. Confer quoque in gonorrhœa, satyriasi & priapismo. Externe gangrænæ & sphacelo succurrit. Vis concentrata consistit in capsulis seminalibus.

℞. Rut. sabin. abrotan. ana Mj. coq. c. cerevisia & cape cum tinctura castorei vel croci, contra omnes obstructions uteri.

℞. Capsul. seminal. rutæ q. v. affunde aquam propriam ruosam f. essentia, exhibe in morbis malignis cum camphora, vel ru vini camphorato & theriaca.

℞. Rut. affund. acet. q. v. cape tempore pestis pro præservatione. add. rad. Zedoariæ, Camphor.

SA-

Est planta flore rosaceo quatuor plerumque petalis cavis & in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum subrotundum ut plurimum tetragonum, ex quatuor sæpe capsulis axi affixis compositum, seminibusque foetum non raro reniformibus aut angulatis. Juxta ipsum **TOURNEFORTIUM** Ruta utique pertineret ad flores cruciformes nisi sæpe floribus esset pentapetalis. In usum promiscue veniunt sequentes species.

Ruta hortensis latifolia C. B. Pin. 336. Ruta sativa vel hortensis I. B. 3. 197. Ruta graveolens hortensis Dod. Pempt. 119.

&

Ruta hortensis altera C. B. Pin. 336. Ruta tenuifolia Tabern. Icon. 133.

Colitur in hortis, floret Junio. In usum cedit herba ac summitates cum seminibus. Incidit & attenuat, alexipharmaca est cephalica, stomachica, carminativa & anodyna. Singularem antipathiam cum bufonibus & serpentibus obtinere creditur, narrant hinc mustelam cum serpente dimicaturam manducare solere Rutam & se præmunire, quoniam itaque bufonibus adversus existit juxta salviam, cui sæpius subsunt, plantari potest. Jungitur etiam Salviae in potu ob vim venenis resistendi, unde **SALERNITANI** canunt

Salvia cum Ruta faciunt Tibi pocula tuta.

Usurpatur jejuno ventriculo ad arcendum contagium & est Rusticorum Theriaca.

Rutam ad libidinem stimulare sexum muliebrem cum aliis tradit **TABERNÆMONTANUS**, unde de hac aliisque virtutibus **SALERNITANI** differunt,

*Nobilitas Rutæ hæc, quod lumina reddat acuta,
Auxilio Rutæ vir quippe videbis acute,
Cruda comesta recens Oculos caligine purgat.
Ruta Viris minuit Venerem, Mulieribus addit.
Ruta facit castum dat lumen & ingerit astum
Cocta Ruta facit de pulicibus loca tuta.*

Virtute anthelmintica Ruta quoque gaudet. Externe nervinas vires exserit, in carbunculis & ictibus serpentum ut & in fistulis laudatur

laudatur. Ophthalmicam virtutem externe possidet, unde vel appensa oculos à Variolis præservare fertur. Recens contusa cum fermento panis capiti, item plantis pedum contra cephalalgiam & æstus febrium malignarum & ardentium non sine successu applicatur; imprimis ubi metuendæ sunt agrypnæ.

Ruta si in vino coquatur & hoc decocto os eluatur calide, contra dentium cariem & gingivas scorbuticas valet. Commendatur ad ictus vesparum apum aliorumque insectorum. Mammis imposita lac discutit, Verrucas abigit. Contra pediculos laudatur. Ad olfaciendum quoque inservit præsertim iis, qui circa ægros & mortuos versantur. Nimius usus internus gravidis noxius est, externe nimium olfacta Cephalalgiam inducit.

IN OFFICINIS PROSTANT

Acetum Rutaceum, *Rauten* • *Esig* / *Vinaigre de Rhuë*, quod Bezoardicum est & externe naribus olfaciendum admovetur.

Aqua Rutæ destillata, ex planta cum cauliculis Majo collectis, *Rauten* • *Wasser* / *Eau de Rhuë*, laudatur imprimis singulariter ad affectus uterinos à mensibus retentis, expertum quoque est remedium ophthalmicum.

Oleum Rutæ coctum, *Rauten* • *Dehl* / *Huile de Rhuë*. Inter linimenta carminativa primatum fere tenet, calefacit discutit, dolorem colicum sedat cum clysteribus injectum. Nervorum & spinæ resolutioni convulsionibusque medetur.

Oleum Rutæ destillatum, destillat *Rauten* • *Dehl* / *Huile de Rhuë distillé*. Convenit in doloribus colicis, morbis flatulentis præsertim ubi Epilepsiæ metus. Exinde quoque cum oleo Nucistæ paratur.

Balsamum Rutæ, *Rauten* • *Balsam* / *Beaume de Ruë*, in Cephalalgia & præservatione à morbis malignis & pestilentialibus usurpari solitum.

S A B I N A.

Salia volatilia oleosa fixis juncta inclusa habet resinæ; hinc vermes, urinam, præcipue vero menses & foetum promovet, & ob resinam inter vulneraria ponitur. In

In verme umbilicali dicitur specifica. [Si pulvis sabinae cum vitro veneto & melle subigitur & in putamine nucis dimidiatae infantis umbilico per noctem applicatur. De hoc verme umbilicali vid. Sennert. Pract. l. 3. part. x. c. 4. p. m. 984. & Hœfer. Hercul. Medico. l. 7. p. m. 352.]

℞. ʒ. dest. sabin. gt. ij. extract. inspiss. croc. myrrh castor. ana gr. vij. f. pil ad menses provocand.

℞. Rut. matricar. sabin. ana Mß. Myrrh. zij. Croc. 3ß. f. pessus syndoni involvendus &c.

MAR-

SABINA à Sabinorum regione, in qua copiose crescebat, *Βεῖδος*, quia *Βεῖδως* tarde in altum crescit, SAVINA, SAVINARIA, Sevenbaum / Eadebaum / Siebenbaum / Mägdebaum / Jungfern-Rosmarin / Kindermord / SABINE OU SAVINIER.

Est frutex flore amentaceo extremitati ramorum innascente sed sterili, embryones autem seu baccæ baccis juniperi similes nucleis turgent angulosi & asperis. Addatur propria Sabinae facies

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. Savina mas Tab. Ic. 945. Savina Mirifolio Cord. Colitur in hortis, perpetuo viret. Folia in usu præsertim sunt, penetrant, incidunt, discutunt, abstergunt, acidum vulnorum externorum & internorum corrigunt & res extraneas extrahunt. Commendantur in ulceribus fistulosis cancris & dysepuloticis, imprimis pulvis eorum cum spiritu Vini adhibitus. Laudatur quoque Sabina in ictero & Hydrope, Asthmate & arthritide, ut & in vermibus. Ob vim promovendi & enecandi partum suspectis mulierculis nunquam dari debet. Ingreditur balnea uterina in mensium obstructionibus & foetu mortuo expellendo, ut & in fluore albo, pulvis Sabinae in consumendis tumoribus & verrucis multum laudatur, cum emplastro diapalmæ clavos pedum abigit.

Decoctum Sabinae vel in aqua vel in vino odontalgiam sedat. Suffitus Sabinae laudatur in erisypelate ut & tenesmo. Tineas arcet Sabina.

IN

IN OFFICINIS ASSERVATUR

Aqua Sabinae, Sevenbaum-Wasser / Eau de Sabine, quæ præter vim emmenagogam, sanguinem congruatum dissolvit cutisque maculas delet.

Extractum Sabinae, Sevenbaum-Extract / Extrait de Sabine, dosi ad ℥j. ℥ij. &c.

Oleum Sabinae destillatum, Sevenbaum-Dehl / Huile de Sabine, fortiter menses movet, foetumque pellit interne sumptum ad aliquot guttas, adeoque personis suspectis minime dandum. Externe resolvit tumores scirrhosos & clavos discutit, doloresque sopit, conducit quoque in vermibus, ut & dolore dentium.

MARRUBIUM seu PRASSIUM.

Præter cæteras virtutes quas cum abrotano aliisque graveolentibus communes habet, possidet quid singulare in tussi asthmate & ictero flavo ex mucagine orto.

℞. Cichor. tarax. ana ℥ij. chelid. maj. ℥j. Endiv. Mij. Marrub. Mß. ꝑri. ℥ß. coq. ex ∇ & vino, infunde fol. fenn. ℥vj. contra icterum.

TANA-

MARRUBIUM dicitur quasi macidorum rubus, quoniam in hectica conducit, πρᾶσιον, PRASIUM OFFICINARUM, MARRUBIUM VULGARE, MARRUBIUM FOEMINA, MARRUBIUM ALBUM, Andorn / Weißer Gemeiner Andorn / MARRUBE.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum est & bicornè, inferius vero tripartitum. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floriscalyx fuit recondita.

Marrubium album vulgare C. B. Pin. 230. Marrubium album I. B. 3. 316. Marrubium album sive Prassium album Tab. Icon. 539.

Multis locis frequens sponte crescit incultum juxta vias, in ruderatis, floret Junio & Julio.

Marrubium, quod folia in usum suppeditat, insigne est solvens, aperiens atque abstergens. Convenit in cachexia, lochiis & mensibus pellendis, aliisque uteri morbis. Roborat porro ventriculum, appetitum excitat, vermes necat, renes expurgat & in hydrope prodest. A quibusdam phthificis & hecticis multum commendatur.

IN OFFICINIS EXTANT

Aqua Marrubii, Andorn-Wasser Eau de Marrube.

Syrupus de Prasio, Andorn Syrop / Syrop de Marrube, qui pectoralis conducit in affectibus à materia crassa & viscida oriundis, in tussi asthmate & expectoratione promovenda.

TANACETUM.

Convenit cum cæteris nempe sabina, matricaria abrotano. Hodie in uterina balnea, cum nepetha, pulegio, menthaistro ingreditur, decocta minus.

AB-

TANACETUM forte à Tanaco, quo nomine Parthenium appellatum fuisse PLINIUS testatur, Ἀθάνατος λεπτοφυλλος, Ἀθάνατος quasi IMMORTALIS, THANASIA, HERBA MARIAE, Rheinfarn / Weinfarn / Wurmkraut / Wurmfar / Kewierblumen / TANESIE.

Est planta flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis constante multifidis embryoni insidentibus & calyce squamoso & quasi hemisphærico comprehensis. Embryo autem abit in semen pappis nequaquam instructum. His notis addendi sunt flores crassi in capitulum quoddam collecti.

Tanacetum vulgare luteum C. B. Pin. 132. Tanacetum vulgare ficeo luteo L. B. 3. 134. Tanacetum Millefolii foliis Lob. Ic. 749.

Passim

Passim ad margines agrorum pratorumque secus fossas & aggeres occurrit, florer Julio & Augusto.

In usu herba cum floribus & semen. Incidit, attenuat, aperit, & ob amaritiem putredini resistit, & vermibus adversatur hinc communiter agyrtae pulveres anthelminticos exinde parant. Vulnerarium præterea est Tanacetum, uterinum, nephriticum, stomachicum, febrifugum, & anticachecticum. Semen laudatur in flatibus & vermibus atque hydrope.

Decoctum Tanaceti in Atrophia membrorum celebratur. Succus in vulneribus & ulceribus inveteratis & dysepuloticis ut & rimis atque fissuris manuum & pedum commendatur. Sunt è mulierculis, quæ ad abortum præcavendum sæpe applicant partibus genitalibus tanacetum in manu calefactum.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua Tanaceti, Reinsarnkraut-Wasser / Eau de Tanesie.

Oleum Tanaceti, Reinsarn-Dehl / Huile de Tanesie. Commendatur in Lumbricis & mensium obstructionibus tum interne ad aliquot guttas tum externe.

℞. Pulv. Tanac. ʒij. Corall. r. C. C. ust. Semin. Cyn. ana ʒj. Cort. Aurant. Rhabarb. ana ʒß. rad. Zedoar. ʒj. Msc. f. pulv. cujus dosis ʒß. Usurpatur autem potissimum Luna decresciente.

ABSYNTHIUM.

Ob sal volatile oleosum cum multis fixis sociatum, convenit in morbis chronicis tanquam polychrestum, in specie est stomachicum, antihydopicum, antifebrile, anticolicum, antihystericum, anthelminticum: ob nimiam sui graveolentiam accersere dicitur somnum.

Datur infus. ~. Essent. Θ. syr. conserv.

℞. Summit. abs. p. ij. menth. rorismar. ana Mß. galang. Zedoar. Zinz. ana ʒj. sem. foenic. ʒß. cinam. ʒv. Cort. aurant. ʒß. f. infus. cum vino ad cachexias quascunque.

Qqq 2

℞. Θ

℞. Θ absynth. ʒj. Oc. ℥ gr. xv. L. O. g. j. ʒo junip. gt. ij. M. f. p. contra febres tertianas.

℞. Θ absynth. ʒj. succi limon. cochl. j M. exhibe in crebro vomitu. [Insigniter laudat River. Prax. l. 9. c. 7. p. m. 284. ubi nominat remedium præstantissimum, præsertim in vomitu, qui à febribus malignis solet contingere: & exemplis id confirmat. Cent. 1. obs. 15. & Cent. 2. obs. 99.]

℞. Elix. propr. 3ʒ. Essent. absynth. 3j. f. mixtura in appetitu prostrato.

℞. Vin. absynthit. cape per totum tempus curationis febris tertianæ, it. ad anorexiam.

AB-

ABSINTHIUM ἀψίνθιον, ἀψίνθιον, quasi planta minime grata, *Wermuth* / *Wermuth* / quasi *Wehr den Muth* / quoniam somnolentum reddit & impigrum ac venerem retundit, *Wurmtodt* / *Wermuth* / quasi *Wehr-Unmuth* / ABSINTHE.

Est planta flore flosculoso sed exiguo, plurimis scilicet flosculis constante multifidis, embryoni insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Embryo autem abit in semen pappis nequaquam instructum. His notis addenda totius plantæ facies.

Absinthium Ponticum seu Romanum Officinarum seu Dioscoridis C. B. Pin. 138. Absinthium vulgare majus I. B. 3. 168. Absinthium latifolium Dod. Pempt. 23. Absinthium commune seu rusticum *Gemeiner Wermuth* / ABSINTHE ORDINAIRE.

Multis in locis hodie seritur, sponte quoque provenit in hortis imprimis vero Alpibus, floret Julio & Augusto.

Folia ac summitates in usum veniunt. Remedium est polychrestum, aperit, attenuat, incidit, anticachecticum, hepaticum, spleneticum, verum bilis, ut quidam loquitur, & sanguinis condimentum, viscera insigniter roborans. Sudorem ciet, putredini ac ipsi etiam pesti, ut loquitur J. MICH. FEHR. in *HIERA PIERA* seu *ANALECTIS DE ABSINTHIO*, resistit; obesitatem minuit, fecunditatem parit, in paralyti & surditate præstans, hydro-

hydropicorum & arthriticorum ichores absument, vermes enecat erapulam & maris nauseam tollit, somnumque inducit, tum interne præsertim cum vino sumptum, tum extrinsecus plantis pedum ac temporibus impositum. Succus absinthii ad ulcera putrida & cancrofa conducit, siccatur, extergit & adstringit. Decoctum capitis furfures & tineam tollit, pediculosque profligat. Curiosum, si verum est, quod infantes recens nati antequam 12. septimanas excedunt, si absinthii succo undique, præsertim manus & pedes, perungantur, nullam neque à frigore neque à calore læsionem per totam vitam sentiant. Prodest porro succus ut & decoctum ad scabiem vitiligines & herpes. Auditum quoque acuit suffitus Absinthii auribus exceptus. Aqua in qua Absinthium maceratum fuit, ut & succus Absinthii pavimentis vestibis & linteis aspersus, curculionum, tinearum, pulicum generationem prohibet. Suffitus ex Absinthio muscas necat & abigit.

Plura qui desiderat adeat supra citatum FEHRIUM & BARTHOL. ZORN in BOTANOLOGIA MEDICA.

IN PHARMACOPOLIIS PROSTANT SEQUENTIA
PRÆPARATA.

Aqua stillatitia ex summitatibus & foliis recentibus destillata, *Wermuth-Wasser* / *Eau d'Absinthe*, insipida fere, cui tamen pluri-
mi decoctum præferunt.

Succus Absinthii inspissatus, *Ausgetrockneter Wermuth-Safft* / *Suc d'Absinthe*, qui alias quoque vocatur *Extractum Absinthii*, *Wermuth-Extract* / *Extrait d'Absinthe*, quod pilulas ingreditur in affectibus ventriculi &c. ex hoc diluto cum vino potest ex tempore parari vinum Absinthites.

Essentia Absinthii, eaque multiplex *Essentia Absinthii simplex*, *gemeine Wermuth-Essenz* / *Essence d'Absinthe*. Stomacho medetur, appetitum excitat, coctionemque promovet atque hepati prodest, aliasque virtutes quas ipsum Absinthium habet possidet. Datur ad triginta quadraginta guttas, vel per se vel etiam cum aliis miscetur.

Essentia Absinthii composita, *Vermischte Wermuth-Essenz* / *Essence d'Absinthe composée*, iisdem sed majoribus ac prior gaudet virtutibus, datur eadem dosi.

Essentia Absinthii Zwelfferi, Zwelffers Bermuth-Essenz/ Essence d'Absinthe composée de Zwelffer. Hanc essentiam tanquam integras sui vegetabilis vires referentem aliis longe præfert author. Datur eadem dosi sed acrior est & magis nauseosa, unde macilentis non usque adeo conveniens.

Oleum Absinthii coctum, Bermuth-Dehl/ Huile d'Absinthe, calefacit & roborat ventriculum, flatus dissipat & lumbricos necat

Oleum destillatum Absinthii, destillirt Bermuth-Dehl/ Huile d'Absinthe distillée, in affectibus ventriculi convenit interne & externe, in febribus & unguentis stomachicis prodest.

Oleum stomachicum Cratonis, Magen-Dehl/ Huile stomachale de Craton, quod principaliter ex Absinthio constat, in affectibus ventriculi, ejus doloribus, flatibus &c. conducit.

Syrupus de Absinthio, Bermuth-Syrup/ Syrop d'Absinthe. Viscerum confortationi imprimis autem stomacho dicatus appetitum excitat, concoctionem juvat, flatusque pellit.

Dari potest ad unum alterumque cochleare vel per se, quod tamen ob amaritatem multi detrectant, vel cum Vino. Ut plurimum electuariis stomachicis & febrifugis, si propter palatum licet, jungitur.

Sal Absinthii, Bermuth-Salz/ Sel d'Absinthe. Paratur per incinerationem Absinthii & elixivationem, adeoque ad alcalina pertinet salia. Ne autem facile lique scat per additionem sulphuris desuper deflagrandi in crystallos redigitur adeoque castratur. Laudatur ad aperiendas obstructions, humores crassos attenuandos, viscidos incidendos & ad putredinem tollendam. Stomacho quoque medetur, appetitum excitat & vomitum compescit, in febribus multum commendatur etiam continuis, ut & in Ictero & Hydrope. Quicquid autem sit, à reliquis salibus plantarum fixis ratione virium non discrepat. Dosis Salis à ℥j, ad ʒj.

Tandem quoque mentio facienda *Vini* istius, quod per infusionem Absinthii solius, vel cum aliis remixti, in vino cum vel absque uvis paratur & vocatur *Vinum Absinthites, Bermuth-Wein/ Vin d'Absinthe.* Prostant hunc in finem *Species pro vino Absinthiaco, Species zum Bermuth-Wein/ Poudre pour le Vin d'Absinthe.* Stomacho potissimum medetur, digestionem juvat & appetitum excitat, urinam ciet & obstructions reserat, in ictero & hydrope conducit,

ducit, Lumbricos necat & venenis, contagioque resistit. Sunt qui ad amarorem mitigandum Absinthium ante infusionem in aquam ferventem conjiciunt. Nocet ficcioris constitutionis hominibus, neque tempore matutino multum debet assumi.

℞. Summit. Absinth. fol. Card. Bened. ana mj. Summit. Centaur. min. Mß. Rad. Helen. ziiij. Pom. Citr. vel Aurant. Caryoph. & Cinam. transfix. No. 1. infund. in fßjv. Vin. gener. stent per diem. Fit inde vinum egregie stomachicum post febres intermittentes imprimis utile.

ABSINTHIUM PONTICUM.

Virtute est remissius absynthio vulgari, sed vim habet diureticam specificam ob quam hydropicis valde convenit.

℞. Absynth. pont. Mj. Card. B. Mj. Cent. min. Mß. lign. assatras zij. f. infus. in vino contra hydropem, ad diuresin movendam.

ABSINTHIUM PONTICUM, ἀψίνθιον πόντικον, quoniam in ponto maxima ejus copia, ABSINTHIUM ITALICUM, ROMANUM, NOBILE & HORTENSE. Welscher Römischer Wermuth/ Pontischer Wermuth/ Alb. Krauth/ quoniam ad incubum præservandum facere dicitur. PETIT ABSINTHE.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum C. B. Pin. 138. Absinthium Ponticum vulgare folio inferius albo L. B. 3. 175. Absinthium tenuifolium Dod. Pempt. 24.

Provenit maxime in Ponto. Hodie tamen in Hungaria Bohemia, Silesia &c. reperiri dicunt, quamvis sint, qui distinguant inter Ponticum & in modo dictis regionibus proveniens. Colitur in hortis florens Augusto.

Herba minus est in usu quam Absynthium vulgare, attamen à quibusdam ratione virtutis carminativa præfertur.

PLAN.

PLANTÆ SALE AROMATICO
CUM PAUCA RESINA
CONSTANTES.

CHAMÆPITYS.

Ob resinofum seu piceum illud, quod tam ex sapore quam odore percipitur anodyna & nervina est & in doloribus arthriticis & ischiaticis specifica est, in asthmate convulsivo singulariter convenit, ab aliis in mictu cruento & catarrhis laudatur.

℞. Chamædr. chamæpit. ana Mj. Cent. min. Mß. coq. ex aqua seu vino dulci contra arthritidem, podagram & ischuriam, si vinum suspectum videatur, decoq. in sero lactis.

BO.

Χαμαίπιλος, quasi Pinus humilis, χαμαιπέυκη, IVA, VA
ARTHETICA & MOSCHATA, AJUGA ABIGA, & IBIGA,
THUS TERRÆ, HERBA APOPLECTICA, Erd-Pin/ Feld-
Cypressen/ Schlag-Kräutlein / IVETTE.

Est planta flore monopetalo unilabiato, in tres partes diviso, quarum media bifida est, labii superioris locum occupantibus denticulis. Ex floris fundo surgit pistillum quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina oblonga in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. Addendum est flores Chamæpytios sparsim in foliorum alis nasci non vero verticillatim.

Chamæpytis lutea vulgaris sive folio bifido C. B. Pin. 249.
Chamæpytis vulgaris odorata flore luteo I. B. 3. 295. Ajuga sive Chamæpytis mas Dioscoridis Lob. Ic. 382.

Crescit locis aridis arenosis & incultis, floret Julio.

Chamæpytis conducit quoque in apoplexia epilepsia, vertigine

gine paralyſi pareſi, ſcorbuto & ictero. Vulnera, recens præſertim, glutinat & putreſcentia ſanat, tumoresque mammarum diſcutit.

IN OFFICINIS HABETUR

*Aqua Chamæpyteos ſive Ivæ artheticae, Erd-Pin oder Schlag-
Kräutlein-Waſer / Eau d'Ivette.* &

Extractum Chamæpyteos, Erdpin-Extract / Extrait d'Ivette
quod datur ad ʒſ. ʒj. &c.

BOTRYS.

Virtute incidente diſcutiente potentior eſt quam chamæpitys, unde in flatulentia hypochondriaca, præcipue infantum expertiſſimum eſt remedium: laudatur quoque in tuſſi, aſthmate & vitiis pulmonum.

R. Botrys Mij. coq. in vin. add. Mell. q. ſ. ad orthopnoeam ſingulis diebus capiendum.

Aqua botrys detur cochleatim ad inflationem hypochondriacam infantum.

LAU-

Botrys, UVA HERBA à diſpoſitione floris atque ſeminis, ARTEMISIA TURCICA, PATIENTIA, Trauben-Kraut / Botrys-Kraut / Lungen-Krauth / Schaben-Motten-Krauth / PIMENT.

Eſt planta flore apetalò, plurimis ſtaminibus conſtante ex calyce multifido ſurgentibus. Piſtillum autem abit in ſemen orbiculatum & planum, in capsula veluti ſtelliformi, quæ floris calyx fuit, reconditum.

Chenopodium Ambroſioides folio ſinuato Tourn. I. R. H. cl. 15. S. 2. g. 4. Botrys Ambroſioides vulgaris C. B. Pin. 138. Botrys Dod. Pempt. 34.

Sponte naſcitur in arenolis Italiæ & Galloprovinciæ locis, in hortis ex deciduis ſeminibus facile propagatur. Floret Julio.

R r r

Botrys

Botrys obstructions viscerum referat, conducit in Ictero & Hydrope. Menses lochiaque pellit, & passionem Hystericam sedat. Adhibetur ad pollincturas. Ob odorem vestimenta à tineis præservat. Antidotum dicitur esse Aconiti,

LAURI FOLIA.

Respondent virtute baccis lauri, licet baccæ ob olei copiam vim potentiores anodynas habeant, quas vide supra.

℞. Fol. laur. Mj. cort. lign. sassafr. ʒij. f. infusum diureticum, hydropicis utile.

Corbeer, Blätter FEUILLES de LAURIER. Tanquam condimentum plus culinis quam usui Medico inserviunt, cum vix non in omnibus ferculis adhibeantur. Quod coronæ exinde formantur, supra jam dictum fuit. Has imponebant tum ad ebrietatem arcendam, tum ut se præcaverent à fulmine. Intactam enim ab eodem manere laurum fabulabantur. Id quod experientia falsum deprehendit. Folia devorata quidam ad ebrietatem arcendam laudant. Ad vesicarum apumque ictus commendantur suffitus, menses provocat. Adhiberi possunt in clysteribus & sacculis carminativis ut & fomentis.

PLANTÆ SALE BLANDO CUM PAUCO VOLATILI CON- STANTES.

AGRIMONIA.

Ob blanda sua salia tam fixa quam volatilia egregium est deobstruens in morbis chronicis, incidens sanguinis impuritates acidas & terrestres, easque per urinam expellens,
unde

unde quoque in mictu cruento specificè laudatur. Externe convenit in uteri procidentia ut & tumore scroti. Datur decoct. infus. extr. essent.

℞. Agrimon. & hyperic. coque ex vino seu cerevisia contra mictum cruentum, a sanguine iusto acidiorè.

℞. Agrimon. fol. plantag. ana Mj. rad. liquir. ʒß. coq. in aq. ferrarior. ʒxij. add. mell. rosac. q. s. extr. aloës ʒß. f. injectio in penem, contra mictum cruentum.

℞. Agrimon. fumar. capill. ʒis ana Mß. rad. Cichor. fœnic. ana ʒj. ir. flor. ʒß. fol. fenn. ʒvj. rhabarb. ʒij. Cort. aurant. ʒiij. ☉ ☿ri. ʒj. M. f. infusum contra hydropem.

THEA

Επαλώριον, ήπαλώριον, ήπαλίτις, EUPATORIUM VETERUM
HEPATORIUM, quod hepati medeatur, LAPPULA HEPATICA, MARMORELLA CONCORDIA, Agrimonien / Odermennig / Aggermennig / Leberfletten / Steinwurk / Bruchwurk, AIGREMOINE.

Est planta flore rosaceo plurimis scilicet petalis in orbem positis constante calyci insidentibus. Calyx autem abit in fructum plerumque oblongum veluti echinatum uno vel altero semine oblongo ut plurimum foetum.

Agrimonia Officinarum Tourn. I. R. H. cl. 6. S. 9. g. 3. Agrimonia seu Eupatorium I. B. 2. 398. Eupatorium veterum sive Agrimonia C. B. Pin. 321. Agrimonia sive Eupatorium Dod. Pempt. 28.

In satorum & viarum marginibus circa sepes & in pratis passim provenit. Æstate floret, semen Autumno maturescit. Herba potissimum in usu, quæ verno tempore, quo maxime est odorata, colligi debet ex mente TRAGI.

Calefacit, siccatur, detergit, subadstringit, unde una ex præcipuis hepaticis & spleneticis est, ad febres, icterum, Hydropem, mensium suppressionem celebratur. Planta quoque est vulneraria, laudatur in quibusvis exulcerationibus internis, hæmoptysi, ut &

Rrr 2

externis

externis. Ingreditur potiones vulnerarias. Conducit in vulneribus & ulceribus mundificandis & detergendis, in ulceribus manantibus & sinuosis, fistulis & ulceribus canerosis &c. Laudatur ad exulcerationes oris, crurumque. In gonorrhœa virulenta, fluore albo, imo ipsa Lue venerea ad dolores artuum mitigandos celebratur. Nervos luxatos restituit, & recens vel sicca juxta **TRAGUM** cum fursuribus triticeis in vino cocta luxationibus medetur. Radix helonii cum herba agrimonie decocta in pernionibus confert. Pediluvia ad abigendam lassitudinem, & lixivium Cephalicum ad sordes capitis detergendas ingreditur. Cum aceto impastata verrucas tollere dicitur. In pulvere data ad ʒj. &c. in incontinentia urinæ laudatur. Sunt, qui dicunt Agrimoniam pulvinari subjectam dormientem tamdiu somno vinctum detinere, donec removeatur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Agrimonie, Odermennig-Wasser / Eau d'Aigremoine.
 ℞. Agrimon. pulv. ʒj. pellicul. Ventric. Gallinac. ʒss. Ciner. erinac. ʒiij. Msc. f. pulv. dos. ʒss. vel ʒj. dum cubitum itur in incontinentia Urinæ.

THEA.

Huius vis in Θ volatili blando potius quam fixo consistit, quod acida quævis dissolvit & per urinam educit, unde in cruditatibus mali hypochondriaci, podagra, arthritide & nephritide mire conducit, & us valde auget & confortat, eosque in continua agitatione conservat, proinde etiam cephalicum audit, & in confortanda memoria, arcendo somno & inducendis vigiliis elegans remedium est. A Chinesibus laudatur in comate tam somnolento quam vigili.

THEA Japonibus **TSIAA**, Sinensibus **THE'** dicta, **THE'E**, **Thee/** du **THE'**.

De planta hac exotica multi equidem verba fecerunt imo integros tractatus aut saltem prolixas descriptiones tradiderunt. Non solum enim ii qui itinerum rationem scriptis reddidere, uti est inter alios **DAPPER**, **NEUHOFF**, **MONTANUS**, **OLEARIUS**, **MANDELSLO** alique plures, quique peculiarem Indiae Chinae atque Japoniae tradiderunt descriptionem, **KIRCHERUS**, **MAFFEUS**, **LINSCHOTTUS**, &c. sed & illi, qui simplicium rariorum consignarunt historiam, ut **BONTIUS**, **WORMIUS**, **PISO**, cum pluribus **Thee** examen sistunt, imo haud pauci peculiarem de eo concinnarunt tractatum, inter quos eminent **SIMON PAULI** de **USU & ABUSU TABACI, & THEE'**: **AUTHOR GALLICUS LIBELLI** de **POTU CAFFE' THEE' & CHOCOLATA**, **PECHLINUS**, imprimis vero **WILHELMUS TEN RHYNE**, *αὐτοπῆς*, cujus observationes legere est apud **BREYNII** in **APPENDICE** ad **EXOTICARUM PLANTARUM CENTURIAS**. Nullus autem magis videtur rem melius examinasse, quam modo dicti **TEN RHYNE** successor, **ENGELBERTUS KÄMPFFERUS** in fasciculo 3. *amoen. exotic. observ. 13.* quia ea, quae antecessor annotare per causas non potuit, optime maximeque curiose, consarcinavit. Hinc non omnimodo rem ingratam fore autumamus, si in compendio ejus deductionem exhibeamus.

THEA ultra orgyiae altitudinem tardo incremento fruticans, foliis vestitur carnosissimis brevissimis surculos perenni, nisi decerpantur, vigore, inordinate singulatim occupantibus, foliis Cerasi hortensis fructu acido, substantia figura colore & magnitudine paribus; utut recens nata, qualia pro interno usu carpuntur, magis fortasse folia **Evonymi** vulgaris granis rubentibus excepto colore, referant. Flores autumno singuli geminive ex foliorum axillis produnt, rosae sylvestris facie, remissa fragrant, albi, hexapetali, petalis rotundis concavis cum numerosis staminibus; fructus florem numerosus excipit monococcus bicoccus & ut plurimum tricoccus, concretus ex tribus globosis capitulis pruni sylvestris magnitudine nucula fere globosa, foetis. Fructuum autem atque florum nullus est usus. De folio deinde sequentia proponit. Pediculo pingui per brevi herbaceo insistit folium ex membranaceo carno-

sum, longitudine maxima geminæ uncia, latitudine pollicari vel minori, figuram obtinens ex angustiori principio languide arcuatam mucrone obtuso; sæpe etiam ovatam in longitudinem repandam & inordinate undulatam medio depresso ambitu aliquantillum reflexo. Facies utraque lævis est, & ex depressis nervulis lacunosa, saturo & ingrato virore micans, in dorso magis diluto, ora denticulis nonnihil repandis, duriusculis, obtusis dense & inæqualiter est crenata. Odorem recens habet nullum, saporem ex sylvestri subamarum, adstringentem, sine tetricitate. Folium ratione soli natalis, situs, ætatis, haud parum in substantia magnitudine & figura variat, unde ex novellis foliis, qualia in Europam tosta perferuntur, perfectorum forma perperam judicatur. Foliiis maligna quædam vis & inimica cerebro qualitas inest, quæ spiritus animales turbando mentem inebriat, & tremulum inducit nervorum motum: quæ vero assidue frigendo egregie corrigitur, ita ut eliminata narcosi blanda remaneat animales spiritus refocillandi efficacia.

Folia autem hæc, quæ ex frutice juniori quam trienni, quæ tum & præstantissima & satis copiosa exhibet, non colligenda, nec carptim rapienda, sed sigillatim capienda sunt & quidem non eodem tempore, nec una vice, sed ut plurimum diversis. Qui tertium colligunt, illi auspiciū tentant circa finem mensis Japonum primi, qui exorditur cum novilunio illo, quod æquinotio verno est propius, sive id in Februarii exitum sive Martii initium inciderit. At hic mensis folia pauca tantum suppeditat, eaque perquam tenella, & nondum integre explicata, duorum aut trium dierum; quæ vero nobilissima sunt omnium & ob pretiosam raritatem palatiis principum ac divitibus dicanda, unde Thea Cæsarea nec non flos Theæ appellari suevit. Ex hoc censu est THEA BUU Sinensium, vera illa atque optima, quæ & sub ipso cœlo patrio bene cara est. Secunda collectio, (quæ prima est aliis) mense secundo instituitur, id est circa Martii finem vel Aprilis initium, hac folia integre explicata una si placet cum semiexplicatis decerpuntur, ante præparationem secundum bonitatem & magnitudinem in classes seligenda. Ex his, quæ nondum explicata sunt bonitatem prædictorum quodammodo assequuntur, unde eodem nomine veniunt, à cæteris ob præstantiam separanda. Postrema atque omnium uberrima collectio (aliis altera) fit mense Japonum tertio;

tlo, quo explicata folia multitudine luxuriant. Sunt qui neglectis prioribus unica hujus mensis collectione omnem Theæ claudunt absoluntque messem, cum sedula disjunctione foliorum in diversas primæ, secundæ & tertiæ bonitatis classes, quarum ultima exhibet folia bimestria & rigidiora pro usu plebejorum.

Triplex foliorum jam est distinctio. Prima est foliorum tenerimæ ætatis, quæ præparata vulgo vocantur *MOLENDÆ THEÆ*, quia molendo in pollinem redigitur cum aqua fervente sorbillanda. Huic Theæ respondet Sinensium quod dixi *THE' H BUU*. Secunda est adultiorum *THEÆ SINENSIS* dicta, quod Sinensium more præparata sit. Hæc in Japonia dividitur à tractatoribus & Theæ venditoribus ut plurimum in quatuor classes bonitate & pretio differentes. Prima est foliorum recens natorum, quorum collectio saltem ineunte vere celebratur, dum singuli novelli surculi non amplius duo vel tria folia sive integre, sive minus explicata ferebant. Secunda est paulo adultorum quolibet mense collectorum. Tertia classis folia non nihil crassiora exhibet. Quarta est foliorum, quæ promiscue & sine discretionem collecta sunt. Tertia distinctio Theæ foliorum ultimæ collectionis farraginem exhibet nimirum rigidiorum ad præparationem Sinicam (id est ad crispandum) ineptorum; unde utcunque saltem præparata usui villicorum & numerosæ plebis dicata sunt. Vires hæc obtinere dicuntur maxime fixas, quæ nec longiori aëris contactu, nec coctione pereant, secus ac Thea priorum ordinum, cujus admodum volatilis quanquam subtilior nobiliorque virtus, nec foliorum in aëre expositionem nec coctionem patitur sine insigni dispendio.

Præparatio in eo consistit, ut folia recens decerpta torreantur supra laminam ferream, tosta vero dum fervent, volvantur volis manuum supra storem, donec crispa reddantur. Torrendo enim non modo folia exsiccantur, verum etiam castrantur maligna sua & inimica cerebro qualitate, ut in usum humanum mitigentur, rotatione vero rediguntur in compendium sive molem parvam, qua commode asservari possunt. Perficitur opus in Officinis urbium publicis eam in rem adornatis, ut quisque folia sua iis inferre torrenda possit, siquidem paucioribus œconomis rite præparandi vel notitia vel apparatus instrumentorum suppetit. Instruuntur Officinæ furnis, quorum summitates claudit sartago ferrea ampla, plana,

na, quadrata vel rotunda, prælonga itidem tabula, floreis ex subtili junco tectis, in quibus foliorum rotatio celebratur, & denique ipsis operatoribus tum exustionem dirigentibus, tum volutationis negotium perficientibus. Torreri debent folia recentissima, quia servata in diem sequentem nigrescunt, dum friguntur, & de virtute plurimum remittunt. Carpta in cumulo jacere diu non debent, ne intestinum calorem concipiant, qui vires destruit.

Ipsa præparatio sic peragitur. Immittit, qui tostionem dirigit, foliorum libras aliquot in prædictam sartaginem, quæ ex supposito igne usque adeo fervere debet, ut immissa folia velut succo nativo humentia ad laminæ contactum crepent. Eadem ille huc atque illuc utraque manu versat strenuè, ne aliquo loco immota quiescant & impariter terreantur. Nota morem obtinere in Sina potissimum, ut folia primæ collectionis ante ustionem bullienti aquæ immergantur per dimidium temporis minutum, quo facultas narcotica, qua maxime scatent folia magis succosa recens nata, duplici correctione eliciatur. Ignis in furno ad illum gradum moderari debet, ut à manibus tractantis ægre perferri possit; versatio autem eo usque est continuanda, dum invalescens foliorum calor tolerantiam manuum pene excedat, quo ipso actutum ope rutabili lignei in flabelli formam expansi eximuntur, ac in storem effusa traduntur collegio rotantium. Ex his illico, dum fervent, volvendis, raptim quisque modicam ante se capit partem. Volvuntur autem utraque palma, non quidem motu promiscuo sed uniformi, quo eodem tenore pariter contorqueantur. Hac volutatione compressa succum exerunt ex luteo virentem, qui fervorem manibus infert pene intolerabilem; sed quo non obstante volutatio continuanda est, donec folia refrixerint. Nam sicut crispandi actus non succedit nisi in fervore, ita gyri non perdurant, nisi sub manibus refrigerant. Refrigeratio autem quo citior eo laudabilior est, cum sic gyros folia arctius retineant, quæ proinde sedula ventilatione ope flabelli promoveri debet: Frigefacta redduntur ustori velut directori operis (interea occupato in assandis aliis, quæ crispanda restituat) frigenda vicissim, dum omnis humor exspiraverit. Hic ea secus ac antea non tumultuarie, sed lenta manu huc illuc commovet, eo consilio ne gyri evolvantur, quamvis caveri nulla arte possit, ne multa rursus dehiscant. Exempta

Sartagine secundo traduntur in manus volutantium priori modo caute rotanda, tum si satis exsiccata sint, asservanda; sin minus, ustioni ac rotationi denuo subjicienda: in iterandis ustionibus cautio est, ut subinde cum decremento humoris gradus quoque ignis imminuatur, quo insuper habito folia aduruntur & nigrescunt. Qui curiosi sunt, quinquies, imo si otium suppetit, septies ustionem cum volutatione iterant, breviter semper & leniori igne theam in frixorio versantes, ut sensim & lentis gradibus arescat, quo ipso viror vividus & unicolor ex voto conservatur, qui citiore nimia & inæquali ustione faceffit. Ad virorem conservandum requiritur etiam ut post singulas ustiones sartago aqua fervente repurgetur ab inquinamentis humorum, qui foliis elicti adherere parietibus & theam immixtam contaminare solent. Tosta sufficienter folia deponuntur in pavementum storea contextum, ut sicuti ante præparationem cruda folia in classes dividebantur, ita nunc à præparatione recondenda censuram subeant, qua crassiora incondite volutata & nimis adusta separantur & ad sequiorem referuntur classem. Folia Theæ primi ordinis Theæ molendæ ad ariditatem majorem assari debent, ut molitori obedian, & in pollinem minori opera se redigi patiantur. Eadem si perquam tenerima ac recentissime nata sint, tunc extracta è ferventi, cui immergebantur, aqua, frigi vel saltem exsiccari solent in crassiori charta, super prunas expansa, omissa ob parvitatem omni volutatione. Rustici folia sua torrent in lebetæ fictili paucis vicibus & rudi manu, nec tamen sic potestremæ notæ Theam obtinent. Thea mensibus aliquot asservata securitatis gratia conditoriis suis rursus eximenda & de novo igne lenissimo frigenda est, ut si quæ humiditas relicta, vel per menses pluviosos contracta fuerit, penitus absumatur, ita citra corruptionis periculum denuo recondenda, & ab aëre caute munienda, quippe qui sub calidiori climate, virtutem Theæ subtiliorem magis faciliusque dissipat. Hinc etiam credendum quod in Europam delata jam subtilissimi salis passa sit jactura, nam in ea nec illa saporis gratia, nec recreandi facilitas invenitur, quam hausta in natali solo. Sina conditoriis utitur ex laminis stanni ignobilioris, in quibus etiam trans mare in alias regiones transmittitur Thea. Japones eam condiunt in ollis magnis fictilibus

orificii angustioris, & si præstantior sit in vasis myrrhinis five porcelanis.

Servit Thea interno usui duplici præparatione. Prima est Sinenfibus usitata quæ fit infusione, dum integris foliis superfundimus aquam ferventem, quæ foliorum virtute imbuta protinus sorbilletur. Hic modus ex Sina in occidentem translatus jam lippis & tonsoribus innotuit. Altera est quæ fit attritu; quomodo folia cum mola manuali ex lapide serpentino fabricata in subtilissimum pulverem pridie vel eodem die re liguntur, ut aquæ ferventi mixta pulpæ ad instar tenuioris pitissando pariter hauriatur. Usus hujus inter divites Magnates & Principes per solam & pene omnem Japoniam obtinet. Tertia est, quæ fit coctione, quæ à civium & rusticorum vulgo recepta est.

Ratione virtutis qua Thea pollet dictum quod inebriandi & spiritus animales turbandi facultate polleat, quæ ustione expelli debeat; non potest autem ita sufficienter debellari, ne remaneat quædam cerebro inimica qualitas, sed quæ sua mitescit sponte, videlicet mora decem pluriumve mensium. His elapsis tantum abest, ut spiritus turbet, ut potius blande excitet & eorum organa demulceat adeoque exhilarandi præstet efficaciam. Intra annum sorbilata delicatissima sapit quidem sed turbat copiose assumpta mentem, & tremorem inducit articulis. Optima delicatissima & maxime exhilarans est, quæ unius anni ætatem habet, recentiorum Japonum nemo bibit, nisi mitigatam admixta æquali portione Theæ vetustioris. Virtutes paucis comprehenduntur, si quis dicat, Theæ liquorem obstructions viscerum reserare, defæcare sanguinem, præsertim vero eluere tartaream calculi materiem. Vitia Theæ à Japonensibus dicuntur sequentia.

Omnis Theæ potus supprimit Medicamentorum efficaciam. In Colica endemia nocet & maxime vitandus est. Recentioris Theæ potus, uti in genere totam cerebri compagem turbat & offendit, ita certo experimento quam maxime nocet ophthalmia laborantibus. Theæ potum qui toto die biberet fortiter extractum, eum vitæ suæ, quæ in calido humidoque residet, radicale fomentum destruere asserunt Medici Sineses. Hæc ex KÆMPFFERO paulo prolixius excerpta nauseam minime motura speramus, quoniam plurima jucunda & curiosa continent, insuper à tali viro prolata sunt, qui

Orien-

Orientalis regiones imprimis etiam Japoniam, cui biennio, sicut toti Asiæ decennio immoratus fuit, nequaquam otiosus sed sedulus rerum præprimis naturalium scrutator invisit. Qui præter allegata aliis narrationibus delectatur is supra citatos adeat auctores aliosque imprimis vero celeberrimi Lycei hujus Professoris Medici Dn. Marci Mappi dissertationem de Potu Théæ. Illud unicum notare adhuc liceat, abusum Thee in causa extitisse, ut ab aliis maxime fuerit culpata, sicuti quoque alii in tradendis ejus laudibus hyperbolice nimis versantur & multum excedunt.

BETONICA.

Ob subtilem suam acrimoniam in qua paucum alcali latet, diureticum & vulnerarium est, præcipue in vulneribus & affectibus capitis. Poterius decoctum herniariæ cum betonica in calculo renum & vesicæ commendat, alii laudant decoctum betonice ad sistendum fluxum lochiorum post partum. Chirurgi addunt cataplasmatibus suis cephalicis.

℞. Fol. beton. Mj. summit. absynth. Mß. cubeb 3j. M. & cum vino fiat catapl. cephalicum. Eligenda sunt folia recentia.

CHA-

Βελονική BETONICA, VETONICA à Vetonibus seu Vetonibus Hispaniæ populis, qui eam invenisse dicuntur. ψυχότροφον, PSYCHOTROPHON quod in frigidis locis nascatur. κέστρον CESTRUM, à floris spicata & mucronata acutie veruculum viriculum præferente juxta J. BAUHINUM, vel ut alii volunt à virtute Medicamentosa. Veteribus SACRA HORO, HORUS VEGETABILIS, NATURÆ PARENS dicebatur Betonien / Braune Betonien / Battenien / Zehr, Krauth / BETOINE.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius furrectum, imbricatum & plerumque bifidum, inferius vero in tres partes divisum, media ampliori & bifida. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina oblonga in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addendum est flores Betonicæ verticillatim & spicatim summis caulibus innasce.

Betonica purpurea C. B. P. 235. Betonica vulgaris purpurea L. B. 3. 301. Betonica Dod. Pempt. 49.

Crescit in pratis & herbidis montium, ut & in hortis, locis umbrosis, floret Junio & Julio.

In usu folia & flores. Polychresta multisque virtutibus prædita est Betonica, ut Itali in proverbio dicant, tunicam seu vestem esse vendendam, ut comparari possit Betonica, & de homine summe virtuoso, ipsum plures quam Betonicam possidere virtutes pronuncient.

Discutit, aperit, attenuat, extergit maximarum virium est ad Capitis, pectoris atque pulmonum, Hepatis, Lienis & Uteri affectus. Arthritidi & podagræ medetur. Epilepsiæ, vertigini, Apoplexiæ convulsionibus & omnibus affectibus capitis sic dictis frigidis auxilio est. Crapulæ molestias levat, à SIM. PAULI substituitur Herbari Thee, suntque multi qui Betonicam infusam in aqua fervente hauriunt. Phthisicis, Tabidis & Hæmoptycis prodest. Venenis adversatur, resistitque morsibus animalium rabidorum. Ab alto delapsis prodest. In stomachi quoque affectibus multæ sunt energię folia & flores, radices autem ingratae sunt & vomitum movent. Tormina quoque colica sedant. Laudatur præterea Betonica in febribus ut & in sterilitate. Convenit externe in doloribus podagricis, quos mitigat cum lacte cocta. Conducit lassos ex itinere: Commendatur in herniis præsertim puerorum. Contusa vulnera mire glutinat, & ulcera inveterata & cacoëthea sanat. Succus Betonicæ tinnitum aurium sedat. Naribus radix Betonicæ indita odontalgiam curat quem effectum quoque præstat decoctum cum vino sapius in ore detentum.

IN PHARMACOPOLIIS EXTANT

Aqua Betonica, Betonien-Wasser/ Eau de Betoine, quæ positiones

tionēs vulnerarias, cephalicas, stomachicas, hepaticas, diureticas, pectorales & uterinas ingreditur.

Conserva Betonica ex floribus, Betonienblüth-Zucker / Conserve de Betoine, quæ cephalica imprimis censetur.

Syrupus Betonicae, Betonien-Syrup / Syrop de Betoine. Capiti dicatus est.

Emplastrum de Betonica, sive Ceratum ex Betonica, Betonien-Pflaster / Emplastre de Betoine. Ad exsiccandos varios humores Cerebri, Cephalæam, Cephalalgiam, Catarrhos aliosque Capitis affectus conducere dicitur, in vulneribus præsertim capitis adhibetur, ubi detergit & ad cicatricem perducit.

CHAMÆDRYS.

Convenit cum chamæpiti ast ficior est & validior in acidis infrigendis, ideo à nonnullis in quartana & mensium remora laudatur.

℞. Chamædr. ʒj. f. pul. ad quartan.

℞ Chamædr. Chamæp. ana Mj. rad. aristol. eryng. ana ʒj. M. f. decoct. in remora mensium.

RI-

Xanthoxylum quasi quercus humilis, ob foliorum quandam similitudinem, *TRIXAGO TRISSAGO, QUERCHLA MINOR, CALAMANDRINA, Erdeich / Gamanderlein / Germanderlein / Bathengel / Klein Bathengel / GERMANDRÉE*.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus stamina labii superioris locum occupant. Labium vero inferius in quinque partes divisum est media ampliori cochlearis instar excavata & quandoque bifida, cæteris in floris cervice è regione positis. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addendum est flores Chamædryos in foliorum alis nasci & calyce donari tubulato.

Chamædrys major repens C. B. Pin. 248. & Dod. Pempt. 43.
 Chamædrys vulgo vera existimata L. B. 3. 288. &

Chamædrys minor repens C. B. Pin. 248. Chamædrys repens minor Dod. Pempt. 42.

Reperitur Chamædrys in collibus, pratis, scrobibus & secus fruteta. Colitur etiam in hortis, floret Julio.

Aperit, penetrat, hepatica est planta & splenetica, urinam & sudorem movet, convenit in hydrope & ictero, commendatur in febribus & scorbuto, in mictu cruento, & hæmoptysi ut & in epilepsia. In morbis quoque pectoris, asthmate & tussi prodest. Caput & nervos roborat, lumbricos necat. In arthritide & podagra multum laudatur, eumque in finem à Medicis Genuensibus Carolo quinto fuit commendata. Externe laudatur in doloribus hæmorrhoidum, scabie pruritu catarrhisque exsiccandis. Ingreditur Theriacam, usurpatur instar herbæ Thée.

IN PHARMACOPOLIIS EXTANT

Aqua Chamædryos, Gamanderlein oder Bathengel = Wasser / Eau de Germandrée ou petit Chêne. Asthmaticis & tussientibus prodest, vermes necat, icterum & hernias curat, sanguinem mundificat, deobstruit, foetum pellit, convenit in fluore albo & Chlorosi.

Conserva Chamædryos, Gamanderlein = Zucker / Conserve de Germandrée, diuretica est atque diaphoretica, spleni insuper ac Hepati dicata.

Sunt qui extractum quoque exinde parant, quod in quartana præsertim à RIVERO laudatur.

℞. Radic. Centaur. major. Arist. rotund. Gentian. fol. Chamædr. Chamæpyt. Centaur. minor. ana partes æquales Msc. fiat pulvis subtilis, qui notante TOURNEFORTIO Principi cuidam Mirandolæ familiaris fuit. Conducit contra Arthritidem malum ischiadicum & podagram. Exhibetur vel in substantia, quod melius, vel in infuso. Dosis drachma una. Jubent autem ut per integrum annum usurpetur, vel quotidie vel alternis saltem diebus, aut saltem singulis septimanis bis vel ter. Prodest quoque hic pulvis in febribus intermittentibus hydrope & obstructionibus viscerum.

RIBESIUM.

Urinam potenter movet, propterea in stranguria & variis morbis chronicis commendatur. Datur infusum ex vino & cerevisia it. decoctum: plurima vis consistit in novellis foliorum germinibus.

PLAN-

RIBES VULGARIS, GROSSULARIA HORTENSIS NON SPINOSA, St. Johannes = Träublein = Stauden / St. Johannes = Beerbaum / GROSEILER.

Est frutex flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, in incisuris calycis monophylli & pelviformis nascentibus. Hujus autem posterior pars abit in baccam globosam, vel ovatam, mollem, seminibus foetum exiguis.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra sive Ribes Officinarum C. B. Pin. 455. Ribes vulgaris acidus ruber L. B. 2. 97. Ribesium fructu rubro Dod. Pempt. 749. Rothe Johannes = Träubel / GROSSELIER ROUGE DE JARDIN.

Grossularia hortensis, majore fructu rubro C. B. Pin. 455. Ribes flore rubente L. B. 2. 98. Ribesii genus amplioribus foliis & majore fructu Clus. Hist. 119.

Grossularia hortensis fructu margaritis simili C. B. Pin. 455. Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens L. B. 2. 98. Ribes vulgaris albo fructu Clus. Hist. 120. Weiße Johannes = Träubel / GROSSELIER BLANC DE JARDIN.

Grossularia hortensis, majore fructu albo H. R. Par.

Grossularia non spinosa fructu nigro majore C. B. Pin. 455. Ribes nigrum vulgo dictum folio olente L. B. 2. 98. Ribesium fructu nigro Dod. Pempt. 749. Schwarze Johannes = Träubel.

Quamvis sponte etiam in quibusdam montibus proveniat hic frutex, ut plurimum tamen colitur in hortis, floret Aprili & Mayo, baccæ circa solstitium æstivum maturescunt.

In usu præter Germinam novellam, quæ rarius usurpantur, sunt bacce. Fervorem ut SEBIZIUS loquitur, stomachi & hepatis seu potius sanguinis alterant, & effervescentiam domant, sitim fugant, cibi fastidium pellunt vomitiones compescunt, ventriculum firman, ventris profluvia sistunt, acrimoniam bilis frænant, putredini resistunt. Utiles propterea caliacis, dysentericis, cholera laborantibus siticulosis, febricitantibus, hæmoptoicis & affectibus, ut ita loquar, calidis laborantibus.

Ribesia nigra præsertim ad affectus urinarios commendantur. Infunduntur in Spiritu Vini, vel vino, & quotidie ad calculum expellendum & præservandum aliquid hauritur. Sunt qui sola hujus fruticis nigrae baccas ferentis folia contrita & naribus admota stranguriam ut & passionem Hystericam demulcere afferunt; quibus foliis adscribitur quoque virtus diuretica & lithontriptica. Laudantur porro hi fructus ad arthritidem vagam, convulsiones paralytica atque paresin.

Fructus tum rubicundi tum albi comeduntur crudi, vel etiam consperguntur saccharo à pediculis imprimis liberati.

IN OFFICINIS PROSTANT

Conditum Ribium, eingelegte Johannis-*Träublein* / *Condit de Groseilles*, gratum in morbis constituunt confortans.

Succus Ribium, roher Johannis-*träubel* : *Safft* / *Suc de Groseilles*, ex quo cum Saccharo elegans paratur

Gelatina Ribium, Johanne-*träubel* : *Galrey* / *Gelée de Groseilles*.

Rob ribium, Johanne-*trauben* : *Safft* / *Rob ou Syrop de Groseilles*. Confortant hæc remedia, sitim sedant, refrigerant & adstringunt. Commendantur in febribus.

PLANTÆ SALE BLANDO FIXO CUM QUIBUSDAM TERREIS CONSTANTES.

VERONICA.

Ob Θia temperata diureticum est & vulnerarium, chamædri

mædri respondet: cæterum incidit viscidam pituitam pulmonibus, intestinis & renibus impactam; confert in phthi-
si, tussi, colica, nephritide.

℞. Heder. terr. veronic. ana Mj. coq. in ▽ ex qua ca-
pe myrrh. ʒss. contra colicam.

HEDE-

VERONICA, BETONICA ALBA, TEUCRIUM, THEE
EUROPÆORUM, Ehrenpreis à virtutibus, Heyl aller Welt/
Heyl aller Schäden / Grund-Heyl / VERONIQUE.

Est planta flore monopetalo rotato & multifido, ex cujus ca-
lyce surgit pistillum mediæ floris parti ad instar clavi infixum, quod
abit in fructum membranaceum, in duo loculamenta divisum se-
minibus fœtum modo crassioribus modo exiguis.

Veronica mas supina & vulgatissima C. B. Pin. 246. Veronica
vulgatior folio rotundiore I. B. 3. 282. Veronica mas serpens Dod.
Pempt. 40.

Nascitur, ut J. BAUHINUS loquitur, incultis & sylvestribus
locis, apricis, sabulosis ac arenosis non raro juxta tumulos, ac
aggeres agrorum, sepimenta, quandoque & saxosis reperitur. Flo-
ret Majo & Junio.

Vires Veronicæ tot tantæque esse dicuntur ut vix satis com-
mendari possit. Sanguinem mundificat, alexipharmaca & sudori-
fera, cephalica atque carminativa est. Laudatur contra pestem &
venena, valet ad icterum. Prodest in cruditate primarum viarum,
malo hypochondriaco, scorbuto, scabie, calculo mictu cruento,
asthmate, empyemate, hectica & omnibus viscerum obstructio-
nibus ac exulcerationibus nondum inveteratis, ipsisque febribus
intermittentibus. Prodest quoque ad Rachitidem, & varia renum
mala. Externe in vulneribus & ulceribus aphthis atque ulceribus fau-
cium deprædicatur. Pulvis Veronicæ in subjectis pinguioribus ad
fœcunditatem facere dicitur. Quidam decoctum vel infusum Ver-
onicæ præsertim ante tempus florendi collectæ infuso Thée nimis ad-
stringenti vel præferunt, vel saltem æquiparant quibus tamen celebr.
NEBELIUS in dissert. de PLANT. ÆSTIV. non assentitur, quo-

niam vel solus Theæ violatus odor de puriore illius Sale volatili oleoso, quo Veronica destituitur, satis testatur. Ejusmodi jam cum aqua factum infusum Veronicæ, ad sanguinem mundificandum & edulcorandum, obstructions reserandas, catarrhos exiccandos, dolores capitis tollendos, memoriam & visum confortandum, ebrietatem arcendam & abigendam, vertiginem & apoplexiam, arthritidem mitigandam sterilitatemque curandam, & nescio ad quos alios affectus mirum quantum celebratur. Conferri hac de re potest JOH. FRANCI Tract. de VERONICA THEEZANS. FRID. HOFFMANNUS in dissert. DE INFUSI VERON. EFFICACIA PRÆFERENDA HERBÆ THEE: & TRACTATUS GERMANICUS, die Preißwürdige Veronica.

IN OFFICINIS ADSUNT

Aqua Veronicæ, destillata ex herba cum florere incipit, Ehrenpreis - Wasser / Eau de Veronique.

Conserva Veronicæ ex summitatibus, Ehrenpreis - Zucker / Conserve de Veronique, phthisicis præprimis commendatur.

Syrupus de Veronica, Ehrenpreis - Syrup / Syrop de Veronique, pulmonum imprimis vitia corrigit, & renum sabulum arenulas atque calculos expurgat; Capiti quoque est dicatus.

HERDERA TERRESTRIS.

Symbolizat cum veronica eam tamen ob salia sua temperata quibus & nonnulla volatilia sunt admixta, & ratione virtutis antipthificæ superat.

℞. Heder. terr. q. v. coq. c. ▽ ℞. Colatur. ℥viii. add. ʒi. laurin. ʒj. Clyster ad colicam.

℞. Heder. terr. q. v. infund. in f. q. ▽æ pro pot. ordin. in calculo & nephritide.

℞. Conserv. heder. terr. rosar. ana ʒj. flor. ʒis. antihect. Pot. Oc. ʒ. ana ʒj. f. Elect. contra phthisin.

℞. Heder. terr. chærefol. veron. ana M. j. helen. ir. flor. ana

ana ʒß. rad. ari. ʒj. caricar. n. v. passul. min. ʒiß. liquirit. ʒß. f. decoct. ex ▽ in tussi & phthisi ad incidendam mucaginem pulmonum.

PIM.

HEDERA HUMILIS, Χαμαικίσσος, CHAMÆCISsus ob folia hederæ similia & reptatum. CORONA TERRÆ, Gundelreb / Grundreb / Donnerreb / Sundermann / Erd-Ephero / Erd-Fränkeln / TERRETRE, LIERRE TERRESTRE.

Est species Calaminthæ, videlicet

Calamintha humilior folio rotundiore Tourn. I. R. H. cl. 4. S. 3. g. 4. Hedera terrestris vulgaris C. B. Pin. 306. Chamæcysus sive Hedera Terrestris I. B. 3. app. 839. Hedera Terrestris Dod. Pempt. 394.

Crescit passim circa sepes, parietes & muros urbium atque hortorum margines, floret Aprili, Majo &c.

In usum venit herba cum floribus. Acidum absorbet, putredini resistit, vulnera & ulcera abstergit, sanationemque promovet in ulceribus & erosionibus internis, in sputo & mictu cruento polychrestum est remedium. Vulnerarium est medicamen insigne, recipitur in potiones. Pectori peculiariter est destinatum ita ut a quibusdam Panacæa pectoris salutetur. Laudatur ad nephritidem & podagram, diarrhœam atque dysenteriam. Pesti obviam ire dicitur & icterum sanare. Vi quoque anthelmintica gaudet. Externe deprædicatur porro ad Herniam, fistulas, ulcera inveterata, scrophulas &c. In vino cocta surditatem & tinnitum aurium auferit. Semicupiiis quoque ad menses & calculum pellendum additur. Laudatur ad narium foetorem ut & ad scabiem. Succus dolorem dentium tollere, auri lateris dolentis inditus à BAYRIO asseritur. Sunt qui dictam herbam in manu tamdiu detentam donec calefiat postmodum naribus sæpius admotam alvum ciere perhibent.

IN PHARMACOPOLIIS REPERIUNTUR

Aqua Hederæ terrestris, Gundelreb-Wasser / Eau de Lierre terrestre, ex herba, Majo præsertim collecta.

Ttt 2

Conserva

Conserva hederæ terrestris, *Gundelreb* : *Zucker* / *Conserve de Lierre terrestre*, &

Syrupus Hederæ terrestris, *Gundelreb* : *Syrup* / *Syrop de Lierre terrestre*. Vires obtinet traumaticas, detergit & consolidat, commendatur præsertim in affectibus pectoris ulceribusque pulmonum. Urinam quoque sudorem & menses ciet.

PIMPINELLA.

Cum hederæ terrestris, veronica, agrimonia simul præscribitur & in viribus etiam coincidit, singulare quid obtinet in dysenteria, tum quod acidum dysentericum infringat, tum quod laxatas intestinorum fibras blande adstringat. Sanguinis quoque purgatorium polychrestum audit.

PIMPINELLA HERBA CUM FLORIBUS sudores ciet, urinamque movet unde in calculo commendatur. Vulneraria quoque est, unde decocta ingreditur. Ejus capitula cum pane pinfuntur & in diarrhæa atque dysenteria commendantur. In acetariis Pimpinella solet ob suavitatem & odorem usurpari. Lætitiâ conciliare dicitur, præsertim in vino infusa, hinc vinorum Majalium perpetuum & principale est ingrediens, forsan hilaritas magis à Vino provenit. Interim egregie tingit vinum lapidumque reddit.

PROSTAT

Aqua ex integra planta Julio collecta quam in specie ad Phthisin laudant.

EUPHRASIA.

Ob. salem tenuem blandum acidas sordes abstergentem Oculis eorumque inflammationibus dicata est. Hoffmann. Clav. in Schroed. Euphrasiam flore albo decoctam in vino contra icterum flavum utilem deprehendit.

℞. ▽ Euphras dest. cape intro & lava oculos inflam-
matus & caliginosos, pro hoc scopo cape etiam conservam.

HYPE-

Εὐφροσύνη, quia oculos juvat & delectat, unde corrupte
EUPHRASIA, EUFRASIA, EUPHRAGIA, OCULARIS,
OCULARIA, OPHTHALMICA, LUMINELLA, Augentrost/
Augendienst/ Weisseleuchte/ Tagleuchte. EUPHRAISE, EU-
FRAISE.

Est planta flore monopetalo, anomalo, personato, in duo la-
bia distincto, quorum superius surrectum & multifariam sectum,
inferius vero in tres partes dividitur, quæ singulæ quoque bifidæ
sunt. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi
infixum, quod abit in fructum seu testam oblongam in duo locu-
lamenta divisam, seminibusque foetam exiguis.

Euphrasia Officinarum C. B. Pin. 233. Euphrasia I. B. 3
432. & Dod. Pempt. 54.

Locis herbosis non omnino aridis sed non nihil humentibus
& pinguibus, æst cultis & incultis, ut pratis, secus agrorum margines, &
vias, imo in ipsis viis provenit, floret mensibus æstivis in autum-
num usque.

In usum trahitur herba cum floribus. Virtutem obtinet cepha-
licam in apoplexia memoriaque confortanda, & imprimis oph-
thalmicam in tanto gradu, ut vix non ad ipsam commendetur cæci-
tatem, & ad omnes oculorum affectus celebretur. Usurpatur vel in
substantia præsertim in Tragæis, vel infuso, in vehiculo aquoso
vel vinoso. Vinum certe Euphragiatum, Augentrost. Wein/ Vin
d' Euphraise, vel per simplicem infusionem in vino generoso, vel
per fermentationem cum musto paratum, rejuvenescere quasi facit,
ut quidam loquuntur, omneque oculorum impedimentum visus-
que defectionem aufert.

OFFICINÆ EXHIBENT

Aquam Euphrasie destillatam ex herba cum floribus collecta,
Augentrost. Wasser/ Eau d' Eufraise, quæ vix non in omnibus colly-
riis humidis primatum tenet;

&

Ttt 3

Conservam

Conservam Euphrasie, Augentrost-Zucker / Conserve d'Euphrase
ad eundem scopum.

HYPERICUM.

Hujus virtutes vid. in capite de semine hyperici.

℞. Virg. aur. Mj. summit. hyper. p. ij. rad. symph. ℥℔.
rasur. corn. cerv. ℥℔. coq. ex aq. ferrarior. ℞. Colatur. ℥xvi.
add. syr. dialth. ℥j. aq. Cinam. ℥℔. pro vulnerario. it. in ero-
sis à dysenteria intestinis.

℞. Summit. hyperic. herb. anagall. fl. purp ana q. v. f.
decoctum contra melancholiam, delirium, maniam pro po-
tu ordinario.

PLANTÆ SALE AROMATICO OLEOSO PENETRANTISSIMO CUM ACIDO VOLATILI CONSTANTES.

COCHLEARIA.

Respondet armoraciæ & cortici Winterano, tamen mul-
to penetrantior est & validior ut ejus acredo ubi suspecta vi-
detur temperanda sit passulis, dulcibus aliis, & temperatis,
scilicet lacte caprillo, sero lactis. [Optime cochlearia cum
acetosa conjungitur & sic evadit nobile remedium antiscor-
buticum. vid. Act. Hafniens. ann. 1671. obs. 9. p. m. 35.]

Datur substantia, succus. conserv. infus. aq. —us oo
Elix.

℞. Rad. helen. armorac. ana ℥j. cochlear. nasturt. ana
Mj. passul. min. ℥vi. f. infus. ex vino vel sero lactis contra
scorbutum.

℞. Cochlear. Nasturt. armorac. rad. ari, contunde omnia,
affund.

affund. —um sambuci, digere & destilla ex balneo f. —us antiscorbuticus.

℞. Cochlear. Mij. fumar. Mj. cortic. fraxin. ʒvj. baccar. Junip. ʒj. summit abs. Mj. rad. cichor. ʒj. helen. ʒß. strobil. abiet. n. v. sine hæc omnia effervesce cum cerevisia, & fiat cerevisia medicata contra scorbutum.

℞. — cochlear. impone membris ab epilepsia contortis.

MAS.

COCHLEARIA à foliorum forma nomen accepit, HERBA SCORBUTI appellatur a virtute, Löffelkrauth/ Löffelblatt/ Scharbockstrauch/ Scharbockshenl/ HERBE AUX CUILLIERS.

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum fere globosum, septo intermedio, cui valvæ adhærent, in duo loculamenta divisum, seminibusque foetum subrotundis.

Cochlearia folio subrotundo C. B. Pin. 110. Cochlearia L. B. 2, 942. & Dod. Pempt. 594.

Copiose provenit in locis maritimis. In hortis quoque colitur & locis riguis & umbrosis felicius, floret primo vere.

In usum trahuntur præsertim folia viridia & recentia, quia in exsiccatis Sal volatile exhalavit. In scorbuto curando primatum ducit, quem in finem ex singulari Dei beneficio in regionibus mari finitimis & hinc scorbuto magis obnoxiiis sponte crescit, ut homines scilicet habeant, quo vitia à scorbuto provenientia, cruentationes scilicet gingivarum, vacillationes dentium &c. corrigant. Magni porro usus est cochlearia in morbis chronicis, cachexia, malo hypochondriaco, cæteris paribus, omnibusque morbis à sanguinis dyscrasia viscida & acida oriundis. Frequenter usurpatur in jusculis, ita ut vel folia in jusculo fervente absque ulteriore coctione infundantur, vel succus exinde exprimatur, & cum jusculis hauriatur. Ubi quam maxime notandum, succum qui recens debet esse extractus, vel in instrumentis lapideis, vitreis aut etiam stanneis

neis esse exprimendum. Quod si enim in mortariis æneis contundantur folia, & paulo diutius ibidem relinquantur, succus facillime vim emeticam summo cum assumentium damno acquirit. Id quod etiam contingit, si post exemptionem foliorum contusorum, non eluatur statim mortarium. Quod si enim die insequente rursus confusio novæ cochleariæ fiat, idem effectus rursus conciliatur, approbante dicta experientia. Externe adhibetur in balneis ad paralyfin arthritidem & scorbutum, convenit etiam, uti dictum, in cruentatione gingivarum & vacillatione dentium.

PLURA IN OFFICINIS EX HAC PLANTA CUSTODIUNTUR MEDICAMINA.

Aqua cochlearia, Löffelkrauth-Wasser / Eau de l'Herbe aux cuillieres.

Conserva cochlearia, Löffelkrauth-Zucker / Conserve de l'Herbe aux cuillieres.

Extractum Cochleariæ, Löffelkraut Extract / Extrait de l'Herbe aux cuillieres, quod tamen multi ob perditas partes volatiles respiciunt.

Syrupus cochleariæ, Löffelkraut-Syrup / Syrop de l'Herbe aux cuillieres, qui, uti antecedentia remedia in affectibus scorbuticis convenit, obstructions referat, urinamque pellit. Datur ad unciam unam usque.

Spiritus Cochleariæ per fermentationem paratus, Löffelkrauth-Spiritus / Esprit de l'Herbe aux Cuillieres. Commendatur tanquam insigne remedium antiscorbuticum, vim obtinet diaphoreticam, stomachicam atque carminativam. Exhibetur ad guttas decem viginti triginta &c. Externe convenit in scorbuto oris & gingivarum exulceratione.

NASTURTIIUM.

Virtute antiscorbutica remissius est Cochlearia, cæterum potenter pellit urinam & in verme pericardii enecando propriam dicitur habere vim. Datur ut cochlearia.

℞. Nasturt. ▽tic. exprime succum, sine effervesce-
 cum fermento, misce cum novo nasturtio & fac massam,
 destilla per balneum, cujus cochl. j. vel ij. exhibe in scor-
 buto.

καρδαμον quasi καρήδαμον, quod caput suo calore & acri-
 monia tentet vel ἀπὸ τῆς καρδίας, quod cor foveat, & in cardiaca
 Passione plurimum valeat, vel παρὰ τὸ κόρας μύειν, pupillas coeun-
 tibus palpebris abscondat. Oculis enim admotum καρδαμύττειν, con-
 nivere cogit. NASTURTIIUM inde dictum, quod nasum tor-
 queat, præsertim semen quod adeo acre ut etiam sternutamenta pro-
 vocet. CRESSIO dicitur, quoniam perenni sobole summis fer-
 voribus vel etiam brumæ rigoribus spretis crescat. Kress / Garten.
 Kress / CRESSON, CRESSON DE JARDIN.

Est planta flore cruciformi, quatuor petalis constante, ex cu-
 jus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum subrotundum, pla-
 num, in duo loculamenta divisum septo intermedio, respectu val-
 varum ad perpendiculum oblique posito, & seminibus foetum ut
 plurimum planis. Adjungantur folia multifida.

Nasturtium hortense vulgatum C. B. Pin. 103. Nasturtium
 vulgare I. B. 2. 912. Nasturtium hortense Dod. Pempt. 712.

Colitur in hortis, tota etiam hieme viret, vere tamen seritur
 ad acetaria, quod multo tenerius. Floret æstate. Sanguinem puri-
 ficat, aperit, attenuat convenit in omnibus morbis à viscoso san-
 guine oriundis, menses reseat, foetum pellit & in mucilagine tar-
 tarea pulmonum prodest.

PLANTÆ SALE VOLATILI ACRI
 CONSTANTES ABSQUE OLEO
 VOLATILI.

ERYSIMUM.

Convenit in tussi pro incidenda mucagine, it. in rau-
 cedine ex lymphâ acidâ viscida in faucibus hærente.

Uuu

℞.

℞. Erysim. Eruc. ana Mj. coq. in hydrom. contra raucedinem.

Ερύσιμον à multiplici foliorum sectione, vel ab ἐρύω saluum conseruo, ob eximias qualitates. IRIÓ, quod fervido sapore in linguam irruat, VERBENA FOEMINA, ERUCA NOBLLIS, S. NAPI SYLVESTRE, Weg-Senff/ Hederich/ Wilder-Senff/ à sapore, VELAR, TORTELLE.

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum seu siliquam septo intermedio in duo loculamenta divisam, seminibusque foetam ut plurimum exiguis & rotundis. Addi debet facies quædam Erysimi propria.

Erysimum vulgare C. B. Pin. 100. Erysimum Tragi flosculis luteis juxta muros proveniens I. B. 2. 863. Erysimum Irio 1. Tab. Icon. 448.

Crescit juxta vias passim in incultis & sterilioribus, floret Junio, Julio, &c.

In usu herba & quandoque semen, quod non tantum ut herba in pectoris affectibus vocisque vitiis, sed & in urina, calculoque pellendis atque in gonorrhæa conducit. Externe in tumentibus mammis earum scirrho & Cancro non exulcerato laudatur.

OFFICINIS FAMILIARIS EST

Syrupus de Erysimi Lobelii, Weg-Senff oder Hederich-Synop. *Syrop de Velar*; attenuat, atque incidit pituitosos atque viscosos humores in pectore, expectorationem promovet, & respirationem liberiores reddit, imprimis commendatur in raucedine. Per se datur ad unciam dimidiam ad unciam unam.

PERSICARIA.

Ratione Θis volatilis penetrantis, aperientis & resolventis summe commendatur in obstructione hypochondriorum, mesenterii & aliorum viscerum, & ob nimiam suam acrimoniam temperatur passulis. ▽

▽ dest. c. ꝑio dulci contra vermes potest dari, commendatur etiam contra calculum.

℞. Perficar. Mj. passul. maj. ℥ij. coq. ex ▽ f. cerevis. contra obstructions varias.

Vis magnetica quam in curandis ulceribus & vulneribus obtinere dicitur, docente experientia merito explodenda est. [Conf. hac dere Helmont. d. Magnet. Vuln. curat. §. 29. p. m. 459. Fonseca consult. 37. p. m. 252. & Marc. Marci Phil. Vet. restitut. Part. v. Sect. 1. subsect. vi. p. m. 495. seqq. de magnetismo Perficariæ.]

Externe in tumoribus resolvendis magni usus est, ut & in ulceribus sordidis mundificandis, succus cavo dentis inditus dolorem ejus tollit.

℞. ▽ dest Perficar. cape cochleatim contra calculum, tempera cum syr. d. althæa.

CUS-

PERSICARIA à similitudine foliorum, PULICARIA à vi pulicifuga, Pserfigkrauth / Flöhkraut / Kottich / Kassel. PERSICAIRE.

Est planta flore apetalo, plurimis scilicet staminibus constante, ex calyce multifido surgentibus. Pistillum autem abit in semen planum ex ovato acuminatum, in capsula, quæ floris calyx fuit, reconditum.

Ex Perficariæ speciebus in usum venit tum acris, tum mitis, tum maculosa tum non maculosa.

Perficaria urens seu Hydropiper C. B. Pin. 101. Perficaria acris sive Hydropiper L. B. 3. 780. Hydropeperi Dod. Pempt. 607. Scharff oder brennend Flöhkraut / Flöh-Pfeffer / Wasser-Pfeffer / à loco & sapore, Pfauenkrauth / Pfauenspiegel / PAVONARIA à maculis, Brennender-Kottich / Mücken-Krauth / CURAGE.

Perficaria mitis maculosa C. B. Pin. 101. Perficaria mitis L. B. 3. 779. Perficaria ij. Tabern Ic. 857. Gelind Flöhkraut.

Uuu 2

Per-

Persicaria lentic non maculosa C. B. Pin 101.

Crescunt in locis humidis, palustribus, fossis & scrobibus, in locis udis & herbidis ad urbes & pagos. Julio & Augusto potissimum florent.

PERSICARIA præsertim HYDROPIPER analysi Chymica suppeditat multum acidi & olei atque terræ cum paucis sale volatili concreto; ut testatur TOURNEFORTIUS in HIST. PLANT. CIRCA LUTET.

Calefacit persicaria, incidit, attenuat, aperit atque resolvit obstructions pulmonum, hepatis, Lienis atque mesenteni. In ictero, Hydrope, asthma, urina suppressa, ut & in scorbuto laudatur. Planta præterea insignis est vulneraria tum interne, tum externe. Tumores veteres, ut SCHWENCKFELDT loquitur, duritiesque veteres discutit & sugillata delet, vulnera & ulcera mirifice purgat. Clavos quoque & verrucas curat. In arthritide vaga scorbutica à nonnullis deprædicatur. Juxta DEODATUM aliosque herba dolentibus dentibus masticata, mox fimo ad putrescendum sepulta, dolorem auferre dicitur. Cubiculis inspergitur ad enecandos pulices. Reperiuntur qui ob signaturam in morbo petechiali laudant, ad sanguinem purificandum & impuritatem expellendam. Curiosum est, quod dicitur equos succo Persicariæ inunctos, muscas non admittere. Carnibus quoque ab insectis servandis circumponitur.

CUSCUTA. EPITHYMUM.

Notæ sunt plantæ ob vim referandi obstructions præcipue in scorbuto & hydrope, quæ in Θ e volatili acri, mitiori tamen quam in persicaria & erysimo consistere videtur, specificè laudatur in viscosa bile incidenda. Datur ∇ dest. syr. & infus.

\mathcal{R} . Rad. helen. \mathfrak{z} j. raphan. rustic. \mathfrak{z} vj. summit. cent. min. Mj. cortic. Winteran. \mathfrak{z} j. Cuscut. p. ij. passul. min. \mathfrak{z} j. f. infus. add. fol. fenn. \mathfrak{z} j. rad. hell. n. \mathfrak{z} ij. contra malum hypochondriacum.

PLAN.

Κασσῦτη, κασσυλα, CASSUTHA, CASSUTA LUPULI, ANGINA & PODAGRA LINI, OROBUS ARBORUM & HERBARUM, quoniam tanquam planta parasitica se circumvolvitur plantis, easque quandoque strangulat, Filskraut / Seide-Flachs / Seide / Seidenkraut / Hopffen-Seiden / Flachs-Dotter / CUSCUTE.

Est planta flore monopetalo veluti campaniformi multifido, ex cujus calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod abit in fructum membranaceum, subrotundum, angulatum (postica parte perforata incumbente capsulæ, quæ fundum calycis occupat) seminibusque sætum tenuissimis.

Cuscuta major C. B. Pin. 219. Cassutha sive Cuscuta I. B. 3. 266. Cassitha Tabern. Icon. 901.

Falsum est hanc plantam omni plane destitui radice, tum deum illa deficit, quando aliis plantis, ex quibus deinde nutrimentum exsugit, jam adhæsit. Prope sepes inter Lupulos, & Linum, urticam, Hyssopum &c. haud raro luxuriat, & mole sua plantis nocet; floret Junio, Julio & Augusto. In usum trahitur potissimum Cuscuta Lupulo & Lino adhærens. Vi aperitiva, abstersiva ac diuretica gaudet, ad affectus hepaticos & Spleneticos, malum Hypochondriacum, melancholiam Hypochondriacam & icterum, imprimis nigrum nec non ad scabiem commendatur. Febris quoque auxiliari dicitur. Sunt qui Cuscutam in lue Venerea laudant.

Επιθυμόν, EPITHYUMUM, supra Thymum crescens, CUSCUTA THYMI, CUSCUTA MINOR, CASSUTA MINOR, Thym-Seiden / Stolz-Kraut / EPITHIM, GALLE OU TEIGNE DE THYM.

Est utique species Cuscutæ, quæ dicitur Cuscuta minor Tourn. I. R. H. App. p. 652. Epithymum sive Cuscuta minor. C. B. Pin. 219. Epithymum Tabern. Icon. 357.

Æque ac prior cuscuta radiculis suis nititur, cum primum erumpit, mox autem parasitica facta, cum plantas vicinas arripuerit, circumvolveturque illis destituitur. Foliis quoque similiter caret, & totum capillamentis constat tenuibus, saporis nonnihil acris & subadstringentis, coloris sabrubentis, quæ alimentum sugunt ope cotyledonum seu tuberculorum asperorum, quibus arcte cortici cæterarum plantarum adhærent.

Epithymum aperit quoque, abstergit & alvum laxat; in affe-
ctibus scorbuticis & Hypochondriacis laudatur, item in epilepticis
& vertiginosis præsertim, qui oriuntur per consensum splenis &
Hypochondriorum. Ingreditur nodulos atque infusa laxantia &
purgantia.

PLANTÆ SALIBUS FIXIS SEU AMARIS CONSTANTES CUM PAUCO VOLATILI SALE.

CENTAURIUM MINUS.

Ob intensam acredinem & amaritiem in qua Θ fixum
latet, potentissime deobstruit, acida destruit, unde in ob-
structionibus chronicis & febribus intermittentibus primum
locum obtinet, aperit quoque suppressas hæmorrhoides &
menses promovet. Extra ulceribus applicatum ea mundat,
additur quoque clysteribus contra morbos soporosos.

Datur subst. decoct. infus. extract. aq. Θ .

\mathcal{R} . Cent. min. 3ss . Θ propr. $\mathfrak{z}\text{ss}$. f. pulv. exhibendus c.
aq. propria.

\mathcal{R} . Cent. min. Card. B. summit. orig. ana M^{ss} . Croc. or.
 $\mathfrak{z}\text{j}$. fruct. alkek. $\mathfrak{z}\text{j}$. coq. in aq. simpl. ad consumpt. mediet.
ad ℥ij . hoc decocto curatus fuit senex quidam febre quoti-
diana cum anorexia & ictero afflictus.

CAR.

Κενταύριον μικρόν , CENTAURIUM à Centauro Thessaliæ Medi-
co, FEL TERRÆ ab amaritudine, FEBRIFUGA à virtute,
Klein tausend Gûlden-Krauth/ ob insignes dotes, Erd-Gall/ Sieber-
Krauth/ PETITE CENTAURÉE.

Est planta flore monopetalo, infundibuliformi & multifido, ex
cujus

eius calyce surgit pistillum, quod infimam floris partem perfodit, abitque in fructum cylindraceum pene vel ovatum, in duo locula-
menta divisum, & seminibus foetum ut plurimum exiguis.

Centaurium minus C.B. Pin. 278. & Dod. Pempt. 336. Centau-
rium minus flore purpureo L. B. 3. 353.

Loca amat herbosa & aratro non proscissa, aliquantulum sed
tamen non omnino rigua, floret Julio & Augusto.

In usu est planta foliis ac floribus referta seu summitates. Ab-
stergit & resolvit quasvis sordes in primis viis stagnantes, simulque
intestina ad excretionem stimulat. Omnibus vitiis à bile oriundis
dicata est. Hinc virtutem hepaticam Posthius sequentibus expri-
mit versiculis,

*Flos mihi suave rubet, sed inest quoque succus amarus,
Qui juvat abscessum bilem aperitque jecur.*

Convenit in Cachexia & malo Hypochondriaco, scorbuto, ar-
thritide, lumbricis & morfu canis rabidi. Laudatur etiam in peste.
Ingreditur Theriacam. Vix vinum medicatum stomachicum & an-
ticachecticum paratur, quod non ingrediatur Centaurium minus.
Succus Centaurii minoris cum gossypio pudendis intrusus menses
prolicit. Decoctum laudatur contra pediculos, furfures & tineam.
De Centaurio minore scripsit LEDELIUS.

IN OFFICINIS EXTANT

*Aqua Centaurii minoris, ex integra planta, tausend Gulden-Kraut-
Wasser/ Eau de petite Centaurée.*

*Conserva Centaurii minoris, tausend Gulden-Blumen-Zucker/ Con-
serve de petite Centaurée in vulgus notissima, ad quam in morbis
stomachi a bile oriundis, ut & febribus intermittentibus frequentissi-
me confugiunt.*

*Extractum Centaurii minoris, tausend Gulden-Krauth. Extract/
Extrait de petite Centaurée, datur usque ad drachmam & ultra in
febribus intermittentibus & obstructionibus.*

*Sal Centaurii minoris, tausend Gulden-Krauth-Salz/ Sel de petite
Centaurée, quod præ aliis salibus per incinerationem paratis nil pe-
culiare obtinet.*

CAR-

CARDUUS BENEDICTUS.

Virtute antifebrili respondet centaurio minori, quo tamen paulo mitior est, cæterum sanguinem coagulatum mire dissolvit, & propterea in pleuritide confert. Decoctum observante Ballonio urinam reddit crassam & foetidam.

Datur subst. decoct. infus. aq. dest. syr. & Θ.

F U.

CARDUUS BENEDICTUS, CARDOBENEDICTUS, CARDUUS SANCTUS, à virtutibus ita dicitur, *Κνικὸς ἀγρία*, CNICUS SYLVESTRIS, Cardobenedicten/ gesegnete/ hochgelobte/ gebenedeite Distel / Spinnen-Distel / quod lanugine araneorum telis simili capita ejus septa sint, aut araneorum moribus medeatur. CHARDON BENIT. Ad Cnicum refertur à **TOURNEFORTIO**.

Est scilicet planta flore flosculoso, plurimis flosculis constante multifidis, embryoni insidentibus & calyce squamoso sed amplioribus foliis capitelli instar circumvallato comprehensis. Embryo autem abit in semen pappis instructum.

Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus Benedictus C. B. P. 378. Carduus benedictus I. B. 3. 75. & Dod. Pempt. 737. Colitur in hortis, floret Junio & Julio semen autumnio maturascit.

In usum venit herba colligenda dum floret cum semine.

Carduus benedictus, qui gustu amarus est, incidendi, attenuandi, abstergerendi, penetrandi expurgandi siccandi & calefaciendi vires obtinet. Menses movet sanguinem mundificat, vi diaphoretica gaudet pus è pectore & pulmonibus educit; in morbo comitiali confert. Lienis & jecoris obstructions expedit putredini atque vermibus resistit. Ventriculo confert, cibi fastidium discutit, urinam & calculum pellit. Ad capitis dolorem imprimis Cephalæam & clavum valet, venenis resistit & pestilentibus morbis confert. Vertiginem pellit memoriam confortat atque visum.

Contra febres tertianam & quartanam etiam inveteratas deprædi-

prædicatur. Cancrum aliaque maligna putrida & Gallica ulcera sanat. Carduus benedictus asserente SCHROEDERO, si sub initium Julii collectus fuerit, vulnera recentia mirabiliter curat, sin alio tempore nunquam id præstabit. Sunt qui teneriora folia in cibum trahunt. Pulvis foliorum & summitatum teneriorum euporiston vulgare est in affectibus ventriculi, appetitu dejecto, febribus aliisque morbis. Sæpissime jungitur cum pulvere corticum aurantium Crystallis tartari atque oculis cancerorum aliisque. Dosis est ad ʒj. usque.

Radix Carduibenedicti urinam foetidam reddit, & alarum totiusque corporis graveolentiam corrigit. Conferatur PETRI in peculiari de carduo hoc tractatu.

PROSTANT IN OFFICINIS

Aqua Cardui benedicti ex herba integra, *Cardobenedicten-Wasser / Eau de Chardon Benit*. Vehiculum constituit alexipharmacorum; diaphoresin promovet, in affectibus capitis & pectoris conducit.

Essentia Cardui benedicti, Cardobenedicten-Essenz / Essence de Chardon benit. Stomacho præsertim est dicata, datur ad guttas viginti, triginta & ultra.

Sal Cardui benedicti, Cardobenedicten-Salz / Sel de Chardon benit, cum aliis salibus fixis coincidens.

Syrupus Cardui benedicti, Cardobenedicten-Syrup / Syrop de Chardon benit. Hunc syrupum plebs & mulierculæ magni faciunt in stomacho vitiato, in cruditatibus & in appetitu prostrato, utuntur quoque eo post contractam iram & ad colicam. Commendant porro illum ad vermes enecandos putredinemque arcendam, & in pleuritide, febribus malignis & pestilentialibus laudant. Dosis à cochleari uno ad duo vel tria.

FUMARIA.

Salibus nonnihil subtilioribus volatilioribus & penetrantioribus gaudet quam Centaurium & carduus benedictus, & propterea sanguinis acidam dyscrasiam corrigendo, in mor-

bis chronicis, malo hypochondriaco, scorbutō, scabie, quartana, singularis est efficacīæ.

℞. Fumar. rec. Mj. rad. Chin. ʒʒ. M. f. decoct. contra scabiem, ut & malum Hypochondriacum.

℞. Cort. saffraſas ʒiʒ. fumar. rec. Mj. f. infus. ex vino ad obstructionem hypochondriorum.

℞. Succ. cochlear. fumar. ana q. v. M. c. sero lactis exhibe contra scorbutum, tanquam medicamentum temperatius.

℞. Pil. d. fumar. ʒʒ. ꝑ d. ʒʒ. cape ad scabiem scorbuticam, it. ad sanguinem purificandum.

SCOR-

καπνὸς fumus, quia succus oculis instillatus fumi instar mordeat. Erdrauch/ Trauben Krauth/ Ragen und Trauben Körbel/ Trauben Kropff/ CEREFOLIUM FELINUM & COLUMBINUM, Grind Krauth/ Krag Heyl/ SOLAMEN SCABIOSORUM, FUMETERRE.

Est planta flore polypetalo, anomalo papilionaceo æmulo ex duobus tantum petalis constante quasi bilabiato, labio superiori in caudam abeunte cum inferiori ad pediculum conjuncto. Hæc inter labia velut in palato, cujus os à ligula occupatur pistillum positum est vagina obvolutum, quod deinde abit in fructum membranaceum nunc longiorem nunc breviorē, semine foetum subrotundo. Adde folia tenuiter dissecta & cæſia.

Fumaria officinarum & Dioscoridis flore purpureo C. B. Pin. 143. Fumaria vulgaris L. B. 3. 201. FFumaria Dod. Pempt. 59.

Multis in locis in hortis agris ac secus vias sponte provenit, floret Majo & Junio. In usu est præsertim herba cum floribus.

Urinam ciet laxat leniter & serosos humores purgat. In affectibus hydropicis & cachecticis conducit, ut & in morbis Veneris. Vermes quoque necat. In curis vernalibus sæpius adhibetur, & infusum cum sero lactis scabie prurientibus conducit. In oculorum affectibus quoque laudatur.

IN OFFICINIS ASSERVANTUR

Aqua Fumaria, Taubentropff- oder Erdrauch-Wasser / *Eau de Fumeterre*, quam in variolis & morbillis aliisque febribus continuis quidam laudant, quidam vituperant, oculis conducit, faciei maculas delet. In olfactu laeso laudatur.

Conserua Fumariae, Taubentropff-Zucker / *Conserve de fumeterre*,

Syrupus Fumariae, Taubentropff-Syrup / *Syrop de fumeterre*, in transpiratione promovenda utilis.

Extractum Fumariae, Taubentropff-Extract / *Extrait de fumeterre*.

SCORDIUM.

Ob Θ ia penetrantissima tam fixa quam volatilia omne peregrinum praecipue ad putredinem inclinans per sudorem expellit, hunc in finem est alexipharmacum, antipestilentialia & polychrestum. In malignis, it. in curando morbo Hungarico, in lumbricis. [Qua occasione vis putredini resistendi in scordio reperta fuerit vid. ap. Galen. de antidotis l. i. c. 12.]

Dat. subst. decoct. Elect. diascordium dictum, stimulat optime camphora, sed à plebejis allio.

\mathcal{R} . Scord. absynth. cent. min. ana Mj. Myrrh. \mathfrak{z} j. camph. \mathfrak{z} ij. vel iij. affund. \sim vin. f. infusum pro lavamento ad curandam gangraenam vel sphacelum.

\mathcal{R} . Scord. summitat. hyperic. ana Mj. f. decoct. pro lumbricis.

\mathcal{R} . Scord. summit. hyperic. fol. fenn. ana \mathfrak{z} j. f. pulv. contra vermes.

\mathcal{R} . Diascord. \mathfrak{z} j. camph. gr. iij. Θ volatil. C. C. \mathfrak{z} ss. M. f. bolus in malignis ad ciendos sudores.

Σκώδιον ἀπὸ τοῦ σκωρόδου ab odore & acrimonia, quod folia contrita alii odorem referant, CHAMÆDRYS PALUSTRIS, Wasseroder Lachen-Knoblauch / Wasser-Bathenig / GERMANDRÉE D'EAU, SCORDIUM, CHAMMARAZ.

Est species Chamædrys, scilicet Chamædrys palustris canescens feu Scordium officinarum Tourn. I. R. H. cl. 4. S. 4. g. 1. Scordium C. B. Pin. 247. & Dod. Pempt. 126. & I. B. 3. 292. Crescit in locis humidis, floret Junio & Julio.

Scordium in affectibus pulmonum imprimis empyemate quoque celebratur, expectorationem promovet & visceris corruptelam arcet. Vulnere ac ulcera putrida mundificat. Ventriculo porro benefacit, urinam, sabulum & menses pellit. Hydropicis quoque succurrit.

IN PHARMACOPOLIIS REPERIUNTUR

Aqua scordii destillata, Lachenknoblauch-Wasser / Eau de scordium.

Syrupus scordii, Lachenknoblauch-Syrup / Syrop de scordium, cui vires alexipharmacæ emmenagogæ & anthelminticæ adscribuntur.

Electuarium Diascordium Fracastorii, seu *Diascordium simpliciter dictum*, anhaltende Gist-Lattwerg / *Diascordium*. Egregium est sudoriferum & alexipharmacum in morbis malignis admodum proficuum, sudores elicit, motus sedat, quietem conciliat, vomitum diarrhoeam, dysenteriam omnemque fluxum præternaturalem sistit, ad catarrhos quoque sistendos conducit. Dosis est ad scrupulum ad Drachmam unam; in fluxibus alvinis commode Rhabarbarum tostum commiscetur. Uncia electuarii fere duo grana opii continet.

LUPULUS.

Salem suum utrumque tam fixum quam volatilem in quadam quasi resina & glutinositate inclusum habet, ob quam rationem non tantum crassa & viscida incidit & vel per sudorem vel ver urinam expellit, sed & blande ad somnum componit: in malo hypochondriaco, scorbuto, febribus chro-

chronicis, scabie aliisque cutaneis affectibus laudatur. Turiones etiam vim alvum laxandi obtinent.

℞. Capit. lupul. herb. fumar. ana Mj. passul. min ʒij. f. decoct. contra malum hypochondriacum, cui in alvi adstrictione infunde rad. hell. n. rhabarb. ana ʒij.

PLAN.

LUPULUM, à Lupo sub eo se condente, vel à floribus instar Lupi noxiis & hominibus temulentiam & gravedinem capitis inducentibus. LUPUS REPTITIUS & HUMULUS, LUPULUS SALICTARIUS, quoniam Salices scandit, VITIS SEPTENTRIONALIS, VOLUBILIS MAGNA. Hopff / HOUBLON.

Est planta flore apetalo, plurimis staminibus calyci insidentibus constante & sterili; embryones enim iis speciebus Lupuli innascenti solent, quæ flore carent, abeuntque in fructum squamosum, ex plurimis foliis compositum axi affixis, in quorum alis adsunt semina calyptra obvoluta.

Lupulus mas C.B. Pin. 298. & I. B. 2. 151. Lupulus Dod. Pempt. 409. Camer Epit. 933. &

Lupulus foemina C. B. Pin. 298. I. B. 2. 151. Camer. Epit. 934.

Ubivis ad sepes, dumeta & margines pratorum humentium luxuriat. Colitur quoque in quibusdam regionibus, adeoque vel est sativus vel sylvestris, floret Augusto.

TURIONES LUPULI hybernis praesertim mensibus repertiendi, Junger-Hopff / TENDRONS d'HOUBLONS, LUPULI GERMINA TENELLA, gratum praebent edulium, eodem modo parantur ac turiones asparagi; alvum fluidam reddunt, obstructions viscerum reserant, detergendo, incidendo attenuandoque urinam pellunt. Quidam turiones hos adhuc comedunt, quando folia expandi incipiunt. Melius autem sapiunt, si folia plane nondum comparent, quo juniores eo meliores. Flores potissimum ad cerevisiam, de qua sub hordeo actum, usurpantur.

Rarius in usum Medicum trahuntur. Ob virtutem deopilantem & aperientem commendantur iis qui hepatis, splenis alio-

rumque viscerum obstructione, ictero hydropo melancholia, quartana, laborant. Menses quoque & urinam pellunt. Decocti in lacte ad vermes celebrantur. Imprimis autem depradicantur in scabie aliisque vitiis cutaneis. Externe medentur contusis & luxatis.

PLANTÆ PURGANTES.

SENNA.

Blandum, polychrestum & catholicum, humores quovis movens, per alvum blande educens, jungitur variis specificis, morbo cuique appropriatis, vis potior in Θ e volatili particulis terreis & nonnihil gummosis videtur inclusa, quare potius in infuso, quam in decocto exhibendum est. In gummositate autem potior vis consistere videtur.

Dantur folia pediculis & stipitibus rejectis, corrigitur & stimulatur sale Ψ ri ut & rhabarb. in substantia datur ad \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} j. in infuso ad $\mathfrak{z}\beta$. vel ex aq. fumarie Ψ isata vel sero lactis, vel decocto prunorum, vel melius decocto passularum.

\mathfrak{R} . Fol. Senn. $\mathfrak{z}\beta$. rhabar. $\mathfrak{z}\beta$. Θ Ψ ri. \mathfrak{z} j. sem. anis. fœnicul. ana \mathfrak{z} j. cinam. $\mathfrak{z}\beta$. infunde aq. fumarie pro infuso laxante.

\mathfrak{R} . Fol. senn. \mathfrak{z} ij. Θ Ψ ri. \mathfrak{z} j. infund. aquæ simplici ferventi. \mathfrak{R} . Colatur \mathfrak{z} ij. vel iij. edulcor. syr. d. pom. q. s.

\mathfrak{R} . Fol. senn. \mathfrak{z} j. caryoph. arom. gr. viij. sacch. cand. \mathfrak{z} j. M. f. p.

\mathfrak{R} . Fol. senn. $\mathfrak{z}\beta$. sem. anis. \mathfrak{z} j. affund. aq. ferventiss. stent in infuso, infusum cape sorbillando ut thea, pro laxanda alvo.

SENA, quasi Sana. FOLIUM ORIENTALE, Senne /
Sennet / Sennet-Blätter / SENE.

Est planta flore rosaceo, ex quinque ut plurimum petalis constans, cujus pistillum abit in siliquam planam admodum, ut plurimum incurvam, ex duabus membranis compositam, quas intermidulantur semina gigantis similia, tenuibus veluti dissepimentis inter se distincta.

Senna Alexandrina sive foliis acutis C. B. Pin. 397. Sena I. B. I. 377. Sena Orientalis Tabern. Ic. 517. Senné Orientale ou Senné de Levant.

Senna Italica sive foliis obtusis C. B. Pin. 397. Sena Florentina sive foliis per extremum latis pene cordatis I. B. I. 377. Sena Italica Tabern. Ic. 518.

Hæ duæ species non solum loco natali sed & ipsis foliis atque virtute discrepant. Illa ex Orientalibus regionibus Syria Persia, Arabia, Ægypto per Alexandriam, unde & Senna Alexandrina appellari consuevit, ad nos adfertur; hæc vero in Italia potissimum provenit. Utraque est planta siliquosa, sed minime confundenda cum Coluthea, quam quidam Sennam sylvestrem nominant & nonnulli sed male substituere solent. Senna Orientalis obtinet folia acuta ex viridi plus minus pallescentia saporis subacris, amaricantis, nauseosi quodammodo. Italica folia obtinet latiora, & acumine obtusiore constantia, saporis glutinosi & magis subdulcis, Orientali inferior est.

Eligi debent folia Sennæ viridicantia, probe exsiccata non maculosa, nec teredine corrosa, tractu lævia à stipitibus repurgata, odoris fortis. In Gallia dum præscribuntur folia Sennæ sæpius foliorum Orientalium nomine tantum insigniuntur. Senna speciatim educendis melancholicis & pituitosis humoribus est dicata. In morbis ab atra bile, ut loquuntur, oriundis, & in ipsis etiam febribus continuis & ardentibus, teste WEDELIO, usurpari potest. A quibusdam reprehenditur, quod flatulenta sit & tormina excitet, id quod tamen non tam foliis ipsis quam stipitibus & folliculis Sennæ non diligenter remotis adscribendum est. Ad crudiores autem Sennæ partem corrigendam, adhibentur Tartarea & Nitrosa, Cremor & Crytalli Tartari, imprimis vero Tartarus Solubilis sive Sal vegetabile.

Infundi-

Infunditur Senna vel frigide vel calide, frigide cum solummodo aqua frigida superfunditur addito pauco Sale \square ri, ubi egregia tinctura extrahitur, calide vero cum aqua fervens superfunditur, aut in loco calido infusum detinetur. Hodiernis temporibus folia Sennæ instar herbæ Thée sæpissime usurpantur. Fit etiam infusio horum foliorum per noctem, postmodum insequente mane cum aqua decantata & fervefacta fit infusum Theæ edulcorandum Saccharo, vel ordinario vel Thomæo vel Manna &c. Decoctum cum prunis vel passulis hoc modo paratur.

\mathcal{R} . Prunor. dulc. vel Passul. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iiij. coquantur in aqu. & vin. ana \mathfrak{z} vj. in decoct. infund. fol. Senn. Al. S. S. \mathfrak{z} iiij. Cremoris Tartar. vel quod melius est, Tartar. Solub. $\mathfrak{z}\beta$. vel \mathfrak{z} j. digerantur per unam aut alteram horam, vel decoquantur, in colat. dissolv. Mann. Calabr. \mathfrak{z} iss. pro una vice.

Præscribitur etiam hoc modo,

\mathcal{R} . Fol. Senn. S. S. d. ad ch.

\mathcal{R} . \square r. Solub. \mathfrak{z} j. d. ad ch.

\mathcal{R} . Mann. Calabar. Mann. el. aut. Mann. tabul. vel Tartar. \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ij. d. ad ch.

Postea mulierculæ aut ministri jubentur facere decoctum prunorum cum aqua, vel si è re visum fuerit cum dimidia quoque parte vini. In decocti \mathfrak{z} vj. vel \mathfrak{z} viiij. infunduntur folia Sennæ cum Tartaro per unam aut alteram horam, aut fit statim decoctio. In colatura dissolvitur Manna præscripta, & post dissolutionem, si opus est, rursus fit colatio; unde emergit potiuncula laxans & polychresta.

In Gallia frequenti in usu sunt sic dictæ ptisanæ laxativæ cum Senna, additis quandoque quibusdam aliis appropriatis paratæ. Celebratur imprimis PTISANA REGIA, LA PTISANE ROYALE, ex Senna, Sale polychresto, crystallis tartari, Tartaro Solubili, pomo Citreo aut alio subacido per noctem in aqua simplici vel destillata infusis per noctem, & insequente mane leviter decoctis. Ex. gr.

\mathcal{R} . Fol. Senn. mund. S. S. $\mathfrak{z}\beta$. sem. anis. Cremor. Tartar. aut Tartar. solub. $\mathfrak{z}\beta$. vel \mathfrak{z} j. infunde omnia in aqu. fontan. \mathfrak{lb} j. adde limonem vel mala 2. Renettica seu Borsdorffiana in frusta majora dissecta, mane fiat lenis decoctio, filtretur liquor, & si placet aut

re visum fuerit, in eo dissolvatur Mann. el. ℥j. aut ℥ij. Aeger capiat 2. haustibus una hora interposita.

℞. Fol. Senn. S. S. ℥ij. Rhabarb. el. ℥j. ꝯr. Sol. ℥ij. infunde in Aqu. fontan. calid. ℔j. per noctem, mane insequente bulliant parumper, postea in colatura dissolvatur Mann. el. ℥j. vel ℥ij. & hauriatur. Si autem tempus non suppetit infusionem præmittendi, statim poterit fieri decoctio.

IN OFFICINIS PROSTANT E' SENNA

Decoctum laxativum Managettae, sive aqua laxativa Viennensis
Wienerisch Laxir. Trancflein / *Decoction laxative de Managetta.* Laudatur ad alvum laxandam, præsertim si in liquoris hujus unciiis aliquot solvatur Manna, & postea, si necessarium est, clarificatio instituat.

Species pro Decocto antifebrili, Species zum Fieber, Trancf, poudre pour la Decoction ou Apozeme febrifuge laxative. Tempore usus coquantur in quantitate sufficiente aquæ, per horæ quadrantem, in vase optime tecto. De hoc decocto, singulis diebus intermissionis febrilis, haustus aliquot unciarum trium vel quatuor assumitur. Ut plurimum autem ad potiones laxantes vehiculi loco adhibetur. Commode in eo dissolvitur Manna. Drachma specierum pro uncia una liquoris est sumenda.

℞. Decoct. antifebr. ℥iv. Mann. Calabr. ℥j. Msc. pro dosi in passion. Iliac. repetatur singulis quatuor horis.

℞. Decoct. antifebr. ℥iij. Diacyd. lucid. Gialap. ℥ij. aut ℥iij. Mann. elect. ℥j. Msc. d. ad vitr. pro dosi.

℞. Decoct. antifebr. Mann. liquid. ana ℥j. Diacyd. lucid. Gialap. ℥ij. Aqu. Cinam. bugloss. ana ℥ß. Msc. pro dosi.

Notandum autem has potiunculas calide assumi debere, ne tormina insequantur.

Senna porro vix non omnes nodulos laxantes ingreditur, **W E D E L I O** sequentes species laxativæ placuerunt.

℞. Rad. acetos. Scorzon. Cichor. ana ℥j. summit. fumar. Centaur. min. ana Mß. flor. 4. cordial. ana p. j. fol. Senn. S. S. ℥ß. Rhabarb. elect. ℥iß. Cost. ver. ℥j. Cremor. Tart. ℥jv. Msc. pro nodulo: pro pauperibus omitti poterit Rhabarbarum & dosi Sennæ adaugeri, vel etiam Rhabarbarum Monachorum substitui, Pertinent huc quoque

Species pro decocto aperitivo majori, *Species zum großen eröffnenden Trancé / Poudre pour l'Apozeme aperitive majeure*. Laudatur decoctum exinde factum ad quascunque obstructions in abdomine; usurpatur autem frequentius ad medicamenta laxantia & purgantia in eo dissolvenda. Per se hauritur ad aliquot uncias.

Species pro decocto aperitivo minori sive pro decocto lenitivo, *Species zum eröffnenden oder Laxier-Trancé / Poudre pour l'Apozeme aperitive mineure ou lenitif*. Ad eodem usus conducit ac antecedens.

Electuarium Diacatholicum, *Electuaire Catholicon*. Commendatur tanquam purgans universale in omnibus morbis & ad omnes humores educendos. Dosis ad unciam semis ad unciam unam. In Gallia adhuc in usu; frequenter ad unciam unam cum dimidia usque immiscetur Clysteribus.

Electuarium Lenitivum Florenzolæ, *Electuaire Lenitif de Florenzola*. Ad alvum laxandam & emolliendam, bilem pituitamque & sic dictum succum melancholicum educendum tum in febribus, pleuritide, tum etiam in renum & aliis pectoris affectibus commendabatur. Dosis à drachmis duabus ad unciam & ultra, sed hodie vix aliter quam in clysteribus adhibetur, ad unciam unam, unciam unam semis.

Passulæ laxativæ sive purgantes cum & sine brodio, *Purgier-Rosinen mit und ohne Brüh / Raisins de Corinthe avec jus ou sans jus*. Alvum ob Sennam laxant & purgant. Dantur ad unciam semis ad unciam, unam &c.

Syrupus fragrans laxativus Küsseri, *Dr. Küssers Laxier-Syrup / Syrop laxatif de Kuefer*. Pro scopo laxandi adhibetur ad unciam unam, duas, tres, à Senna quoque virtutem obtinens uti &

Syrupus pomorum laxativus, *Laxierender Aepffel-Syrup / Syrop de Pommes laxatif*. Purgat & aperit, commendatur in affectibus melancholicis & hystericis, menses quoque pellere dicitur. Datur ad unciam dimidiam ad uncias duas.

Extractum foliorum Sennæ, *Sennetblätter-Extract / Extrait de Séné*, quod cum aqua Sale Tartari acuata paratur, datur ad ʒss. ad ʒij. vix autem amplius usurpatur.

HOFFMANNUS IN SCHROEDERUM sequentes *Crystallæ Sennæ laxativas* ab HERTODIO communicatas recenset,

℞. Spir. Roris Majal, q. v. in hoc infunde per noctem folia Sen-

na S. S. q. v. ut Spiritus quatuor digitos emineat, tinctura aliquoties per chartam bibulam filtretur, postea pars superflua levissimo calore exhalet, spiritus reliquus in frigido & sicco loco locetur, & tunc cryalli concrelescent quæ in vase servandæ sunt clauso. Dosis ad gr. v. ad ℥j.

Beato Parenti meo olim in usu multum fuit, nec absque successu à me usurpatur sequens *pulvis stomachico laxativus*.

℞. Succol. pulv. stomach. Birokm. ana ʒvj. Trag. aromat ʒß. fol. Senn. S. S. ʒvj. ʘʘ Cinam. Caryophyll. ana gtt. vj. Ambr. Gryf. Mosch. ana gr. j. Msc. f. pulvis: pro sexu sequiori absque ambræ & Moscho poterit asservari. Assumitur vel ante vel post prastum ad modum Tragææ. Dosis est quantum duobus tribus vel quatuor cultri cuspidibus comprehendi potest.

Tandem pauca de folliculis seu siliquis Sennæ addenda. Sunt autem folliculi sulcati, recurvi, semilunares compressi, ut superior membrana inferiori incumbat, continentes semina nigricantia & subviridescencia. Sunt qui hos folliculos ipsi Sennæ præferunt, experientia autem tutius usurpari folia docet.

SOLDANELLA.

Gallica præstantior quam nostra Belgica, blande aquas præcipue hypochondriorum expurgat per alvum, hinc antiscorbuticis, & antihypochondriacis medicamentis pro laxante adjungitur.

Datur pulv. ʒj. succus ad. ʒß. in decoct. Mj.

℞. Fol. soldanell. ʒj. f. decoct. vel infus. cui infund. rhabarb. ʒj. exhibe hypochondriacis simul hydrope correptis.

℞. Fol. soldanell. cochlear. ana Mj. contere & extrahe succum, quem misce cum passularum decocto, exhibe scorbutico ad laxandam alvum.

GRA-

BRASSICA MARINA, CONVULVULUS MARINUS, CAMPANULA MARINA, Soldanell / Meerfohl / Meerwinde / Meer-glöcklein / SOLDANELLE, CHOU MARIN.

Est species Convolvuli, planta videlicet flore monopetalo, campaniformi, ora repanda, cujus pistillum, quod surgit ex calyce, abit in fructum subrotundum, membranaceum, seminibus angulatis foetum.

Convolvulus maritimus nostras Mor. Hist. Oxon. part. 2. 11. Soldanella maritima minor C. B. Pin. 295. Brassica marina sive Soldanella I. B. 2. 166. Soldanella Dod. Pempt. 395.

In locis maritimis Italiae, Galliae, Angliae, & Belgii crescit, floret æstate.

GRATIOLA.

Aquas hypochondriacorum & hydropicorum fortiter tam per superiora quam inferiora expurgat, in enecandis & expellendis vermibus efficacissima est.

Externe hydrocephalis medetur.

Corrigitur Zinzib. Mac. Cinam. anis. specificatur in malo hypochondriaco cochlearia. Datur pulv. ad ʒij. infus. ad ʒij. succus inspissatus ad ʒj. & aliquando ad ʒiʒ. optimum est extractum cum aqua vini factum, quod datur à ʒj. ad ʒʒ. conserva folior ad ʒij. paratur quoque Θ fixum, quod hydropicis specificum & diureticum est.

℞. Gratiol. ʒʒ. sem. anis. ʒij. passul. min. ʒj. coq. leniter in vino, propinetur colatura ad educendas aquas hydropicorum.

℞. Soldanell. gratiol. fol. ebul. asari, sambuc. flor. genist. persicor. cort. sambuc. frangul. rad. ireos germanicæ, esul. ana q. v. add. pulp. colocynth. p. j. coq. in urina, applica totum hydrocephalo.

℞. Gratiol. Cent. min. ana Mj. sem. tanacet. fanton. ana

ana ꝑ. coq. in ▽ f. Clyster. ad enecandos & expellendos vermes, hærentes præcipue in intestinis crassis.

NI-

GRATIOLA, quasi minus grata ob amaritiem, GRATIOLA CENTAUROIDES, GRATIA DEI, LIMNESIUM, Wild Wurin/ Gottes Gnad/ Gottes Gnad-Krauth.

Refertur à TOURNEFORTIO ad Digitalem, est enim planta flore monopetalo, anomalo, tubulato utrinque patente, & quasi bilabiato ex cujus calyce surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum seu testam è rotundo acuminatam, bifariam dehiscentem, in duo loculamenta divisam, & seminibus foetam utplurimum exiguis.

Digitalis minima gratiola dicta Moris. Hist. Oxon. p. 2. 419. Gratiola Centauroides C. B. Pin. 279. Gratiola I. B. 3. 434. & Dod. Pempt. 362. In locis uliginosis & palustribus pratisque humidioribus provenit. Floret Junio & Julio.

Folia quæ usurpantur tum recentia tum sicca, commendantur quoque ad febres intermittentes imprimis quartanam, arthritidem & alios morbos Heroicos. Virtute gaudet traumatica externe vulneribus inspersa. Pulvis Gratiolæ ad ʒj. ad ʒj. datur in substantia, in infuso vero aut decocto ad ʒj. ad ʒiij. exhibetur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Conserva Gratiolæ, Wild Wurin oder Gottes Gnaden-Zucker/ Conserve de Gratiolæ, quam quidam in febribus pro excitando vomitu in arcanis habent.

Quidam exinde parant extractum, quod melius adhuc quam sal per incinerationem prolectum.

NICOTIANA.

Hujus vis potenter incidendi, aperiendi & resolvendi, ut & purgandi aquas tam supra quam infra consistit in. Oe-

Yyy 3

tam

tam fixo quam volatili, vis somnum inducendi & stuporem, dolor em mulcendi, consistit in pinguedine seu glutinositate volatili.

Foliorum infusum vel decoctum purgat per superiora & inferiora, idem faciunt folia in pulverem trita, quæ masticata salivam potenter movent, dentium quoque dolorem tollunt, naribus attracta sternutationem inducunt. Decoctum mundificat ulcera sordida.

Fumus accensorum foliorum in quo Θ volatile \circ sum seu mucositas stuporem inducit, ac somnum accersit.

Oleum destillatum sanguini immediate permixtum præsentaneam infert mortem, unde Viganus in Chym. p. 36. oleo hoc foetido feles enecari dicit, dummodo una guttula stillatur in linguam. [Circa hanc rem plura experimenta instituit Franc. Redi in Experim. circa res diversas naturales pag. 13. seq. it. p. 54. & Joh. Jacob. Harder. in Apiario obs. I. usque ad septimam, qui in varii generis animantibus experimenta fecit.]

Succus ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. datus purgat $\acute{\alpha}\nu\omega$ & $\kappa\acute{\alpha}\tau\omega$, injicitur quoque fistulis ad eas mundificandas & curandas.

Balsamus Nicotianæ vulnerarium est externum. Unguent. ex Nicot. factum necat pediculos, quod etiam præstat \circ Nicot.

Syrup. & ∇ Nicot. in asthmate & catarrho suffocativo valent. Prostat quoque Syrup. Nicot. emeticus in asthmate & aliis thoracis affectibus deprædicatus.

\mathfrak{R} . Fol. Nicot. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{\beta}$. infund. vino seu cerev. ad $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{\beta}$. cape infus. pro purgante $\acute{\alpha}\nu\omega$ & $\kappa\acute{\alpha}\tau\omega$.

\mathfrak{R} . Fol. Nicot. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. fl. ros. pall. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. infund. s. q. vini pro vomitorio & purgante.

\mathfrak{R} . Syr. Nicot. heder. terr. d. symph. Fern. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$. M. exhibe contra asthma.

\mathfrak{R} . ∇ dest.

℞. ▽ dest. Nicot. ʒj. ʒ̄ per camp. gt. v. cape contra
asthma.

℞. Succ. Nicot. inde vulneribus ad ea mundificanda,
add. quoque myrrh. aloë ad vulnera & fistulas curan-
das.

PLAN.

NICOTIANA à Joh. NICOTIO Nemausensi Regis Galliarum
apud Regem Portugalliarum Legato, qui anno 1560 semen, quod à
Belga ex Florida reduce acceperat, primum in Galliam attulit, Re-
ginæque obtulit, unde & HERBA REGINÆ, HERBA LEGATI
dicitur. TABACUM vocatur ab insula in qua abundat. PETUM
à πῆλω extendo, à foliorum scilicet extensione, SANA SANCTA
INDORUM, HERBA SANCTA, HERBA DIVINA à viribus.
HERBA SANCTÆ CRUCIS, HERBA MEDICEA, HERBA PA-
NACEA, HERBA PRIORIS quoque audit. Taback / India-
nisch Wund-Krauth / Indianisch Beinwelle / Heilig-Krauth / India-
nisch Bilsen-Krauth / NICOTIANE OU TABAC.

Est planta flore monopetalo, infundibuliformi & multifido;
ex cujus calyce surgit pistillum infimæ floris parti ad instar clavi
infixum, quod deinde abit in fructum membranaceum oblongum,
vel subrotundum, septo intermedio in duo loculamenta divisum,
plurimis seminibus foetum placentæ affixis.

Nicotiana major latifolia C. B. Pin. 169. Nicotiana major
sive Tabacum majus I. B. 3. 629. Hyoscyamus Peruvianus Dod.
Pempt. 452. &

Nicotiana minor C. B. Pin. 170. Priapeja quibusdam Nico-
tiana minor I. B. 3. 630. Dubius Hyoscyamus luteolus solani-
folius Lob. lc. 269.

Nicotiana ex Indiis tum Orientali tum præcipue Occidentali
ad nos allata copiosissime nunc in Europa in agris colitur, seritur
vere, folia Augusto & Septembri colliguntur ex plantis, quibus
apex, ne in florem abirent, fuit decerptus. Floret alias Augusto.
Nicotiana minor in hortos translata se ipsam ex semine pro-
pagat.

Nicotiana anodyna expectorationem quoque promovet, & laudatur tanquam pestis præservativum juxta DIEMERBROECK. Externe planta recens vulnerarium remedium est egregium sive folia integra sive contusa imponantur. Folia *Nicotianæ* leviter contusa & imposita multum præstant in cruribus oedematosis. Medentur lichenibus, achoribus, favis, ulceribus fistulosis atque sinuosis, commendantur quoque in Phthiriasi. Quando usurpare volumus decoctum foliorum *Nicotianæ*, caute agendum, homines enim exinde in Maniam etiam incidisse historiæ tradunt. Fumus in genitalia admissus uteri affectibus confert, sicuti quoque per peculiare fistulas in anum inflatus in dolore colico & alvi obstructione pertinaci commendatur, quem ultimum in finem incoquitur quoque clysteribus vel cum aqua vel cum vino paratis. Effectus quidem violentos à talibus clysteribus observarunt authores, sed sæpe sæpius non adeo felices. *Nicotiana* minor ad culices, cimices & pediculos fugandos laudatur, si vel ejus succo vel decocto vel etiam foliis contritis obviam eamus. Semine hujus *Nicotianæ* utuntur ad priapismum sedandum, unde forsan nomen. Occasio hic sese offerret, de virtute egregia *Nicotianæ* in affectibus catarrhalibus aliisque ut & in subjectis phlegmaticæ potissimum constitutionis verba faciendi; cum sive ejus fumo, qui per fistulas hauritur, sive pulvere per nares attracto, similibus morbis atque subjectis quam maxime succurrì possit. At, ut credo, melius est fumibibulis & Naribus Tabacophilis suam relinquere consuetudinem incorrigibilem. Magis in excessu quam in defectu peccari extra dubium est, Folia manducantibus suam relinquimus aſam.

IN OFFICINIS PHARMACEUTICIS EXHIBETUR

Syrupus Nicotianæ, *Tabac-Syrup* / *Syrop de Tabac ou Nicotiane*, qui convenit adversus affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia, pituita crassa ac viscida adeo infarciuntur, ut intercepta respiratione suffocationis periculum immineat. Vomitus movet & expectorationem promovet. Datur ad drachmam ad drachmas sex ad unciam. Externe ulcera sordida & antiqua detergit absque dolore.

Oleum Nicotianæ, *Taback-Dehl* / *Huile de Tabac*, per infusionem paratum, quod ad tumores discutiendos & membra paralytica foven-

fovenda valet. Prodest etiam in coryza, sed rarioris est usus. Sunt qui ex Nicotiana destillant etiam oleum, sed non extat in officinis.

Unguentum Nicotianæ, Taback-Salb / Onguent de Nicotiane ou de Tabac. Mira huic unguento in scrophulis dissipandis vis inesse dicitur. Celebratur etiam in ulceribus, vulneribus tam recentibus quam antiquis persanandis. Adusta quoque, morphæam & tineam capitis juvat, ac cutim à scabie mundificat.

Pertinet huc quoque *Spiritus arthriticus per fermentationem paratus Boecleri, Bœcklers Glieder-Spiritus / Esprit contre la goutte.* In externis doloribus artuum, doloribus ischiadicis & in catarrhis conducit, confortat nervos, prodest in paralyti. Usurpatur solummodo externe.

PLANTÆ CONSTANTES SALE NITROSO LAXANTE. MERCURIALIS.

Ob nitrosum suum laxantem salem fœces emollit & promovet, propria quoque virtute fluxum mensium uterumque purgat, ob quam rationem forsitan sterilitatem à vitio Uteri arcere dicitur.

Adhibetur interne & externe, in decoctis, cataplasmat. pessariis, Clysteribus.

℞. Mercurial. parietar. violar. coque in juscule pulli, vervecis vel alterius ad alvi adstrictionem.

℞. Myrrh. ʒʒ. Croc. or. ʒʒ. succ. Mercurial. vel mell. Mercurial. M. f. pessus sindoni involvendus, & utero intrudendus ad provocandum menses & purgandum uterum, stimuli loco adde troch. alhand, ʒʒ.

MERCURIALIS à Mercurio inventore, MERCURII HERBA, ἑρμῆ βοτάνη, λυγρόζωσις, παρθένον φύλλον, PHYLLUM, Bingel-Krauth / Bengel-Krauth / Mercurius-Krauth / Scheiff-Krauth / Clyslier-Krauth / Winter-grün / MERCURIALE.

Est planta flore apetalo, plurimis scilicet staminibus calyci insidentibus constante & sterili. Embryones enim in speciebus Mercurialis nasci solent, quæ floribus carent, abeuntque deinde in fructum ex duabus capsulis compositum, semine foetis subrotundo.

Mercurialis testiculata sive Mas Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. Mercurialis mas Dod. Pempt. 658. & I. B. 2. 977.

Mercurialis spicata sive foemina Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. Mercurialis foemina Dod. Pempt. 658. & I. B. 2. 977.

Nascitur in campestribus cultis, vinetisque, floret per integram æstatem.

Mercurialis olim in escam cedebat, hodie culinas non amplius ingreditur. Bilem atque aquam evacuare creditur. Sunt qui ad emolliendam alvum folia viridia contusa in anum intrudunt. Sunt etiam qui asserunt, quod si Mercurialis mas à purgatione menstrua bibatur & folia ejus trita genitalibus admoveantur mares, si foemina foemellæ generentur. Fides sit penes authores. Mercurialis à quibusdam mulierculis in pulte infantibus exhibetur ad alvum laxandam. Succus Mercurialis verrucas tollere, impetigines delere, & auribus instillatus surditatem corrigere asseritur. Pertinet ad quinque herbas emollientes,

IN OFFICINIS NON PROSTAT NISI

Mel Mercuriale, Bingel Kraut-Honig / Miel de Mercuriale. Adhibetur in clysteribus abstergentibus & laxantibus, ut & ad repurgandum uterum in injectionibus uterinis.

PARIETARIA.

Respondet mercuriali & in specie ratione nitrosi salis copiosioris movet simul urinam, ejusque ardorem temperat, hinc commendatur in hydropicis. Externe applicata pubi, ischuriæ infantum medetur.

R. Pa-

℞. Parietar. Mij chæref. Miß. coq. cum butyr. rec. ℥ij.
add. ʒss scorp. ʒiß. applica pubi ad suppressionem urinæ, ut
& ad tormina ex calculo orta.

PARIETARIA ita dicta à loco natali, quod circa muros ac parietes antiquos & rudimenta antiquarum domuum crescere soleat. HERBA MURALIS, ἐλῆιν, quia vestes ad se trahit, HERBA URCEOLARIA, aut URCEOLARIS, HERBA VITRARIA, HERBA VITRI, quoniam vitris expurgandis conducit, περδίκιον, PERDICUM, PERDICALIS, quoniam perdices ea delectantur. Tag und Nacht / St. Peters - Krauth / Glas - Krauth / Feldhühner - Krauth / PARIETAIRE.

Est planta flore apetalò, quatuor plerumque staminibus constante ex calyce quadripartito surgentibus, nunc campaniformi nunc infundibuliformi, modo rotato. Pistillum autem abit in semen utplurimum oblongum, in capsula, quæ floris calyx fuit reconditum.

Parietaria officinarum & Dioscoridis C.B. Pin. 121. Parietaria Dod. Pempt. 102. & I.B. 2. 976.

Ex hac herba Majo florente, in usum veniunt præprimis folia, adhibentur in clysteribus cataplasmatibus & fomentis emollientibus. Succus laudatur ad expurgandos renes à sabulo & lapillis, celebratur quoque ad sanguinem sistendum præsertim in hæmoptysi. Uterum porro expurgat & menses pellit, in affectibus quoque pectoris commendatur. Externe virtute vulneraria gaudere fertur. Sunt qui dicunt parietariam inflammare interna viscera, semen autem eadem refrigerare, experientia autem hoc nondum satis comprobatum. Semen a quibusdam cum aceto mixtum applicatur pedibus ad tumores discutiendos. In Anglia per Syrupum parietariæ è succo integræ plantæ cum saccharo paratum, curationem hydrophis quidam instituere conantur, mediante diuresi sive sit hydrops ascites sive anasarca.

PHARMACOPOLIA NON HABENT NISI

Aquam Parietariæ, Tag und Nacht oder Glas - Kraut - Wasser /
Eau de parietaire,

VIOLARIA.

Virtute emolliente laxante cum parietaria & mercuriali
convenit, juvat quoque ad expectorationem si cum pro-
priis floribus coquatur & exhibeatur.

℞. Violar. Mj. coq. c. ▽ colaturæ ferventi infunde flor.
violar. p. ij. edulcora syr. violar. pro expectoratione.

Biolen-Krauth/ Beyel-Krauth/ Beyelloten-Krauth/ HERBE
DE VIOLETE, DE VIOLIER.

De charactere plantæ sub floribus violarum tractabitur.

Refertur inter quinque herbas emollientes, quæ sequenti versu-
culo comprehenduntur.

Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Acanthus.

Alii addunt Parietariam, betam aut atriplicem.

In clysteribus emollientibus laxantibus & anodynis, in cata-
plasmatis maturantibus fomentationibus lotionibus & balneis pe-
diluvii anodynis & somniferis adhibentur folia hæc, quæ oculo-
rum mitigant æstum, & in oris & faucium affectibus, gargarismata
ingrediuntur.

PLANTÆ CONSTANTES PAR-
TICULIS OLEOSIS AQUOSIS
CRASSIS.

ALTHÆA.

Respondet seminibus & radici, ingreditur decocta cly-
steres, cataplasmata emollientia.

℞. Fol. Malv. alth. coq. ex ▽ add. camphor. & applica
scirrhis emolliendis & maturandis.

℞. Foll.

℞. Fol. Malv. alth. flor. chamom. ana Mj. melilot. Mss. ficu. n. iij. liquir. zij. vel iij. coq. in lacte f. cataplasma. emolliens, colatura inservire potest in angina pro gargarismo.

Supra jam dictum quod ex althæa radix ex malva folia sint usurpanda.

MALVA.

Convenit cum althæa, ast debilior est.

TUS.

Μαλάχη à μαλάσσειν ab emolliendo præsertim alvum, MALVA dicta putatur, Papplen / Râß-Papplen / Râßlein-Kraut / Hasen-Papplen / Pappellen / MAUVE.

Est planta flore monopetalo campaniformi, patente & multifido, ex cujus fundo emergit tubus pyramidatus, staminibus plerumque onustus. Ex calyce vero surgit pistillum, infimæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum planum, orbiculatum quandoque acuminatum, calyce ut plurimum involutum, è plurimis capsulis constantem axi ita circumhærentibus, ut singulæ ejus striæ capsulam suam quasi articulatione quadam excipiant, semine foetam, non raro reniformi. Adde folia minus secta quam alceæ, minus villosa & incana quam althææ.

Species potissimum usuales sunt sequentes.

Malva vulgaris flore minore folio rotundo Joh. B. 2. 949. Malva sylvestris folio rotundo C. B. Pin. 314. Malva sylvestris minor Tabern. Icon. 769. Kleine Râß-Gânß Hasen oder Roß-Pappellen.

Malva vulgaris flore majore folio sinuato I. B. 2. 949. Malva sylvestris folio sinuato C. B. Pin. 314. Malva sylvestris major Tabern. Icon. 768.

Crescunt hæ malvæ quæ intelliguntur, quoties simpliciter malvæ fit mentio, passim incultæ. Florent Majo sequentibusque mensibus.

In usum suppeditat folia flores radicem, & semen de quo ultimo supra. Radix, quæ satistenuis est, eximii candoris gustu dulcis, & lubrico lentore viscida; temperat, humectat atque emollit. Imprimis tanquam dentifricium usurpatur; Vim quoque habet ophthalmicam. Folia quoque emolliunt laxant, dolores mitigant, acrimoniamque demulcent, pro alvo laxanda ut & in affectibus pulmonum vesica renum atque urina acri, commendantur. Clysteres frequentissime ingrediuntur. Adhibentur in balneis, cataplasmatibus & fomentis emollientibus. Juxta TABERNÆMONTANUM gravidæ facilius pariunt, si decoctum Malvæ sæpius assumant. Laudatur porro Malva in doloribus colicis externe & interne. Folia hæc in butyro frixa, remedium constituunt colicæ infantibus. Ob vim insignem quinque herbis emollientibus accensetur,

Malva tum cruda tum cocta olim usurpabatur, hodie non amplius comeditur.

De virtutibus Malvæ SALERNITANI canunt.

Dixerunt Malvam Veteres, quod molliat alvum,

Hujus radices rasæ, solvunt tibi fæces.

Vulvam moverunt & fluxum sæpe dederunt.

Quibus merito jungitur illud MARTIALIS,

Exoneraturas ventrem mihi Villica malvas

Attulit.

Paratur è Malva ejusque radice cum butyro Majali non salito & addita pauca camphora linimentum ad loca Tinea & Achori- bus affecta detergenda. Hæc porro radix à prægnante gestata dicitur vim obtinere foetum ad debitum tempus gestandi, sicuti quoque eadem radix Sole aquarium ingrediente in plenilunio præsertim effossa & appensa singulare dicitur remedium ophthalmicum in ophthalmia Epiphora &c.

OFFICINÆ ASSERVANT

Aquam Malvæ, Pappellen, Wasser / Eau de Mauve, sed rarissimi est usus.

TUS.

TUSSILAGO.

Hujus folia tenuiorem habent mucaginem quam althææ folia, hinc specifica sunt in tabe, phthisi, ulcere pulmonum vel aliorum viscerum, ut & in vomica pulmonum, it. in catarrhis à salibus acribus. Horum decoctum Lindanus laudat in asthmate & orthopnoea, ut & in pleuritide à quibusdam.

Foliorum fumus haustus per fistulam à Boileo commendatur in phthisi & catarrhis falsis.

Datur pulvis foliorum, succus expressus, Syrupus ut & decoct. cum propria radice factum, addita China, sassafras, aliisque appropriatis. Vulgus recipit folia ad placentas contra tabem & phthisin.

℞. Fol. tussilag. succin. sem. anis. ana q. v. hauri fumum per fistulam contra catarrhos Salsos.

℞. Tussilag. flor. Δis. succin. fol. nicotian. hauri fumum per fistulam contra phthisin.

De Tussilagine confer ea, quæ supra dicta sunt de radice Tussilaginis.

VERBASCUM.

Ob mucaginem emollientem terreis junctam convenientissimum est in tenesmo, dysenteria, dolore hæmorrhoidum in specie ad procidentiam uteri & ani.

℞. Fol. verbas. querc. coq. in lacte contra tenesmum.

℞. Verbas. Mij. sem. hyosc. coq. in ∇ contra tenesmum & dolores hæmorrhoidum.

PLAN.

Φλόου & à Φλέγω uro, CANDELA REGIS, CANDELARIA, à flore, VERBASCUM seu potius BARBASCUM dici volunt à canitie illa, seu barba pubescente, qua folia verbasci vulgaris obduci solent; LANARIA, Woll-Krauth / Brem-Kraut / Himmel-Brand / Königs-Kerzen / Feld-Kerzen / Fackel-Blumen / BOUILLON BLANC, MOLENE, BON HOMME.

Est planta flore monopetalo rotato & multifido: ex cujus calyce surgit pistillum mediæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum seu testam ovato acuminatam, septo intermedio in duo loculamenta divisam, & seminibus foetam ut plurimum exiguis & angulatis placentæ affixis.

Verbasum mas latifolium luteum C. B. Pin. 239. Verbasum vulgare flore luteo magno, folio maximo I. B. 3. App. 855. Verbasum latius Dod. Pempt. 143. &

Verbasum foemina flore luteo magno C. B. Pin. 239. Verbasum maximum odoratum luteum I. B. 3. App. 855. Verbasum maximum album foemina flore subpallido Lob. Ic. 561.

Verbasum juxta agrorum margines, arborumque aggeres, scrobes, aliisque locis haud cultis à Junio mense in Autumnum usque cum flore reperitur.

Ex verbasco in usum veniunt folia & flores rarius radix, quæ appensa ad affectus catarrhales præservandos & curandos laudatur, unde etiam dicitur radix Rheumatica. In pulvere assumpta per plures dies dolorem & fluxum hæmorrhoidum sedare dicitur; Succus hujus radice celebratur ad quartanam ante paroxysmum sumptus. Radix porro contusa & in vino infusa ad fluxus alvi & vermes deprædicatur. Folia præter virtutes allegatas vi quoque gaudent vulneraria, conferunt ad contusiones & sugillata. Succus rugas & maculas faciei verrucasque delet, qui etiam æque ac succus radice interne ad quartanam commendatur.

PLANTÆ TERREIS CONSTANTES.

EQUISETUM seu CAUDA EQUINA.

Virtute fibras Ventriculi & intestinorum roborante, adstringente, ut & incrassante sanguinem cæteris sui generis præpollet, & propterea in sistendis hæmorrhagiis, in sedando mictu cruento & cæteris generibus fluxuum sanguinis laudatur; recipitur hoc nomine inter vulneraria.

℞. Equiset. Millefol. plantag. ana Mj. coq. in ▽ colat. add. succ. vel syr. granator. q. s. ad sistenda profluvia sanguinis.

℞. Equiset. q. v. coq. in ▽ ad ulcera quævis pulmonum sanguinolenta.

MUS-

ἵππου HIPPURIS, CAUDA CABALLINA à foliorum figura, CAUDA CATTI, Ross oder Pferd-Schwanz / Raßen-Wadel / Raßen-Schwanz / PRELE, QUEÛE DE CHEVAL.

Est planta flore monopetalo, plurimis scilicet staminibus apici fungiformi donatis constante, spicato & sterili. Fructus enim equiseti speciebus innascuntur, quæ floribus carent, grana nempe auctore CÆSALPINO nigra, aspera, & fæcta. His notis addendum est folia internodiis constare invicem commissis, ut unum in alterum inferatur tubarum modo.

Plures occurrunt equiseti species ratione virtutis non multum differentes, usualis tamen præprimis est in Medicina

Equisetum arvense longioribus setis C. B. Pin. Equisetum minus terrestre l. B. 3. 730. Hippuris minor Dod. Pempt. 73.

Decoctum Equiseti scabiei vesicæ mederi dicitur, Radix aut

A a a a

herba

herba trita fronti aut radici naris imposita hæmorrhagiam sistit.

IN OFFICINIS REPERITUR

Aqua Equiseti, Rakenwadel-Wasser/ Eau de Prêle ou de Quenë de Cheval, quæ præter virtutem adstringentem, quam ipsi adtribuunt, etiam in affectibus renum & vesicæ conducit.

MUSCUS QUERNUS.

Equiseto & cæteris quercuum partibus longe anteponitur ob insignem sui vim desiccativam, & humorum motum sistentem, specificè laudatur in tussi à tenui & acri lymphâ proveniente, pulmones erodente & nonnunquam phthisin inducente. Externe quoque cum phlegmate Oli, aceto vel alio acido applicatus mire sistit sanguinem fluentem. Ingreditur quoque capillares pulveres seu cyprios ad desiccandas humiditates.

℞. Musc. Quern. ʒj. ʒo anis. gt. iij. sacch. cand. ʒj. M. f. pulv. contra tussim.

℞. Musc. ʒij. lac. ʒis ʒij. sem. anis. ʒj. M. f. pulv. contra tussim.

℞. Musc. quern. usneæ cran. human. ana ʒʒ. cape c. ▽ burs. pastor. in hæmorrhagiis internis etiam periculosis.

℞. Equiset. Millefol. musc. quern. ana Mj. coq. in ▽ cape contra mictum cruentum.

PULMONARIA.

Musco querno inferior est virtute, cæterum in ulcere pulmonum & sanguinis sputo, hectica & phthisi singulariter commendatur, usurpatur ut muscus quernus.

℞. Pul.

de. Pulmonar. fol. tussilag. ana Mj. f. decoctum contra phthisin ex ulcere visceris nobilioris cum alvo adstricta.

MUSCUS PULMONARIUS, PULMONARIA ARBOREA
MUSCOSA, LICHEN ARBOREUS, Lungenmoß / Baumlun-
frauth / Baumflechten / Eichenlung. HEPATIQUE DE BOIS,
HERBE AUX POUMONS, PULMONAIRE DE CHENE.

Est species Lichenis floribus carens, fructu vero quodammo-
do pelvisiformi, polline seu semine tenuissimo foeto, quod micro-
scopii ope subrotundum videtur.

Lichen Arboreus sive Pulmonaria arborea I. B. 3. 759. Mu-
scus pulmonarius C. B. Pin. 361. Pulmonaria Dod. Pempt. 474.

Quercuum, fagorum, aliarumque sylvestrium arborum
corticibus annosis rimosisque, lapidibus etiam & duris pavitisque
Germinibus instar crustæ aut lorice inducuntur coriacea pulmona-
riæ folia, rugosa lacunis eminentiisque inæqualia, ineffabili lacinia-
rum variatione, quæ, qua matri suæ adhærent albicant, altera ve-
ro parte virent, sapore amaricante non sine adstrictione, ut J.
BAUH. loquitur.

Laudatur præsertim pulmonaria querna. Exsiccatur & adstrin-
git, abstergit, vulnera glutinat. Ad vulnera pudendorum & ulce-
ra & ad utrumque muliebrem, juxta SCHWENCKFELDT, proflu-
vium, dysenteriam & biliosos vomitus conducit. Ejus decoctum
laudatur in ictero.

SOLIDAGO SARACENICA. VIRGA AUREA.

Harum plantarum particulis terreis, EIS Otrösi diure-
tici aliquid esse inclusum docet earum vis diuretica, & quia
impedimenta quæ vulnerum curationes morantur remo-
vent, inter vulneraria recensentur. Datur decoctum &
pulvis.

[Quam mira præstare dicitur virga aurea in resolu-
tione

tione calculi renalis vid. ap. Wedel. Amoen. Mat. Medic. l. i. f. 3. c. 9. p. m. 185. ex Barclai Satyrico p. i. p. m. 75.]

℞. Virg. aur. ʒij. cape ex vino seu decocto proprio pro diuretico & nephritico.

℞. Alchymill. virg. aur. consol. saracen. summit. hyperic. ana Mj. rad. consolid. ʒij. glycyrrh. ʒβ. coq. ex ∇ vel Cerev. col. add. fyr. d. symph. Fern. q. s. ad grat. f. apoz. vulnerarium & diureticum.

BUR.

SOLIDAGO SARACENICA, vocatur etiam CONSOLIDA SARACENICA, vel VIRGA AUREA SARACENIA, *Heidnisch Wundkrauth*.

Est species Jacobææ, planta videlicet flore radiato, cujus scilicet discus ex pluribus flosculis corona vero ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce tubiformi & multifido comprehensis. Embryones autem abeunt in semina pappis instructa, thalamoque affixa.

Jacobæa Alpina foliis longioribus ferratis Tourn. l. R. H. cl. 14. S. i. g. 3. Virga aurea angustifolia ferrata, sive Solidago Saracenica l. B. 2. 1063. Virga aurea angustifolia ferrata C. B. Pin. 168. Consolida aurea Tabern. Ic. 556.

Invenitur in montibus, & ad fossas atque rivulos, floret Julio & Augusto.

VIRGA AUREA quod ramuli floribus aureis gravidi auricolorem virgulam referant, SOLIDAGO & CONSOLIDA à virtute, *Gulden Wundkrauth* / *Grund-Heyl* / VERGE D'OR, VERGE DOREE.

Est planta flore radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, corona vero ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Embryones deinde abeunt in semina pappis instructa. His notis addendi sunt flores longa serie in summis ramulis nascentes

Virga aurea vulgaris latifolia l. B. 2. 1062. Virga aurea angustifolia

gustifolia minus ferrata C. B. Pin. 268. Virga aurea Dod. Pempt. 142.

Nemorosis & saltuosis opacis lato pinguique loco enascitur, Augusto virga lucet aurea dicente SCHWENCKFELDT.

Commendantur hæ plantæ ad fluxus alvi & uteri, item ad icterum & hydropem. Renes atque ureteres ab impuritatibus liberant. Sanant ulcera oris, columellæ inflammationem arcent & faucium morbis medentur, putredinem gingivarum & vacillationem dentium curant.

BURSA PASTORIS.

Tam intra quam extra pro adstringente & vulnerario habetur, convenit quoque in sputo sanguinis & hæmorrhagiis quibusvis, nonnulli prædicant etiam in pollutionibus nocturnis.

℞. Burs. pastor. Mij. f. dec. ex ▽ ad sistendum hæmorrhagias, & præcipue nimium mensium fluxum, mictum & vomitum cruentum, vel cape succi expressi ʒβ. ex decocto proprio contra eundem affectum.

VER.

Ita dicitur à forma fructus, qui ad pastoris marsupium accedere existimatur, PERA PASTORIS, PERA PASTORIA, nonnullis appellatur HERBA CANCRI, CRISPULA, SANGUINARIA & SANGUINALIS, quia sanguinis fluxus sistit. *Seckel-Kraut/ Teschel-Kraut/ Hirten-Seckel/* BOURSE DE PASTEUR, BOURSE à BERGER, TABOURET, BOURSETTE.

Est planta flore cruciformi quatuor petalis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum planum, ora suprema scissum, triangulum isosceles inversum quasi referentem, septo intermedio, cui valvæ utrimque adhærescunt in duo loculamenta divisum, seminibusque sætum exiguis.

Bursa pastoris major folio sinuato C. B. Pin. 108. Bursa pastoria l. B. 2. 936. Pastoria bursa Dod. Pempt. 103.

Ubivis obvia est hæc herba, locis incultis secus vias sepes &c. Aprili, Majo & Autumno floret.

In usu sunt folia quæ refrigerant & adstringunt. Ad fluxum mensium nimium in calceis gestatur bursa pastoris, applicatur quoque alis & popliti & lumbis in hæmorrhagia narium & uteri. Radix ut & herba ob eundem scopum sub lingua aut in manibus detinetur. Succus bursæ pastoris vulnera glutinat, & ulceribus aurium medetur. Succum alii naribus immittunt, alii fronti & collo cum aceto & albumine ovi imponunt. In ictero nudis pedum plantis subditur. Juxta Borellum bursa pastoris contusa & auribus adplicita optimum constituit remedium, sæpe expertum in dolore dentium, ob singularem cum iis consensum,

IN OFFICINIS DESTILLATUR EX FOLIIS,

Aqua bursæ pastoris, Tschelkraut-Wasser / Eau de Tabouret ou de Bourse à Berger, quam in fluxibus alvinis quidam commendant.

VERBENA.

Vim adstringentem cum cæteris suæ fortis obtinet, ab hac an dependeat vis specifica contra dolorem capitis à tenui & acri lymphæ ortum aliis judicandum relinquo, interim omnibus cephalicis medicamentis impune addi potest. [Etiam ex collo suspensam miraculi instar dolorem capitis sedasse exemplo demonstrat Forest. lib. 9. obs. 52. p. m. 270.]

℞. Extr. verben. inspiss. ʒ. hyosc. papav. q. s. applica temporibus ad dolores capitis tollendos.

℞. Santal. rubr. ʒij flor. rofar. fol. verben. ana Mj. camph. ʒß. sacch. ʒni ʒj. acet. q. s. f. epith. egregie sistens dolorem capitis febricitantium, temporibus applicatum.

℞. Aq. dest. verben. ad ʒiiij cum aliquot guttulis — us
Oli assumpta Hoffmanno Clav. in Schroed. in dolore capitis
mira præstare dicitur.

℞. ▽

℞. ▽ verben. cape bon. haust. cum ʒj. Oc. ☿ ad abortum præcavendum.

FOLIA

VERBENÆ vocabulum quidam à verrere deducunt, quoniam olim ad aras detergendas adhibebatur; alii dictam volunt quasi HERBENAM seu VENERIS VENAM. Vocatur etiam VERBENACA, περιστεριον, PERISTEREUM, HERBA SACRA, SAGMINALIS & FERRARIA, Eisen-Krauth / Eisenhart / Eiserich / à ferri duritie. VERVEINE.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius surrectum & plerumque bifidum est, inferius vero tripartitum, sic tamen secantur ambo, ut flos quinquepartitus primo aspectu videatur. Ex calyce surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina tenuia & oblonga totam pene capsulam, quæ floris calyx fuit, occupantia. His notis addendum est flores spicatum ut plurimum nasci, non tamen verticillatim & quandoque in capitulum disponi.

Verbena communis cæruleo flore C. B. Pin. 269. Verbena vulgaris L. B. 3. 443. Verbena recta Dod. Pempt. 150.

Ubique secus pagorum viarumque margines & urbium areas, ac non raro in ipsis ruderibus nascitur, floret mensibus nunc æstivis nunc autumnalibus.

Verbena, cujus folia in usu, vires habet anodynas & vulnerarias, convenit in affectibus pectoris, obstructionibus Lienis & hepatis, ictero, torminibus ventris, vermibus, calculo, arthritide, febre tertiana &c. Commendatur Verbena ad arthritidis species. Virtute quoque ophthalmica gaudet. Externe in doloribus capitis in oleo coctam verbenam applicant, vel planta recens sola aut cum pulvere radicis rhodiæ vel zedoariæ contusa capiti dolenti circumligatur. Quod etiam facit decoctum ejus aut aqua cum proprio pulvere. Verbena laudatur quoque ad epilepsiam & ad affectus melancholicos. Tanquam amuletum laudatur ad strumas. Succo verbenæ ferrum indurari sunt qui asserunt. Sunt qui superstitiose geniculum

lum tertium Verbenæ sursum à terra decerptum ad febrim tertianam commendant.

OFFICINÆ CUSTODIUNT

Aquam Verbenæ, Eisenkraut-Wasser / Eau de Verveine, ex herba cum floribus collectam, in collyriis & frontalibus multi est usus, hepar & lienem deobstruit, icterum curat, arenulas pellit, febres fugat, lac auget, oris vulnera & ulcera curat.

FOLIA QUERCUS.

Cum corticibus conveniunt, in specie laudantur in procidentia ani & uteri.

FOLIA QUERCUS tempore pestis accensa aërem repurgare dicuntur. Suffitus aut etiam balneum foliorum in fluore mensium aut hæmorrhoidum nimio commendatur. Laudantur quoque ad odontalgiam in vino vel aqua decocta.

Ex his tenellis Majo collectis destillatur.

Aqua foliorum Quercus, Eichenlaub-Wasser / Eau de feuilles de Chesne, tanquam adstringens non solum in alvi fluxibus, sed & ad mictum cruentum sabulum & calculum celebratur. Aphthas medetur & dentibus vacillantibus: Ulcera quoque antiqua & præsertim Tibiarum sanat.

PYROLA.

Virtute vulneraria, quæ sola de hujus foliis innotuit cæteris omnibus congeneribus præfertur.

℞. Pyrol. sanicul. virg. aur. ana Mij. hyperic. p. ij. rad. symph. ziiij. coq. in vino f. decoct. vulnerarium.

SANI-

PYROLA à Pyro, propter foliorum similitudinem, Wintergrün / Waldmangolt / PYROLE. Est

Est plantæ genus flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in fructum subrotundum, striatum plerumque umbilicatum quinque-capsularem seminibusque fœtum ut plurimum exiguis.

Pyrola rotundifolia major C. B. Pin. 191. Pyrola L. B. 3. 535. & Dod. Pempt. 148.

Locis gaudet montanis ac umbrosis, in multis per Germaniam sylvis occurrit, cum floribus Junio ac Julio viget, toto anno viret.

Pyrola laudatur in cohibendis fluxibus sanguineis, ut & in herniis curandis, si præsertim cum consolida Sarracenica decoquatur.

PROSTAT

Aqua Pyrolæ, Wintergrün-Wasser / Eau de Pyrole.

SANICULA.

Cum cæteris suæ fortis ad vulneraria tam interna quam externa refertur.

℞. Sanicul. alchym. beton. ana Mj. rad. aristol. ʒj. symph. ʒiij. f. decoct. vulnerarium tam internum quam externum, pro interno add. syr. d. symph. Fern.

A.L.

SANICULA à Sanando dicta, DIAPENSIA, Sanicfel/ Sanicfel/ SANICLE.

Est planta flore rosaceo, & umbellato in capitulum conglobato, plurimis petalis constante in orbem positis ad centrum floris plerumque reflexis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum, hinc gibbis & echinatis, inde vero planis. Ex floribus nonnulli sæpe steriles sunt.

Sanicula officinarum C. B. Pin. 319. Sanicula mas Fuchsi sive Diapensia L. B. 3. 639. Sanicula Dod. Pempt. 140.

B b b b

Crescit

Crescit in montibus ac vallibus, solo gaudet pingui & opaco, floret Junio, quo tempore etiam colligi solet.

Roborat, glutinat, & adstringit, commendatur in hæmoptysi aliisque fluxibus sanguinis. Herniis medetur. De hac herba in proverbio dicitur; **NON EGET CHIRURGO QUI SANICULAM HABET.**

OFFICINÆ ASSERVANT

Aquam Saniculæ, destillatam ex herba florente, *Sanicel-Wasser / Eau de Sanicle.*

ALCHYMILLA.

Ob vim validam adstringentem, additur tam decoctis quam clysteribus, convenit vulneribus medendis, dysenteriae curandæ & laxis pudendis constringendis, laudatur quoque ad flaccidas laxasque mammas duriusculas & minores reddendas.

℞. Alchymill. fol. symph. cum toto q. v. f. infusus vel balneum vel fodus ad mammas & pudenda strictiora reddenda. [De vi adstrictoria radicis symphiti in hoc casu vid. ridiculam historiam apud Phil. Hœchstetter. Decad. 3. cas. 5. p. m. 236.]

PILLO.

ALCHIMILLA dicitur, quoniam ab alchimistis multum celebratur, **PES LEONIS, PLANTA LEONIS, LEONTOPODIUM** a figura foliorum, **HELIODROSIUM**, quod sole licet præfente rorem servet. **PSIADIUM** à roris guttis vocatur. **Stellaria** à foliorum dispositione. **Sinnau** quasi **Sonnenhau / Löwentap-pen / Löwenfuß / gulden Sanßerich / Senseselgrün / Sternkrauth / grosser Sanicel / Marien-Mantel / unserer Frauen-Mantel** à plicis foliorum. **PIED DE LION.**

Est planta flore apetalo, plurimis scilicet staminibus constante
ex

ex calyce infundibuliformi & multifido surgentibus. Pistillum autem abit in semen unicum vel multiplex in capsula, quæ calyx floris fuit, reconditum.

Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319. & Clus. Hist. cvij. Pes Leonis sive Alchimilla J. B. 2. l. 17. 598. Alchimilla Dod. Pempt. 140.

Crescit loco udo & humido, item in pascuis, colitur quoque in hortis, florens Majo & Junio.

Alchimilla cum sanguinem tenuem incrasset, in fluxibus variis, nimio v. gr. mensium fluxu & fluore albo prodest. Usurpatur in potionibus vulnerariis. Succus alchimillæ ad aliquot uncias per tres dies haustus in principio Epilepsiæ à quibusdam commendatur. Ingreditur unguenta & emplastra. In gargarismate adhibetur ad anginam, & alia oris vitia.

IN OFFICINIS EXTAT

Aqua Alchimillæ, destillata ex integra planta collecta mense Junio cum floribus, *Sinnau-Wasser / Eau de pied de Lion*. Hac aqua virgines flaccidas mammas turgidulas reddere conantur, tales scilicet, quales cruda viro servat puella.

PILOSELLA.

Inter vulneraria temperatior est, & propterea infantibus ad herniam curandam datur. Laudatur quoque in temperanda lymphæ acida, à qua aspera arteria moleste afficitur & inflammationem faucium producit.

R. Pilosell. Mij coq. ex Cerev. f. gargarism. ad dentium dolores ortos ad humore acido acri.

POLY-

PILOSELLA quasi pilosa herbula, AURICULA MURIS à similitudine foliorum, PILOSELLA LUTEA Mauf. Dehrlein / gelb Mauf. Dehrlein / Nagel-Krauth / friechende Piloselle / PILOSELLE.
Bbbb 2 Est

Est planta flore semiflosculoso, plurimis semiflosculis com-
stante embryo insidentibus & calyce comprehensis. Embryo
autem abit in semen pappis instructum, in capitulum globosum
collectum & thalamo affixum. His addendum est flores innasci
pediculis non ramosis, adeoque est dentis Leonis species.

Dens Leonis qui Pilosella officinarum Tourn. l. R. H. cl. 13.
S. r. g. r. Pilosella major repens hirsuta C. B. Pin. 262. Pilo-
sella Auricula muris Tabern. Ic. 196. Pilosella majori flore sive
vulgaris repens I. B. 2. 1039.

Nascitur arido solo locis incultis, collibus & agrorum her-
bidis limitibus, pratis siccioribus. Floret Majo & Junio.

Usurpatur pilosella tanquam adstringens in fluxibus alvinis &
sanguineis. Pectori benefacit, Ictericis, Phthisicis & Lienosis
prodest. Laudatur etiam in scabie ejus decoctum. Externe in
vulneribus & ulceribus inveteratis imprimis conducit, odontal-
giam sedat, & oris ulcera sanat. Hæmorrhagiam narium sistit
pulvis inditus.

IN OFFICINIS EXTAT

Aqua Pilosellæ ex integra planta, *Maukôhrlein-Wasser.* *Eau*
de Piloselle.

POLYGONUM.

Præter virtutem vulnerariam habet quoque specificam
in hæmoptysi & quavis hæmorrhagia. Externe applicatur
carpis manuum ad æstus febriles tollendos.

℞. Succ. polygon. ʒj. vin. auster ʒiiij. cape contra vo-
mitum sanguineum.

℞. ▽ Polygon. melius decoct. in quo exhibe rhab. tost.
N. M. tost. ana ʒß. contra hæmoptysin.

PLAN.

Πολύγονον, quasi planta multum geniculata POLYGONIA,
GEN-

CENTUMNODIA, **CENTINODIA SANGUINARIA** herba à virtute sanguinem sistendi, **CORRIGIOLA**, **Weg-Graß**/ **Weg-Tritt** a loco natali, **Tausend-Knoten**/ **Blut-Kraut**/ **RENOUÉE**, **TRAINASSE**, **CENTINODE**.

Est planta flore apetalò, plurimis staminibus constante, ex calyce infundibuliformi & multifido surgentibus. Pistillum autem abit in semen triangulare in capsula, quæ floris calyx fuit, reconditum. His addendum est flores in foliorum alis nasci & plantam radicibus fibratis donari.

Polygonum latifolium C. B. Pin. 281. **Polygonum** sive **Centinodia** 3. 374. **Polygonum mas** Dod. Pempt. 113. **Sanguinaria** Advers. Lob. Ic. 419.

Hoc polygono, ut loquitur **SCHWENCKFELDT**, nihil comtemptius ac vulgatius habent compita & rura, floret æstate.

Polygonum ob virtutem adstringentem in omnibus fluxibus alvulaudatur. Sunt, qui dicunt, nihil magis sanguinem sistere, quam ipsam hanc herbam: calculum præterea pellit, stranguriam sedat, lumbricosque necat, ad difficilem quoque partum & foetum mortuum ejiciendum commendatur. Externe hæmorrhagiis narium uteri hæmorrhoidum &c. medetur axillis vel ossi femoris alligata, quem in finem celebratur quoque radix, convenit porro in inflammatione oculorum & tumoribus mammillarum.

IN PHARMACOPOLIIS EXTAT

Aqua Centinodia vel Polygoni, Wegtritt-Wasser / Eau de Renouée ou de Centinode, qua uti solent in fluxibus alvi, dysenteria ut & in vomitu sanguinis, adhibetur quoque in gargarismatibus ad oris & gingivarum inflammationes.

PLANTÆ PARTICULIS TERREIS
TEMPERATIS ET BLANDIS VOLATI-
LIBUS CONSTANTES.

HERBÆ CAPILLARES.

Sunt Adiantum album seu ruta muraria. Adiantum nigrum seu Capillus ♀is. Polytrichum aureum. Asplenium seu Ceterach seu Scolopendrium.

In terrea substantia habent quidpiam volatilis, ob quod blande incidunt, referant, hinc viscerum obstructionibus quibusvis, in specie scorbuto, malo hypochondriaco, scirrhis & obstructionibus lienis conducunt, profunt quoque in vitiis pectoris & renum, ad incidendum mucum illis impactum. Ob substantiam terream tubulos & poros constringunt ne defluant capilli.

Pulvis aureus qui parti foliorum aversæ adnascitur cum succino albo & succo portulacæ datus mire sistit fluxum gonorrhœæ.

Datur decoctum, syrupus tam simpl. quam comp.

PHYL-

Quinque communiter solent numerari in usum venientes herbæ capillares. ADIANTUM NIGRUM seu CAPILLUS VENERIS, ADIANTUM ALBUM seu RUTA MURARIA, POLYTRICHON AUREUM, TRICHOMANES & ASPLENIUM seu CETERACH.

Αδίαντρον, ADIANTHUM, quod aqua non madescat. ADIANTHUM NIGRUM, CALLITRICHON, quod crines pulchriores reddat, HERBA CAPILLARIS, CAPILLUS VENERIS, CAPILLUS TERRÆ, Frauen-Haar / Venus-Haar / Jungfer-Haar / CAPILLAIRE.

Capillus Veneris duplex est communis & ex Gallia allatus.
Ille

Ille ad filiculam pertinet, dum ratione foliorum ad filicem accedit, & dicitur

Filicula quæ adiantum nigrum Officinarum pinnulis obtusioribus Tourn. I. R. H. cl. 1. 6. S. 1. g. 6. Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. Pin. 355. Adiantum nigrum Officinarum I. B. 3. 742. Dryopteris nigra Dod. Pempt. 466.

CAPILLUS VENERIS OFFICINARUM, CAPILLAIRE ORDINAIRE. Ab hoc nobilior species discrepat quæ à cæteris plantis, quæ floribus carent & quarum fructus foliis innascuntur, differt propria foliorum facie. Fructus nascuntur in sinubus seu complicatione foliorum, in quibus occurrunt capsulæ sphaericæ annulo vi elastica donato munitæ, cujus contractione rumpuntur & semina fundunt minutissima.

Adiantum foliis Coriandri C. B. Pin. 355. Adiantum sive capillus Veneris I. B. 3. 751. Adiantum Dod. Pempt. 469.

Capillus Veneris communis. In parietibus petrosis, umbrosis, humidis secus fontes & aquarum stillicidia exit. Viret quavis anni parte. Altera autem species in Languedocia circa Montem pessulanum multum provenit, & præfertur tanquam nobilior.

ADIANTUM ALBUM seu RUTA MURARIA, SALVIA VITÆ, RUTA PARIETUM, FILICULA ASELLORUM. Maurraute / Stein-Naute / Esels-Farn.

Discrepat à congeneribus plantis foliis ad rutam accedentibus. Fructus foliis innascuntur; capsulæ scilicet membranaceæ Sphaericæ annulo vi elastica donato munitæ, cujus contractione rumpuntur seminaque fundunt minutissima.

Ruta muraria C. B. Pin. 356. I. B. 3. 753. & Dod. Pempt. 470. Adiantum album Tabern. Ic. 796.

Locis saxosis & è scissuris, juncturis murorum vetustorum, juxta aquas, puteos, fontes locis umbrosis provenit, folia ejus non prius, quam nova emergant, marcescunt.

POLYTRICHUM AUREUM, Polytrichum dicitur quasi ex crinibus multis constans. ADIANTUM AUREUM, à caulibus & summitatibus aureo colore præditis, CHRYSOTRICHON, MUSCUS CAPILLARIS AUREUS, Gulden-Wiederthon / Gulden-Haar / Wolfs-Gerst.

Cum

Cum foliis singularibus gaudeat, flores vero & fructus vulgo desiderentur ad Muscum pertinet.

Musculus Capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus Tourn. I. R. H. cl. 17. S. 1. g. 1. Musculus aureus capillaris medius Herm. H. L. B. Polytrichum aureum majus C. B. Pin. 356. Polytrichum Apuleii majus quibusdam I. B. 3. 752. Adiantum Aureum Tabern. Ic. 797.

In altis sylvis è muscosis præsertim & antiquis, ut vult SCHWENCKFELDT, quæ corruerunt, arboribus provenit.

TRICHOMANES παρά μανὰς τείχας è rasis capillis, quod nempe capillum rarum derasumque nasci faciat. POLYTRICHUM vulgo, Wieder-Todt / Nothe-Mauerrauthen / Wieder-Thon / POLITRIC.

Differt à reliquis capillaribus, quod ejus folia à foliolis componantur plerumque subrotundis, costæ utrinque quasi per conjugationes innascentibus. Fructus foliis innascuntur, capsulæ scilicet membranaceæ, globosæ ferme, squamis obvolutæ annulo elastica vi donato munitæ, cujus contractione rumpuntur, seminaque fundunt tenuissima.

Provenit in sylvis & montibus, locis umbrosis tenebricosis & humidis, sabulosis itidem & arenosis saxis.

ASPLENIUM, Ἀσπλήνιον, σπλήνιον, σπλένιον, à virtute contra morbos lienis, SCOLOPENDRIA, SCOLOPENDRIUM VERUM, CETERACH, Milk-Krauth / Milk-Fahrn / Nebel-Farn / CETERAC.

Ab antecedentibus plantis flore carentibus differt foliis singulari forma præditis, margine scilicet pulchrè sinuato.

Asplenii prona pars squamis obducitur, è quibus velut è sinibus propriis emergunt capsulæ sphaericæ annulo elastica vi donato munitæ, cujus contractione rumpuntur seminaque fundunt minutissima.

Asplenium sive Ceterach I. B. 3. 749. Ceterach Officinarum C. B. Pin. 354. Asplenium Dod. Pempt. 468.

In montibus asperrimis, in vetustis item quandoque parietibus, in rupibus, in saxosis opacis ac umbrosis profilit, toto anno virens.

Herbæ capillares, præter virtutes allegatas, laudantur quoque in morbis uteri, mensibus & secundinis pellendis, fluxu albo, pleuritide

tide itidem asthma Phthisi & Hectica, ut & in ictero, hydrope & febribus. Ad rachitidem tanquam specificum commendatur Ruta muraria; quæ etiam in Herniis infantum multum deprædicatur. Capillus Veneris haud raro in infuso instar Theæ usurpatur. Lixivium aut potius decoctum herbarum capillarium capillos auget, pulchrioresque reddit, & furfures capitis abigit.

IN OFFICINIS PROSTAT

Syrupus Capillorum Veneris, Syrup Capillaire / oder Frauenhaar-Syrup / Syrop capillaire. In pectoris morbis, tussi asthma, raucedine, pleuritide item commendatur, expectorationem promovet; admiscetur remedii beccichis sapissime in infuso Theæ jucunditatis gratia assumitur loco Sacchari. Inficitur etiam odore florum Aurantiorum. Præfertur qui Montepessulano ad nos advehitur.

PHYLLITIS seu LINGUA CERVINA.

Convenit cum plantis capillaribus & cum his simul & semel præscribitur, frequenter ingreditur vulneraria decocta.

℞. Phyllit. Mij. virg. aur. Mj. rad. helen. ℥iij. rad. Cichor. ℥vj. bacc. juniperi ℥ij. sine effervescente cum Cerevisia recentis f. potus diureticus & vulnerarius, cachecticis & hydropicis utilissimus.

CA-

Φυλλίτης, PHYLLITIS, quasi foliosa herba, cum tota quasi folium sit, LINGUA CERVINA, SCOLOPENDRIA VULGARIS, SCOLOPENDRIUM. Hirsch-Zung / Hirsch-Zungenkrauth. LANGUE DE CERF, SCOLOPENDRE.

Est planta cujus folia linguæ cervi figuram æmulari vulgo existimantur, nunc simplicia, nunc laciniata, interdum ramosa seu costæ affixa. Linguæ cervinæ fructus innascuntur foliis; in sinibus

CCCC

enim

enim sulcatis & quasi bivalvibus occurrit numerosa congeries capsularum, quæ singulæ annulo elastica vidonato muniuntur, cujus contractione rumpuntur seminaque fundunt minutissima.

Lingua Cervina Officinarum C. B. Pin. 353. Phyllitis five Lingua Cervina vulgi I. B. 3. 748. Phyllitis vulgaris Clus. Hist. CCXIII. Crescit in sylvis locisque umbrosis ac opacis in puteis. Colitur etiam in hortis. Viret fere per totum annum.

Aperit, attenuat & subadstringit. Laudatur ad affectus spleneticos, hepaticos & pectorales. Ingreditur Vina Majalia. Externe quoque ad vulnera & ulcera mundificanda celebratur, ut & ad casum capillorum, in odontalgia quoque & scorbuto oris prodest in aqua vel vino decocta.

IN PHARMACOPOLIIS HABETUR

Aqua Scolopendrii, Hirschungen • Wasser / Eau de Scolopendre.



CAPUT SEPTIMUM.

DE FLORIBUS.

SALIBUS VOLATILIBUS OLEO-
SIS SEU AROMATICIS CON-
STANTES.

FLORES RORISMARINI
OFFICIN. ANTHOS.

Recentiores sunt subtiliores & spirituosiores quam folia, cum quibus cæteroqui conveniunt. Ex his fiunt —
Essent. ▽ reg. Hung. 00 dest. conserva cum saccharo facta,
in

in qua tanquam appropriato vehiculo cephalica, uterina & nervina exhiberi possunt.

℞ Conserv. anth. Menth. ana 3℔. ☉ vol. succin. gr. xv. M. f. uterin. & cephalic. pro ij. dos. si addideris petrol. alb. gt. ij. vel iij. habebis medicamentum contra vertiginem.

℞. Conf. anth. 3℔. ☉ cinam. gt. j. borrac. Ven. 3℔. f. bolus in mensium remora.

℞. ℥us vin. rectific. s. melius ℥ rorismar. per ferment. fact. s. ▽ propr. dest. sæpius cohob. affundendo floribus rorismarini & destilla ex balneo, hunc laborem continua donec destillatum fragrantissimum acquisiverit odorem & saporem, hoc repone pro ▽ Reginae Hungariæ.

℞. ▽ frag. rorismar. & ℥ uos. cohoba cum ☉ dest. rorismar. recenti, destilla blando Δe, donec imbiberit tantum ☉ quantum commode suscipere potest, hoc applica partibus paralyticis.

℞. ▽ Reg. Hung. applica vertici capitis ad tollendos dolores.

Confer ea quæ superius dicta sunt de Roremario.

FLORES LAVENDULÆ seu SPICÆ.

Virtutibus cephalicis uterinis & nervinis rorismarini floribus multo præstantiores & penetrantiores esse, probat primo ☉ destillatum, deinde salivatio quam flores & folia masticata excitant, hinc in soporosis & catarrhalibus morbis valdopere laudantur. Horum odorem fugiunt pediculi, blattæ & alia insecta, propterea in his fugandis vel enecandis conducunt.

Datur ▽ dest. dec. conf. infus. o dest.

℞. ▽ dest. lav. ℥uof. ℥ij. Ess. Castor. ℥ij. ℞ Ce-
raf. n. ℥j. detin. in ore contra aphoniam & amissam loque-
lam.

℞. o d. spicæ, o thereb. ana gt. v. o laur. expr. ℥j.
camph. gr. v. M. f. balsamum, cujus gr. v. in jusculeo calido
exhibita mire conducunt convulsis, externe applicatur pa-
ralysi, stupori, & omnibus convulsionis generibus citissime
medetur.

Conf. flor. tunic ℥j. add. o spic. gt. v. f. bolus contra
aphoniam.

℞. Flor. & fol. lavend. ana q. v. affund. ▽ ℞uofam pro-
priam, add. rad. pyrethri, ari q. v. f. infusum contra apho-
niam.

℞. Decoct. vel lixivium lavendulæ, lava caput pro ene-
candis pediculis.

FLO-

LAVANDULA à lavando, quod ea parentur balnea, elotaque
omnia si permisceantur odoris commendet suavitate. PSEUDO-
NARDUS SPICA, Lavendel / Spicæ / LAVANDE, ASPIC,
SPIC, NARD.

Est plantæ genus flore monopetalo labiato, cujus labium supe-
rius surrectum est, subrotundum plerumque bifidum, inferius ve-
ro tripartitum. Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad in-
star clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui
deinde abeunt in totidem semina, in capsula, quæ floris calyx fuit,
recondita. His notis addendum est flores, Spicæ in modum, verti-
cillatim summis caulibus & ramis innasce.

Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. Pseudonardus quæ vulgo
Spica l. B. 3. 281. Lavandula Dod. Pempt. 273. Spicæ / Spica-
nard / ASPIC. &

Lavandula angustifolia C. B. Pin. 216. Lavandula Dod.
Pempt. 273. Pseudonardus quæ vulgo Lavandula l. B. 3. 281.
Lavendel / LAVANDE. Utraque

Utraque in Hispania & Gallia Narbonensi sponte provenit, apud nos colitur in hortis, Junioque ac Julio floret.

Flores utriusque plantæ ventriculum calefaciunt, flatus discutunt, urinam & menses movent, aperiunt hepar & Lienem, unde in ictero & hydropo profunt.

Externe in balneis uterinis cephalicis & nervinis adhibentur. Semen Lavendulæ in difficili laudatur partu.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Lavendulæ, Lavendel-Wasser / Eau de Lavande ex summitatibus & herba destillata.

Conserva Lavendulæ, Lavendel-Zucker / Conserve de Lavande, quæ ad uteri præsertim atque capitis commendatur morbos.

Oleum Lavendulæ destillatum, Lavendel-Dehl / Huile de Lavande, quod Cephalicum est, uterinum, diureticum & carminativum, specificum juxta quosdam in convulsionibus nervorum à vulnere & punctura tam interne quam externe; ex quo paratur colore suo cæruleo maximopere se commendans

Balsamum Lavendulæ, Lavendel-Balsam / Beaume de Lavande.

Oleum Spicæ, Epice-Dehl / Huile d'Aspic, quod etiam cephalicum est, uterinum, diureticum, carminativum, & anthelminthicum est. I ediculos fugat, tineas libris affricatum arcet.

FLORES SALVIÆ.

His folia multo anteponuntur, de quibus supra.

CHAMÆMELI FLORES.

Licet Romani flores habeantur penetrantiores quam vulgaris, tamen in his potior vis anodyna est; cæterum utriusque flores aliquid balsamici volatilis in Eibus tam fixis quam volatilibus foveant, à quo pendet singularis vis acris quævis mulcens & obtundens, hinc in cardialgia, colica

lica simplici & convulsiva & nephritica, ut & flatulentis omnibus discutiendis nulli cedunt, promovet quoque lochia, menses, dolores post partum tollunt, conducunt etiam in lacte cocti contra dysuriam. Externe emolliunt, & dolorem præcipue tenesmi leniunt, ingrediunturque clysteres ad flatus & tormina.

Datur eorum pulv. decoct. ▽ dest. ∞ d. essent. c. ▽ propria s. spirituosæ facta.

℞. Flor. chamom. Mij. coq. in vin rhenan. ℥ij. leniter exprime & expressum novis floribus affunde, laborem aliquoties reitera, exhibe cochl. iij. contra nephritidem.

℞. Flor. chamom. Mj. coq. ex vino leniter, exhibe contra dolores post partum, stimuli loco add. essent. artemis. q. s. vel coq. in lacte ad dysuriam & aromatiza nucem moschata.

℞. ▽ dest. chamom. ℥iij. — theriacal. ℥ij. L. O. gr. j. ∞ d. chamom. gt. ij. fyr. è Cort. aurant. ℥β. f. mixtura in colica flatulenta.

℞. ▽ Menth. Chamomill. ana ℥ij. — Carm. Sylv. ℥j. Elix. menth. ℥ij. — Otr. dulc. q. s. ad acorem L. O. gr. j. vel ij. f. mixtura colica.

℞. ∞ d. chamom. gt. v. ∞ laur. expr. ℥j. f. balsam. quo inungatur regio ventriculi ad cardialgiam, add. L. O. gr. iij. exhibe cum jusculo calido hujus balsami ℥β. interne contra cardialgiam.

℞. Flor. chamom. ℥j. cape ex decocto proprio ad febres puerorum, idem confert in lumbricis.

℞. Flor. chamom. Mij. coq. in vase clauso, igne leni sufficienter. ℞. Colatur. ℥viiij. add. ∞ laur. expr. ℥j. f. clyster. ad colicam quamcunque, si nullæ exeant fœces. add. Ois ℥ij. injice denuo clysterem, in torminibus cum convulsione add. Essent. castor. fact. cum ∞ subtili therebinth. ℥β.

CRO.

χαμαίμηλον, quasi pomum humile, quoniam quædam species pomum redolent, CAMOMILLA ἀνθεμῖς, ANTHEMIUM, λευκάνθεμον, CHAMOMILLA, LEUCANTHEMUM, ROTULA SOLIS, DISCUS SOLIS, Chamomillen / Chamillen / Gamillen / Hermlein / Magd-Blum / Meyd-Blum / Laugen-Blum CAMOMILLE.

Est planta flore plerumque radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, corona vero ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Embryones autem deinde abeunt in semina thalamo affixa. His notis addenda sunt folia intenuissimas lacinias divisa, totiusque plantæ facies.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis C. B. Pin. 135. Chamæmelum vulgare amarum I. B. 3. 116. Chamæmelum vulgare Dod. Pempt. 257. Gemeine Camillen. &

Chamæmelum nobile flore multiplici C. B. Pin. 135. Chamæmelum Romanum flore multiplici Tabern. Ic. 19. Chamæmelum repens odoratissimum perenne flore multiplici I. B. 3. 119.

Prior species passim obvia est in segetibus aliisque locis, posterior vero colitur in hortis & hoc habet peculiare quod pedibus conculcata fortiolem odorem spargat. Floret utraque Junio Julioque. Chamomilla vulgaris colligenda singulis annis, cum flores suos in ambitu albos cum umbone luteo expandit. Tota autem herba cum floribus est in usu. Chamomilla digerit atque laxat, ad urinam pellendam convenit, possidet virtutem discutientem & resolventem atque obstructions referantem, unde in febribus varii generis, pleuritide itidem præsertim spuria, asthmate, Ileo, tenesmo, paresi, dysenteria, hypochondriorum tensionibus, nephritide, dolore calculi, urinæ suppressoribus, stranguria & dysuria, ictero hydrope, mesenterii, Lienis, hepatis aliisque obstructionibus & morbis exinde oriundis usurpatur. Multum celebratur in affectibus uteri, ejusque doloribus præsertim post partum; sic quando puerperæ frigori se exponunt, unde uterus inflatur, ita ut quasi semel adhuc paritura compareant, nullum fere melius remedium quam Chamomilla tum interne tum etiam externe in vino decocta. In febribus intermittentibus interne commendatur, ubi flores pulverisati ad drachmam semis, singulis quatuor horis assumuntur, ad profligandos paroxysmos, sunt qui eundem ac corticem Peruvianum exferere effectum volunt. Nauseosum interim est medicamen-

camentum, sed non omnino spernendum. Planta hæc decocta cum lacte, addita præsertim Linaria, hæmorrhoidibus cæcis dolentibus confert, imprimis autem, ut & ipse author innuit in clysteres emollientes carminativos & anticolicos recipitur, imo vix ullum est clyfma, quod Chamomilla non ingreditur. Inter plantas, quæ in balneis contra calculum & colicam recipiuntur; flores Chamomillæ egregium constituunt ingrediens. Adhibetur etiam Chamæmelum frequentissime in pediluviiis, ubi ad lassitudinem confert, cum floribus Nymphææ mixtum iisdem pediluviiis ad vigilias arcendas, & dolores capitis sedandos immiscetur. Sacculi porro è Chamomilla parantur, in contusionibus sanguinis, suffusionibus tumoribus, doloribus abdominis & uteri convenientes.

IN OFFICINIS VARIA EX CHAMOMILLA JUVENI-
UNTUR PRÆPARATA

Aqua Chamomillæ, ex floribus præsertim destillata, *Camillen-Wasser* / *Eau de Camomille*, in colica aliisque affectibus flatulentis laudata.

Oleum Chamomillæ, per infusionem & coctionem paratum, *Camillen • Oehl* / *Huile de Camomille*, quod emollit, laxat discutit, & dolores mitigat, commendatur in tumoribus, affectibus flatulentis, in contracturis, convulsionibus arthriticis, affectibus febrilibus ac lassitudine: à nonnullis olei benedicti nomine insignitur.

Oleum Chamomillæ, per destillationem prolectum, præsertim *Sapphirinum*, sive *cæruleum*, *Blau Camillen • Oehl* / *Huile distillée Bleue de Camomille*. Oleum hoc externe convenit in colica, suffocatione uterina umbilico, abdomini & scrobiculo cordis inunctum: ut specificum contra cardialgiam celebratur, item cum bombace auribus inditum, in eorum doloribus. Constat insuper mihi hoc oleum quoque deprædicari ad affectus nephriticos & calculos pellendos. Interne guttatim propinatur vel in vehiculo vel cum Saccharo in Elæosaccharum mutatur, admodum conveniens in affectibus flatulentis. Guttæ circiter sex octo aut decem unciz sacchari admiscentur. Quæ de hoc oleo Sapphirino dicta sunt suo modo etiam communiter destillato applicari possunt.

Syrupus de Chamomilla, *Camillen • Syrup* / *Syrop de Camomille*.

mille. In doloribus colicis, iliacis, nephriticis & uterinis tum à flatibus, tum aliis causis oriundis præsertim in doloribus abdominis infantum commendatur. Pertinet porro huc

Aqua Carminativa Schræderi, sive *Aqua contra flatum cum Vino*, Schröders Wind und Grimmen-Wasser / *Eau carminative de Schræder.* Hæc aqua quoad partem cum vino parata adeoque spirituosam magnarum ab autore dicitur esse virtutum, in morbis à flatibus subortis, præsertim cum etiam aliqualem vim possideat paregoricam. Dosis uncia semis & ultra.

Aqua contra flatum sine vino, sive *Aqua carminativa Dorncreilii correctæ*, Grimmen oder Wind-Wasser ohne Wein destillirt / *Eau contre les vents ou carminative sans Vin.* Convenit cum priori ratione virtutum, excepto, quod ut loquantur, minus calida sit ob vinum, dosis quoque eadem. Optandum autem esset, ut & Chamomillæ & exinde præparatis gratior inexistere sapor.

Aqua ad tormina infantum, Leibweh-Wässerlein / *Eau contre la colique pour les enfans.* In colica infantili flatum dissipando & fibras intestinorum demulcendo convenit. Datur cochleatim.

CROCUS ORIENTALIS.

Crocus optimus ex Anglia ad nos transfertur, in India orientali ipse non crescit, sed ad Indos e nostris regionibus transfertur.

Constat Oribus fixis & volatilibus fragrantissimis & penetrantibus junctis blando oleo seu unctuositati, hinc aromaticus est, anodynus & hypnoticus, discutit mirifice, & in tussi dyspnœa, asthmate convulsivo, in phthisi, roborando & exhilarando corde, in mensium lochiorum & foetus remora ut & in ictero in usu habetur, item in syncope & palpitatione cordis, externe ventriculo applicatus eum roborat. Frontalibus admotus phrenitidem, maniam & cephalalgiam à frigido ortam tollit, membris paralyticis & induratis impositus mire discutit.

Uſus vini crocatus grumos ſanguinis ſub cute ſolvit & diſcutit, immoderatioꝝ uſus vitandus eſt, quia ſtuporem, ſomnolentiam nimiam & aliquando etiam amentiam inferre ſolet.

Datur ſubſtant. ad ꝑ. Eſſent. Extract. proſtat etiam emplaſtrum oxycroceum.

℞. Croc. or. gr. viij. Cinam. ac. ꝑ. Myrrh. gr. viij. Zedoar. ꝑ. ꝑ diaph. ꝑ. M. f. pulv. ad lochia promovenda.

℞. Croc. or. gr. viij. borrac. ꝑ. Myrrh. gr. xv. cinam. ac. ꝑ. M. f. p. pro ij. doſ. in remora menſium & lochioꝝ.

℞. ▽ Meliſſ. ꝑ. Croc. or. ꝑ. exhibe ad cordis palpitati-
onem, idem quoque applica regioni cordis.

℞. Croc. or. ꝑ. ꝑ. Olat. gr. viij. fem. aquil. ꝑ. cape ex vino contra icterum.

℞. Croc. or. ꝑ. Moſch. gr. v. cape ex vino in aſthmate convulſivo.

℞. Eſſ. croc. Caſtor. ambr. ▽ Quos. meliſſ. ana ꝑ. exhibe ad gt. xxx. ex decocto vel ▽ Meliſſ. contra palpitati-
onem cordis.

℞. Extract. Croc. ꝑ. ▽ roſar. ꝑ. ▽ ſolan. ꝑ. f. Epith. contra cephalalgiam, addita aq. nymphææ prodeſt contra maniam & phrenefin.

FLO-

κρόκος, κρόκον, CROCUS, à puero Croco, ut fabulantur, in hanc plantam converſo, aut à vocabulo κρόκῆς, κρόκη, filamen-
tum, pilos denotante quoniam Crocus in filamentis exiſtit. CROCUS
SATIVUS, CROCUS VERUS, CROCUS NOBILIS, SAHA-
FARAN ZAPHERAN, Saffran/ Edler Saffran/ Gerechter
Saffran/ SAFRAN.

Eſt planta flore liliaceo, inferius tubulato, monopetalo tubo
ſcilicet

scilicet in partes sex ampliato & pediculo insidente. Pistillum ex fundo floris surgit in terna capillamenta capitata & cristata divisum: calyx vero deinde abit in fructum oblongum, trigonum in tria loculamenta divisum, seminibusque foetum subrotundis. His notis addenda est radix gemina tuberosa, quarum altera, quæ minor est alteri majori carnosæ & fibratæ insidet; utraque vero involucro membranaceo obducitur.

Crocus sativus C. B. Pin. 65. Crocus Dod. Pempt. 213. & Joh. Bauh. 2. 937.

Plures regiones Croci esse feraces etiam in Oriente sitas, Indiam nempe Africam Turciam &c. multi contra Authorem, in Oriente non provenire putantem, asserunt. Quicquid autem sit, non opus est ut illum ex tam remotis accersamus locis, cum in nostra Europa Anglia, Hispania, imprimis vero Gallia atque Germania hujusque provincia Austria in agris Viennensibus aliisque locis, uberrime & summa efficacia præditus proveniat. Floret tempore autumnali.

In usum apud nos trahitur Crocus tam Gallicus tum Austria-cus sic dicto Orientali minimè inferior. Crocus autem nihil aliud est quam styli seu stamina florum purpureo & aureo colore nitentia, sapore subacri & subamaro, odore specifico intense acuto & quodammodo etiam narcotico prædita.

Cum Crocus sæpius adulteretur nunc staminibus carnis bubulæ salitæ, nunc Cnici floribus sive Carthami, nunc etiam in locis humidioribus asservetur, sequentes bonitatis notas proponit LANGEIUS. Si odorem de se spargat fragrantem in distans spatium 2. Si color quodammodo ad candorem inclinet in capreolis 3. Si madefactus notabiliter manus inficiat, 4. Si sapore acris fuerit, 5. Si non situm aut alium peregrinum odorem spiret, 6. Si manipulus ejus faciei admoveatur, ejusque odor exhalans acris palatum & oculos verberet, 7. denique si non sit pulverulentus.

Crocus cordialis est, & ob vim becchicam ANIMA PULMONUM audit. Cephalicus est ad vertiginem imò ipsam apoplexiam cæteris paribus utilis. In syncope & affectionibus hysteri-cis prodest. Urinam pellit, Veneremque stimulat. In obstructionibus porro conducit & ictero medetur, affectibusque spasmodicis auxilio est. Terminibus ventris obviam it & in alvi fluxibus et-

iam sanguineis confert. Dosis est ad scrupulum unum & paulo ultra. Cavendum utique ne in majori usurpetur dosi, capitis enim dolorem creat pallorem inducit, cibique appetitum dejicit, mentem turbat, temulentos homines reddit, somnum nimium & in specie delirium cum risu infert, imo zij. vel. iij. prorsus hominem interimere valent. Externe in epithematibus cordialibus & anodynis, ut & in cataplasmatibus discutientibus, emollientibus & suppurantibus adhibetur. Pulvinari in sacco subjectus somnum conciliare fertur, sed caute mercandum. Paralyticis quoque membris confert, & remedium ophthalmicum insigni constituit, præsertim in variolis & morbillis, ubi cum lacte muliebri aut aqua quadam ophthalmica, haud raro applicatur, quo modo etiam aurium dolores profligat. Cordi impositus, hilaritatem conciliare fertur. Crocus à multis tanquam condimentum usurpatur. Plura qui nosse cupit, adeat HERTODTI CROCOLOGIAM, ZORNII BOTANOLOGIAM aliosque.

IN OFFICINIS ASSERVANTUR

Essentia Croci, Saffran-Essenz / Essence de Saffran, quæ vires cordiales pectorales hystericas & anodynas obtinet, exhibetur ad guttas tres quatuordecem & ultra.

Extractum Croci, Saffran-Extract / Extrait de Saffran, quod cordiale est cephalicum uterinum atque anodynum. Dosis aliquot grana tantum.

Emplastrum Oxycroceum, Saffran-Plaster / oder Oxycroceum / Emplatre de Saffran ou Oxycroceum. Ad contusa, ossium fracturas; nervorum dolores & abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam idoneum; Emplasticum quoque & gignendo callo habile, in compescendis doloribus contusionibus & contorsionibus Chirurgorum est asyllum, præstaret tamen hoc in casu sæpius illud omittere & spirituosius uti.

Plures ingreditur compositiones Crocus Theriacam, Mithridatium, confectionem de Hyacyntho, Elixiria proprietatis aliaque & basin constituit decantati illius medicaminis quod vocatur

Electuarium de ovo Maximiliani I. Imperatoris, Gulden-Eylattwerg/

merg / Electuaire ou opiate de ovo. Male de ovo appellatur cum nihil fere de eo ingrediatur, sed solummodo Crocus in testa ovi coquatur cum vitello, potius nomen traxit à forma oviformi, in quam redigitur & postmodum deauratur. Commendatur in peste & præservatione à venenis deleteriis, sudores potenter movet & venenatos ichores à centro ad circumferentiam propellit, cor à tetrifugis fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas discutit, commendatur etiam in variolis modo tempus probe mensuretur, ubi expulsiōne opus est; dosis à scrupulo ad drachmam unam & paulo ultra.

Virtutem quoque insignem exinde nanciscitur apud nos usualis sic dictus

Pulvis Trium nummorum, Drenpfennig-Pulver oder Drenpfennert / Poudre à trois pfennings, qui ad tormina infantum curanda adhibetur à plebe & mulierculis. Datur cuspidatim.

℞. Mic. pan. tritic. q. v. coque in lacte ad pulmenti liquidioris consistentiam, adde postea unum aut alterum vitellum ovi, coque ad cataplasmatissimæ & quasi emplastriformis consistentiam, injice sub finem pulveris Croci cuspidēs aliquot. Habebis cataplasma egregie demulcens anodynum, emolliens, suppurans atque discutiens.

FLORES STOECHADOS.

In specie inter aromata cephalica, pulmonica nervina & uterina recensentur. Datureorum conserva & syrupus, in quibus tanquam vehiculo specifica ad supra dictos affectus exhibentur.

℞. Aq. flor. til. ℥ij. syr. stœchad. ℥j. conf. alk. ʒß. —
Ceraf. n. ʒij. f. mixtura ad roborandum caput in Apoplexia.

℞. Conserv. fl. Stœchad. ʒj. Θ vol. C. C. ʒß. f. bolus in capitis & uteri obstructione.

Στόχας, σίχας, STICHAS, duplex est, STOECHAS ARABICA, & STOECHAS CITRINA. Prior vocatur etiam STOECHAS VULGARIS. Stechas • Krauth / Römischer Welscher Fremb- der Rummel oder Thymian / Arabischer Stechas / Welscher = Labendel / STOECAS, STECAS ARABIQUE. Stœchas in insulis Galliæ gignitur, quæ è regione Massiliæ sitæ Stœchades appellantur, & ab iis nomen accepit.

Est planta flore monopetalo labiato, cujus labium superius erectum est bifidumque, inferius vero tripartitum, sic tamen secantur ambo, ut primo aspectu flos quinquepartitus videatur. Ex calyce autem surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina in capsula, quæ floris calyx fuit, recondita. His notis addendum est Stœchadis flores varia serie disponi in capitulis squamosis, è quorum cacumine aliquot foliola eminent visui grata, quæ CLUSIUS membranaceas ligulas vocat.

Stœchas purpurea C. B. Pin. 216. Stœchas Arabica vulgo dicta L. B. 3. 277. Stœchas brevioribus ligulis Clus. Hist. 344.

Colitur apud nos in hortis.

In usu flores Stœchadis sive potius spicæ inter florum & seminum proventum collectæ, eligendæ autem sunt recentes odoratæ & subamaræ. Ex Gallia ad nos advehuntur. Conveniunt hi flores in affectibus pectoris, asthmate tussæ &c. In affectibus Lienis & hepatis profunt, & quoniam vi alexipharmaca pollere censentur, in Theriacam atque Mithridatium recipiuntur.

IN OFFICINIS ASSERVATUR

Syrupus de Stœchade, Stöchas • Syrup / Syrop de Stœchas, qui inter remedia cephalica, nervina, stomachica & becchica refertur.

STOECHAS CITRINA vocatur alias CHRYSOCOME, COMA AUREA, AMARANTHUS LUTEUS, ἐλίχρυσον, ELICHRYSUM, TINEARIA, quoniam Tineas abigit, Rhein • Blumen / Winter • Blumen / Motten • Blumen / Schaben • Krauth / Wein • Blumen / Streichblumen / IMMORTELLE, quia flores exsiccati diu admodum servari possunt. AMARANTHE JAUNE.

Est

Est species Elichrysi, planta Scilicet flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis constante, stellæ ad instar divisis, embryoni insidentibus & calyce comprehensis squamoso, splendido, aureo. Embryo autem abit in semen pappis instructum.

Elichrysum seu Stœchas Citrina latifolia C. B. Pin. 264. Stœchas Citrina Germanica latiore folio I. B. 3. 153. Amaranthus luteus. I. Tabern. Icon. 387.

In locis asperis sabulosis siccis & convallibus frequens juxta Rhenum provenit, floret Junio & Julio.

Flores vim obtinent vulnerariam, & absterisivam atque aperientem. Conducunt in obstructione & in sanguine coagulato. In affectibus Lienis Hepatis & Renum profunt.

In catarrhis morbisque pectoris variis conducunt, Lumbricos necant tum interne tum externe usurpati.

Lendes atque tineas abigunt in lixivio, capillosque flavo colore tingunt. Ad lumbricos pellendos quidam hos flores de collo suspendunt.

FLORES SCHOENANTHOS.

Conveniunt cum planta propria quam evolve.

FLORES TUNICÆ.

Caryophylli hortensis flores, officinis flores tunicæ dicti, & de blando temperato volatili aromatico ad caryophyllos aromaticos accedente gaudent, & propterea in roborando capite, ut & à Sim. Pauli Q. B. aliisque in morbis malignis prædicantur, prostat horum conserva, aq. dest. syrupus multiplici infusione factus, quæ omnia stimulantur caryophyllis aromaticis.

℞. Conf. flor. tunic. ʒj. caryoph. ar. gr. vj. ʒo d. caryoph. gt. j. M. f. bol. ad roborandum caput, add. ambr. gr. iij. vel iiij. in ℞ rosar. solut.

℞. Decoct.

R. Decoct. flor. tunic. exhibe contra febres ex observatione multorum practitorum.

FLO.

CARYOPHYLLUS ab odore florum Caryophyllum æmulante, CARYOPHYLLUS HORTENSIS RUBER, TUNICA, BETONICA CORONARIA, CARYOPHYLLUS ALTILIS, Rothe Graß-Blumen / Nelcken / OEILLET ROUGE.

Est planta flore Caryophyllæo plurimis petalis constante in orbem positis, ex calyce cylindraceo membranaceo ad exortum squamato emergentibus. Pistillum autem ex eodem calyce surgit, abitque in fructum cylindraceum pariter apice dehiscentem calyce ipso involutum, seminibus foetum planis & quasi foliaceis placenta affixis.

Caryophyllus pleno flore minor C. B. Pin. 308. Hortorum Caryophyllus multiplex, minor, ruber striatus versicolor peræmœnus, Lobel. Icon. 442.

Caryophyllus maximus ruber C. B. Pin. 207. Caryophyllus maximus plenus flore rubro Eyst.

Coluntur in hortis, florent Junio:

Præter virtutes cephalicas & cordiales, in apoplexia, paralyfi, tremore & palpitatione cordis &c. profunt, conducunt quoque hi flores in affectibus hepatis, ut & in partu doloribusque post partum. Externe non solummodo hi flores in sacculos ad cor & pulsus, cucuphasque & suffimenta pulveresque sternuatorios recipiuntur, sed in vulneribus capitis, cephalalgia, odontalgia eorum adhibetur decoctum

IN OFFICINIS PROSTANT

Acetum florum Tunicae, Graßblümlein = Efig / Vinaigre d' Oeuillets, quod in pestis præservazione, aliisque morbis malignis syncope & Lipothymiis, externe naribus illitum vel pulsui applicitum prodest.

Aqua florum Tunicae, Graßblümlein = Wasser / Eau d' Oeuillets, quæ cephalica & ophthalmica habetur,

Cono

Conserva florum Tunicae live *Tunicarum*, *Graßblümlein = Zucker / Conserve d'Oeuillets*, quæ in electuariis cordialibus & cephalicis adhibetur.

Syrupus florum Tunicae, *Graßblümlein = Syrup / Syrop d'Oeuillets*. Admiscetur mixturis confortantibus, cephalicis & alexipharmacis. Sunt tamen qui dubitant de his virtutibus.

Cæterum elegans tinctura vel cum aqua spiritu acidulo acuatâ, vel cum phlegmate Vitrioli extrahi potest, quæ in febribus continuis ardentibus & malignis non omnimodo inutilis.

FLORES VIOLARUM.

Sunt violæ martiæ purpureæ flores pentapetali oblongi purpurei, posterius obtuso calcare notati. Temperatum & blandum volatile aroma in tenui laxante viscositate possident, propterea conveniunt in tussi, asperitate faucium, ariditate linguæ, Oib. acribus, catarrhis, it. phthisi, pleuritide, in fallenda siti, in affectibus cordis ab acido & terreo seu melancholia ortis, it. in febrium nimio æstu temperando. Inter cardiaca roborantia numerantur tam ob gratum odorem seu blandum volatile aroma, quam ob tenuem viscositatem terrea rigida solventem & lenientem.

Colligendi sunt matutino tempore dum rore adhuc madent. Calices in quo vis nauseosa est rejiciendi, sin autem vis potior laxans expetitur, calices cum floribus in usum sunt vocandi.

Datur conserv. tinct. syr. simplex. & comp. it. succ. aq.

℞. Mann. q. s. affund. succ. violar. ad conservæ consistentiam add. novos flores recentes & fac conservam cujus j. ad 3ij. data laxat alvum.

℞. Conserv. violar. 3j. Mann. 3j. syr. violar. q. s. f. laxans.

℞. Flor. violar. infund. aq. borrag. bugloss. q. s. add tantillum — Δis. f. tinctura.

℞. Syr. violar. ex multiplic. infus. aq. violar. cum sacchar. f. q. f. tabulatum ad morbos pulmonum, tussim, asthm.

FLO-

Ἰὼν, ab Jo puella, uti volunt, VIOLA ob odorem, vel quasi minime violanda sit, VIOLA PURPUREA, Ἰὼν πορφυρεῖν, Ἰ.ν μέλαν, καὶ μελαίνιον, à floris colore, VIOLA MARTIA, Biolen / Beylotten / Blaue Biolen / Merck Biolen / FLEURS DE VIOLIER OU VIOLETTES.

Est planta flore polypetalo, anomalo papilionacei floris æmulo, hujus enim duo petala superiora vexillum, duo lateralia alas, inferius vero, quod in caudam desinit, carinam quodammodo representant. Ex calyce surgit pistillum quod deinde abit in fructum plerumque trigonum, trifariam dehiscentem seminibusque foetum ut plurimum subrotundis.

Ex multis Violæ speciebus usualis præsertim est

Viola Martia purpurea flore simplici odore C. B. Pin. 199. Viola Martia purpurea L. B. 3. 542. Viola nigra sive purpurea Dod. Pempt. 156.

Amat opaca & aspera, ad murorum radices, ut SCHWENCKFELDT, loquitur, hortorum margines, sepes & dumeta provenit, frigoris patientissima, floret Februario, Martio & quandoque citius, pro tempestatis ratione

In usum ex hac planta veniunt folia, de quibus supra, radix sed rarissime, semen atque flores & quidem frequentius.

Radici vis vomitoria atque purgans adscribitur, præsertim si ex præcepto TOURNEFORTII Sal absinthii jungatur. Semini mucilaginoso saporis subacri cum levi amaritie prædito, præter virtutem laxantem, vis diuretica & lithontripica tribuitur, quoniam tradente præprimis ETTMÜLLERO Therebinthinatum spirat odorem. Sunt tamen authores qui de ejus viribus dubitant.

Imprimis autem in usum veniunt Flores fragrantem gratum subtilem

subtilem & tenuem odorem spargentes, qui juxta **TOURNEFORTIUM** succum acidum, multo oleo, sale volatili concreto & fixo lixivioso gaudentem obtinent. Sunt ex quatuor floribus cordialibus. Ob vim laxantem dantur vel in acetariis, infusis vel decoctis laxantibus, vel in pulvere ad drachmam usque & ultra. Pro sunt etiam in affectibus viarum urinariarum. Laudatur quoque ad cephalalgiam, nec destituuntur virtute ophthalmica,

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua violarum, **Biolen oder Beilotten = Wasser / Eau de Violettes**; inter quatuor aquas cordiales refertur, insipida autem est & fere inodora, nisi peculiaris adhibeatur encheiresis.

Conserva florum Violarum simplex, **Biol oder Beilotten = Zucker / Conserve de Violettes de Mars**, quæ & virtute laxante & cardiaca gaudere censetur.

Conserva florum violarum Vitriolata, **Saur Biolen = Zucker / Conserve de Violettes Vitriolée**, quæ præter virtutem cordialem magis refrigerans & adstringens habetur.

Mel violatum simplex, **Biolen = Honig / Miel violat**, quod refrigerat, demulcet atque sanat, adhibetur in clysteribus & gargarismatibus.

Oleum violarum, **Biolen oder Beilotten = Oehl / Huile de violettes**, per infusionem paratum. Emollit, lenit, febrilem æstum mitigat, in vigiliis fronti ac temporibus illinitur pro somno conciliando.

Syrupus Violarum, **Biolen oder Beilotten = Syrup / Syrop violat**, cui Syrupus suavissimo & usitatissimo vires cordiales atque pectorales, ad tussim, raucedinem & asperitatem faucium, refrigerantes insuper & humectantes adscribuntur. Infantibus præsertim conducit alvum parumper laxando. Æstivo tempore Julapia sæpius inde fiunt. Color hujus Syrupi cæruleus ab affuso acido in rubicundum, ab alcali vero instillato in viridem mutatur. Curiosum est quod color cæruleus non possit restitui, sed semper vel rubicundus vel viridis postmodum exoriatur. Confici quoque Syrupus elegantior fere potest ex succo violarum per expressionem prolecto, at carior est,

Syrupus violarum laxativus, laxitender *Violen* • *Syrup* / *Syrup violat laxatif*, qui alvum subducit & infantibus præsertim exhiberi potest. Datur ad drachmas duas, ad unciam unam usque ad uncias duas.

Julepus violarum, *Violen* = *Julep* / *Julep violat*, refrigerandi confortandique fine conducit.

Saccharum Cantum violatum, *Violen* • *Zucker* / *Sucre Candi violat*, quod vel ex Syrupo ulterius cocto paratur vel ex sponte crySTALLATO extrahitur. A quibusdam quoque in usum trahitur.

Tinctura violarum, quæ vel cum aquis destillatis, uti author ipse docet, vel cum aqua simplici spiritu acido grato acidulata, aut etiam phlegmate Vitrioli elicitor. Conducit ad sitim sedandam & æstum sanguinis mitigandum. Parari quoque cum aceto exinde potest *acetum violaceum* eleganti colore violaceo resplendens. Cape videlicet violas justumque earum pugillum infunde mensuræ aceti; Stent per 3. horæ quadrantes, easque tunc exime ac redintegra septies infusionem simili quantitate violarum, prodibit acetum tam fragrans odore florum, ut si post annum proferatur, in acetario percepturus sis odorem antequam offeratur. Perfectius etiam fragrantiam odoris redolet longiori post spatio, quam prima vice. Tandem nec silentio prætereunda.

Emulsio violata Mynsichti, *Dr. Mynsichts Ruhmilch* / *Emulsion violat de Mynsicht*, quæ refrigerat, humectat, sitim sedat; somnum conciliat & dolores mitigat. Dosis haustus mediocris duarum scilicet trium vel quatuor unciarum. Loco Julepi violacei edulcorari poterit Saccharo. Quandoque additur Syrupus papaveris albi.

De viola Martia purpurea conferri meretur dissertatio Henringeri.

FLORES ROSARUM PALLIDARUM.

Florum vis temperata alvum laxans, bilem mulcens & aquas evacuens consistere videtur tum in rore, quo flores matutino tempore madent, tum in odore seu particulis volatili-

volatilibus, quæ à rore tanquam menstruo Sino Otroso suscipiuntur, reliquum vero totum terreum est & adstringitorium. Cæterum in volatili illo odore residet quoque vis analeptica, propterea tota substantia florum laxat, adstringit & simul roborat, in specie vero convenit biliosis, hydropicis, & in fluxu albo mulierum.

Aq. dest. habet vim roborantem & refrigerantem, quæ ex rosis damascenis est aqua, laxat simul alvum si paulo largiore dosi exhibeatur. Datur conserva, syrupus, & ardens. Aq. dest. decoct. ung. $\circ\circ$ destil. & infus. Ob vim purgantem non exhibentur in decocto, quia vis purgans consistit in volatili, frequentius dantur in infuso.

℞. Rosar. pallid. rec. matutino tempore collectar. q. v. adde mannam & tantillum rosarum pallidarum, fac conservam purgantem.

℞. Conserv. ros. pallid. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. pulv. hepat. rubr. \mathfrak{ij} . scammon. rosat. gr. v. \mathfrak{ss} rosar. q. s. f. bolus laxans, convenit in febribus intermittentibus, præcipue in declinatione.

℞. Aq. dest. ros. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. verben. $\mathfrak{ss}\mathfrak{j}$. acet. ros. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. santal. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. f. epith. fronti applicandum.

℞. Aq. rosar. additur mixturis & emulsionibus cardiacis pro lubitu.

FLO-

ROSA flos ab omnibus cognitus, in duas præsertim dividitur species, sylvestrem alteram, alteram domesticam de qua hic sermo. *πόδαρ*. Rosa & flos & frutex est, *Rosenstaud* / ROSIER.

Est frutex flore ex plurimis petalis in orbem positis constante, cujus calyx foliatus abit deinde in fructum subrotundum, vel oblongum, carnosum, unicapfularem, seminibusque foetum ut plurimum angulatis & villosis.

Ex plurimis sequentes quam maxime in usum trahuntur spe-

cons.

E e e e 3

Rosa

Rosa alba vulgaris major C. B. Pin. 482. Rosa candida plena & semiplena I. B. 2. 44. Rosa alba Tabern. Ic. 1083. *Weisse Rosen / Weiße Garten-Rosen / ROSES BLANCHES.*

Rosa Moschata simpliciflore C. B. Pin. 482. Rosa Moschata minor flore simplici I. B. 2. 45. Rosa Muscata alba Tab. Ic. 1086.

Rosa Moschata flore pleno C. B. Pin. 482. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. 2. 47. Rosa Muscata alba multiplex Tabern. Ic. 1086. *Weiß Muscaten-Rosen / Bisam-Rosen / ROSES MUSQUÉES*

Rosa purpurea C. B. Pin. 481. Rosa provincialis major Tabern. Ic. 1084. Rosa rubello flore majore multiplicato sive pleno incarnata vulgo I. B. 2. 36. *Leibfarbe-Rosen / Damascener-Rosen / ROSES INCARNATES.*

Rosa Rubra pallidior. C. B. Pin. 481. Rosa holosericea Lob. Icon. 207. Rosa pallida *Bleiche Rosen / Blasse Rothe-Rosen oder Zucker-Rosen / ROSES PASLES.*

Coluntur in hortis, florent mensibus Majo & Junio.

In usu præsertim sunt flores rosarum. Tempore quo Rosæ florent frequentissime pro alvo laxanda in sero lactis infunduntur.

IN OFFICINIS EX ROSIS QUIBUSVIS PROSTAT

Aqua Rosarum, Rosen-Wasser / Eau de Roses. Destillatur vel cum aqua per vesicam vel in balneo Mariæ. Optima fit, quæ aut absque aqua affusa per se destillatur, aut quæ juxta Dn. Lemery in Balneo vaporis vel Mariæ cum Succo rosarum expresso & super rosas recentes cohobato elicitur. Rosæ porro salitæ egregiam quoque aquam fundunt. Aqua hæc odorifera virtute gaudet refocillante, inter quatuor aquas cordiales refertur, sæpius autem omittitur, & tunc præscribuntur aquæ trium florum cordialium. Usurpatur tum pro usu Medico tum pro usu culinari in bellariis præsertim variis præparandis. Externe in affectibus oculorum, ophthalmia aliisque laudatur, præfertur tamen à multis hunc in finem.

Aqua Rosarum pallidarum, Bleich Rosen-Wasser. Eau de Roses pasles. Post destillationem aquæ ad siccitatem remanent sic dictæ *placentæ Rosæ, die Rosen-Ruchen / Chapeau de Rose*, quæ odoris gratia

tia linteaminibus & vestimentis interponuntur. In doloribus quoque capitis a quibusdam usurpantur.

Conserva rosarum albarum, Weiß-Rosen-Zucker/ *Conserve de roses blanches*.

Conserva rosarum pallidarum, Bleich Rosen-Zucker/ *Conserve de Roses pasles*, quæ conservæ inter se non multum discrepant.

Muchari seu infusum rosarum, *Infusion de roses*, pro scopo laxandi adhiberi potest ad aliquot uncias.

Julepus rosarum, Rosen-Julep/ *Julep rosat*, cordialis censetur, inservit pro edulcoratione.

Syrupus rosarum solutivus, laxierender Rosen-Syrup/ *Syrop de Roses laxatif*, alvum blande subducit, ipsis infantibus exhiberi potest. Datur ad ʒij. ʒß. ad ʒij. usque.

Electuarium e succo rosarum, Rosensafft-Electuerg/ *Electuaire de suc de Roses*. Commendatur ad bilem evacuandam & in affectibus a bile ortis. Dosis ad drachmas duas ad unciam semis. Drachma continet scammoniei grana quatuor circiter.

Spiritus Rosarum per fermentationem, Rosen-Spiritus/ *Esprit de Roses par fermentation*; Vires stomachicas atque cordiales interne & externe obtinet. Datur ad ʒj. ʒß. ʒij. in vehiculo. Sunt qui etiam Spiritum Rosarum parant cum Spiritu Vini.

Oleum Rosarum per infusionem paratum, Rosen-Oehl/ *Huile de Roses*, Emollit mitigat, repellit & refrigerat, somnum inducit alvumque laxat.

Oleum Rosarum verum, destillirt Rosen-Oel/ *Huile de Roses véritable*. Cephalicum est & cordiale. Inservit præsertim ut exinde paretur

Balsamum Rosarum, Rosen-Balsam/ *Beaume de Roses*.

Mel Rosarum laxativum, laxierender Rosen-Honig/ *Miel Rosat laxatif*. Abstergit, alvum laxat & infantibus ad aliquot drachmas dari potest.

Unguentum Rosatum simplex, Rosen-Salblein/ *Onguent Rosat ordinaire*; Cephalalgia mederi ac hæmorrhoidum inflammationem demulcere dicitur, refrigerat insuper viresque restaurat & conservat, dolores quoque mitigat imprimis articulorum. Præbet quoque ob suavem odorem quorundam simplicium, quæ exterius applicare volumus, vehiculum. In russi infantum cum unguento rubro

rubro potabili commendatur. Loco unguenti pomatini optime inservire potest. Quod si Camphora addatur, exurgit

Unguentum Rosatum Camphoratum, Rosen-Sälbel mit Campfer/ Onguent rosat Camphré.

Tabulæ Manus Christi simplices, Manschrift. Zäffelein / Tablettes de Sucre rosat.

Tabulæ Manus Christi perlata, seu Saccharum perlatum, Manschrift. Zäffelein mit Perlen / Tablettes de Sucre rosat perlé, ou Sucre perlé. Inserviunt potissimum ad edulcorationem.

Tandem de medicamentis rosaceis notandum, quod in eorum applicatione bene respiciendum sit ad idiosyncrasiam subjectorum, præsertim in sexu sequiori. De Rosis conferri meretur ROSEMBERG in RHODOLOGIA.

FLORES TILIÆ.

Aroma suum volatile in temperata tenui viscosa substantia foveant, unde capiti, nervis & spiritibus dicantur, & in specie conveniunt in vertigine, convulsione, epilepsia, suffocatione hypochondriaca. Externe commendatur eorum decoctum pro cataplasmate in tenesmo.

Præscribitur ▽. decoct. & —us.

℞. —lil. convall. flor. til. ana ℥j aq. Cinam. ℥iij conf. alkerm. ℥j syr. flor. tunic. ℥j M. f. mixtura ad epilepsiam add. — Ceras. nigr. ℥iij.

LILI-

TILIA, Linden / Lindenbaum / a mollitie uti quidam volunt, TILLAU, TILLEUL.

Est arbor flore rosaceo, plurimis petalis in orbem positis constante, ex cujus calyce surgit pistillum, quod abit in testam unicapsum, seminibus foetam oblongis.

Tilia foemina folio majore C. B. Pin. 426. Tilia vulgaris platyphyllos I. B. I. 133. Tilia Dod. Pempt. 838. &

Tilia

Tilia foemina folio minore C. B. Pin. 426. Tilia folio minore J. B. I. 137. Tilia sylvestris Trag. 1111.

Hinc inde colitur Tilia, arbor in multam ætatem vivens, floret Majo & Junio.

In usu ex hac arbore trahuntur Cortex, Lignum, folia semen & imprimis flores. Folia ac cortex siccant, discutiunt, menses & urinam pellunt, ambustis quoque profunt. Decoctum foliorum tumores pedum discutere & in aphthis atque ambustis prodesse dicitur. Folia porro in lacte vel in aqua decocta in tenesmo mederi perhibentur. Lignum adhibetur ad sanguinem coagulatum dissolvendum. Imprimis autem carbones Ligni Tiliæ vim cephalicam & antepilepticam obtinere quidam persuadere volunt, creduntur & contra casum facere, multi tamen his viribus nihil tribuunt. Inserviunt alias hi carbones ad candelas fumales odoratas.

Flores, quorum virtutes author satis expressit, frequenter in decocta pro potu ordinario recipiuntur, ubi non injucundum colorem & saporem largiuntur.

Umbram arboris Tiliæ quidam Naturæ curiosi adeo salutarem esse contendunt, ut dolorem capitis in umbra juglandis contractum, umbra Tiliæ sanari pronuncient. Arbori huic quoque haud raro innascitur Viscus, quem, ut supra dictum, querno in affectibus epilepticis quidam præferunt.

IN PHARMACOPOLIIS REPERITUR

Aqua florum Tiliæ, Lindenblüht-Wasser / Eau de fleurs de Tilleau quæ vehiculum in affectibus capitis epilepticis & convulsivis, item in palpitatione cordis præbet, de hac aqua notandum, quod tota prodeat mucilaginosa, si ignis urgeatur.

LILIUM CONVALLIUM.

Virtute coincidunt cum floribus tiliæ sed præstantiores sunt, externe naribus admoti sternutationes provocant. Dantur ut flores tiliæ.

℞. Aq. flor. lil. convall. lavend. rorismar. primul. ✓veris
Ffff

— ceras. n. ana q. v. cape pro usu interno & externo in mor-
bis convulsivis.

PRI-

LILIUM CONVALLIUM, quia in convallibus multum prove-
nit, LILIUM CONVALLIUM SYLVESTRE, LILIUM CONVAL-
LIUM VERUM THEOPHRASTI, EPHEMERUM NON LETHA-
LE FUCHSII, sed juxta J. BAUHNUM non admodum bene.
Mäyenblümlein/ a mense, quo maxime florent. MUGUET.

Est planta flore monopetalo campaniformi, brevi, calycis expe-
te & multifido, ex cujus fundo surgit pistillum, quod deinde abit in
fructum mollem, ut plurimum globosum & seminibus dense conge-
stis foetum.

Lilium convallium album C. B. Pin. 304. Lilium convallium
vulgo J. B. 3. 531. Lilium convallium Dod. Pempt. 205.

In sylvis & locis umbrosis humidisque sponte provenit. Aprili
aut citius nova germinaprotrudit, eodemque mense sub finem atque
Majo floret.

In usu flores, raro radix: flores concretum sunt singulare odoris
suavissimi. Obtenent vires cephalicas praesertim in affectibus sic
dictis frigidis, apoplexia &c. nervinas item & arthriticis, analepti-
cas porro in Lipothymis atque cardiacas, sternutatorias & erthinas.
Succus aut liquamen florum multum a quibusdam commendatur in
doloribus podagricis mitigandis. Flores exsiccati pulveres ingre-
diuntur sternutatorios.

IN OFFICINIS EXTANT

*Aqua Liliorum convallium, Mäyenblümlein-Wasser/ Eau de Mu-
guet, quæ cephalica praesertim habetur.*

*Conserva Liliorum convallium, Mäyenblümlein-Zucker/ Conserve de
Muguet, ad eundem scopum ac aqua utilis.*

*Oleum Liliorum convallium, Mäyenblümlein Oehl/ Huile de Mu-
guet, spasmus convulsioni & aliis nervorum affectibus frigidis con-
ducit, torminaque puerorum sedat.*

*Spiritus Liliorum convallium, Mäyenblümlein-Brandtenwein/
Esprit*

Espirit de Muguet, paratur per infusionem cum Spiritu Vini & insequentem destillationem. Est confortans memoriam, & in affectibus cephalicis præsertim soporosis conducit. Externe autem ut plurimum usurpatur ad contusiones, luxationes, dolores & affectus nervorum sic dictos frigidos, ut & ad odontalgiam per nares attractus.

PRIMULA VERIS.

Tiliæ & lavendulæ floribus respondent, & in specie laudantur in paralyfi, iis quoque qui tenerioris sunt ætatis & complexionis hypnotici sunt & anodynæ. Dantur ut flores tiliæ.

℞. Aq. prim. veris flor. til. lil. convall. ana ℥ij aq. apopl. — ceras. n. ana ℥ss. add. Θ vol. succin. 3℔ syr. flor. tunic. ℥j. f. mixtura contra apoplexiam & paralyfin.

FLO-

PRIMULA VERIS dicitur a primo Vere, quod scilicet plurimæ ejus species tunc florere soleant. HERBA PARALYSIS, quod ad artuum, & nervorum dolores conducit, VERBASCULUM ODO-RATUM, HERBA St. PETRI, Schlüssel Blumen/ a floribus eorumque præsertim caule, Himmelschlüssel/ St. Peters Schlüssel/ Sichttraut/ PRIMEVERE.

Est planta flore monopetalo hypocrateriformi & multifido, ex cujus calyce (qui tubulatus est) surgit pistillum infimæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum seu testam oblongam, in ipso calyce vel feræ reconditam, apice dehiscentem & seminibus foetam subrotundis placentæ affixis. Dignoscitur flore & semine carens, foliis rugosis & veluti asperis tenuibus, ad Lactucam nonnihil accedentibus.

Ex pluribus primulæ Veris speciebus in usum præsertim venit Primula Veris odorata flore luteo simplici J. B. 3. 495. Verbasculum pratense odoratum C. B. Pin. 241. Primula veris flavo colore elatior Clus. Hist. 301.

Ubique in pratis præsertim uliginosis & riguis veris tempore florent.

Vis horum florum antapoplectica a quibusdam multum celebratur. Laudantur in arthritide. Virtute quoque traumatica æque ac folia gaudent. In balneis antiparalyticis item in cucuphis adhibentur. Radix commendatur in febribus, calculo renum, herniis & lumbricis.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Paralyseos, Schlüsselblumen-Wasser / Eau de Primevere, ex integra herba caule & floribus destillata, refertur inter aquas cephalicas & articulares. Conducit ad cephalalgiam.

Conserva Paralyseos, Himmelschlüssel-Blumen-Zucker / Conserve de Primevere.

Syrupus Paralyseos, Schlüsselblumen-Syrup / Syrop de Primevere. Morbis nervorum capitis atque articulorum dicatus est æque ac conserva.

Oleum Paralyseos, Schlüsselblumen-Dehl / Huile de Primevere, quod Paralyticis & convulsis prodest.

FLORES MUCAGINE TENUI POLLENTES.

FLORES MELILOTI.

Blandum discutiens \ominus volatile temperatum, quasi unguositate sociatum habent, hinc interne inter expectorantia recensentur, potior tamen eorum usus est externus, discutiunt, emolliunt, dolores mitigant, hinc in inflammationibus quibusvis præcipue uteri, ani, testium, ut & in doloribus nephriticis & podagræ conveniunt.

Præscribuntur in cataplasmate, fomentis, emplastris; junguntur floribus chamomillæ.

℞. Flor. melil. chamom. fol. alth. ana Mj. rad. alth. ʒj
fic^u.

ficuum n. vij coq. in aqua vel lacte pro gargarismate in inflammatione faucium maturanda, residuum applica partibus induratis emolliendis.

FLO.

MELILOTUS quasi diceret Lotum mel olentem, *μελίλωτος*, LOTUS URBANA, SAXIFRAGA LUTEA, TRIFOLIUM ODORATUM, SERTULA CAMPANA, quia in coronas recipiebatur. *Steinklee / Honigklee / Meliloten / MELILOT.*

Est planta flore papilionaceo, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in capsulam nudam, hoc est in calyce non reconditam, ut in Trifolio, uno vel altero semine foetam subrotundo. His notis addenda sunt folia terna singulis pediculis insidentia.

Melilotus officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. Trifolium odoratum sive Melilotus vulgaris flore luteo L. B. 2. 370. Melilotus Germanica Lobel. icon. 48.

Melilotus Officinarum Germaniæ flore albo C. B. Pin. 331. Melilotus 2. flore candido Dod. Pempt 567.

Circa arborum margines, locis præprimis saxosis, nec non inter segetes, tota æstate florens provenit.

Adhibetur Melilotus in clysteribus & decoctis ad hydropem, pleuritidem, stranguriam obstructionem mensium ut & venena. Prodest quoque in fluore albo. Decoctum Meliloti laudatur insigniter ad dolores post partum atque etiam ante partum mitigandos.

IN OFFICINIS EXTANT

Aqua Meliloti, Stein-Klee oder Honig-Klee-Wasser / Eau de Melilot, quæ capiti dicata est, reserat obstructions partium præsertim urinarum, dolores oculi solvit, & si vapor hujus aquæ auribus excipiat, dolores & susurros tollit.

Emplastrum de Meliloto, Meliloten oder Meloten-Pflaster / Emplâtre de Melilot. Malacticum sive emolliens celebre est emplastrum, commendatur ad durities jecoris, Lienis ventriculi, viscerum & reli-

quarum partium etiam inveteratas emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resolvendos, bubones discutiendos ac dolores a frigido sedandos. In intumescencia genarum cum dolore dentium conjuncta ad hoc emplastrum confugiunt plurimi, cum tamen saepius plus prodesset, si Theriacam cum Spiritu Vini camphorato applicarent.

FLORES SAMBUCCI.

Hujus flores Θ e discutiente adeo potenti gaudent, ut simul sudores moveant, si recentes sunt & frixi cum butyro exhibentur alvum blande subducunt, & si ex sero lactis coquuntur hydropicis conducunt. Horum decoctum commendat Langius in augendo lacte mammarum. Externe in erysipellate applicantur feliciter ut & in cephalalgia & nimis vigiliis, nam ob demulcentem virtutem blandum somnum accersunt.

Dantur in decocto vel ex aqua vel sero lactis facto, aq. destill. laudatur in Variolis. Externe ingrediuntur clysteres & cataplasmata; inspergitur pulvis cum creta & sacch. Sui in erysipellate.

\mathcal{R} . Flor. chamom. Sambuc. Melil. coq. c. aq. ad ileum, residuum applica ad calculum renum, idem quoque conducit pro clystere in colica passione.

FLO-

FLORES SAMBUCCI, Holder = Blüth / FLEURS DE SUREAU.

Laudantur in cachexia, pellenda urina & mensibus, obstructionesque viscerum reserant febribusque medentur. Interne quoque in erysipellate tum curative deprædicantur tum præservative, si videlicet Lunæ decrementis hauriatur eorum decoctum. Flores quoque cum pasta farinacea friguntur, & comeduntur; si pro lacte augendo.

augendo flores decoquuntur, observatur quandoque in infantibus alvum laxari. In doloribus quoque partium scorbuticis profunt. Conveniunt in tumoribus emolliendis discutiendis & maturandis. Ingrediuntur sacculos carminativos & discutientes in doloribus podagricis vel cum floribus Chamomillæ vel cum farina secalina. Notandum imprimis de his quoque floribus, quod iis mediantibus vino & cerevisiæ odor & sapor Moschatellinus communicetur, & Vinum Neccarinum evadat, ubi hoc sciendum, quod tale vinum insignem capitis inducat dolorem.

IN OFFICINIS HABENTUR

Aqua florum Sambuci, Holderblüth = Wasser / Eau de fleurs de Sureau, quæ est diaphoretica, & convenit in colica & pellendis mensibus. Externe in doloribus capitis prodest ob vim anodynam. Maculas faciei delet oculisque prodest.

Oleum Sambuci ex infusione florum, Holder = Dehl / Huile de Sureau. Lenit, abstergit, mundificat, & anodynum est.

Spiritus Sambuci ex floribus per fermentationem, Holderblüth = Spiritus / Esprit de fleurs de Sureau: Vires obtinet discutientes & diaphoreticas interne & externe, datur ad guttas decem triginta & ultra.

Acetum Sambucinum, Holder = Esig / Vinaigre de Sureau, quod diaphoreticum & discutiens censetur. Usurpatur quoque pro embammate.

FLORES SALE FIXO CUM
PAUCIS VOLATILIBUS
CONSTANTES.

FLORES CHEIRI.

Sunt Leucoji vulgaris flores lutei, saporis subacris subamari. In specie utero dicantur, in pellendis mensibus & lochiis, laudantur quoque tanquam nervinum & discutiens in paralyfi & apoplexia. Datur conserva & ☉ ex florum infusione

fusionem, quod in Italia ad facilitandum partum regioni pubis inungitur.

℞. Conserv. flor. cheir. cape ex aqua propria dest. ad apoplexiam & paralyin præservandam, add. Θ volat. succin. gr. v. & ʒ d. caryoph. gt. j.

CAL-

CHEIRI, KEIRI, ALCHEIRI, LEUCOJUM LUTEUM
 VIOLA LUTEA, Negelein / Negel = Biolen / Gelbe, Nägelein /
 GIROFFLIER OU VIOLIER.

Est planta flore cruciformi, quatuor scilicet petalis constante; ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu siliquam longam compressam, septo intermedio, cui valvæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque foetam planis orbiculatis & marginatis.

Leucojum luteum vulgare C. B. Pin. 202. Leucojum luteum vulgo Cheiri flore simplici I. B. 2. 872. Leucojon luteum Dod. Pempt. 160.

Colitur ut plurimum in hortis, raro apud nos sponte provenit, floret Aprili Majo &c.

Commendantur hi flores in exsiccandis catarrhis & doloribus caput infestantibus, laudanturque ad icterum profligandum. In balneis quoque uterinis adhibentur.

IN OFFICINIS EXTANT

Aqua florum Cheiri, Gelbnägelein = Wasser / Eau de Giroflées.

Oleum Cheirinum, Negelblumen = Oehl / Huile de Violier jaune, quod ventris torminibus succurrit, lumbricos interimit, uterinæ suffocationi medetur, menses provocat, partum faciliat, convenit etiam in nervorum affectibus.

CALENDULA.

Sunt Calthæ vulgaris flores aurei discoidei radiati, saporis

poris acris nauseosi, conspirant cum floribus Cheiri, sed in mensibus pellendis & foetu tantæ efficaciae censentur, ut & menses calendularum odorem spirasse nonnulli affirmant. Cæterum virtutem alexipharmacam habent, & in variolis, morbillis, peste aliisque malignis, ut & ictero conducunt.

Externe applicantur verrucis mollioribus tollendis, alias additur ꝯ ω -ti gr. j. interim vicinæ partes muniantur emplastro diapalm. vel de gratia Dei; in hoc casu etiam possunt applicari c. urina vel ∇ propria.

Datur conserva decoct. acet. calend. quod frontalibus pulsui & plantis pedum applicatur. it. ad capitis dolores in peste commendatur.

℞. Succ. flor. calend. ʒj. pulv. lumbr. terr. ʒj. exhibe contra icterum.

℞. Conserv. fl. calend. ʒj. ʒo cinam. gt. j. f. bolus in remora mensium.

FLO.

CALENDULA, quod Calendis mensium florere soleat, SOLSEQUIA, SOLSEQUIUM AUREUM, & SOLIS SPONSA, quod flos Solis ortu aperiatur & occasu claudatur. FLOS OMNIUM MENSIVM, VERRUCARIA à virtute contra verrucas. FLOS ANNULI à semine intorto & in circulum acto, Ringel-Blumen/ Gold-Blumen/ Soucy.

Est species Calthæ, planta videlicet flore radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, corona vero ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus & calyce comprehensis. Embryones autem abeunt in capsulas plerumque incurvas & marginatas, semine foetas ut plurimum oblongo.

Caltha vulgaris flore pallido C. B. Pin. 275. Caltha flore simplici l. B. 3. 101. Calendula Dod. Pempt. 254. &

Caltha vulgaris flore Citrino C. B. Pin. 275.

Crescit in hortis, florere incipit Majo, floretque per integram ætatem, Gggg Flo-

Floribus his adscribitur quoque virtus cordialis, diaphoretica & anthelmintica. In paralyfi & contracturis profunt. Externe porro in balneis adhibentur, in suffitu menses & foetum pellunt & ad odontalgiam commendantur, praesertim succus: capillos colore flavo tingere dicuntur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Calendulae, Ringelblumen • Wasser / Eau de Soucy, quae oculorum morbis & capitis dolori medetur.

Acetum Calendulae, Ringelblumen • Esig / Vinaigre de Soucy, quod virtute alexipharmaca imprimis tum interne tum praesertim externe se commendat.

FLORES AQUEIS CONSTANTES.

BORRAGO & BUGLOSSA.

Utriusque flores cardiacis annumerantur, dum sua aquositate Θ ia acida terrestria seu Melancholica — us suffocantia dissolvunt, hinc melancholicis & hypochondriacis conveniunt; profunt quoque specificè ad mensium suppressionem.

Datur conserva ex floribus recentibus parata, ut & ∇ destillata & syrupus.

\mathcal{R} . Conserv. bugl. borrag. ana \mathfrak{zj} . cape c. ∇ propria ad melancholiam, add. tantill. aq. cinam.

\mathcal{R} . Conf. borrag. \mathfrak{zj} . cape cum vino albo ad mensium emanfiones.

\mathcal{R} . Flor. bugloss. infund. vino ad desperatam epilepsiam ex mente Willisii.

BORRAGO, quasi Cor ago, quod cordis affectibus opituletur, & quod quasi gaudia cordis agat, unde proverbium:

Dicit Borrago, gaudia cordis ago.

A PLINIO dicitur EUPHROSINUM, quod cor & mentem exhilaret. Quibusdam audit NEPENTHES, vel *νηπενθης* quasi sine tristitia vel moerore, Burreß / Burretsch / Borretsch / Herzensfreud / BOURRACHE.

Est planta flore monopetalo rotato, ex cujus calyce multifido surgit pistillum, mediæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina viperini capitis æmula, quæ in calyce ipso longe ampliato maturescunt.

Borrigo floribus cæruleis J. B. 3. 574. Buglossum latifolium, Borrigo flore cæruleo C. B. Pin. 256. Buglossum sive Borrigo Matthiol. 1186.

Borrigo floribus albis J. B. 3. 574. Buglossum latifolium Borrigo flore candido C. B. Pin. 256.

Crescit ut plurimum in hortis, tum quoque locis incultis: floret Junio & subsequentibus mensibus in Septembrim usque.

In usu ex hac planta sunt radix, folia, flores qui inter famulos quatuor flores cordiales recensentur, sunt autem flores BORRAGINIS, BUGLOSSÆ, ROSARUM, VIOLARUM.

Ubi notandum quod, dum plura præsertim ex sequiori sexu subjecta odorem rosaceum ferre nequeunt, rosis omissis, reliqui tantummodo sumantur, id quod quoque notandum de aquis quatuor cordialibus ex modo dictis floribus prolectis, quo in casu præscribuntur solummodo *Aquæ trium florum cordialium*.

Tota planta est temperatissima. Folia à quibusdam vel per se vel cum aliis oleribus elixantur. Placentulæ quoque ex iisdem parantur.

Flores vino injecti mentis hilaritatem conciliare & suavitatem saporis inducere dicuntur, insperguntur quoque acetariis. Laudatur porro Borrigo adversus venena, adhibetur in febribus & quidem etiam ardentibus & malignis. Externe flores in epithematibus, sacculis cordialibus & cucuphis adhibentur. Succus Borriginis in potu exhibitus ad ducendam secundinam commendatur.

datur. Radix ad scabiem conducit, semen autem ad lac producendum facere dicitur.

IN OFFICINIS EXTANT

Aqua Borriginis destillata ex herba & floribus, *Burretsch-Wasser* / *Eau de Bourrache*.

Conserua Borriginis, *Burretsch* oder *Borrigenblüth*. *Zucker* / *Conserve de Bourrache*, quam præter vim cordialem ad profitandos menses commendant.

Syrupus florum Borriginis, *Burretsch* oder *Borrigen-Syrop* / *Syrop de Bourrache*, cui quoque vires cordiales, lætitiā conciliantes, antimelancholicæ & antimaniacæ ex quorundam opinione adscribuntur.

Βόγλωσσον, *BUGLOSSA*, quasi linguam bubulam diceret, *LINGUA BOVIS*, *ECHIMUM ITALICUM SPINOSUM*, *ANCHUSA ALCIBIADION*, *Ochsen-Zung* / *Buglossen* / *Buglosse*.

Est planta flore monopetalo infundibuliformi & multifido, ex cujus calyce ad basin usque secto, surgit pistillum infimæ floris parti ad instar clavi affixum, & quatuor veluti stipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem semina viperini capitis æmula, quæ in calyce ipso longe ampliato maturescunt.

Buglossum angustifolium majus flore cæruleo C. B. Pin. 256. *Buglossum vulgare majus* J. B. 3. 278. *Buglossum angustifolium* Lob: Ic: 576.

Provenit locis campestribus & agris arenosis, plantatur quoque in hortis, floret Majo & Junio.

Usurpantur radix folia & flores, qui quatuor cordialibus accensentur: cum *Borragine* convenit *Buglossa* & eodem modo usurpari potest. *SALERNITANI* de hac planta ita canunt.

Vinum potatum, quo sit macerata Buglossa,
Mærorem cordis dicunt auferre periti;
Fertur Convivas decoctio reddere lætos.

IN PHARMACOPOLIIS REPERIUNTUR

Aqua Buglossæ, *Ochsenzungen-Wasser* / *Eau de Buglosse*.

Conserva Buglossæ, Ochsenzungen, Blüthzucker / Conserve de Buglosse. &

Syrupus Buglossæ, Ochsenzungen, Syrup / Syrop de Buglosse, qui convenit ratione virium cum Syrupo Borruginis.

FLORES CYANI.

Ejusdem sunt virtutis cujus sunt flores borraginis & buglossæ, potentius tamen urinam pellunt, quapropter hydropicis censentur utiles. Camerarius pulv. 3j. feliciter exhibuit in ictero. Decoctum florum cyani & calendulæ datur ad urinam promovendam.

℞. Aq. dest. fl. cyan. chærefol. ana ʒiij add. — vin. camphorat vel tinct. Croc. tantill. applica linteis exceptum oculorum suffusioni.

G g g g 3

FLO-

Κυανος à cyaneo vel cæruleo floris colore, BLAPTISECULA, BATTISECULA, GRUIS PES, à foliorum antequam excaulescat figura, FLOS FRUMENTI, FLOS SILIGINIS, Korn-Blumen / wilde Korn-Blumen / BLUET.

Est planta flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis sed dissimilibus constante. Alii enim, qui meditullium occupant, cæteris minores sunt in lacinias æquales divisi. Cæteri vero ad circumferentiam positi, longe majores sunt, magisque conspicui & veluti bilabiati, utrique embryoni insident & calyce squamoso non aculeato comprehenduntur. Embryo autem deinde abit in semen pappis instructum.

Cyanus segetum flore cæruleo C. B. Pin. 273. Cyanus hortensis flore simplici ejusd. Cyanus Flos Dod. Pemp. 251. Cyanus J. B. 3 2 F.

Crescit passim inter segetes, floret Majo & Junio.

Flores Cyani saporis sunt amari & nonnihil acris, abster-
gunt,

gunt, discutiunt, menses pellunt, sanguinem purificant, & in scabie profunt. Externe liquor florum Cyani oculis, à calida fluxione & falso humore infestatis, auxilio est. Succus florum ulcera mundificat, & stomacaci medetur. Flores contusi & appliciti sugillatis profunt.

IN OFFICINIS REPERITUR

Aqua florum Cyani, Kornblumen-Wasser / Eau de Bluet, quæ in collyriis præsertim usurpari solet, & ad sugillata deprædicatur. Ad puerorum facilem dentitionem hæc aqua, si in ea prius contusus fuerit cancer vivus, gingivis illita commendatur.

FLORES MUCAGINE
CRASSA CONSTANTES.

FLORES MALVÆ ROSEÆ
seu HORTENSIS.

Ob viscositatem & vim adstringendi quam in recessu relinquunt in specie medentur inflammationi & exulcerationi faucium, gingivarum & uvulæ. Commendantur quoque ad erysipelas sub forma cataplasmatidis, in faucium vero affectibus præscribuntur sub forma gargarismi.

℞. Flor. Malv. coq. in aq. add. par. aceti. & syr. violar. pro gargar. ad faucium inflammationes add. par. Qtri q. s. ad gratiam.

℞. Pulv. flor. malvæ ʒj. laccae, myrrh. ana ʒj mell. q. s. & tantillum conf. alk. f. liniment. contra putredinem gingivarum scorbuticam, add. quoque tantillum mus cochleariæ.

VER-

MALVA ARBOREA, MALVA AUTUMNALIS, μαλὰ ἄχνη
χορσάια

χορδαία & κηπευτή, Erndrosen/Herbstrosen/Pappelrosen/Baumrosen/
Halsrosen/Mundrosen/Römische Pappeln/ROSE D'OUTREMER,
MAUVE DE JARDIN ET CULTIVÉE, ROSE DE TREMIER:

Character sub Malva explicatur. Ex sequentibus potissimum
speciebus possunt desumi flores, solummodo usuales.

Malva rosea folio subrotundo, flore dilutius rubente C. B.
Pin. 315. Malva rosea sive hortensis flore carneo J. B. 2. 951.
Malva arborea sive hortensis Tabern. Icon, 765. Malva horten-
sis flore simplici incarnato Eyst.

Malva rosea folio subrotundo flore saturatius rubente C. B.
Pin. 315. Malva rosea sive hortensis flore sature sanguineo J. B.
2. 951. Malva rosea flore simplici rubro Eyst.

Malva rosea folio subrotundo flore pleno rubro C. B. Pin.
315. Malva hortensis multiplici flore Dod. Pempt. 652. Malva
rosea multiplex flore pleno rubro Eyst.

Coluntur in hortis florentes sub finem æstatis.

Sunt qui flores hos in fluxu mensium nimio commendant,
sunt etiam, qui ad eundem fluxum promovendum iis utuntur.
Res experientia nondum satis confirmata.

VERBASCUM.

Respondent foliis, quibus tamen præstantiores sunt.
℞. Flor. verbasc. pone in cella ut liquecant, cape ꝰ & ap-
plica omnibus tumoribus, præcipue lienis, hæmorrhoidum
arthritidis & podagræ.

POEO-

FLORES VERBASCI, Wollkraut-Blumen/ FLEURS DE
BOUILLON BLANC.

Sunt remedium temperatum, anodynum emolliens ac di-
scutiens; Valent contra tormina ventris, profunt in ipsa dysente-
ria vel etiam tenesmo ab hypercatharsi orto, laudantur ad hæ-
morrhoidum dolorem & fluxum. Adhibentur vel per se vel cum
foliis

foliis in clysteribus anodynis & sacculis lenientibus & demulcentibus. In tenesmo ab assumptis purgantibus excitato decoquuntur in lacte, quo postmodum spongia imbuitur, quæ, quam calide fieri potest, applicanda parti dolenti. Ad nimium hæmorrhoidum fluxum decoquuntur in aqua ferrariorum, vel etiam in vino rubro austero. Cum vitello ovi tumentes & dolorificas hæmorrhoides cohibent.

Flores æque ac folia ad apostemata interna, dolores laterum & pectoris commendantur. Decoctum horum florum capillos flavo colore tingere dicitur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Oleum florum Verbasci, Wollblumen-Dehl / Huile de bouillon blanc, per infusionem paratum, quod emollit & dolores præsertim hæmorrhoidum mitigat. &

Liquamen florum Verbasci per insolationem, Wollblumen-Dehl an der Sonnen gemacht / Huile de bouillon blanc par insolation, cujus etiam author meminit. Insigniter est vulnerarium, egregie demulcens & anodynum in doloribus quibusvis dentium, hæmorrhoidum &c.

Dicitur quoque esse insigne remedium in Tympanitide.

POEONIA.

Sunt flores rubentes, saporis fatui, odoris nullius. Conveniunt cum radice & seminibus. Constant particulis aquosis mucilagine volatili & crassa, ob mucilaginem volatilem antepileptica est, raro decoctum vel infusum paratur, sæpius conserva utimur pro vehiculo.

℞. Conserv. flor. pœon. ʒj. Θ volatil. C. C. gr. v. syr. pœon. q. f. pro bolo f. Elect. epileptico.

Contra vertiginem ℞. conf. flor. pœon. ʒj. rad. galang. gr. xv. castor. gr. ij. syr. pœon. q. f.

POEONIAE FLORES, *Sicht-Rossen / FLEURES DE PIVOINE*. Adhibentur potissimum ad præparandam exinde *laquam* per destillationem. Addi floribus potest ipsa radix. *Sichtrosen-Wasser / Eau de Pivoine*.

PROSTAT etiam *Conserva florum Poeoniae, Sichtrosen-Zucker / Conserve de Pivoine,*

& *Syrupus Poeoniae, Sichtrosen-Syrup / Syrop de Pivoine*, qui ut & priora medicamina ad affectus capitis epilepsiam convulsionesque adhibentur.

PAPAYER ERRATICUM.

Ob mucaginem volatilem cui quidpiam acredinis & amaritiei est conjunctum, blande discutiunt, moderate incrassant, leniunt, mulcent, & somnum inducunt, propterea conveniunt in pleuritide aliisque pulmonum & thoracis affectibus, ortis ab acri tenui materia, magis tamen in principio ubi dolor urget quam in statu & declinatione conferunt, sistunt quoque nimias hæmorrhagias & nimium mensium fluxum.

℞. Conf. flor. papav. ʒj. mandib. luc. pisc. 3ʒ. Θ volatil. C. C. gr. vij. L. O. gr. j. syr. papav. q. f. f. bolus contra pleuritidem.

℞. Aq. flor. papav. nymph. ana ʒj sem papav. alb. ʒij f. Emuls. add. syr. violar. vel papav. contra nimias vigilias.

℞. Flor. beton. papav. ana p. ij saffr. ʒij f. decoct. ex aq. colatur add. syr. papav. q. f. contra phthisin.

℞. Flor. papav. infunde aquæ propriæ dest. exhibe contra nimium fluxum mensium.

FLO.

Μήκων ῥόιας aut ῥόιας, PAPAYER RHOEAS, PAPAYER FLUIDUM à floribus facile deciduis, PAPAYER AGRESTE sive
Hhhh Syl-

SYLVESTRE, PAPAVER RUBRUM, FLOS PLEURITICUS,
 Klapprosen / Klapprosen / Wilder = Mohn / Feld = Mohn / Feld =
 Magsaamen / Rothe Korn-Blumen / Korn-Rosen / Feuer-Blu-
 men. PAVOT ROUGE, COQUELICOQ.

Characterem hujus plantæ vide sub Papavere albo.

Papaver erraticum majus *παράς* Doiscoridis, Theophrasto,
 Plinio C. B. Pin. 171. Papaver erraticum rubrum campestre I. B.
 3. 395. Papaver erraticum Dod. Pempt. 447. &

Papaver erraticum minus C. B. Pin. 171. & Tabern. Icon.
 575.

Crescit in arvis juxta vias ac inter segetes, floret Majo, Junio
 & Julio.

Flores, qui solummodo in usu, conducunt in sanguine congru-
 mato dissolvendo, & in omnibus inflammationibus tum internis
 tum externis. Specificè laudantur in pleuritide. Conducunt iti-
 dem in Catarrhis acribus salsis & tenuibus, hæmorrhagia narium,
 hæmoptysi, dysenteria & mensibus nimis. In infuso commo-
 de usurpari possunt hi flores instar herbæ Theæ, quod infusum lau-
 datur etiam ad ebrietatem & exinde ortam Cephalalgiam.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua Papaveris erratici, destillata ex floribus, Klapprosen-
 Wasser / Eau de Coquelicoq.

Acetum Papaveris erratici, Klapprosen = Essig / per infusionem
 florum paratum, *Vinaigre de Coquelicoq*, quod à quibusdam in Peste
 &c. laudatur.

Syrupus Papaveris erratici, Klapprosen = Syrup / Syrop de Co-
 quelicoq, qui adhibetur in morbis pectoris pro scopo demulcendi,
 laudatur in angina, tussi, phthisi, hæmoptysi & specificè in pleu-
 ritide.

FLORES TERREIS CONSTANTES.

FLORES BALAUSTIORUM.

Vi adstringente & roborante conveniunt cum cortici-
 bus querc, granator, aliisque congeneribus. R. Flor.

℞. Flor. balauſt. ʒj. pulv. Malicor. ʒij. conf. roſar. ʒlat. ʒj. ſacch. ʒn. gr. v. ʒ N. M. expr. ʒß. L. O. gr. ij. ſyr. granat q. ſ. f. boli in diarrhæa.

℞. Pulv. flor. balauſt. inſperge intertrigini & cuti exulceratæ.

FLORES BALAUſTIORUM Granaten-Blumen / BALAU-
STES OU FLEURS DE GRENADIERS.

Notandum hic quod flores mali granatæ ſativæ & frugiferæ vocentur CYTINI, ſylveſtris vero & infrugiferæ atque flore pleno præditæ appellentur BALAUſTIA; cum quibus ſæpiſſime miſcen-
tur calyces.

Interne exhibentur ad ʒj. ʒß. & ultra, commendantur alias in laxi-
tate gingivarum, præſertim ſcorbutica, ſi cum melle Sale & flori-
bus malvæ arboreæ fiat linimentum. Gargarismata quoque in
modo dicto affectu exinde parantur, commendantur ad hernias.

Decoctum balauſtiorum cum ſolutione Vitrioli mixtum ni-
greſcit. Decoctum hoc dicitur oculos præſervare in variolis &
morbillis, ſi circulus ducatur circa oculum.

FLOES NYMPHÆÆ.

Conveniunt cum radice propria:

℞. Sem. pœon. ʒij. aq. Nymph. bugloſſ. q. ſ. f. Emulſ.
add. ʒtr. præpar. ʒj. & tantillum ſyr. nymph. ad nimiam
ſalacitatem.

℞. Conf. flor. nymph. ʒj. camph. gr. v. L. O. gr. j. ſacch.
ʒni ʒß. ſyr. nymph. q. ſ. f. bolus contra maniam.

FLO.

Non tantum ad maniam, ſed & in Satyriæ ſalacitate, &
furore uterino deprædicantur. Flores & folia adhibentur ad ſom-
num conciliandum adque æſtum mitigandum in febribus; ap-
plican-

plicantur temporibus, lumbis, plantis pedum & in pediluvio usurpantur.

Turcas flores Nymphææ in aqua macerare, & se à multis præservare morbis, modo ea nares inungant vel eandem bibant, à S. PAULI perhibetur. Sunt qui hujus plantæ usum ideo averfantur, quod desiderium coitus compescat frigidumque reddat.

Flores hi nunquam intra aquam aperiuntur, sed supra superficiem se attollunt. Authores quidam de Nymphæa alba referunt, ipsam occidente Sole florem claudere, deinde se totam cum foliis sub aqua occultare, eoque oriente florem primum extra aquam promere, aperire atque paulo post cum omnibus foliis supra ipsam assurgere. Recte pronunciat RAYUS: Nobis, inquit, hæc incredibilia videntur. Semen iisdem gaudet virtutibus.

EX NYMPHÆA IN OFFICINIS PRÆPARATA
PROSTANT

Aqua ex floribus albis destillata, Seeblumen-Wasser / Eau de Nenufar, quæ vim anodynam, Hypnoticam & refrigerantem obtinet, adhibetur in mixturis emulsionibus & epithematibus.

Conserva florum Nymphææ, ex floribus scilicet candidis, Weis Seeblumen-Zucker / Conserve de Nenufar, quæ phthisicis & hecticis prodest, refrigerat & humectat, seminis & sanguinis acrimoniam corrigit, fervoremque extinguit, unde in furore uterino & gonorrhœa commendatur.

Syrupus Nymphææ ex infusione florum, Seeblumen-Syrup / Syrop de Nenufar. Refrigerat & incrassat, hæmorrhagias compescit & somnum conciliat ad uncias duas usque datus. Conducit in gonorrhœa virulenta & ardore urinæ.

Oleum Nymphææ, ex infusione quoque florum paratum, Seeblumen-Öhl / Huile de Nenufar, quod temporibus & fronti illitum somnum conciliat, convenit in dolore capitis, vigiliis & phrenitide. Lumbis & spinæ illitum febres mitigat. Renibus & ventri inunctum Venerem extinguit, gonorrhœam sedat, ambustis quoque medetur.

Mel Nenupharinum, Seeblumen-Honig / Miel de Nenufar, quod refrigerat, humectat atque demulcet. Adhibetur præsertim in clysteribus ad unam aut alteram unciam.

FLO.

FLORES ROSARUM RUBRARUM.

Sunt rosæ rubræ C. B. P. flores ampli, modo simplici modo multiplici petalorum serie conflati, saporis si siccati adstringentis & austeri, si recentes subacris subamaricantis ingrati. Quia minus odorati sunt terreis constant, & ubique adstrictione opus est mire conducunt, præcipue si cum acido exhibeantur, laudantur quoque ad compescendum vomitum, it. in phthisi ad consolidanda ulcera, ut & in hæmopthisi.

Paratur nobile balsamum rosarum ex o^o proprio destillato apud Persas.

Constant quibusdam particulis Sinis volatilibus cum prædominio tamen terrearum.

Datur conserva, syrupus ut & pulvis.

℞. Conserv. rosar. r. ʒj. — Oli g. v. L. O. gr. j. o^o N. M. express. ʒj. f. bolus in omnibus fluxibus. In nimio mensesium fluxu conserva rosarum ad ʒj. cum syrupo cydoniorum commendatur, præcipue si menses dolorosi sunt.

℞. Conf. rosar. rubr. ʒj. sem. pap. alb. ʒj. syr. rosar. f. bolus contra hæmoptysin.

℞. Corall. r. præpar. ʒj. Crem. Fri. ʒʒ. pulv. rosar. r. ʒj. — Oli santal. rubr. tincti q. s. f. pulvis ad æstus vagos & phlogoses reprimendas.

℞. Flor. rosar. r. affund. acetum, exhibe in quibusdam dysenteriiis, præcipue si à bile acri oriuntur.

℞. Pulv. rosar. rubr. ʒij. cape successive ex aqua plantag. ad contumacissimam diarrhæam & dysenteriam.

℞. Flor. ros. r. balauft. ana ʒʒ. N. M. tost. ʒʒ. L. O. gr. j. in dysenteria maligna.

℞. Conserv. ros. ʒij. pulv. Zedoar. ʒj. succ. cydonior.

H h h h 3

q.

q. s. f. Elect. in pica add. parum -us Oli vel succ. Lemon. vel acetositat. citri.

Aqua destillata interne blande refrigerat, hinc in siti febricitantium. ℞. Decoct. hord. ℥j. aq. rosar. ℥iiij. syr. acetos. Citr. q. s. add. Qtr. depur. vel lap. prunell. ʒj. syr. rosar. ʒj. pro Julapio.

Externe in inflammationibus oculorum. ℞. Aq. rosar. foenicul. ana ʒj. sacch. ʒni ʒj. sacch. cand. ʒiʒ. camphor. gr. iij. extr. croci gr. ij. f collyrium.

CA.

ROSÆ RUBRÆ, ROSÆ PROVINCIALES, Rothe-Rosen/
Knopff-Rosen / ROSES ROUGES, ROSES DE PROVINS.

Rosa rubra C. B. Pin. 481. Rosa rubra flore simplici fere I. B. 2. 34. Rosa Damascena Lob. Icon. 206. &

Rosa rubra multiplex C. B. Pin. 481. Rosa rubra flore valde pleno & semipleno I. B. 2. 34. Rosa Miesia flore rubro pleno Eyft. florent hi frutices cum cæteris rosis.

Rosæ Rubræ externe ad contusiones, luxationes & sugillationes, contorsiones item, & ubi adstringendum atque roborandum est, in vino decoquuntur & partes eo decocto foveantur. Conducunt in affectibus faucium & gingivarum scorbuticis, item in prolapsu ani & uteri. Adhibentur in suffumigiis, & pulveribus sternutatoriis. Stamina tum harum tum aliarum etiam rosarum flava ANTHERÆ das Gelbe von Rosen / SOMMETS DE ROSES dicta usurpantur ad affectus dentium & Gingivarum. Rosæ Rubræ multas ingrediuntur compositiones, unde exungulari debent, id est liberari à parte inferiori minus rubicunda.

IN OFFICINIS REPERIUNTUR EX HIS ROSIS

Acetum rosaceum, Rosen-Eßig / Vinaigre rosat, cujus aceti eleganter rubentis usus & in mensis, & in arte Medica pro refocilandis præsertim ægris, in febribus aliisque morbis. Haud incommode noduli odoramentales ex mica panis amygdalis contusis, pulvere

pulvere Cinamomi, Caryophyllorum macis &c. parati, in hoc aceto humectantur, qui quandoque magis reficiunt quam aqua Regina Hungariae aut alia spirituosae.

Conserva rosarum rubrarum, Rother Rosen-Zucker / Conserve de Roses rouges ou de Provins, quæ virtute analeptica roborante & adstringente gaudet. Commendatur emaciatis, præsertim Phthisicis Præfertur quæ Genua adfertur.

Conserva rosarum rubrarum antiqua, Altrothrosen-Zucker / Conserve de Roses rouges vieille, quæ magis adstringens habetur, & pro eo scopo adhuc magis celebratur.

Conserva rosarum rubrarum Vitriolata, Sauerroth Rosen-Zucker / Conserve de Rose Vitriolée.

Conserva Visceralis, Eröffnender-Zucker / Conserve Viscerale, cujus principale excipiens est conserva rosarum. Polychresta est, viscerum obstructions, Hepatis & Lienis ita aperiens, ut simul cum primis ventriculum & caput roboret. Hinc in cachexia ictero hydrope, affectibus splenicis, hystericis hypochondriacis, melancholicis & quibuscumque ab acido viscido provenientius, item in febribus usurpatur cum successu. Dosis per se ad drachmam semis ad drachmam unam.

Saccharum rosatum tabulatum, Rothrosen-Zucker in Zäffelein / Sucre rosat en Tablettes. Immiscetur Tragæis, pulveribus atque positionibus.

Mel Rosatum, Rosen-Honig / Miel Rosat. Vulnerarium censetur, adhibetur in faucibus lingua palato aliisque partibus his vicinis læsis & quovis modo excoriatis. Usurpatur etiam in clysteribus pro absterfione.

Species diarrhodon Abbatis, Leber-Species / Poudre diarrhodon Abbatis. Commendatur hic pulvis hepaticis, ictericis cardiacis & caliacis, medetur mensibus suppressis & cachexiæ. Dosis ad ℥j. ad ℥ij. Parantur exinde etiam

Trochisci diarrhodon Abbatis, Leber-Zeltlein / Trochisques diarrhodon.

Species Aromaticæ rosatæ completæ & incompletæ sive Aromaticum rosatum Gabrielis, Gewürzt Rosen-Pulver mit und ohne Bisam und Ambra / Poudre aromatique rosate complete & incomplete. Vires obtinent stomachicas carminativas, anticolicas & cephalicas. Dantur ad ʒß. ad ʒj.

*Syrupus è Rosis siccis, gedörter Rosen, Syrup / Syrop de Rosés
secchées. Vires adscribuntur cordiales & adstringentes in fluxibus
alvi atque hæmorrhagiis.*

*Tinctura Rosarum, Rosen-Tinctur / Teinture de Rosés, refrige-
rat, sitim sedat & corroborat, vel per se hauritur vel immisce-
tur potui ordinario,*



CAPUT OCTAVUM.

DE SUCCIS RESINIS ET GUMMATIBUS.

Succus dicitur, quod prælo ex planta vel arbore exprimitur.
Resina est corpus oleosum crassum quod tamen in oleo
fis & spirituosus solvitur. Gummi est pars aquea congelata
in mucilaginem crassiore, quæ tamen in aqua solvitur.
Dantur ceu amphibia, dicunturque gummi resinæ, quæ par-
tim in aqueis, partim oleosis & spirituosus solvuntur; resi-
na autem ex iis extracta, aliarum statim genium induit resi-
narum, tantumque in aquosis se solvi patitur.

SE-

Dantur etiam succi, qui sponte extillant, reliquis expressis
ut plurimum præferuntur. Resinæ quando ab authore dicuntur tan-
tum in spirituosus dissolvi, illud non ita intelligendum est, quasi
non etiam in vehiculis aqueis possint dilui, modo enim vel cum
amygdalis nucleis pineis &c. vel cum vitello ovi optime teran-
tur, artificium statim succedet.

SE-

SEQUENTIA HABENT PARTICULAS
SALINAS VOLATILES OLEOSAS CUM MUCILA-
GINOSIS TENUISSIMIS SUBTILIBUS.

CAMPHORA.

Prima est Camphora nostra officinarum, Chinensis vulgo dicta, licet nulla in China inveniatur, eo quod his olim ad nos tantum profecta sit: Est substantia candidissima facie salis vel nivis, pinguis & oleosa, vi ignis sublimata, ex ligno arboris camphoriferæ Japonensis & compacta in glebas; saporis acris amaricantis, aromatici, pinguis & leniti, odoris fragrantis & gravis. Est scilicet arborum camphoriferarum in Japonia, quæ sunt folio rigido viridescente & fere laurino, flore pentapetalo, baccis bifidis: radix, truncus, rami, folia fissa conjiciuntur in ahenum, cui imponitur capitellum seu conus ex stramine qui usitator, vel storeis, vi substrati ignis quicquid volatile est expellitur, & lateribus coni se applicat, quæ dum levis instar fuliginis decedit, quæ deinde in massam cogitur & ad nos transferatur.

Secunda species est, quæ in insula Zeylon conficitur, paratur ex radice seu arctius cortice radicis cinamomi, hic nempe separatus à materia lignea immittitur vesicæ instructæ suo capitello, vase serpentino & recipiente, affunditur ▽ & destillatur, hinc obtinetur 1. aqua 2. oleum & 3. oleo supernatans camphora, quæ ab oleo optime expressione manuum separatur.

• Tertia species ex variis plantis Indiæ orientalis elicitur, sic ex radice Zedoariæ recenti, modo supra in secunda specie descripto obtinetur aqua, oleum & huic supernatans Camphora, quæ eadem methodo separatur. Hinc radix
Iiii Zedoariæ

Zedoariæ destituta suo sale volatili cum ad nos deferatur optime Camphora stimulatur. Sic ex Menthæ quadam specie camphoram mihi quoque comparavi. Atque hæ tres species sunt camphoræ factitiæ, quarum duæ posteriores non nisi à curiosioribus asservantur & possidentur.

Quarta nativa est in Insula Borneo, quæ in arboribus mole tiliis, configuratione florum, foliorum & baccarum arboribus camphoriferis paribus, cæsis truncis in partes divisus in spaciolis quibusdam forma minutissimarum lamellarum lenticularium, quæ uncia Indis vocantur reperiuntur in rara satis copia: duæ namque vel tres sæpe arbores cæsæ vix 3ij. vel iij. suppeditant. In Oriente maxime ad Japonas, quibus domestica sordet Camphora. distrahitur, tantum pro libra una 100. solvuntur floreni, ad nos ob pretium non transfertur.

Blandam spiritibus requiem ob sale suum subtilissimum inducit, & simul acida, viscosa, terrea crassave potentissime discutit, hinc sudoriferum est & anodynum universale, quibus nominibus specificè convenit in peste, malignis, deliriis, melancholia, passione hysterica & motibus convulsivis, gonorrhœa, &c. dos. in substantia à gr. v. ad vij. & x.

Jungitur tam internis quam externis medicamentis: tanquam stimulus. Sic. e. c. in Catarrhosis cum capitis dolore & alvo adstricta. ℞. Resin. jalap. gr. x. extr. troch. alh. gr. iij. ʒo succin. gt. j. camph. gr. v. bals. Peruv. q. f. f. pil.

Singularis est in febribus malignis omnibus, item tam continuis quam intermittentibus: sic in febre acuta cum alvi fluxu. ℞. C. C. præp. 3ʒ. L. O. gr. j. Camphor. gr. v. f. pulv.

℞. ʒ diaph. ʒj. ʒ vol. succin. gr. v. Camphor. gr. ij. f. pulv. contra febres malignas, exhibe ex ▽ Card. B. vel the-riacali.

Specificæ

Specifica est cum Laud. Op. & extracto Croci, in mania, deliriis, melancholia. Sic. ℞. ∇ flor. sambuc. hyperic. ana ℥j. camphor. gr. v. extr. Croc. gr. iij. L. O. g. j. M. vel in forma pulveris : ℞. Arcan. duplicat. ♂ diaphor. ana ℥j. sacch. ℥ni ℥ss. camphor. gr. v. L. O. g. j. M. f. pulv. vel excipe conserv. flor. nymph.

℞. Laud. op. gr. ij. camph. gr. iij. f. pil. ad præsertionem epilepsiæ.

℞. Camph. ℥ss. Myrrh. 3ss. gum. tragac. cum aceto in mucagin. redact. f. trochisci antipestilentiales.

Externe additur unguentis ceu stimulus pro incidente & anodyno. ℞. Ung. dialth. ℥j. camphor. 3j. pro tumoribus emolliendis.

℞. Empl. diapomph. ℥j. Croc. or. ℥j. camph. 3ss. ☉ philosoph. q. s. f. emplastr. in tumoribus dissipandis.

Paratur etiam Epithema egregium manuum febrifugum contra tertianas agyrtis commune, quod sæpe effectu suo non caruit.

℞. Fulig. splendent. 3ss. thereb. 3vj. tel. araneæ. 3j. camphor. 3ss. ☉ araneæ. vel scorpion. q. s. pro epithemate, applicatur carpi manuum.

Utimur etiam —u theriacali Camphorato it. essentia ejus in omnibus febribus malignis. ℞. ∇ flor. sambuc. Card. B. ana ℥ij. — theriac. camphorat. 3ss. L. O. gr. ij. syr. acetos. Cir. ℥j.

℞. ∇ rosac. ℥ij. — vin. camphorat. 3j. f. colyr.

OPIUM.

Κάφουρα, CAPHURA, CAPUR & CAFUR ARABUM
Kampher / Kampfer / Gampfer / Kaffer / CAMPHRE.

Arberem Camphoriferam, quam BREYNIUS cum aliis etiam quoad partem descripsit quidem, sed supra laudatus

KÆMPFERUS in catalogo plantarum Japonicarum ita delineat. **Laurus Camphorifera** arbor est sylvestris, in Japonia occidentali & adjacentibus insulis in latam vastamque Tiliæ magnitudinem adulescens. Radice nititur valide ac parum brachiata, quæ camphoram præ cæteris partibus spirat, & coctione impertitur. Cortex est scaber coloris pulli. Medulla magna fungosa & lignosa. Lignum candidum per siccitatem ex rufo variegatum, substantiæ laxioris ex fibris crassiusculis compactæ, aliquando serviens pro fabricandis scriniis, sed quorum superficies per vetustatem asperatur, dum volatilis resina poros destituit. Folia promiscuo loco singula, membranacea, triuncialia vel longiora ex brevi acuto principio ovata, mucrone oblongo angusto, margine integro undulato, non raro tenui pallescente virgula fimbriato, supina facie saturo virore imbuta, ac micante, dorso herbaceo & quasi holoserico. Flosculi in fastigiis ramulorum sed arboris provecæ ætatis & magnitudinis mense Majo Junioque inter foliorum axillas prodeunt, albi hexapetali, intra seminis Coriandri ambitum radiantes, petalis ovatis, staminibus apicatis novem ea dispositione locatis, ut terni medium stylum premant, hos cæteri in orbem ambient, intercepti singulis tuberculis carnosulis exiguis luteis, mollibus, umbilico laxè adnatis. Florem excipit calyculo accrescente Bacca per maturitatem atro purpurea & splendens, magnitudine pisi majoris, figuræ quodammodo turbinatæ, pericarpio molli purpurascens, saporis ex camphora caryophyllacei; nucleo intus piperis magnitudine, corticula nigra micante obducto, bifido oleoso, saporis fatui.

Extractio Camphoræ rusticorum opus est in provincia Satzuma & insulis Gotho, qui radices & ligna in festucas comminuta, cum affusa aqua coquunt in vesica ferrea, impositoque capitello fictili amplo & (ne ex vapore rumpatur) rostrato, sublimatam resinam excipiunt, stramini, quod capitellum replebat adhaerentem.

Modo laudatus author camphoram quoque in destillatione Schoenanthi Persici & arabici se obtinuisse copiosam asserit, nec eandem Junipero aliisque stirpibus camphoriferis inesse dubitat. Ad camphoram ex arbore canellifera, quod attinet, Author noster recensente BREYNIO, ex Zeilan insula Dn. à Beverningk & Dn. Syem Camphoram corticis Cinamomi per calcem sublimatam; Camphoram crudam, seu Sal volatile corticum radicis arboris Cinamo-

mī crudam; Camphoram corticis radicum arboris Cinnamomi per se sublimatam; cum oleo & corticibus radicum arboris Cinnamomi & aqua ex foliis Cinnamomi transmiserat.

De arbore camphorifera Borneensi hæc ex BOCCONE observationibus naturalibus annotat modo citatus BREYNIUS. Caphura de Borneo, quæ melioris notæ est & rarior quam Japonica in Borneo insula ab arbore ibi Liono dicta, quæ minor graciliorque est Japonica, profertur. Huic Liono arbori tunc temporis cum Caphura abundare & quasi turgere norunt, sub ortum solis aurem applicant, & notatu dignum strepitum percipiunt, deinde ipsam amputatam in partes dissecant, quas findunt, folique ut siccentur exponunt, siccitas in particulas comminuunt, & Caphuræ frustula eximunt, cribroque à sordibus purgant, si majuscula frustula offenderint, iis oculos leniter & leviter confricare solent. Camphora hæc magis clara est & perspicua, nec ullo modo ut Japonica evanescit & consumitur.

In insula quoque Sumatra ab arboribus itidem camphoriferis, quas à Borneensibus non differre quidam putant, obtineri GRIMMIUS asserit.

Si ERASMO FRANCISCO fides adhibenda, etiam in China nascitur quoque Camphora.

Ex dictis jam pater Camphoram minime esse bituminis, uti quidam voluerunt, genus, nec etiam est merum gummi, sed resina, aut gummi resina, ardet enim & menstruis oleosis atque spirituosius potissimum dissolvitur.

Camphora Japonica seu Chinenensis dicta potissimum ad nos adfertur, in panes ingentes coacta, eligi autem debet, candicans sine maculis pellucida fere instar crysalli, digitis friabilis, odoris fragrantis, saporis quadantenus amaricantis, quæ accensa vix extinguiibilis, & quæ in aqua quoque ardere perseveret, volatilis ita, ut tota sublimari queat, & aeri expolita etiam cum tempore evanescat. Servanda hinc est in vasis locisque bene clausis, adjiciunt alii semina Lini, Psyllii, Milii, alii in granis piperis sepeliunt.

Ratione virium multum olim disceptabant de Camphora, an calida sit vel frigida, qui frigidam esse putant, præter plures alias rationes in eo se fundant, quod Venerem extinguat, juxta communem illum versiculum,

Camphora per nares castrat odore mares.

Cujus verliculi veritas licet non semper deprehendatur, atamen non prorsus illud monitum esse contemnendum ex DIEMERBROECKIO docet LANGIUS, & experientia propria confirmat; Sed nec ex hoc effectu frigiditas camphoræ demonstratur, sicuti etiam de Pipere calorem in corpore moderante, non possum argumentari ad ejus naturam calidam. Aliud est agere per se aliud vero per accidens. Nemo dubitare potest de summa partium camphoræ subtilitate, & potentissima penetratione.

Camphora dolores capitis mulcet, inflammationes sedat, sanguinemque stagnantem resolvit, Venenis & putredini resistit, MINDERERUS inter fortissima pestis alexipharmaca reponit. Quod usum Camphoræ in febribus præsertim continuis concernit, in nostris aliisque regionibus diætâ vinosa & aromatica assuetis, Camphora vix locum invenit, quæ tamen subjectis phlegmaticis & victu crassiore viscosioreque utentibus summo usui esse potest. Distinguaturn etiam quam maxime, an in ejusmodi febribus sanguinis massa magis ad dissolutionem an vero coagulationem inclinet, nam in casu priori omnia exagitantia & dissolventia exulent, præferanturque magis temperata, & blanda acida. In Epilepsia, vertigine, apoplexia multi camphoram commendant, sunt qui in hæmorrhagiis laudant, in hæmoptysi, vomitu cruento nimio mensium fluxu, in dysenteria itidem diarrhœa atque hypercatharsi. A multis magni fit in fluore albo aliisque uteri vitii passione hysterica, furore uterino &c. Nonnulli haud parum commendant in doloribus arthriticis aliisque morbis plurimis. Distingue ubivis tempora, regiones subjecta, victum aliasque circumstantias & concordabit scriptura. Externe camphora in Epithematibus, frontalibus ad dolorem capitis sedandum, in collyriis, emplastris & unguentis adhibetur. Conducit in inflammationibus, contusionibus, gangræna &c. odontalgiam sedat, cum Butyro Majoranæ vel oleo ovorum commixta in coryza prodest. Quidam camphoram de collo suspendunt in tergum, ad febres intermittentes profligandas; Camphoram avolare certum est, frequentissime autem febris remanet.

IN OFFIGINIS PROSTANT

Oleum Camphoræ verum SENNERTI, Campffer, Dehl / *Huile de Camphre*, dicitur esse summum diaphoreticum & alexipharmacum in peste ad præservationem & curationem ad aliquot guttas datum. Obtinet quoque vim cosmeticam & partibus gangrænosis prodest. Laudatur ad sanguinem mundificandum, lipothymias, palpitationem cordis, vertiginem, Epilepsiam, Maniam &c. Dolores dentium sedat, tinnitum & susurrum aurium curat. Quod si Camphora Spiritui Nitri, Salis, aut aquæ forti injiciatur, solvitur camphora, saporem & odorem amittit, & sub forma olei supernatat, si autem hoc oleum rursus instilletur aquæ, denuo renascitur camphora & sub antiquo sapore & odore comparet.

Spiritus vini camphoratus, Campffer, Brandtenwein / *Esprit de vin Camphré*. Vires habet diaphoreticas cephalicas, cordiales, alexipharmacas, antiarthriticas, exhibitis guttis sex ad viginti & ultra. Ut plurimum externe solummodo usurpatur, in contusionibus luxationibus & ubi discussione opus est.

Spiritus Theriacalis camphoratus, Theriack-Spiritus mit Kampffer / *Esprit Theriacal camphré*. Virtutes adscribuntur diaphoreticæ & alexipharmacæ, incidentes & attenuantes, tenuitateque substantiæ universum corpus sine molestia penetrantes. Cordialium in numero locum habet, dominante pestilente contagio prodest in actu curationis ad drachmas duas, in actu præservationis ad drachmam semis, sumtus cum vino generoso.

Unguentum album camphoratum, weiß Kampffer-Sälblein / *Onguent blanc camphré*. Ad erysipelas, leviores inflammationes, & cutis vitia à falsedine enata prodest.

Tandem notandum ex HOFFMANNI CLAVE IN SCHROEDERUM, quod camphora cum sale tartari cosmeticum constituat externum, item quod ex camphora in aqua forti soluta & cum aqua præcipitata fiat sapo, cum quo si mulierum perungantur manus & aqua postmodum abluantur, manus reddantur molliculæ & lacteæ.

De camphora consulantur MOEBIUS atque WEDELIUS, qui expresse de Camphora scripserunt, alique auctores *Materia Medica*.

O P I U M.

Est substantia partim resinosa, partim gummosa, dum recens est mollicula dum inveterata durior, collecta ex papavere & in massam redacta, saporis subacris amari, odoris virosi narcotici & quasi stupefacientis.

Aliud est Thebaicum, aliud Indicum, prius est subtilius & in Egypto circa Cairo & confines tractus colligitur, posterius est crassius, fœculentius & in Insulis Bengalenfibus colligitur. Scilicet utrinque agri, imo integri tractus conferuntur semine papaveris hortensis, ubi per æstatem ad maturitatem vergunt discussis floribus scalpello 5 vel 6 locis sauciant capita, è quibus lacteus stillat humor, qui idem in massam coactus ad nos transfertur. Unum caput papaveris ultra ij vel iij grana vix suppeditat.

Thebaicum fere tantum apud nos officinale, uti in oriente proprio solo enutritum. Opium album vulgo Maslac seu magnanimum, est opium ab omnibus sordibus depurgatum, quod carioris est pretii. Meconium aliud non est quam papaver coctum expressum, filtratum & inspissatum.

Universale est remedium in omnibus morbis ubi opus est somnum vel torporem inducendi, ubi conjuncti sunt dolores, ubi acredo obtundenda, sistit etiam functiones animales impeditque spiritus quo minus in organa influere possint.

Datur per se à gr. j. ad iij. in assuetis ʒj. imo 3^b in India non nocuit.

Vis ejus narcotica suspecta corrigitur optime tostione, sic enim multum ʒis volatilis perit, sed nota statim esse exhibendum, alias ad genium & malignitatem suam redit, reanimatum ab aëre. Alias etiam succo Citri vel cydoniorum castratur.

Nonnulli præcipue recentiores corrigunt castoreo, quod

quod quasi est opii antidotum. Item ℞. opii 3j. Castor. 3℔. Camph. ʒ℔. spirit. vin. Qisat. q. s. f. tinctura, quæ filtretur & inspissetur. Omnium vero mitissime agit opium leviter tostum.

Additur etiam clysteribus in colica, sed decoquitur in nodulo inclusum, ne se applicans intestinis tormina excitet.

Additur purgantibus validioribus pro correctorio præcipue in colica. Sic ℞. Extr. agaric. ʒj. Extr. troch. alhand. gr. iiij. ʒo expr. flav. cort. aur. gt. iiij Castor. gr. iiij. L. O. gr. ij f. c. Bals. Peruv. pil. vel cum conf. fl. anthos bolus.

℞. Opii tost gr. ij Nuc. Mosch. tost. 3j f. pulv. in dysenteria.

℞. Opii tosti gr. iiij. ʒo Nucist. expr. ʒ℔. Corall. r. præpar. ʒ℔. rad. tormentill. ʒj. conserv. rosar. Olat. q. s. f. bolus in dysenteria.

℞. Opii præp. gr. j. Camph. gr. iiij conf Nymph. 3j f. bolus in delir. & mania add. sacch. ʒn. gr. ij vel iiij.

℞. Resin. jalap. gr. xv. extr. lign. aloës ʒ℔ ʒo succin. gt. iiij opii gr. iiij. bals. Peruv. q. s. f. pilulæ purgantes & anodynæ, post alvi evacuationem placidum inducentes somnum.

Externe poma in manu calefacta naribusque admota narcotin inducunt v. c. ℞. styrac. calam. L. O. ana 3i℔. lign. aloës rad. ir. flor. ana 3iiij.

In hæmorrhoidibus exulceratis inflammatis, tenesmo dysenterico sequens unguentum profuit. ℞ Ung. alb. camphorat. 3j L. O. 3j sacch. ʒni. 3ij. ʒ viv. 3℔. ʒo rosac. vel quod sæpe præstat lini q. s. quod exceptum stupis vel filamentis linteaminum, præmissis universalibus intruditur ano ad partem usque affectam.

Οὐσίον αὐτὸ τὸ ὀπὸν à succo dicitur, **MECONIUM**, **Mohn-Safft**, **Schlaff-Safft**, **OPIMUM**.

Opium ex papavere tam nigro quam albo, cujus capita prægrandia, in locis orientalibus crescunt, elicitor. Exinde vel sponte stillat, vel methodo ab authore proposita & cum **BELLONII**, **GARZIE**, aliorumque narrationibus correspondente colligitur. Addere liceat verba **KAMPFFERI**. In Perside, inquit, collectio opii celebratur per ineuntem æstatem, propinqua maturitati capita decussatim sauciando per superficiem. Culter negotio servit quintuplici acie instructus, qui una sectione quinque infligit vulnera longa parallela. Ex vulnusculis promanans succus postridie scalpro abstergitur, & in vasculum abdomini præligatum colligitur. Tum altera capitum facies eodem modo vulneratur ad liquorem pariter proliciendum. At hæc collectio ob capitum impar incrementum & magnitudinem aliquoties in eodem arvo instituitur. Solent in plantis nimium ramosis, superflua capita prius amputari; sic reliqua magis grandescunt & succo implentur majoris efficaciam. Primæ collectionis lacryma præstantior est & graviori pollet cerebrum demulcendi virtute, colorem exhibens albidum vel ex luteo pallentem, sed qui color ex longiori insolatione & ariditate infuscarì solet. Altera collectio succum promit priori, ut virtute ita pretio inferiorem, coloris plerumque obscuri vel ex rufo nigricantis. Sunt qui & tertiam instituunt, qua obtinetur lacryma nigerrima & exiguæ virtutis. Preparatio opii potissimum in eo consistit, ut aquæ pauxillo humectatum spatha crassa lignea continuo & fortiter ducatur, & reducatur, in patina lignea & plana, donec elaboratissimæ picis consistentiam, tenacitatem & nitorem inducat. Ita diu multumque subactum ad ultimum manu non nihil pertractatur nuda, & demum in cylindros breves rotatum venale exponitur, forcipe dividendum cum particulas emptores petunt. Hactenus ille.

Olim plurimum & optimum opium mittebat Regio Thebaica Ægypto contermina, unde **THEBAICUM** dicitur & adhuc hodie num optimæ notæ censetur. Colligitur quoque copiosissime in Natolia, Cilicia, Cappadocia, aliisque Indiæ Orientalis regionibus. Nos opio puriore vix potimur.

In opio color, ad aloen fere accedens hepaticam, ex nigredine rufescens, cum frangitur splendore quodam nitens, probatur. **Odor**
ad

adeſt vehemens, graveolens, naſeabundus papaveraceam redolens proſapiam, ſapor ineſt acris atque amaricans. Compactum eſt & grave, facile aqua imprimis accedente calore diſſolvitur, non tamen inſtar ceræ & mucaginis cujuſdam lenteſcit. Non rarum eſt & friabile, non aſperum nec grumofum ſed ponderoſum, denſum, ſolidum. Inflammabile eſt nec atra obſcuraque nec ſplendida lucidaque exardet flamma, plus tamen ad obſcurum vergente.

Quod naturam opii attinet de eo magnus admodum eſt diſſenſus, qua de re pertractavit WEDELIUS in OPIOLOGIA & plures alii. Veteres ut plurimum frigida eſſe temperiei judicarunt, eo quod calorem vitalem opprimat, ſomnum profundum inducat, & totum cerebrum, omneſque ſenſus frigidos reddat. Alii calidum aſſerunt opium, ob odorem gravem penetrantemque, ob amaritiam, ob ſudorem, quem excitat, ob inflammabilitatem, ob ſitim ab ejus uſu excitatam, ob virtutem diſcutientem & ob animoſitatem, quam conciliare fertur. HOFFMANNUS in SCHROEDERUM Opium qualitatem non ex primis calido, frigido, nec ſecundis amaro & Sulphureo principio metiendam eſſe, ſed opium agere juxta ſingularem partium texturam, figuram motum, quietem & ſitum, à quibus ſupra dictæ proveniunt qualitates pro iſtius applicatione, docet. Juxta alios modus agendi opii conſiſtit in ἀνθυμιάσει ſeu blanda evaporatione, quæ porulos cerebri à vigiliis nimis apertos & dilatatos obſtruit, ſpirituum animalium, ſeu ſucci nervei, effrenem influxum impedit, eodemque quaſi coagulat & addenſat adeoque ſuaviſſimam corpori conciliat quietem. Cum autem in opio emineat ſulphur copioſum & ſal volatile, (deſtillationi namque ſubjectum exhibet phlegma, ſpiritum volatilem ſeu ſale volatili reſertum, urinoſum, qui cum ſpiritu Vitrioli aliisque acidis commixtus efferveſcit, odore reſtante fœtido, & oleum nigricans, præter partes ſalinas fixas & terreas in capite mortuo reſidentes) quaeritur, an ſulphuri an ſali volatili viſ opii narcotica ſit adſcribenda. Plures autem in ſulphure narcotico (non tamen plane excluſo omni ſale volatili) rationem quaerendam eſſe cenſent, cum ejus ſulphur admodum ſit reſolubile. Opium enim in quolibet fere menſtruo, aqueo, ſalino, acido, ſpirituoso & oleoſo abſque deperditione ſaporis & conſequenter virium diſſolvitur. Ita pariter in corpore noſtro omni-

bus aut pluribus humoribus obsecundat, imprimis vero serosis aqueis, unde spiritus vaporosos & sulphureos cum sanguine & cerebro communicat, qui cerebri conceptacula & poros opplentes, soporem inducunt. Non autem omnibus opium æque somniferum est, sed qui serosis abundant humoribus. Dolores opium lenit, somnum procurando, nervos partesque membranaceas demulcendo & obliniendo, humorumque acrimoniam temperando. Sudorem insuper movet opium, partim ob sal volatile, partim ob somnum inductum, sub quo sudoris excretio non, ut alias excretiones, supprimitur, sed potius promovetur. Quod autem in tam exigua dosi opium suos exferat effectus, non adeo difficulter comprehendi potest. Quod si certe duæ guttæ alicujus olei ætherei, v. gr. Olei anisi vel per intergram amphoram aut ad minimum dimidiam ita dispergi possunt, ut quælibet gutta odorem & saporem referat anisi, quid impedit, quominus & unum aut alterum opii granum à calore corporis nostri in tam incomprehensibiliter fere exiguas resolvatur particulas, quæ vix non per omnes omnino meatus penetrent, ibidemque suam edant virtutem.

A Turcis, Persis atque Indis, opium usurpatur pro scopo stimulandi venerem, ac magnanimitatem conciliandam. Prior effectus non semper sequitur, sed quandoque etiam supprimitur. Quando autem excitatus inde observatur stimulus Venereus, id potius aromatibus ambratis aliisque additis adscribendum esse videtur, uti haud inepte GARZIAS AB HORTO judicavit, cui assensum præbere videtur supra allegatus KÆMPFFERUS. Magnanimitas inducta proprie talis non est, sed potius stupiditas, æquædam quasi conciliata ebrietas, ob quam pericula pensitare, multo minus dijudicare nequeunt. Hi populi autem opio ita adfuerunt, ut absque ullo alio damno, quam ut tremulum aliquem exinde persentiunt motum, ad 3ß. ad 3j devorent. Externe dolores lenit capitis v. gr. moderate appositum, vel naribus illitum, item pro vigiliis simul coercendis plantis pedum, temporibus, fronti, nuchæ & pone aures inunctum.

Dosis opii infima est pars quarta vel dimidia grani, vel granum unum, media, grana duo vel tria, summa, grana quatuor vel quinque.

Opium

Opium crudum minus usurpari solet, cum in eo reperiantur halituosæ excrementitiæ particulæ, quæ correctionem aliquam requirere videntur. Veteres calidis hanc correctionem præstare pipere v. g. Zingibere & imprimis Castoreo conati fuere. Moderni quidam corrigunt opium tostione super lamina ferrea seu patella, Scinditur in minutula frustula opium, & in laminam orbemve apposite collocantur segmenta, ne se tamen arctius contingant invicem; subdito moderato carbonum igne finitur sensim exhalare sulphur, à quibusdam dictum vaporosum, donec odor papaveraceus teter expiret & opium in pulverem facile teri possit. Rejiciunt autem alii hanc tostionem, nam opium non est castrandum virtute narcotica, non sulphur narcoticum separandum, alias evanidum fiet & nullarum virium, sed heterogenea atque noxia sunt removenda. Hinc veram correctionem in ejus à partibus excrementitiis depuratione consistere dicunt. Fit autem hæc depuratio solutione atque separatione per Menstrua, quæ triplicis generis sunt, vel aquea vel salina, vel sulphurea. Inter menstrua aquea habemus vel aquam simplicem, vel destillatam, imprimis autem rorem Majalem destillatum qui ultimus imprimis ea propter commendatur, quod neque privet opium virtute salina ut acida, nec illam secum auferat, ex quorundam opinione, ut Spiritus Vini, sed cum levis & subtilis sit facile evaporetur sine ulla virtutis privatione. Inter salina menstrua eminent imprimis acida acetum tum simplex, tum destillatum, succus citri, succus cydoniorum &c. Verum hic rursus notat W E D E L I U S opium acidis, si non plane destruat, multum tamen castrari. Quod succos attinet, si cum eis opium extrahatur, horum extractum proprium, forte paris, si non majoris, cum extracto opii, ponderis simul emergit; quod ipsum tamen vires non auget sed imminuit. Egregie sese habent menstrua sulphurea, Vinum Hispanicum, Malvaticum, aliudque generosum non dulce & imprimis etiam Spiritus Vini rectificatissimus probeque dephlegmatus, vapidas enim & halituosas opii partes naturæ reddit amicas.

Opium ingreditur Theriacam Andromachi & Cœlestem, Mithridatium, Philonium Romanum, aliasque compositiones. Remedia opiata magna esse remedia nullum est dubium, cautum autem & prudentem exposcunt directorem, alias sunt ut gladius in manu furiosi.

IN OFFICINIS PROSTANT

Essentia anodyna sive *Laudanum liquidum Sydenhamii*, *Schmerzstillende Esenz* / *Essence anodyne* ou *Laudanum liquide de Sydenham*. In mitigandis doloribus totius corporis acutissimis vigilisque nimis coercendis ac fluxibus sistendis inservit. Dosis est ad guttas aliquot ad decem viginti & paulo ultra in quovis liquore.

Extractum opii, *Opium Extract*, *extrait d'opium*, cum aqua succo citri acidulata paratum, datur ad granum unum duo tria vel quatuor.

Extractum opii Laudanum opiatum dictum, *Extrait d'opium nomme Laudanum opiatum*. Conducit ut *Laudanum liquidum*. In febribus pertinacibus, quæ cortici etiam Peruviano resistunt non spernendum est remedium. Dosis ad granum dimidium, granum unum, duo, tria, quatuor.

Tryphera Magna Nicolai, *Stärck-und Ruh-Essenz*. Putredines humorum emendat & bonum corporis habitum restituit, porro ad omnia muliebria à frigiditate nata vitia efficax est, infantibus quoque propinatur, sed parce danda.

CONSTANTIA PARTICVLIS SALINIS VOLATILIBVS OLEOSIS CVM VIRTUTE LAXANDI.

AMMONIACVM.

Est substantia gummosa & resinosa ex variis densis solidisque grumis modo flavescentibus modo lacteis, qui optimi, collectis ex ferula ammoniacifera, quæ mole fere arbo-rem æquat & lactescens est, splendidis & nitidis in glebam coactis, dum manibus tractantur lentore mollescentibus, saporis acris, amaricantis, viscosi, lenti & paululum nau-seosi, odoris fragrantis gravis, alliaris fere, aut castoreum utcunque æmulantis.

Ra-

Ratione Θ is volatilis oleosi incidit & discutit & aperit, ratione resinæ lenit & mollit, utriusque vero ratione, in largiori dosi datum, alvum solvit, & proinde in tussi, asthmate, hysterica passione, hypochondriaca & scorbutica specificum est. Externe tumores & scirrhus resolvit, discutit & emollit.

Datur in substantia \mathfrak{zj} sub forma emulsionis, electuarii, boli vel pilularum, stimulat $\overline{\text{Pro}}$, oleo $\overline{\text{Pri}}$, Θ e $\overline{\text{Pri}}$, borace &c. pro scopo vero alvum laxandi exaltatur trochiscis alhandali & diagrydio. Præparant ad impuritates removendas solvendo in aceto, filtrando & inspissando, in pilulis, bolis, emplastris, in potionibus vero melius solvitur in ipso vehiculo non inspissandum, alias periret multum Θ is volatilis, v. c. in asthmate: \mathfrak{R} . Gum. ammon. $\mathfrak{3\beta}$. ∇ Cinam. simpl. vel puleg. \mathfrak{zij} . syr. hyssop. puleg. vel cinam. \mathfrak{ziii} .

\mathfrak{R} . Gum. ammon. purgat. \mathfrak{zj} . solv. in ∇ Cinam. $\mathfrak{ziii\beta}$. f. haustus contra tussim, vel loco ∇ Cinam. cape ∇ puleg. vel menthæ.

\mathfrak{R} . Gum. ammon. purg. \mathfrak{zj} . $\overline{\text{Pr}}$. Θ lat. $\mathfrak{3j}$. ∇ fumar. Meliss. ana \mathfrak{zib} . syr. cochlear. \mathfrak{zij} f. haustus in passione hypochondriaca & scorbutica.

\mathfrak{R} . Gum. ammon. sal. ammon. ana q. v. destilla ex retorta, cape \sim um ad gt. x xx. cum ∇ destillata vel syrupo ad tussim, asthma, scorbutum.

\mathfrak{R} . Gum. ammon. $\mathfrak{3j}$. $\circ\circ$ caryoph. & tantundem $\circ\circ$ amygdalarum f. linimentum ad resolvendos tumores frigidos.

\mathfrak{R} Gum. ammon. $\mathfrak{3\beta}$. troch. alhand. $\mathfrak{3\beta}$. Elix propr. q. f. f. pil. laxantes, pro aliquot dosibus in scorbuto & passione hypochondriaca.

Habentur in officinis pilule de ammoniaco, quæ sunt asthmaticæ hypochondriacæ & uterinæ, pro cujus obstru-

ctioni-

Etionibus tollendis egregie maritantur purgantibus. ℞. Pil. d. ammon. ʒʒ. extr. troch. alhand. gr. j. Θ vol. succin. gr. v. ʒʒ d. succin. gt. iij. f. pil. Emplastrum de ammoniaco impositum in dolore iliaco, ischiatico lumbarique commendatur junctum cum emplastro de cicuta anatica portione.

Externe in doloribus dentium à cavitate, pro iis extrahendis sequens paro unguentum : ℞. Gum. ammon. sem. hyosc. ana ʒiʒ succ. hyosc. cum pinguedine ranarum viridum ana q. s. f. unguentum, quod exceptum stuppis intruditur cavo dentium, ubi circumjectam carnem quasi solvit, ac proinde extractionem dentis multum faciliat.

GAL.

AMMONIACUM, Ἀμμωνιακὸν ARMONIACUM GUTTA AMMONIACA, AMMONIACI LACRYMA, HARMONIACUM, Ammoniac / Gummi Ammoniac. GOMME AMMONIAC.

Hoc Gummi resinosum quod & flammam concipit & in aqua atque aceto dissolvitur, provenire dicitur ex ferula quadam, quam Ammoniaciferam vocant. Crescit illa in Lybia locis sabulosis, præsertim circa Jovis Ammonis delubrum, unde & nomen traxit. Ex hujus truncis aut, ut alii volunt, radicibus potius effluit hoc Gummi.

In infarctibus & incipientibus scirrhis viscerum non solum interne, sed & externe egregie prodest, in mensium obstructionibus non contemnendum est. In scrophulis & strumis quoque conducit.

IN PHARMACOPOLIIS EXTANT

Pilulae de Ammoniaco Quercetani, Ammoniac. Pillen / Pilules de Gomme Ammoniac. Commendantur ad incidendam Lymphæ visciditatem & ad eandem educendam. Unde in affectibus non solum supra allegatis ab authore, sed in uteri obstructionibus, cachexia, febribus

febris inveteratis conveniunt, Dantur ad scrupulum unum, scrupulos duos & ultra.

Oleum Gummi Ammoniaci, Ammoniac. Oehl/ Huile de Gomme Ammoniac, usurpatur potissimum externe ad membra paralytica, obstructions resolvit & tumores discutit. Cum oleo prodit quoque *Spiritus* quem rectificatum ad guttas 10. 20. & ultra in peste, morbis malignis scorbuto & omnibus obstructionibus commendant.

Spiritus asthmaticus Michaëlis, de quo sub viridi æris.

Emplastrum sive Ceratum de Ammoniaco Foresti, Ammoniac. Plaster/ Emplatre de Gomme Ammoniac. Malacticum & plurimi usus ac emolumenti esse dicitur in omnibus affectibus externis digestionem & coctionem requirentibus, inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat & callum obducit. Ammoniacum ingreditur plura alia emplastra.

℞. Aqu. hyssop. ℥iij. Vin. Rhen. ℥iβ. Gummi Ammon. ʒj. Msc. pro dosi. Est decantata BRUNNERI potiuncula in paroxysmo asthmatis, humidi præsertim, cum viscositate conjuncti, & ubi laxatione opus, sat efficax at admodum ingrata.

GALBANVM.

Est substantia gummosa & resinosa, pinguis, ceræ instar ductilis, ammoniaco similis, at ex variis albescentibus & splendentibus grumis in massam coacta, collecta ex *Ferula Galbanifera Syriaca*, saporis subacris, subamari nauseosi, odoris fragrantis gravis, odor & sapor idem qui ammoniaci, mitior tamen, tantumque gradu differunt.

Virtute nonnihil inferior est gummi ammoniaco, sed in specie valet in colica hysterica & affectibus convulsivis, datur ut ammoniacum.

℞. Mass. pil. d. galban. Sylv. ʒβ. diagryd. gr. v. f. pil. purgantes hystericæ.

℞. Galban. q. v. solv. in + seu — u vini, soluto add. extract.

extract. Castor. Croc. ana ziiij. ss d. succin. spic. ana zi β . M.
 applica umbilico ad passionem iliacam.

BDEL.

FERULA GALBANIFERA, FERULA SYRIACA, Galbantrauth / Syrisch Ferultrauth. Est planta flore rosaceo & umbellato, plurimis petalis constante in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum amplis planis striatis & marginatis, involucrum sæpe deponentibus. Addenda sunt folia apii æmula, adeoque pertinet ad Oreoselinum licet à Tournefortio ante ad ferulam fuerit relata & appellata.

Ferula Galbanifera, Lob. Icon. 779. Galbanifera ferula J. B. 3. part. 2. 52. Ferulago latiore folio C. B. Pin. 148. Oreoselinum Galbaniferum Tourn. de us. med. l. 2. c. 6.

In Arabia, Syria & India magna reperitur. Colitur nunc etiam in hortis quibusdam.

Ex hac planta vulnerata, jam extillat atque colligitur GALBANUM, γάλβανον, χάλβανον, CHALBANUM, LACHRYMA FERULÆ SYRIACÆ, SUCCUS METOPII, Galben = Gassit / Mutter-Harz / GALBANUM quoque Gallis audit.

Adfertur Galbanum, odore ingrato præditum, vel in massa vel in forma lachrymarum. Eligenda autem est massa arida, sicca, nitida, pura, repleta lachrymis albicantibus, odoris ut plurimum foetidi. Lachrymæ præferuntur siccæ, odoris fortis.

Interne rarius adhibetur, Dosis tamen est ad \mathfrak{zj} . ad $\mathfrak{z\beta}$. sed potissimum usui externo est dicatum. Convenit in affectibus dolorosis & convulsivis partium internarum, imprimis in colica hysterica vel sub emplastri forma, vel in suffumigiis per se aut cum aliis castoreo, assa foetida, &c. usurpatur. Dolores quoque à Lue Venerea oriundos & diuturnos discutit. In apoplexia & paralyfi spinæ dorsi applicatur. Multis immiscetur emplastris, ingreditur Theriacam atque Mithridatium & Diascordium.

IN

IN OFFICINIS HABENTUR

Emplastrum de Galbano crocatum Mynsichti, Mutter-Plaster mit Saffran / Emplatre de Galbanum avec Saffran. Commendatur ad emolliendos & resolvendos tumores duros & scirrhosos, nec non ad sedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, vel ab alia causa, uti loquuntur, frigida, ortos. Strumas quoque emollit, lenit atque discutit. Præterea in convulsione & singultu laudatur, nec destituitur virtute antihysterica; in tumoribus mammarum mulierum multum præstat calide applicitum, imprimis si simul sacculus arena repletus calide applicetur.

Emplastrum Matricale Norimbergensium, Mutter-Plaster / Emplatre Hysterique, prodest in uteri affectibus, calefacit, flatus dissipat, doloresque placat præsertim sic dictos frigidos; in suffocatione & strangulatione uteri umbilico imponitur.

Oleum Galbani destillatum, Galbensafft Dehl / Huile de Galbanum. Convenit in affectibus spasmodicis, colica convulsiva, affectibus hystericis, hemiplexia, membris paralyticis & pareticis, in affectibus scorbuticis & contracturis artuum, umbilico & partibus affectis inunctum.

Referri quoque huc potest *Balsamum Hystericum, Mutter-Balsam / Baume Hysterique,* quod in affectibus matricis naribus, temporibus vertici & umbilico applicatur.

BDELLIVM.

Est substantia gummosa & resinosa, pinguis, ceræ instar tenax, glutinosa, coloris ex flavo ferruginei, collecta ex arbore Americana spinosa, saporis acris, pinguis, lenti, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis.

Constat Eibus volatilibus cum resinosis multis, convenit cum ammoniaco in virtute nisi quod tanta vis cathartica non insit, sed potius adstrictoriam in recessu relinquat.

℞. Pil. d. bdell. ʒss. sacch. ʒni ʒj. balsam. Peruv. q. s. f. pil. in hæmorrhagia hæmorrhoidum.

Externe paratur emplastrum, linimentum, pro mollienda duritie & nodis nervorum, pro membris convulsis. R. g. bdell. myrrh. ana ʒj solv. in ʒss laurin. express. super carbon. add. ʒss succin. spic. ana ʒss. ʒss scorpion. lumbricor. & ceræ q. s. pro consistentia linimenti vel emplastri.

Odoramenta uterina etiam ingreditur. R. Bdell. myrrh. succin. ana ʒj. injiciantur carbonibus & fumus recipiatur per muliebria, ad lochia, foetum, menses pellendum. Oleum destillatum specificum est contra obstructions Uteri.

ASA

Βδέλλιον Βρόχον, BOLEHON, MALATHRAM, MAL-
DA CON, Germanice quoque *Bdellium* / ut & Gallice *Bdellium*
vocatur.

Arborem hoc gummi resinosum ferentem nondum describere authores, ut par est. Author in America illam provenire autumat, alii in Arabia, Media, India aliisque Orientalibus regionibus illam reperiri & haud abs ratione censent. Sunt qui Myrrham & Bdellium ex una eademque arbore provenire sed. ex mente aliorum male putant. Sunt etiam, qui gummi animæ legitimum Bdellium esse dicunt. Res nondum est decisa.

Bdellium digerit, discutit, emollit, & virtute roborante atque adstringente gaudet. Commendatur in affectibus pectoris ad acrem lympham temperandam, ulceribus pectoris, obstructione urinæ & mensium, rarius autem interne usurpatur, nisi quod olim exinde pararentur *Pilulae de Bdellio*, quæ ad moderandum nimium mensium & hæmorrhoidum fluxum usurpabantur, præsertim si simul suffitus Bdellii simul fuit adhibitus. Mithridatium ingreditur & plura emplastra.

ASA FOETIDA.

Est substantia gummosa & resinosa, aridior, ceræ instar
se-

sequax, ex variis splendentibus grumis, modo albescentibus, modo flavescentibus modo elegantissime incarnatis collectis ex tithymalo Persico foetido sarmentoso, ferula Persica rectius dicto, in massam coacta, saporis acris mordacis lenti, aliquantum nauseosi, odoris fragrantis gravis allium mentientis. Indi loco aromatis in cibis usurpant.

Ammoniaco & Galbano potentior est & specifica in colica & hysterica passione, sudorifera est in variolis & morbillis, febribus malignis, odor naribus exceptus hystericam passionem sistit. Datur à ʒss. ad ʒj.

℞. As. foetid. ʒj. Θ vol. succin. gr. xv. borrac. ʒss. f. cum bals. Peruv. vel Elix. propr. pil. in mensibus lochiis & foetu pellendo.

℞. As. foetid. q. v. infund. in — vin. Qisat. q. f. f. tinctura antihysterica, cujus guttas xx vel xxx. exhibe in aqua florum sambuci.

℞. Ung. alcis ʒij as. foetid. ʒj. verruc. equor. ʒj vel ij. f. pulv. injiciendus carbonibus candentibus ad suffocationem uteri.

℞. As. foetid. ʒj. Θ vol. succin. ʒj. L. O. gr. j. conserv. flor. stœch. ad ʒj f. bolus uterinus.

℞. Galban. ʒj. as. foetid. ʒss. Castor. ʒss. ☉ succin. cer. alb. q. f. f. pomum auro obducendum, quod naribus sæpius admotum passionem hystericam impedit.

℞. As. foetid. q. v. album ovor. q. f. applica panaritio.

S A-

ASSA FOETIDA, ὀπὼς σπιγὰνδρς, ὀπὼς μὴδὶκὼς, LASER, LASER FOETIDUM, LASER SYRIACUM, STERCUS DIABOLI, STERCUS DÆMONIS, ob atrocem foetorem, Teuffelsdreck/ Stinkendasand/ Gallice quoque appellatur ASSA FOETIDA.

Historiam hujus asæ foetidæ nemo melius tradidit aliquoties jam laudato KÆMPFFERO, ex quibus sequentia non displicebunt.

HINCISCH asam fundens est planta umbellifera Levistico affinis, foliis instar Poeoniæ ramosis, caule pleno maximo, semine foliaceo, nudo, solitario, Brancæ ursinæ vel pastinacæ simili, radice asam foetidam fundente. Hujus plantæ conjecturis botanicorum ad varias species distractæ genuinam tradit historiam, instituta eum in finem laboriosa profectio. Patria ejus sola est Persia, non Media, Lybia, Syria, aut Cyrenaica regio, unde ex hoc capite facta succi apud authores distinctio est inanis. Illa planta potissimum, quæ circa Heraatum campestre desertum occupat, & quæ crescit in montibus vicinis, territorio & oppido Disguun, succi ferax existit.

Asa foetida nulla ex caulibus vel sponte fluit, vel arte exprimitur, sed ex radice manat sauciata. Hæc autem radix miræ longævitas est, magna, ponderosa, nuda, exteriori vultu nigra in solo limoso lævis, in sabuloso scabra ac quadantenus rugosa, ut plurimum pastinacæ instar simplex, sæpe paulo à capite duabus vel pluribus divaricationibus bracchiata, aliis perpendiculariter demissis, aliis incodite & in obliquum extensis, prout ab objectis flectuntur. Radix hæc quadriennio minor parum lactescit & nunquam secatur, quo autem vetustior & major est, eo majorem impertitur lacrymæ copiam. Exemta tellure, si vel postridie secetur, lacte tamen stillabit, adeo nimirum succo diffluit, à quo insolens pondus obtinet. Succus ex utriculis suis recens emanans candidissimus, liquidus & pinguis est, flori lactis dulcis exacte similimus, adeoque omnis exsors lentoris, ad aëris vero solisve contactum, colorem subfuscum induit & coalescens lentorem quoque. Foetor, virtutis index, quo major est, eo meliorem asam testatur. At ille in recenti lacryma vehementissimus est, cum eo quem concreta & antiquior redolet, qualem Europa recipit, nullatenus comparandus. Affirmare ausim, inquit author, unam drachmam recens effusam majorem spargere foetorem, quam centum libras vetustioris, quem siccum venundant aromatarii nostrates, succi. De virtute medica Laseris dicit, Persicos Medicos ob delicatum nationis genium ab usu ejus fere abstinere, rusticis

sticis saltem in colicis torminibus & hydrope præsertim tympanitide curanda usus innotuit. Vulnere ex imposito recenti succo coalescere dicuntur ad miraculum. Afferit porro cum HERMANNO nostro Indis, præsertim Benjanis, crebrum asæ usum esse in cibis pro condimento. Quo modo etiam à Romanis usurpata fuit, uti videre est in APICII LIBRO DE RE COQUINARIA. Degustavi, dicit rursus KÆMPFFERUS, hoc succo imbuta crustula, quæ mihi non adeo sapiebant teterrime, ac putaveram. Familiare est Benjanis oras craterum eadem lacryma perfricare, pro appetitu excitando male habentium.

In nostris regionibus raro, & fere non nisi in affectibus uterinis, passione Hysterica mensium difficultate &c. usurpatur tum interne tum externe. In morbis equorum multum adhibetur. Ingreditur emplastrum matricale, de quo sub Galbano.

A PHARMACOPÆIS PRÆPARANTUR

Pilulæ fætidæ, sive *Matricales Sydenhamii*, *Mutter - Pillen / stinckende Mutter-Pillen / Pilules fœtides & Hysteriques de Sydenham*. Commendantur in variis uteri morbis, passionibus hystericis & mensium negotio. Dosis ad grana decem quindecim & ultra.

SAGAPENVUM.

Est substantia gummosa & resinosa lactescens, in grumos foris ex rufo flavescentes intus candidos concreta, collecta ex ferula Ægyptiaca sagapenifera, saporis acris mordacis nauosesi, odoris virosi si recens, fragrantis gravis.

Constat virtute laxandi cæteris majore, tum datur ad ʒiij alias ubi alterare debet ad ʒj.

Mitius est asa fœtida, & interne in retentis lochiis, fœtuque mortuo pellendo usurpatur.

℞. Ammoniac. opopan. sagap. galban. ana ʒj. ʒo philosphor. q. s. f. Emplastr. ad suppurandas hernias carnosas, additur magnes arsenicalis & bdellium.

RE-

Σαγαπίνον, SAGAPENUM à sagire & pinu, uti quidam volunt, quoniam odorem acrem & fortem ad odorem pinus accedentem spirat, GUMMI SERAPINUM, SACOPONIUM, *Serapin-Gummi / Seraphin-Gafft / GOMME SAGAPENUM.*

Sagapenum oriri dicunt ex planta Ferulacea, quam propterea Ferulam Sagapeniferam appellitant, & plures in India Orientali Persia atque Media provenire afferunt.

Attenuat, aperit, lentos crassos & pituitosos humores expurgat, obstructionsque reserat in hydropo asthma &c. prodest. Ob vim emmenagogam sat fortem, prægnantibus maxime noxium est, unde & suspectis mulierculis concedi non debet. Externe discutit, resolvit atque detergit; à multis ad spicula & res extraneas extrahendas deprædicatur, & ex eo fundamento immiscetur à quibusdam Emplastris magneticis lumbis applicandis ad herniam retrahendam.

RESINÆ SPISSIORES ET SOLIDIORES ARIDIORES, SALE OLEOSO CONSTANTES.

GUMMI ANIME ET CANCAMVM.

Est substantia resinosa, arida, forinsecus retorrída, alba, subinde farina aspersa, intus ex candido flavescent, succino similis, facile friabilis, collecta ex arbore Jetoiba in occidentali & orientali India. Sponte nascitur in insula Minæa, unde antiquitus tantum ad nos transfertur, hinc forte anime dicitur. Saporis prima fronte nullius evidentis, hinc pinguis resinosi, odoris dum accenditur fragrantis jucundi, accedentis ad odorem thuris vel olibani.

Ratione odoris cerebro & spiritibus gratissimo annumeratur cephalicis, nervinis & anticatarrhalibus, quoniam

vero

verò suum volatile habet in resina durissima in ventriculo vix solubili, ideo præscribitur tantum in suffitu, si interne velimus usurpare volatilibus stimuletur vel oleis.

℞. Anim. ʒj Mastich. Benz. ana ʒij Ladan. ʒß. M. f. p. pro suffitu in Catarrhis.

℞. Lign. al. ʒj anim. benz. ana ʒß. f. pulv. pro suffitu ad corrigendam aëris malignitatem.

Parantur & flores ex hac resina, ejusdem virtutis cum floribus benzoë, egregie nempe thoracici. ℞. Flor. g. anim. ʒj. benz. gr. vij. exhibe in ▽ Cinam. vel syr. asthmatico.

SAN-

ANIME seu GUMMI ANIME, GUMMI ANIMÆ, RESINA ANIMÆ, CANCAMUM quibusdam, Gummi Anime/ GOMME ANIME.

Cum hoc Gummi aut confunditur Cancamum, aut sæpissime substituitur, ab aliis vero utrumque Gummi invicem distinguitur. Cancamum rarius est quam Gummi animæ & hoc potissimum in usum cedit. Arbor unde profluit, describi nunc non potest, cum destituar Breynii cent. 2, ubi ea appellatur Acaciæ quodammodo accedens, Arbor animæ Gummi fundens Americana, foliis magnis acuminatis in pediculo binis, Lobo magno crassissimo eduli. Raro in usum trahitur.

SANDARACHA.

Est substantia resinosa, arida, pallide flavescent, splendida, in guttas vel strias modo rotundas, modo oblongas mastichi similes concreta, collecta ex truncis juniperi vulgaris fruticosæ, saporis resinosi, odoris dum accenditur fragrantis & suavis.

Constat Θ volatili $\circ\circ$ so incluso mucilaginosus crassus, cum acido volatili remissiore tamen quam in superioribus gradu.

Cum g. anime convenit, & contra catarrhos in suffitu tantum præscribitur. Cum $\circ\circ$ succini vel lini soluta medetur doloribus hæmorrhoidum, cocta cum $\circ\circ$ lini externe applicatur vulneribus. In multis etiam convenit cum mastiche, pauciora tamen habet Θ ia volatilia, hinc in defectu mastichis in suffitu eo possumus uti.

\mathcal{R} . Sandarac. \mathfrak{z} ij Mastich. \mathfrak{z} j benz $\mathfrak{z}\beta$. ras. succin. \mathfrak{z} ij. f. pulv. pro suffitu in catarrhis & coryza.

MA-

SANDARACHA ARABUM, SANDARAX, GUMMI JUNIPERINUM, VERNIX SICCUS, VERNILAGO, quasi veris ros, Wachholder. Harz/ trockner Firnis/ Verniß/ Glas-Birniss/ GOMME DU GRAND GENEVRE. Hoc bene notandum quod Sandaracha Arabum optime distingui debeat à Sandaracha Græcorum, quod est Arsenicum adeoque summum venenum. Extillat ex junipero præsertim arbore æstivis mensibus. Interne commendatur quidem ad hæmoptysin, vermes, affectus capitis & nervorum, sed rarissime usurpatur interne: potius externe in usum trahitur in suffitu & in Cucuphis.

Ex hoc Gummi in oleo Lini aut Terebinthinæ vel etiam Spiritu Vini soluto Vernix liquidus, qui pictoribus & Bibliopægis potissimum inservit: alias ad ambusta dolores hæmorrhoidum & in affectibus nervorum commendatur, mammillis inflammatis prodest & ab exulceratione præservat.

MASTICHE.

Est substantia resinosa arida, dura, pellucida ex flavo pal-

palescens, granulata, modo oblonga, modo rotunda, profluens ex lentisco Chiensi, odoris quasi oblitterati, dum accenditur fragrantis. Salia sua volatilia resinæ molliori facilius solubili & nonnihil constringenti habet inclusa, hinc in ventriculi debilitate, diarrhæa & dysenteria convenit. Ratione acidi sui volatilis, ventriculi acidum suppressum erigit, unde prodest hypochondriacis scorbuticis; externe convenit in suffitu ad procidentiam uteri & ani.

Datur in granis iij vel iiij vel coct. ut & destillat. it. sub forma emplastri & unguenti.

℞. Mastich. gr. iij integra deglutiantur ad debilem ventriculum roborandum.

℞ Mastich. 3℔. pulv. Caryoph. 3j. ros. rubr. p. ij. vin. rubr. adstr. 1℔ coq. in vase clauso ad medietatem, ad sistendum vomitum & diarrhœam. add. L. O. gr. j.

℞. Pil. Mastichin. 3j horis vespertinis post cœnam ad movendam alvum in doloribus capitis à catarrhis, quibus add. pro stimulo diagryd. gr. v. troch. alhand. gr. ij.

℞. Medull. lapid. 3iij. lign. aloës resinof. 3i℔ f. pulv. cujus 3℔ exhibe in incontinentia urinæ puerorum, & fiat ex solo mastiche suffitus.

Paratur etiam ▽ Mastichina capiēdo ollam recentem, suspendendo super fumos mastichis ita enim egregie imprægnabitur, huic deinde infunde vinum vel aquam utere pro potu ordinario, vel in liquoribus hisce extingue accensam mastichen.

Si per retortam destillatur, phlegma prodit subacidum, si vero per vesicam aqua aromatica.

LENTISCUS, seu arbor mastichen sudans, ita dicitur quod lentore quodam folia ejus lentescant, vel a lentis ramulis, *σχίρος*, quod ejus ligno utantur ad repurgandos dentes, *Mastix-Baum / LENTISQUE*.

Arbuscula hæc à Terebintho vera, cujus characterem infra evolve, differt foliis, quæ per conjugationem quidem costæ affiguntur, sed nullo plerumque impari claudente.

Lentiscus vulgaris C. B. Pin. 399. *Lentiscus* J. B. I. 285. & Dod. Pempt. 871.

Lentiscus copiosissime provenit in Chio *Ægæi* maris insula. Provenit & in *Ægypto*, Syria & Græcia. Nascitur porro in Italia, Hispania & Gallia præsertim Narbonensi. In Germania in hortis colitur, floret vere.

Lentiscum totam vi gaudere adstringente asserunt, sed vix aliquid præter resinam in usum cedit, nisi quod dentiscalpia ex Ligno parata ad repurgandos præsertim à pastu dentes, à multis adhibeantur, quoniam odontalgiam curare & gingivas roborare creduntur, orisque suavitatem conciliant.

Resina ex *Lentisco* manans vocatur **MASTICHE**, **RESINA LENTISCINA**, **OFFICINIS MASTIX**, *Mastix / MASTIC*. Hæc gummi resina, uti **STROBELBERGERUS** in **MASTICHOLOGIA** refert, exsudat non liquida ut aliæ resinæ, sed arida potius grumosa, duraque aut saltem mox indurescens. Laudatissima & copiosissima ex insula Chio atque Oriente affertur. Duplex solet proflare, **MASTICHE** videlicet **IN SORTE**, *gemeiner Mastix* multis adhuc impuritatibus scatens, & **MASTICHE ELECTA** seu **IN GRANIS**, *außerlesene Mastix* - *Körner / MASTIC CHOISI*. Eligenda autem sunt grana majora, si contundantur pellucida, friabilia, suavem odorem spirantia; improbantur nigricantia bitumini similia, viridia livida & impura.

Mastiche laudatur in catarrhalibus morbis, ut & in asthmate. Datur ad grana aliquot ad drachmam semis & ultra, ut plurimum in ovo forbili. Grana mastiches aliquot masticata pituitam eliciunt, foetorem oris corrigunt, carnemque gingivarum roborant. Usurpatur in pulveribus dentifriciis & frequentissime in emplastris ad odontalgiam, præsertim à defluxionibus catarrhalibus ortam. *Mastiche* scilicet pulverisata parumper aut confracta inspergitur panno

panno sericeo aut etiam holosericeo, & cultro ignito dissolvitur, & in emplastrum redigitur. Alii addunt Gummi Tacamahaca vel Galbanum, quidam etiam aliquid cantharidum adjiciunt. Ejusmodi emplastra nunc tantummodo tempori lateris dolentis nunc utrique tempori, nunc etiam pone aures applicantur, quam calidissime fieri potest: quo citius vesicæ eleventur, eo promptius etiam auxilium. Frequenter admodum usurpatur in suffimentis. Sacculus granis mastiches repletus aut calefactus stomacho applicatur ad eundem roborandum.

A PHARMACOPOLIS SEQUENTIA DIVENDUNTUR

Aqua Mastichina, Mastix-Wasser / Eau de Mastic, coctionem ventriculi confortat, nauseam, singultum, vomitum fluxus alvinos, diarrhoeam, dysenteriam &c. cohibet. Nauseabunda cum sit & per se exhibita ingrator, exhibetur ut plurimum cum aliis. Dosis ad drachmas duas, unciam semis & ultra.

Oleum Mastichinum, Mastix-Dehl / Huile de Mastic, sedat vomitum, & fluxus alvi, nervos roborat & juncturas, inflammationi gingivarum, linguæ, & totius oris medetur.

Oleum Mastichinum destillatum, distillirtes Mastix-Dehl / Huile distillée de Mastic, eidem scopo ac prius inservit, assumitur interne guttatim.

Pilulæ Mastichinæ, Mastix-Pillen / Pilules Mastichines, Catarrhos demulcere & intemperiem Ventriculi sic dictam frigidam corrigere dicuntur. Dantur ad scrupulum unum ad scrupulos duos.

Spiritus Mastichinus cum Spiritu Vini, Mastix-Brandtenwein / Esprit de Mastic avec l'esprit de Vin. Prodest in imbecillitate ventriculi, in cruditatibus & doloribus colicis. Dosis guttæ viginti, triginta & ultra. Gedani paratur ejusmodi spiritus & elegantissimus & suavissimus, sub nomine desß Danksiger Mastix-Wassers/ cognitus.

THUS seu OLIBANUM.

Est substantia resinosa ex flavo pallescens & splendescens,
M m m m 3 in

in guttas mastichi similes sed majores concreta & indurata, collecta ex arbore spinosa Arabica thurifera, saporis amari-
cantis resinosi, odoris fragrantis.

Ratione figuræ est vel indicum, quod est in glebis, vel mammosum, quod est in guttis, vel masculum, quod est in granis.

Mastiche fragrantius & suavius, cæteroquin cum ipso convenit.

℞. Mastich. Oliban. ana gr. v. Ocul. ⚥. gr. xv. Corall. r. præpar. C. C. præpar. ana ʒß. ʒ d. foenic. gt. iij M. f. pulv. ad absorbenda acida, ex lacte dandus, præcipue contra tor-
mina puerorum.

℞. Thur. ʒj Mastich. ʒß. Θ*ci. ʒj. f. pulv. pro erosio gin-
givis, superfumendum decoctum salviæ.

L A C-

Λιβανός, λιβανωδόν, Thus à θυώ suffio, quoniam ad suffi-
menta inservit, OLIBANUM, quasi oleum Libani, quoniam in
Monte Libano arbor, ex qua exstillat, crescere dicitur, Weyrauch/
ENCENS, OLIBAN.

Arbor Thurifera in Arabia præsertim ejusque provincia Sa-
bæa, crescens, pertinet utique inter plantas nondum rite descriptas,
quicquid etiam quidam referant. Adfertur interim ex eadem tum
ejus cortex crassus resinosis atque odoratus, quem THYMIA-
MA, quoniam ad suffimenta inservit, THUS JUDÆORUM,
NARCAPHUTUM & SERICHATUM THURIS CORTICEM,
Weyrauch • Rinden appellitant, tum imprimis ejus succus
resinosus exsiccatus. Is autem diversus existit gradu puritatis fi-
gura & magnitudine discrepans. Si Thus adhuc cortici huic ad-
hæret, vocatur *Thus corticosum*, *Olibanum Corticosum*, *Rinden-Wey-*
rauch.

Qui succus primus ex arbore vel sponte vel sauciata profluit, in La-
chry-

chrymis purioribus pellucidis & candicantibus comparet, vocaturque **THUS MASCULUM**, **OLIBANUM**, **THUS ALBUM TESTICULATUM**, **OLIBANUM TESTICULATUM** à quorundam granorum forma, **Olibanum/ OLIBAN**, **ENCENS MASLE**. Quod si ex hoc grana rotundiora, minora, purissima, **Manna pulchra** colore resplendentia, colligantur, audit **MANNA THURIS**, **MANNA LIBANI**, quamvis à quibusdam etiam Olibano confecto in moleculas minores redacto, aut etiam ejus farinæ, hoc nomen tribuatur, aliasque etiam **MICA THURIS**, **THUS GRANULOSUM**, **OLIBANUM GRANULOSUM**, *zerbrochener oder zerstückelter zerbrockelter Weyrach* dicitur. Resina minus elegans in massa quandoque existens flavescens & minus pura vocatur **THUS** vel simpliciter, vel **THUS COMMUNE**, **THUS FOEMININUM**, *Weyrach/ ENCENS*, **ENCENS FEMELLE** denominatur.

Vires obtinet cephalicas, stomachicas, pectorales, vulnerarias & adstringentes, in consolidatione ulcerum & vulnorum convenientes, aliasque, sed vix unquam interne usurpatur. Ejus usus potius est externus in suffimentis, cum accensum gratissime & suavissime redolet. Conducit etiam ejus fumus in catarrhis, vertigine, Coryza, proidentia ani atque tenesmo.

LACCA.

Lacca in ramulis est substantia resinosa superficie inæquali veluti granulata, dura, rufa pellucida, intus cavernosa, elaborata à formicis alatis & circa extimos arborum pinguescentium ramulos congesta, saporis resinosi, odoris dum accenditur fragrantis sulphurei, nonnihil acidi, & spiritibus nostris mire grati.

Lacca in granis, sunt grana resinosa, parva dura rubicunda, lapillis granatorum similia, pellucida, collecta ex arbore Indica Kapethia dicta, floribus villosis, semine tricocco, ricini specie, saporis & odoris præcedentis.

Utraque in resina sua adstringente fovet Sem volatilem
lem

lem qui cum accenditur seu incalescit se prodit, cujus ratione blandum diureticum, & præcipue in morbis chronicis, variolis & morbillis blandum & elegans diaphoreticum est. Externe tanquam specificum ingreditur compositiones ad gingivarum & dentium vitia scorbutica. Datur soluta in Spiritu Vini.

℞. Lacc. q. v. affund. — vin. rectificat. relinque donec — us vini sufficienter tinctus fuerit, hanc tincturam exhibe cum syr. Card. B. vel emuls. sem. aquileg. ad expellendum variolas add. quoque tinct. myrrhæ. essent. Castor. ☉ volat. succin. &c.

℞. Crem Fri ziiij. Lacc. 3j. ☉. cypr. gr. viij. f. pulv. dentifricius.

℞. Lacc. 3iβ. Myrrh. alum. ust. ana 3j. phlegm. ☉li q. f. stent in digestionem f. tinctura, huic admisce syr. cochleariæ, vel syr. gran. cherm. q. v. f. linimentum, ad gingivas carie scorbutica infectas.

SUC-

GUMMI LACCA, LACHETTA, Lac / Gummi = Lac / Lac / LACQUE, GOMME LACQUE.

Arbor hoc gummi suppeditans nondum ita innotuit, ut nulum supersit dubium, sequentibus interim insignitur nominibus & imprimis à BREYNIO cujus prodromos nunc non possideo, vocatur Jujuba Indica rotundifolia spinosa foliis majoribus subtus lanuginosis & incanis Breyn. 2. prodr. Ber Indica fructu jujubino J. B. 1. p. 2. 44. Cleyerus in Ephem: Nat. Cur. anno S. p. 79. arborem vocat Lacciferam Japanensem Fasnoky sive Namra. Sicuti autem nondum plane concordēs sunt de arbore, ita quoque de ortu hujus Gummi non conveniunt.

LACCA IN RAMULIS AUT IN BACULIS, Steffen, Lac / LACQUE EN BATON, masticata salivam rubore tingit,

tingit, & cum aqua modice acidulata decocta, eidem quoque elegantem conciliat rubedinem; sunt qui vocant Laccam Sumetri, quia ex Sumatra insula obtinetur.

LACCA IN GRANIS, *Lack in Körnern* / *LACQUE EN GRAINE*. Quod si grana pulchra sint utique præferri debent, accidit autem quandoque, ut minus elegantia adinveniantur. His addenda

LACCA IN TABULIS, *Taffel-Lack* / *LAC EN TABLET-ES* OU *LACQUE PLATE*, quam ex baculis fundunt. Cum loco gummi Lacce autem minime confundenda est LACCA FLORENTINA, quæ etiam in usum Medicum vix cedit, à quibusdam interim commendatur ad obesitatem nimiam. Gummi nostrum usui externo potissimum est dicatum.

Pictores atque Mechanici Laccam dissolvendo in Spiritu Vini vel oleo Therebinthinæ ea utuntur ut vernice. Massa quoque ista literis obsignandis dicata, cera obsignatoria dicta cum Lacca paratur, dum vel cinnabari tingitur, quæ omnium optima & merito præferenda ei, quæ ex Lacca impuriore cum resina &c. est fabrefacta. Color huic ceræ conciliari potest vel nigricans vel flavescens vel alius etiam. Optima censetur elegans, lævis, polita, resplendens, facile fluens & charæ artissime adhærescens.

PROSTAT

Tinctura Lacce cum aquis facta, *Lack • Tinctur mit Wasser* / *Teinture de Gomme Lacque faite avec de l'eau*; in scorbuto oris & gingivarum laxitate, cruentatione atque putredine conducit.

SUCCINUM.

Est substantia resinosa in lapideam duritiem concreta, lucida, magnitudinis & figuræ variæ, transparens, flavescens, nata in terræ visceribus Prussiæ mari Balthico vicinæ, saporis subacris & resinosi, odoris fragrantis dum accenditur. Est vel album vel flavum vel nigrum, præstat omnibus album.

Habet Θ ia volatilia oleosa cum acidis volatilibus inclusis resinosis crassis & terreis. Utrumque & album & flavum, polychrestum medicamentum est, tum ob salem volatilem oleosum incidentem & discutientem, tum ob resinam temperantem, & adstringentem, utriusque nomine in catarthis, morbis soporosis, convulsivis, alvi fluxibus, gonorrhœa specificè convenit. Datur à \mathfrak{zj} ad 3β . in substantia, pulvere. Externe fumitur ad suffimigia contra catarrhos, coryzam.

\mathfrak{R} . Succin. præp. terr. sigil. ana 3β . Ocul. \mathfrak{S} \mathfrak{zj} Diascord. Fracast. & syr. myrtin. q. f. sumaturcum ∇ plantag. contra dysenteriam, addi possunt L. O. gr. ij vel iij.

\mathfrak{R} . Troch. d. charab. $\circ\circ$ N. M. expr. ana \mathfrak{zj} . L. O. gr. ij. conserv. rosar. \mathfrak{O} lat. $3j$ M. f. bol. contra diarrhœam.

\mathfrak{R} . Succin. præpar. 3β borrac. Venet. \mathfrak{zj} . $\circ\circ$ cinam. gt. j. conserv. fl. anth $3j$ f. bolus in mensium remora. Vel. \mathfrak{R} . succin. præpar. 3β . borrac. calcinatæ \mathfrak{zj} omitte $\circ\circ$ cinamom. cape cum conserva flor. nymph. ad nimium mensium fluxum.

\mathfrak{R} . Succin. præpar. of. sepia ana \mathfrak{zj} datur ex ∇ flor. nymph. contra gonorrhœam.

\mathfrak{R} . Succin. præpar. \mathfrak{zj} vin. auster. q. f. cape ad lochiorum fluxum.

\mathfrak{R} . Essent. succin. gt. xv. ∇ Cinam. $3j$ f. lac in mensium remora & passione hysterica & aliis debilitatibus nervorum & spirituum.

\mathfrak{R} . Essent. succin. Croc. castor. ana cape ad menses.

Contra sputum sanguinis & mictum cruentum: \mathfrak{R} . succin. præpar. $3j$ terr. sigill. lap. hæmatit. ana $\mathfrak{z}\beta$ conserv. heder. terrestr. 3β . L. O. gr. j. syr. de symph. q. f. pro bolo.

Externe parantur etiam linimenta pro partibus convulsis egregia, ut & balsama antapoplectica, quæ naribus indu-

dunduntur. Sic ℞. ʒ. ʒ. expr. bacc. laur. ʒ. ʒ. succin. lavend. ana
 ʒj camphor. ʒ. M. f. liniment.

℞. ʒ. junip. succin. ana ʒj. ʒ. caryoph. gt. v. camphor.
 q. f. scil. gr. xxx vel xl. f. balsamum.

Ex diutina coctione cum oleo lini fit vernix pro in-
 crustandis scriniis.

GUMMI

SUCCINUM a succo dictum, quoniam vel arborum vel terræ
 credebatur succus. Vocatur etiam CARABE, KARABE, ELE-
 CTRUM CHRYSOELECTRUM, AMBRA CITRINA, seu
 FLAVA, RESINA TERRÆ, *Ulgstein / Bernstein / Succin*, AM-
 BRE JAUNE, AMBRE CITRIN, CARABE OU KARABE.

De hujus origine admodum disputatum fuit. Fabulæ Deo-
 rum & Dearum lacrymas esse docent. Quidam ex urina Lynceis aut
 ex semine Cetorum concrefcere autumarunt. Nonnulli ex arbori-
 bus succinum stillare censent, ita ut ratione originis sit lacryma
 aut resina arborum resiniferarum Pini, Abietis, Alni, Populi, in mare
 defluens & ab eodem congelata & ad littora delata, præeunte in hac
 sententia O L A O M A G N O, sunt qui pro spuma maris habent. Mul-
 tis videntur bene judicare illi, qui statuunt Succinum esse bituminis
 subterranei speciem scaturientem vel è fundo maris, vel in prope po-
 sitis locis, tandem in talem consistentiam per sal marinum ope solis
 aërisque redactam. Licet autem non sub forma fluida aquis super-
 natet, nihil tamen impedit, quo minus dicamus, Succinum in primo
 ortu fuisse liquidum, quod varia adhærentia & inclusa corpora, inse-
 cta, aliaque tam nobili tumultu tecta satis ostendunt. HARTMANNUS
 in HISTORIA SUCCINI ejus generationem sequentibus delineat
 verbis. Prussiæ solum undiquaque bituminosum cogita, insignes
 enim glebæ bituminis condensati in abditis terræ aut luti fuere depre-
 hensæ, Cespites bituminosi ex pluribus locis effodiuntur & olei rivi
 ex terra dimanant. Bituminoso itaque Litoris Sudavici solo calor sub-
 terraneus, quicumque iste fuerit, bituminis exhalationes per interanea
 dispersas undique consociat, & in guttas cogit præprimis ex corticosa

& lignosa fossili matrice eandem congregat, quod dum agit vicina simul salia pervadit ipsorumque effluvia secum abducens bituminosis guttis immiscet, salina spicula fluorem bituminosum sistunt & si nulla suppetiæ bituminosarum guttarum à calore submituntur, gleba pro modulo incunabuli formam subit, omni que exhalationum motu sopito caloreque evanescente salinae partem rigorem recuperant, bituminosis superfluum humorem exhalantibus; sociataeque succineam gemmam producant, nitidiorem, splendidiorem fragrantior, firmiorem ex puritate & proportionem exhalationum bituminosarum ac salinarum. Hæc jam vera est succini generatio quam antea nos (verba sunt authoris) nemo erudito orbi perspicuum reddidit, siquidem præconceptis opinionibus laborantes, in animalibus, in vegetabilibus, in fundo maris prima succinorum incunabula quærendo à veritate aberrarunt omnes.

Succinum in regionibus potissimum ad mare Germanicum & mare Balticum sitis Prussia præprimis & hinc Pomerania adinvenitur. Versus Pillaviam multum reperitur. Non autem cuilibet pro lubitu succinum licet colligere, peculiares enim hanc in rem constituti sunt custodes, quos *Strandtreuer* appellant, qui impediunt, ne Succinum pro aliis quam pro imperantibus colligatur. Et Mare & terra in Prussiam dona succinea confert; sed maris dona partim in litore leguntur partim ex aqua hauriuntur. Vadoso scilicet mari signis apparentibus, coloni reticulis conto affixis fundum verrunt aut fluctibus volventibus eadem adversa opponunt; hæc quæ haustilia: reliqua inter ejectamenta, quæ natantia prædæ indicium faciunt, algarum, sarmentorum lignorum aut arenarum, sedulo investigantur & seliguntur, lectaque audiunt. Ex terra vero quæ fodiendo acquiruntur, fossilia appellantur: Amam longiori conto præfixam venæ in mentium litoreorum jugis conspicuæ, admovent, tentanda sicuti glebam ligno immersam offendant, qua animadversa lignum fossile leniter radunt, amaque subjecta glebas excipiunt, exceptasque adducunt.

In Succino eminet quoque virtus ista insignis corporum sic dictorum Electricorum qua mediante calefactum motu & attritione paleas stramenta aliasque res leviculas arripit, & ad se trahit, sibi agglutinat, quam, ut explicarent authores mi e se orserunt, alii namque ad sympathiam aut nescio qualem vim attractricem confugerunt, nonnulli

nulli facultatem Succini electricam exinde oriri suspicantur, quod à corpore hoc caloris ope propellantur viscosi ac tenaces halitus seu radii & fila quasi halituum, quæ filamenta halitua paululum tensa, postquam retrahuntur, tunc corripiant corpuscula leviora secumque reducant. Cartesiani dicunt è succino confrecto primi elementi corpuscula per illius rimulas quasi gladiolos erumpere, quæ cum in aëre idoneos meatus non offendant, in locum suæ originis revertuntur, & minora corpora, quorum meatibus implicata sunt, secum reducant. Res videtur pulsu effici. Succinum nempe paleas aliasve res leviusculas attrahit, quia, dum aër circa corpus Succini, ut ita loquar, atmosphaericus frictione & calore debilitatur, & postmodum Succinum ad res leviculas in sphæram activitatis locetur, aër his rebus à tergo incumbens sese expandendo illas versus Succinum, ubi sufficiens resistentia, ex causa dicta deest, cum impetu propellat, uti hoc videmus in aliis corporibus electricis; è quibus talia effluvia viscosa exhalare probabile non est: exemplo sit Adamas, aliæque gemmæ attritu quadantenus calefactæ, simili modo paleas &c. attrahentes. Ultima autem in experimento physico manifesto, dum duo cylindri lignei in canali ferreo post extractum intermedium aërem magno impetu invicem compelli videmus, fundatur opinio.

Præter tres ab authore allegatas Succini species plures adhuc aliæ, diversorum colorum, reperiuntur.

Succinum commendatur in affectibus nephriticis & urinariis, in stranguria atque dysuria. Partum promovet, convenit in casu ab alto, sputo & vomitu cruento, ut & vulneribus nervorum atque capitis. Globuli ex succino collo circumligati ad catarrhales defluxiones oculos præcipue infestantes arcendas gestantur.

IN PHARMACOPOLIIS SEQUENTIA REPERIUNTUR PRÆPARATA

Succinum album & flavum præparatum, præparirter weißer und gelber Alstein / Succin blanc & jaune préparé.

Essentia Succini, Alstein-Essenz / Essence de Carabé, Succin, ou ambre jaune. Conducit in affectibus cephalicis generisque nervosi, ut & in morbis uterinis. Convenit quoque in gonorrhœa virulenta datur ad ℥j ad ʒj usque.

Spiritus Succini Volatilis, flüchtiger Agstein • *Spiritus* / *Esprit Volatil de Succin ou d'ambre jaune.*

Sal Succini Volatile, flüchtig Agstein • *Salz* / *Esprit Volatil de Succin ou d'ambre jaune.*

Oleum Succini rectificatum, rectificirtes Agstein • *Dehl* / *Huile de Succin rectifiée.*

Sal Volatile ad naturam *Salium* essentialium aut potius acidorum temperaturum quam proxime accedens, multi usus est ad affectus cephalicos & nervinos, apoplexiam, lethargum, vertiginem morbosque catarrhales. Dosis est ad grana sex scrupulum semis & paulo ultra. *Spiritus* quoque ad eosdem affectus ad guttas quatuor decem &c. usurpari potest. Magis tamen externe adhibetur ad aurium affectus, tinnitum susurrationem aliosque. *Oleum Succini* egregium est remedium interne & externe in affectibus nervorum & capitis, apoplexia & similibus. Ictericis prodest, convenit Ischuria & Gonorrhœa laborantibus. Dosis est ad guttas quatuor ad scrupulum unum. Quod sub finem destillationis extillat oleum nigrum naribus & umbilico admoveri potest in passione hysterica, membra quoque paralytica eo foventur.

Balsamum Succini, Agstein • *Balsam* / *Beaume de Carabé ou d'ambre jaune.*

Pilula de Succino Cratonis, purgirende Agstein • *Pillen* / *Pilules de Succino Cratonis.* A veteribus maxime commendabantur in morbis capitis affectibusque catarrhalibus. Dantur ad gr. xv. 30. & ultra.

Liquor Cornu Cervi Succinatus, de quo sub cornu cervi.

Tandem vel verbo tangenda Succinum fundendi & parva frustra in unam molem salva firmitate uniendi ars, quam quidam se callere asseverarunt; Juxta HARTMANNUM inter adeptos numerandi ejusmodi artifices, si idoneis documentis fidem fecerint, neque minus quam ex lapide Philosophorum lucrum Electrotoreutæ ipsis promittunt. Quod nondum patet forsan dies docebit.

G U M M I E L E M I.

Est substantia resinosa pinguis ex flavo albicans, splendida,

dida, ad viridiusculum inclinans, in massam coacta, dum recens mollecula, dum inveterata durior, collecta ex arbore indica prunifera, saporis resinosi & pinguis, odoris fragrantis, cum suavitate graviusculi.

Hujus usus externus frequentissimus est præcipue in confortandis nervis & roborando cerebro, quidam interne commendant pro diuretico.

In usum domesticum parant Indi impinguando storeas cannabinas vel paleas, quibus deinde utuntur, pro elychniis, diutius enim alit flammam.

℞. Elem. ʒß. detur ex vitello ovi ad gonorrhœam simplicem, ex debilitate nervorum à causa paralytica.

℞. Elem. q. s. solv. in ʒo dest. elem. vel. succin. f. ung. contra dolores artuum à frigore ortos.

℞. Elem. ʒj. ʒo d. caryoph. ʒß. laurin. ʒj. f. linimentum quo inungatur abdomen.

℞. Tacamahac. Caran. Elem. ana ʒij ceræ ʒj picis ʒß ʒo dest. elem. q. s. ad dissolutionem omnium, add. ʒo mac. ʒß. ʒo caryoph. ʒj f. emplastrum ad dolores scapularum, dorsi, in catarrhis, aliisque affectibus à frigida causa ortis, applica etiam partibus dolentibus in colica.

C A-

GUMMI ELEMI, ELEMI RESINA, quidam hoc gummi ita dictum putant, quod ex olivæ quadam specie extillet. *Elemi* Aethiopisch Oehlbaum-Harz, GOMME ELEMI.

Nec de hujus succi arbore res clara existit. Alii in India Orientali, quidam in America illam quærunt. Gummi interim Elemi Orientale Occidentali à plurimis præfertur.

Hæc resina, quæ facilius in oleo quam menstruo aquoso dissolvitur, vi balsamica mire succurrit in vulneribus præsertim cranii
ut

ut & ejusdem fracturis. In contusionibus quoque confert & ulceribus serpentibus medetur. Recipitur in varia emplastra & unguenta. Celebre præsertim ob hoc gummi resinofum est

Balsamum Arcæi, Wund- und Digestiv- Balsam/ Beume & Arceus, Communissimum nunc est vulnerarium, consolidat vulnera & ulcera fortificatque nervos, conducit in luxationibus & contusionibus & tanquam insigne digestivum usurpatur.

CARANNA & TACAMAHACA.

Caranna est substantia resinosa, concreta, laxa, dum recens tenax, picis instar ductilis, sine tamen agglutinatione vel colliquatione, inveterata dura ac friabilis, foris ex cinereo nigricans, piceæ coloris, collecta ex arbore Mexicana Caragna, saporis viscosi amaricantis, odoris dum accenditur fragrantis.

Tacamahaca est substantia resinosa, arida & retorrida, ex cinereo & rufo nigricans, modo figura minori, modo in glebas coacta, modo foliis tubuli in modum convolutis inclusa, ex arbore Mexicana Tacamahaca collecta, saporis aromatici resinosi, odoris fragrantissimi.

Utrumque ob suavissimum odorem nervinum est & cephalicum potentius quam elemi. In specie medetur externe podagræ, arthritidi, ischiatico dolori, capitis item & dentium catharrhis & doloribus. Egregie stimulatur ol. Nuc. mosch. expr.

℞. Carann. Tacamah. ana q. v. dissolv. in bals. Peruv. f. q. f. emplastr. temporibus applicandum ad prædictos affectus, etiam in debilitate ventriculi & doloribus post partum.

℞. Ol. dest. caran tacamahac. ana q. v. succin. ʒj f. linim. ad affectus prædictos.

℞. Gum.

℞. Gum. Carann. sem. nasturt. ana q. s. M. c. albumine ovorum, & fac Ceratum, impone herniæ intestinorum.

Interne etiam usurpari potest in affectibus pectoris, licet apud practicos non præscribatur. Sic ℞. Gum. Carann Tacamah. ana ʒj. affund. ol. thereb. ad eminent. iij. digitorum f. essentia à gt. ix. ad xx. sumenda in ▽ Cinamomi vel syru-
po pectorali.

Oleum destillatum acre & rubicundissimum, specificum uterinum est, confortatque egregie, odoriferum etiam sum-
mum est.

BEN.

CARAGNA, Caranna/ GOMME DE CARAGNE OU CA-
REGNE.

Arbor hanc resinam fundens licet nondum quoad omnes partes delineata, sequentibus insignitur nominibus

Caranna Monardi C. B. Pin. 503. Clus. exot. 298. Carannæ Garcix nomine data resina I. B. 1. p. 2. 329. Tlahueliloca Quahuil, id est arbor infantiæ Caragna nuncupata Hern. 56.

Ex nova Hispania aliisque Indiæ occidentalis locis, foliis junce-
is involuta adfertur Caranna.

Caranna habetur a quibusdam præstantior Tacamahaca, vola-
tilior & penetrantior, naturæque magis balsamicæ.

Tacamahaca, Tacamahac / corrupte Sacmanhac /
TACAMAQUE.

Arbor Tacamahacifera, quæ in Indiæ potissimum occidentalis nova Hispania aliisque locis, & juxta quosdam etiam in India Ori-
entali provenit, appellatur ab authoribus

Tacamahaca Officinarum Parkins. Tacamahaca populo si-
milis fructu colore pæoniæ I. B. 1. p. 2. 346. Tecomahoica Hern. 55. Tacamahaca Clus. Exot. 298.

Ufus internus & Tacamahacæ & Carannæ rarus est, externus autem admodum celebris. Tacamahaca imprimis celebratur tan-
quam uterinum, in suffocatione matricis egregie conducens etiam in suffitu si adhibeatur, Cum temperet & quodvis acre leniat, attenu-
etque

etque atque dissolvat viscidum, in podagra multum extollitur, juxta illud Poëtæ.

Indomitam lenit, Tacamahaca podagram,

IN OFFICINIS PROSTAT

Oleum Tacamahacæ, Tacamahac = Dehl / Huile de Tacamaque.
Doloribus ac tumoribus est dicatum, ventriculum roborat & podagricis doloribus mederi dicitur, ad affectus quoque Hystericos prædicatur egegrum, umbilico illitum.

BENZOE seu ASA DULCIS.

Est substantia resinosa arida & indurata ex variis splendentibus micis modo flavescentibus, modo albicantibus in massam coacta, collecta ex arbore indica Benzoifera, saporis pinguis cum quadam dulcedine odoris suavis.

Respondet styraci, & ob sui mollitiem & blandam dulcedinem Pulmonibus dicatur, externe fiunt linimenta, emplastra, balsama, suffitus. Prostant flores, tinctura s. essentia.

℞. Benz. ʒj. Mastich. thur. ana ʒj. anim. ʒij. M. f. suffitus in catarrhis & coryza.

℞. Flor. benz. ʒj. Flor. ʒij. bals. Peruv. q. s. f. pil. contra tussim, ab hydrope pectoris, quibus adde ol. dauci vel foenic. ana gt. ij. vel. iij. Flores benz. soluti in ol. Thereb. balsamum præbent summe asthmaticum, in u. vini tincturam rubicundam summe thoracicam ex syrupo pectorali.

PIX.

ASSA DULCIS, BENZOIN, BELZOE, BENJOINUM
Benzoe / Benjoin / Wohlriechender Asandt / BENJOIN.

Arbor ex qua colligitur hæc resina, vocatur arbor Benzoinifera in India Orientali reperiunda. Teste imprimis TOURNEFORTIO

IN

IN TRACTATU DE MATERIA MEDICA, arbor est alta crassa & pulchra, folia habet malo citreo fere similia, sed minora, minus viridia & in dorso albicantia. Florere illam quæ in horto Regio aservatur tempore verno asserit, a florem non descripsit. Fructum fert nuciformem, uti GRIMM, IN EPH. NAT. CUR. DEC. 2. ANNO I, OBS. 1, 2. notat, qui collectionem Benzoes in Sumatra hoc modo describit. Postquam dicta arbor ad 5. vel 6. ætatis suæ annum pervenerit, supra ad principum ramorum secundum longitudinem sed aliquantulum oblique ad lignum usque inciditur, unde tunc præstantissimum hoc gummi profluit, quod à Sole & aëre suam maturitatem & coagulationem acquirit. Primo collectum est colore albo, tenue, viscosum, glutinosum & pellucidum, tractu vero temporis flavedinem contrahit. Duplex habetur Gummi, primum quod eleganter album & flavum est, secundum quod est crassius, subfuscum durum & recrementa habet admixta. Nobilissimum Benzoinum in Sion & Malaccis provenire ignobilius vero in Sumatra & Java quidam putant. Distinguunt in BENZOEN IN LACRYMIS, BENJOIN EN LARMES, quod & ob micæ albicantes interspersas amygdalis confractis similes, BENZOINUM AMYGDALOIDES appellatur, & BENZOEN IN SORTE quod quidem non æque nobile, interim tamen alteri substitui potest, modo recrementis non scateat.

Vires obtinet calefaciendi, incidendi atque attenuandi. Usus tamen internus rarus est. Externe in dentium dolore prodest masti-
cando, sternutationem ciet, & virtute cosmetica gaudet. Ingre-
ditur suffimenta & alia odoramenta.

PROSTANT

Flores Benzoin per sublimationem & per destillationem per retortam prolecti, Sublimiter Benzoin / Fleurs de Benjoin ou par sublimation ou par destillation par la cornue. Gaudent aciditate, pectorales sunt & asthmaticis conducibiles. Dosis grana tria ad decem &c. Priores flores ut paratu ita & virtute elegantiores sunt.

Oleum Benzoin, Benzoin. Oehl / Huile de Benjoin; Valet in catarrhis ad pectus depluentibus, commendatur ad vulnera & ulcera, odontalgicum quoque est remedium, Aromatariis & unguentariis quoque usu venire potest.

Tinctura Benzoës, seu Lac virginis, Benzoin-Tinctur oder Jungfrauen-Milch / Lait virginal ou Teinture de Benzoës. Tanquam cosmeticum ad maculas tollendas & nitorem faciei conservandum commendatur, dum hæc tinctura aquæ instillatur lactescit, & constituit sic dictum Lac virginis, ad quatuor uncias aquæ sumitur drachma una plus minus Tincturæ. Asthmaticis & aliis pectoris affectibus laborantibus ad aliquot guttas propinari potest.

P I X.

Est substantia resinosa nigricans, splendescens, ignis calore in furnis, vel destillatione per descensum ex foliis & arboribus resinosis & piceis ut pini, abietis &c. collecta & prolecta, primo liquida, hinc igne inspissata, saporis resinosi, odoris gravis. Constat ex volatili oïso incluso resinæ & crassis terreis.

Robustissimis etiam in dysenteria aliquando datum una cum cera, in forma pilularum. Externe virtute discutienti, temperandi, mulcendi cum resinis aliis convenit, ingreditur emplastra & cerata, ob vim conglutinantem, it. ad tineas capitis & alopecias.

℞. Pic. ℥iij. resin. pin. ʒj virid. æris. Oli Romana ʒ℥. Ar. viv. ʒj. coq. c. + to f. emplastrum contra tineam applicandum, & biduum relinquendum, postea removendum, ut hujus beneficio radices pilorum simul evellantur.

STY-

Pix, *ωλοα, Pech / Poix*

Placet Picis Historiam quam ex JOH. CONRADE AXTHII TRACT. DE ARBORIBUS CONIFERIS ET PICE CONFICIENDA extraxit LANGIUS, apponere. Arbores ex quibus pix habetur diversæ sunt, Abies, Picea, Pinaster &c. Hæ omnes morbo aliquo subinde laborant, dum nempe non solum cor, sed etiam

pax

pars externa caudicis, abundantiori succo resinoso liquidiori reple-
 tur, unde strangulantur quodammodo ab abundantia largissimi suc-
 ci nutritii, vocaturque hoc vitium **TÆDA**, **Rhünholz**.
 Et hæc affectio seu morbus Pino & Pinastro propria est, pati-
 untur tamen eam subinde etiam reliquæ. Ex hac tæda tum naturali
 tum artificiali conficitur Pix. Tæda autem artificialis hoc
 modo fit. Mense Majo decresciente Luna adeunt operatores
 Piceas & Pinastros detrahuntque corticem. Incipiunt in parte su-
 perna, qua ascia pertingere possunt & detrahunt corticem latitudi-
 ne trium digitorum usque in partem imam, ita tamen, ut pedibus
 duobus à terra plaga absit; deinde sinunt corticem in arbore, lati-
 tudine unius circiter palmæ & iterum plagam inferunt, & sic per-
 gunt, donec tota arbor ita sit sauciata, quem laborem vocant **ge-
 lagen** / ipsos lucos autem seu plagas **lagen**. Duobus aut tribus
 annis plagæ illæ ita sunt repletæ resina, ut deradi se patiatur. Ac-
 cingunt itaque operatores **die Hartz scheerer** se operi & induunt tu-
 nicas lineas breves & ubique consutas **Hartz - Kappen** / cultrisque
 ancipitibus incurvis longis baculis infixis **mit den Hartzmessern**
 deradunt resinam eamque recondunt in vasculis seu sportalis ex
 cortice sorbi sylvestris factis, & deinde in acervum dictam mate-
 riam congerunt. Tæda hæc picem dat. Faciunt nempe in offici-
 nis suis furnum quadratum, oblongum, in quo duobus fere pe-
 dibus à terra ponunt duos canales ligneos, in posteriori parte tan-
 tum prominentes, his imponunt ollas figulinas tres oblongas in
 fundo foramine donatas, quas tædis aut resina replent, dein ac-
 cendant ignem intra fornacem & liquefscens resina à calore stillat
 in canales suppositos è quibus effluens vasis certis excipitur. Sunt
 etiam qui ex ipso ligno per distillationem per descensum picem ex-
 torquent. Pix quædam dicitur **NAVALIS LIQUIDA**, **PISSA**,
Schiffdörr / **TARC** ou **GOUDRAN**, **GOUDRON**, quæ navi-
 bus dolisque potissimum picandis inservit, & **PIX COMMU-
 NIS NIGRA**, **Schwarz Pech** / **Poix noire**. Sicca est quoniam
 omni humiditate est orbata, unde ex pice liquida hæc facile para-
 ri potest. Hæc ultima, quæ in usus varios opificibus cedit, in
 usum præsertim Medicum recipitur. Interne vix usurpatur. Pice
 solent uti in atrophia aut aridura membrorum, ubi his empla-
 strum inde confectum imponitur. Sunt qui picem commendant

præsertim sutoriam , quæ fit picem cum sevo miscendo , ad clavos pedum. Sanguinem quoque sistere dicitur. Vulneribus equorum conducit & scabiei ovium medetur.

STYRAX CALAMITA.

Est substantia resinosa , pinguis , mollecula , ex flavo rufescens , in grumos vel micas variæ magnitudinis collecta , ex trunco arboris styracis foliis mali cotonei in insulis Massiliensibus & locis calidioribus , saporis subacris lenti aromatici , odoris suavis. Habetur etiam styrax liquida , quæ sponte fluit , estque substantia liquida , resinosa , terebinthina crassior & spissior , ex flavo ferruginea , collecta ex corticibus arboris styracis , folio mali cotonei , saporis acris aromatici oleosi , odoris fragrantis gravis.

Convenit cum tacamahaca sed cum odoris sit fragrantioris , conducit in corroborandis nervis , cerebro , spiritibus ut & utero , convenit & cum benzoë sed abest dulcedo , interne datur velut mastiche , externe recipitur inter suffimigia.

℞. Styrac. calam. benz. ana ʒj Mastich. oliban. an ʒss L. O. gr. j. succ. liquir. sol. in elix. propr. q. s. f. pil. in obstructionibus cerebri cum doloribus , in coryza.

Sublimantur etiam flores , qui exterius in doloribus pudendorum specifici sunt , vel soli cum modico Oli applicati.

RE-

Στυράξ, Storax, Styrax / Storax / STORAX.

Est arbor flore monopetalo veluti infundibuliformi , multifido , è cujus calyce surgit pistillum , posticæ floris parti adinstar clavi

clavi infixum, quod deinde abit in fructum subrotundum, carnosum, uno vel altero ossiculo plerumque foetum, in quo nucleus continetur.

Styrax folio Mali Cotonei C. B. Pin. 452. Styrax arbor J. B. I. 341. Styrax Lob. Icon. 151.

In regionibus calidioribus etiam Europæis atque Italia reperitur, ast non fundit resinam, nisi in Orientalioribus, Syria Pamphilia Cilicia &c.

Resina hæc, quæ dicitur *Styrax calamita* à cannarum calamis, & arundinibus, quibus inclusa olim advehebatur, hodie in vesicis adfertur.

Styrax conducit quoque in affectibus pectoris tussi, asthmate catarrhis raucedine, gravedine &c. calefacit, discutit, atque resolvit. Ingrediens est *Theriaca*.

IN OFFICINIS PROSTANT

Styrax sive *Storax expressa*, sive *Resina Styracis*, *Storax-Harz* / *Resine de Storax*, quæ longe est nobilior.

Pilulae de Styrace seu de *Storace*, *Pillen von Storax* / *Pilules de Storax*, commendantur in affectibus catarrhalibus & tussi serina sistenda, ut & prægnantibus, cum metu abortus tussientibus. Dosis ad grana sex ad octo decem &c. Scrupulus continet *Opii* grana duo circiter.

Trochisci fumales cum & sine moscho, *Rauch-Täffelein mit und ohne Bisam* / *Trochisques à parfum musqués & sans musc.*

Candelæ Fumales, *Rauchkerzlein* / *Cloux à parfum.*

Massa ad fornacem, *Ofenlack* / aut καλὴ ἔσχαλη, *Storax* / *Masse d'Espagne odoriferante*. Hujus & antecedentium præparatorum usus ex nomine patet.

Styrax liquida, *STYRAX LIQUIDUS*, weicher oder fließender *Storax* / *Storax-Honig* / *Storax liquide*, utique deberet esse id pro quo ab authore venditatur & sic esset præferenda priori. Haud pauci autem plerumque *Styracem* liquidam factitiam esse autumant, ex *Styrace calamita* in oleo ac vino soluta & cum tantillo *Terebinthinæ* aut resinæ mixtam. Optimum est, quod pro usu interno non multum usurpetur. Externe interim ob vim bal-

balsamicam in vulneribus & ulceribus, doloribus mitigandis, nervisque roborandis conducere potest.

RESINÆ LIQUIDÆ SALE VOLATILI OLEOSO CONSTANTES.

TEREBINTHINA.

Est substantia resinosa, transparens mollecula, resina laricea crassior, coloris flavescentis ad cœruleum vergentis, collecta ex trunco arboris Terebinthi ad imam medullam fauciato, saporis acris amaricantis resinosi, odoris fragrantis & gravis, & hæc quidem est Cypriæ descriptio. Vulgaris colligitur in Germania, Norvvegia ex truncis pini & abietis junioribus fauciatis, quæ dum lavatur aqua, donec limpida tota iterum possit decantari, depurata dicitur.

[Terebinthina vera ex Cypro vel Chio Insula allata nunc raro est in usu apud nos, loco hujus usurpatur Terebinthina Veneta dicta, & est resina liquida collecta ex arbore laricis, consistentia mellis novi, coloris flavescentis, saporis acris & amaricantis.]

Respondet superioribus resinis & gummatibus ficcis, ast cum gaudeat &e volatili copioso balsamico oleo sociato & temperato, vim suam per diuresin exerente, multivarii usus est: inprimis medetur tussi, asthmati, pleuritidi, nephritidi, stranguriæ, gonorrhææ, fluori albo, & sanandis vulneribus tam internis quam externis. Alvum facit apertam in majori dosi.

Externe in nervorum vitiis & tumoribus discutiendis nulli inferior est, additur quoque clysteribus tam vulnerariis

riis quam anticolicis & antinephriticis, vesicæ utero & intestinis injiciendis.

In genere datur à ʒʒ ad ʒj. datur lota cum vitello ovi, vel in Emulsione.

℞. Tereb. ʒʒ. cape ex vitell. ovi add. tantillum sacchari contra tussim, addito succo Citri contra pleuritidem, addito syrupo symphiti ad vulnera & ulcera interna, præcipue renum & vesicæ.

℞. Sem. papav. ʒij Melon. ʒʒ. f. ex ▽ Portulac. Petrofel. ana ʒiij emuls. add. ʒʒ tereb. gt. vij. in nephritide & lumborum dolore.

. Tereb ʒij rhabarb. ʒj Merc. virid. gr. iij sacch. ʒñ ʒʒ. cap. cum vitello ovi contra gonorrhæam virulentam pro duabus dosibus.

℞. Rhabarb. tost. Nuc. Mosch. tost. borrac. probe calcinat. oss. sep. terræ alum. dulc. ana ʒj Merc. virid. gr. iij. tereb. q. s. f. pil. in gonorrhæa sistenda, pro quatuor vicibus.

Post curatam maxime pleuritidem residuis tamen adhuc doloribus. ℞. Pic. naval. ʒiʒ. flor. ʒis ʒʒ ceræ ʒvj. tereb. ʒj ʒʒ chamom. q. s. f. emplastr.

Fiunt etiam clysteres in passionibus colicis non spernendi. ℞. Urinæ human. ʒij tereb. venet. ʒj vitell. ovor. q. s. f. clyster injiciendus; parari etiam hoc modo potest cum lacte bubulo.

BAL-

Τερέβινθος, TEREBINTHUS, Terbenthin-Baum / TERE-
BINTE.

Est arbor flore apetalò, plurimis nempe staminibus constante apicibus donatis, embryones autem iis Terebinthi speciebus

bus inuasci solent, quæ floribus carent, abeuntque deinde in testam nunc unicapsularem nunc bicapsularem, semine foetam oblongo. His notis addenda sunt folia per conjugationes costæ affixa cui summæ folium impar innascitur.

Terebinthus vulgaris C. B. Pin. 400. Terebinthus J. B. I. 278. & Dod. Pempt. 870.

Reperitur arbor hæc præprimis in insula Chio & Cyprio, unde Terebinthina Chia & Cypria vocatur. Invenitur quoque in Syria, Arabia, circa Montem Idam, Macedonia, item in Gallia Hispania aliisque Europæ locis. Ex Terebintho vel sponte vel per incisionem effluit resina hæc quæ non usurpatur, nisi quod in Theriacam recipiatur. Quoniam olim Terebinthina per Venetiam ad nos devehebatur, Terebinthina Veneta audiebat. Ab hac non differt TEREBINTHINA VULGARIS nisi in eo quod sit fluidior parum, & coloris magis flavescentis, Terbenthin/Terberthin-Harz/ TEREBINTHINE. Ex variis arboribus resiniferis Larice præcipue abiete atque Pinu &c. obtinetur. Vulnerantur nempe hæ arbores terebra ad cor usque, sic extillat resina Terebinthina dicta. Arbores juvenulæ splendidiorem, vetustiores flavescentem magis suppeditant. In sylva Hercynia ex abietibus præsertim acquiritur Terebinthina, quam R. J. U. S. appellat Argentoratensem. Optima est quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit. Præfertur semper fere ab omnibus Terebinthina Veneta, quanquam multi sint, qui demonstrare conantur illam nihil aliud quoque esse, quam ipsius abietis resinam. Si dicendum quod res est, non nisi puritatis gradu videntur differre. Et hinc fit quod una species alteri substituitur. Dicente E. T. M. U. L. L. E. R. O nil melius purgat renes quam Terebinthina, unde & calculi præcaventur & Urina odore violaceo imbuatur, ubi curiosum est, quod non solum hunc odorem violaceum largiatur Terebinthina, si per os assumatur, sed & si vel carpis manuum affricata fuerit, vel si quis versetur in locis ubi Terebinthina coquitur, destillatur, aut etiam balsamum Sulphuris Terebinthinatum præparatur. In exulcerationibus renum, atque vesicæ primatum ducit. Ob vim balsamicam plurima ingreditur emplastra, & unguenta, digerit, abstergit atque emollit, ulcera & vulnera mundificat,

ificat, suppurat atque maturat. Pro usu interno oblati seu pane azymo involuta, aut in aqueo liquore mediante vitello ovi dissoluta adhibetur, vel inspissata in pilulas redigitur. Sunt qui in dosi Terebinthinæ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ascendunt. In diarrhæis & dysenteriiis frequenter immiscetur clysteribus, nunquam autem mixtio fieri potest, nisi cum vitello ovi, ubi notandum, quod Terebinthina prius probe cum vitello sit subigenda, antequam affundatur brodium.

IN OFFICINIS EXTANT

Terebinthina cocta, gekochter Terbenthin, *Terebenthine cuite*, quæ commodius assumitur.

Aqua anhaltina completa & incompleta, Anhaltisch Wasser mit und ohne Bism / *Eau anhaltine complete & incomplete*, cujus ingrediens primum est Terebinthina. Aqua hæc ob vim ingredientium balsamicam & spirituosam, nauseabundum licet saporem conciliantium, adhiberi poterit in iis affectibus, ubi sanguinis motu majore opus, tonusque roborandus & viscera confortanda; hinc externe & interne locum habet in catarrhis & doloribus, à causa ut loquuntur, frigida ortis, in arthritide vaga, Paralyfi, Apoplexia, tremore, Lethargo, vertigine, in animi deliquiis, affectibus ventriculi à cruditate acida & viscida præsertim productis, in flatibus, in colica, variisque affectibus uterinis, ut & certo respectu in calculo, vim enim diureticam obtinet. In odontalgia quoque conducit, si una aut altera gutta denti cavo instilletur. Interne datur per se ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. & ultra pro ratione circumstantiarum, vel miscetur cum aliis. Externe membra eadem foventur.

Aqua contra Gonorrhæam Quercetani, Wasser gegen den Drüpper / *Eau de Quercetan contre la Gonorrhée*, partes Spermatikas egregie deterget, & propterea in gonorrhœa virulenta, tum recentium etiam inveterata, convenit. Datur à $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ in vehiculo.

Pilulae de Terebinthina cocta, Pillen von gekochtem Terbenthin / *Pilules de Terebenthine cuite*. Dosis ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ & ultra.

Spiritus Terebinthinæ, Terbenthin-Geist / *Esprit de Terebenthine*, nihil aliud est quam Oleum Terebinthinæ album.

Oleum Terebinthinæ, Terbenthin-Dehl / *Huile de Terebenthine*. Spiritus Terebinthinæ abstergit, urinam & calculum pellit, ulcera

ulcera mundificat &c. unde frequentissime in gonorrhœa virulenta adhibetur. Externe vulnerarius est atque balsamicus, valet imprimis contra frigus hyemale mammarum aliarumque partium, quas inunctus præservat & læsas curat. Per os propinatur ad guttas 10. 20. & ultra. Oleum flavum iisdem virtutibus gaudet, conducit etiam membris à frigore læsis.

Balsamum Sulphuris Terebinthinatum, Schwefel-Balsam mit Terbenthin-Dehl / Beaume de Souphre avec l'Huile de Terebenthine.
Exulcerationibus tam externis quam internis conducit, in gonorrhœa prodest, præservat à putredine, hinc etiam in peste & morbis malignis laudatur. Datur ad guttas sex decem &c.

BALSAMUM PERUVIANUM ET TOLUTANUM NIGRUM.

Balsamum Peruvianum est liquor oleosus viscosus tenax, balsamicus nigricans ex arbore Hoitziloxilt Hernandez dicta, ramis cortice & ligno excoctus & saporis & odoris balsamo albo debilioris & ignobilioris. Fluit illud etiam partim sponte, partim ex arbore sauciata, est sacchari instar coagulabile.

Spirituosius est & subtilius terebinthina & in specie confert in phthisi. In vitello ovi solut. datur à gr. v. ad 3℔. exhibetur ut terebinthina, additurque pro specifico clysteribus in erosionem intestinorum,

℞. Bals. Peruv. 3℔. Junip. 3iij vitell. ovi q. s. ad stomachum confortandum.

℞. Bals. Peruv. 3ij ʒo succin. 3℔. f. liniment. ad epilepticas convulsiones.

In phthisi conjungitur cum elix. p. p. f. acido ad 3j cuius gt. vj ad x exhibentur, & decocto vel syrupo thoracico vel aqua hordei.

In majori quantitate sudorem movet, sic in morbis malignis

lignis ꝑeis. ℞. res. lign. guajac. ʒß. ʒ. Guajac. vel lign. rhod.
gt. ij Bez. min. ʒß. Balf. Peruv. q. s. f. pil. sudoriferæ no-
cturnæ.

BAL-

BALSAMUM PERUVIANUM ET TOLUTANUM NI-
GRUM, Author hæc duo Balsama confundit, alii vero distin-
guunt.

BALSAMUM PERUVIANUM, BALSAMUM INDICUM NI-
GRUM, Schwarzer, Indianischer oder Peruvianischer Balsam/
BEAUME DE PEROU.

Arbor balsamum hoc largiens quæ ab aliis folia myrti, ab
aliis amygdali habere dicitur, & nondum satis descripta est, in
Peru & Brasilia reperitur.

Balsamum Peruvianum, quod densum, ponderosum, sapo-
ris acris & odoris grati est, egregium existit aromaticum, revera
balsamicum analepticum & summe anodynum, concretum, ut in-
quit ETTMULLERUS, anomalum est, quia neque cum aqueis
neque oleosis, neque volatilibus intime miscetur. Dissolvitur
quidem in saccharo dissoluto, si vero in aquam infunditur, ite-
rum se resolvit. Cum Spiritu Vini optime quidem commiscetur,
sed si refrigescat supernatat iterum, propterea si eo uti voluerimus,
in ovo leniter cocto solvi & assumi potest, vel miscetur cum sac-
charo. Externe propter viscosam substantiam & nimiam glutino-
sitatem non absque molestia applicatur, præcavetur hoc optime
si in forma liquida cum vitello ovi probe subigatur; hoc enim
modo facile spiritibus & oleosis redditur commiscibile.

Calefacit, siccatur, discutit, roborat partes, putredini resistit,
conducit in anorexia, prodest in omnibus pectoris affectibus, asth-
mate, phthisi, dolore nephritico, mensibus retentis hepate obstru-
cto, ac utero squalido & gonorrhœa virulenta &c. Externe lenit
dolores ex humoribus frigidis ortos caput roborat, ac nervosas
partes contracta sanat, arthriticis doloribus summe confert, in
vulneribus consolidandis proficuum, lienem durum emollit, do-
lorem nephriticum lenit, & emplastra stomachica ingreditur.

BALSAMUM TOLUTANUM, BALSAMUM DE TOLU,
Balsam aus Tolu / BEAUME DE TOLU.

Profluit & extrahitur ex arbore pruno aut ut alii volunt Pinui simili, in provincia Tolu Americæ, hoc Balsamum resinofum, viscosum, coloris rubicundi, odoris grati & citrati. Nauseam non causatur assumptum. Cum balsamo peruviano coincidit ratione virtutum, sed rarius est.

Præter hæc duo balsama prostat etiam BALSAMUM PERUVIANUM SICCUM RUBRUM & ODORATUM, BEAUME ROUGE, BEAUME DURE, BEAUME EN COQUE, ex ramis arboris stillans colore albicante, sed in sole exsiccatum rubescit.

BALSAMUM PERUVIANUM ALBUM.

Est liquor oleosus, tenax, limpidus ex albo flavescens terebînthina consistentia tenuior, stillans ex arbore Americana eadem, saporis acriusculi aliquantum amari, odoris fragrantis & grati.

Est potentius nigro, specificè commendatur in diarrhœa & gonorrhœa, ubi cum adstringentibus formantur pilulæ.

Oleum destillatum statim concrescit in salem instar sacchari, candidum velut camphora, quod nobile est in obstructionibus uteri, tussi & asthmate.

BAL-

Datur ad guttas quinque decem &c. in affectibus pectoris multum conducit.

BAL-

BALSAMUM DE COPAIVA.

Est liquor oleosus, viscosus, tenax, terebinthinæ consistentia, balsamicus limpidus, subflavus, stillans ex arboris Americanæ Copiava Bontii trunco ad medullam usque vulnerato, saporis acriusculi amaricantis aromatici, odoris fragrantis. Nihil differt à Peruviano nisi quod in fluore albo & gonorrhœa sit specificum, datur ut Peruvianum à ʒss ad ʒj.

℞. Rhabarb. ʒj. bals. copaiv. ʒiſs. ꝯ vir. gr. ij. solv. in vitell. ovi, singulare est in fluore albo.

℞. Extr. lign. sassaf. cui proprii olei aliquid admixtum est ʒss Bals. Copaiv. gr. xv. vitell. ov. q. s. cape pro gonorrhœa & fluore albo.

℞. Succin. præpar. ʒj. bals. Copaiv. q. s. f. pil. stipticæ ex ▽ Hormini.

A M -

BALSAMUM DE COPAIBA, COPAHU, COPAU, COPOLYVA, COPAIF, CAMPAIF, GAMELO, BALSAMUM INDICUM ALBUM quoque vocatur, & cum antecedente sæpius confunditur, weisser Indianischer Balsam/BEAUME DE COPAIBA.

Extillat ex arbore in Brasilia, Mense Majo & Junio, tempore plenilunii vulnerata & quidem tanta, ut ferunt, in copia, ut spatio trium horarum duodecim libræ colligi possint. Vulnus obducitur postmodum cera aut argilla, & quando post quindecim dierum spatium rursus adaperitur, majori adhuc in copia defluit.

Cum vitello ovi optime assumitur. Hoc & antecedentia balsama in odoramentis quoque usurpantur.

I m

IN OFFICINIS PROSTAT

Tinctura Balsami Indici albi, Tinctur von weißem Indianischem Balsam / Teinture de Beaume de Copayba. Fragens hæc Tinctura medicamentum est cephalicum, nervinum, roborans & cardiacum, conducit quoque in gonorrhœa virulenta, Datur ad guttas decem, viginti & ultra.

AMBRA LIQUIDA.

Est liquor resinofus, oleofus, pinguis crassiusculus, terebinthina consistentia tenuior & dilutior, coloris ex flavo rufescentis, stillans ex arbore Mexicana, saporis acris aromatici, odoris ad styracem accedentis. Styraci respondet, & potius externo quam interno usui dicata est, adhibetur ut terebinthina.

℞. Liquid. ambr. ʒij Mosch. gr. j f. linimentum ventriculo applicandum.

℞. Ambr. liquid. ʒj tacamahac ʒj f. emplastrum temporibus ad capitis dolorem applicandum.

O P O.

Liquidambra, liquidambar, Liquidamber / flüßige Ambra/weiße Ambra/Liquidambre. Arbor ex qua extillat vocatur à quibusdam Ococol.

Emollit maturat resolvit atque consolidat, conducit ad duritiem uteri, rheumatismum malum ischiaticum, & debilitatem nervorum.

OPOBALSAMUM.

Est substantia liquida balsamica oleosa ac crassiuscula
lim-

limpida, albicans, collecta ex arbuscula Syriaca & Ægyptiaca, Balsamum dicta, saporis acris aromatici, odoris fragrantis, Huit hoc sponte ex arbuscula. Fructus dicitur carpobalsamum, lignum vero xylobalsamum.

Recentissime collectum & destillatum oleum præbet fragrantissimum, ubi annosius fit terebinthinaceum fere habet odorem.

Copaivæ respondet, sed spirituosius & subtilius est, in specie laudatur in viscerum debilitate; Alpinus contra sterilitatem in Ægypto adhiberi refert.

Externe in nervorum vitiis applicatur.

℞. Opobals. ʒj. spic. nard. q. s. f. bol. vel dissolv. in vitell. ovi & cape in debili ventriculo, add. rad. helenii pro appetitu excitando.

℞. Opobals. ʒj. succin. præpar. q. s. f. bolus vel cum vitello ovi dilue & cape pro fluore albo & gonorrhœa & Alpino teste contra sterilitatem.

LA-

BALSAMUM VERUM, JUDAICUM, GILEADENSE, SYRIACUM, ÆGYPTIACUM, BALSAMÆLEUM, OLEUM BALSAMI, BALSAMUM DE MECCHA, LACHRYMA BALSAMI. Balsam/gerechter Balsam. BEAUME BLANC OU VRAY BEAUME, BEAUME DE JUDEE, OU DE GRAND CAYRE, BEAUME DE SYRIE, BEAUME DE MECQUE.

De arbore, ex qua profluit, dictum sub Carpobalsamo.

Ex arbore partim sponte, partim ex læsa sive incisa Junio, Julio, Augusto, profluit, & in vascula recipitur. Statim, ut loquitur ALPINUS, eductum colore albescit & postea in viridem, tertio in aureum atque demum in melleum mutatur. Stillatum ejus est clarum, quod mox turbatur, crassescit & tertio denique tenuissimum atque clarissimum fit, tandemque senio confectum,

ut Terebinthina crassescit. Olet in principio recentissime destillatum acutissimo atque eximio odore, qui multis capitis dolorem concitare solet, & aliquibus etiam sanguinem ex naribus promovere, odoris vero illa acuties ac vehementia tempore obtunditur & gravior evadit, Senio vero confectum vix sentitur in eo aliquis odor. Est etiam in principio levissimum, & dilui facillimum, ita ut si in aqua vel lacte ex alto distillet in imo vasis residere non patiatur, clarum vero aureumque redditum, ac ab omni fece purgatissimum mediocri levitate præditum est, ita ut instillatum in aquam, etsi fundum petat, tamen cito rursus in superficiem aquæ feratur, cum eaque cito resolvatur, quæ omnia, quo annosius eo obscurius habet. Hactenus Alpinus.

Cum hocce Balsamum haud raro adulteretur, sequentes Notas observandas esse ajunt Authores, 1. Si una gutta aquæ vase excepta infusa fuerit, illico sursum evehitur ac super aquæ superficiem expanditur, pelliculæ albæ formam referens, quam paulo post cuspide colligere licet a concretionem, exuto colore flavo qui in album abit 2. Gut- tula opobalsami panno infusa illic subsistit, neque illum ulterius subi- ens ac ope aquæ tepidæ potest abstergi vel affricando digitis si exicca- ta 3. Gutta Lacti infusa huic commixta ac specietenus concorporata sursum statim effertur, & supra superficiem expanditur, partem maxime sibi vicinam lacti coagulans: quibus 4. addunt odorem adeo fragrantem, ut sanguinem proliciat. Quas tamen ultimas no- tas non adeo necessarias esse volunt, cum sufficiat Opobalsamum condensari in lacte, & odor non nisi recentissimo eique tantum- modo competat, qui aut sponte exudat, aut per incisionem ef- fluit, minus vero illi, qui per decoctionem ligni & fructus aut etiam destillationis ope prolicitur.

Balsamum, inquit SCHROEDERUS, inter olea quævis & balsama omnium est laudatissimum, præstantissimum, ac toto or- be celebratum, utpote quod vires habeat abigendis morbis tam internis quam externis nulli medicamento secundas. Confert fe- bricitantibus asthmaticis, jecoris obstructions solvit, menses mo- vet, stomachi dolores sedat, Phthisicos juvat, appetitum excitat. Recens igneis & aëreis partibus abundat, & suavissimo halitu per os exhibitum, viscerum putredinem & corruptionem tollit, ab- scëssibus internis pulmonum hepatis & renum conducit. Exter-

ne vulnera consolidat ulceraque sordida expurgat. Ab Ægyptiis & Arabibus vix non pro panacea habetur. Ob vim alexipharmacam, & vim venenis venenatorumque moribus resistendi ingreditur Theriacam. Substituatur tamen Oleum Nucis moschatæ expressum optimæ notæ.

LADANUM.

Est substantia partim resinosa, partim gummosa pinguis, indurata ex gryseo, & fusco nigricans, multis arenulis permixta, collecta ex Ladani Cretici, vel Cysti Ladani-feræ foliorum superficie, & in spiras contorta, saporis amaricantis, odoris, dum accenditur fragrantis & grati: nec in aqueis nec oleosis, sed tantum spirituosissimis solvitur, principia activa sunt Ætheria volatilia oleosa cum multis partibus terreis, propter quas constringit, fibras confortat, cephalicis nervinis maritatur. Datur solut. in ℞u vini à ℥j ad 3℔.

Ingreditur etiam candelas odoratas & balsama apoplectica, tum ratione virtutis, tum ratione nigredinis quia tingit, solvitur nempe ladanum prius in ℞u vini, solutum inspissatum, additur ʒo menth. caryoph. &c.

STY-

CISTUS LADANIFERA, Cisten-Röflein/Ladanumbäumlein/
CISTUS LADANIFERE.

Est frutex flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positus constante; ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum subrotundum vel acuminatum, apice plerumque dehiscentem, multicapsularem, seminibusque foetum ut plurimum exiguis.

Cistus Ladanifera Monspeliensium C. B. Pin. 467. *Cistus ladanifera* five *Ledon Monspessulanum* angusto folio nigricans J. B. 2. 10.

Cistus Ladanifera, Hispanica, Salicis folio, flore candido Tourn. J. R. H. cl. 6. S. 4. g. 10. *Cistus ladanifera* Hispanica, incana, C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon*. 1. angustifolium flore omnino interdum albo. Clus. Hist. 77.

Cistus ladanifera Cretica flore purpureo Tourn. Coroll. J. R. H. *Ladanum Creticum* Prosper. Alpin. Exot. 88. *Cistus* è qua *Ladanum* in Creta colligitur Bellon. observ. l. i. c. 7.

Sicuti duæ priores species in Gallia & Hispania Majorumque florentes reperiuntur, ita posterior in Cantalia Cypro Græcia præsertim luxuriat, & ex hac potissimum colligitur *Ladanum*, *Labdanum*, *Ladum* *Ladanum*/ *Ladanum* de quo hic sermo. De modo colligendi hoc *Ladanum* diversi sunt authores, quidam ex barbis aliisque pilis hircorum, quibus, dum circa frutices hos pascuntur, adhæret, obtineri putant, unde *LADANUM DE BARBA*, *LADANUM DE BARBE* & *LADANUM NATUREL* vocatur. Alii, ut *LANGIUS* notat, funiculos præsertim coriaceos per frutices trahunt, ut resina ipsis adhæreat. *BELLONIUS* ex propria observatione docet, Græcos peculiare parare instrumentum rostro dentium exerto simile, cui affixæ sunt multæ ligulæ ac zonulæ ex corio rudi non præparato, quas leniter ardente Sirio affricant *Ladaniferis* foliis, ut adhæreat liquidus is humor, qui deinde à ligulis iterum abraditur labore pene ineffabili, cum per totas sæpe dies æstum intolerabilem ferre cogantur operatores.

Ladanum hoc, (nam de liquido cum rarum admodum sit hic non est sermo) emollit, digerit, maturat, acrimoniam *Lymphæ catarrhalis* mitigat, in tussi nocturna & affectibus asthmaticis conducit, stomacho quoque applicari potest in ejus vitiiis. Ingreditur varia emplastrâ consolidantiâ & anodyna item contra *Hernias*. R. *Ladani* ziiij. *Mastich.* 3ß. *Nuc. cupress.* no. iij. *Hypoc. terr.* sigill. ana 3j. *Picis nigr.* 3ij. *Terebinth.* Venet. *Cer. virgin.* ana 3j. *Rad. consolid. major* 3ß. *Msc. f. l. a.* emplastr. applicandum postquam intestina fuere reposita. Simul tamen debet usurpari *Spiritus Salis* optime rectificatus sequenti modo. *Vini generosi* libræ j, infundantur scrupuli quatuor *Spiritus* & infantibus

Bus sex annorum ad decem quotidie per viginti dies duæ propi-
nentur uncia. Infantibus quindecim annorum libræ vini infundi
debent drachmæ duæ spiritus, subjectis viginti annorum immisceri
debent eidem Vini quantitati drachmæ duæ semis vel tres instil-
lentur, & adultioribus concedi possunt drachmæ quinque spiritus
simili Vini quantitati remixta: Omnibus autem quolibet die duæ
uncia de hoc Vino spiritu salis imprægnato per 20. dies debent pro-
pinari. Est hoc famosum illud secretum PRIORIS DE CA-
BRIERES benignitate Ludovici magni revelatum.

STYRAX LIQUIDA.

Ambraë liquidæ succedanea est, & frequentius externe
quam interne usurpatur. v. styr. calam.

RESINA SALE TAM VOLATILI QUAM FIXO CUM INTENSISIMA AMARITIE CONSTANS.

MYRRHA.

Specificam vim obtinet resistendi putredini, referandi
obstructiones uteri, lumbricos expellendi, variolas & mor-
billos, & curandi morbos malignos quoscunque.

Est refina arida, dura, ex flavo ferruginea & nitens,
unguibus subinde pallidis permixta, in glebas compacta.
Collecta ex arbore spinosa Bola dicta, cui aliquando adna-
tæ inveniuntur glebæ magnæ, saporis subacris amari & aro-
matici, odoris fragrantis. Myrrha Stacte est, quæ sua spon-
te effluit.

Datur à ʒß. ad gr xv. in pilulis convenientius, quam
in cæteris formulis, datur tantum in parva dosi ob insignem

Qqqq. 3

ama.

amaritiem ; in majori dosi alvum laxat , simulque vim adstrictoriam habet in recessu. Famosissimæ sunt illæ pilulæ de tribus dictæ, seu pestilenciales Ruffi, quæ elixir proprietatis siccum dici merentur.

℞. Myrrh. gr. xv. borrac. ʒʒ cinam. ʒj. f. pulv. excipiendus vel conserv. menth. vel balsamo Peruviano pro formandis pilulis , ①i foliis obducendis ad mensium remoram.

℞. Myrrh. C. C. præpar. ʒ diaph. ana ʒʒ f. pulv. pro ij dosibus. Vel cum theriaca in forma pil exhibendus.

℞. Tinct. Myrrh. ess. Castor. ess. as. fœtid. ana ʒʒ cape ex ▽ flor. sambuc. ad promovendam maturationem variorum & morbillorum.

℞. Sabin. Mʒ Myrrh. ʒij lign. asphalt. troch. alhand. ana ʒj f. suffitus ad remoram mensium.

In halitibus uteri putridis. ℞. Myrrh. gr. iiij croc. orient. gr. iij. rad. Zedoar. ʒʒ. conf. anthos q. s. f. bolus.

℞. Aqu. theriacal. ʒj. — theriac. ʒij camph. gr. v. Myrrh. ʒj in malignis.

Convenit etiam me experto in tertiana & quartana, quas aliquando feliciter fugavi h. m.

℞. Myrrh. ʒʒ. ①absynth. ʒj extr. gentian. vel absynth. cent. min. ana ʒʒ f. pil. paulo ante paroxysmum , etiam si placuerit diebus vacuis assumendæ.

Singularis est etiam in defectu bilis ab obstructo poro vel vesicula à calculo. ℞. Rhabarb. ʒij myrrh. ʒʒ rad. helen. ʒʒ f. cum pauxillo sacchari pulvis , vel cum —u vini aucta helenii dosi tinctura, guttatim ex vino generoso vel jusculo exhibenda.

Externe vel per se vel cum Euphorbio inspergitur ossibus denudatis cariosis , vel cum —u vini extrahitur tinctura , quæ in sphacelo & gangræna specifica : egregio sæpe cum successu ingreditur etiam linimenta contra gingivas putridas,

tridas, fanguineas scorbuticas, sic & Tinct. Lacc. 3j Myrrh.
3^b alum. 3j mell. anthos. syr. gran. cherm. q. s.

R E-

MYRRHA, juxta POLISIUM, qui Myrrhologiam scripsit, est vocabulum Hebræum ab amaritudine derivatum, competitque non tantum succo & lacrymæ, sed & ipsi arbori, alii à Myrrha Cynaræ Cypriorum Regis filia in arborem conversa, alii vero à *μύρον* unguentum derivant, Myrrhen/ MYRRHE.

Arborem vel fruticem myrrham ferentem nondum clare descripserunt authores. Adinvenitur in Arabia plantarum pretiosarum feracissima.

Ex arbore Myrrha vel sponte sudat, & *سائل* Stacte appellatur, optimaque censetur, vel arte elicitur nempe per incisionem, sic destillat in substratas tegetes, pars vero circa caudicem concrescit. Myrrha hodie plerumque dividitur in MYRRHAM COMMUNEM, gemeine Myrrhen/ MYRRHE, & MYRRHAM ELECTAM quæ & Troglodytica audit, *außerlesene Myrrhen/MYRRHE CHOISIE*. Illa in glebas est redacta, externe ex flavo rufescens, micis quibusdam albicantibus interspersis, intus vero magis albescent. Hæc non æque in massa seu glebis apparet, sed tantum fragmentis avellanæ magnitudinem non excedentibus, colorisque est magis fulvi. Notas bonitatis supra allegatus author hastradit. 1. Friabilis quæ est, 2. lævis, 3. undiquaque concolor 4. quæ confecta intrinsecus lineas candidas intercurrentes habet, unguium speciem præ se ferentes. 5. Amara, 6. odorata, & acris eligenda venit. Ponderosa & picei coloris quæ est, merito rejicitur.

Myrrha calefacit, siccatur, attenuat, aperit, & subadstringit. Ob vim alexipharmacam ingrediens est Theriacæ & Mithridatii. Ob vim putredini resistendi in condiendis cadaveribus multi & magni est usus. Myrrha sudores alarum foetentes cum albumine ovi mixta curat, suffitusque ejus facie exceptus à rugis anilibus præservare præsentemque tollere dicitur. Dosis Myrrhæ est ad ʒss. ʒj. ʒij. Multas ingreditur compositiones, Elixiria proprietatis, pilulas unguenta & emplastra.

IN

Essentia Myrrhæ, Myrrhen-Essenz / Essence de Myrrhe. Usurpatur interne & externe, calefacit atque roborat, discutit atque aperit, sudorifera est atque alexipharmaca & anthelmintica atque stomachica. Externe convenit in gangræna sphacelo atque carie imprimis ossium, vulneribus & ulceribus sordidis. Antequam fiat extractio, digerenda prius Myrrha cum liquore Nitri fixi, unde discrepat ab hac essentia.

Tinctura Myrrhæ, Myrrhen-Zinctur / Teinture de Myrrhe, quæ absque ulla præcedente præparatione, cum Spiritu Vini extrahitur. Coincidit cum priori ratione virtutum & eadem dosi datur, nempe ad guttas decem, viginti, triginta & ultra.

Tinctura Myrrhæ succinata, Myrrhen-Zinctur mit Alstein / Teinture de Myrrhe succinée, quæ in affectibus uterinis præstantior præcedentibus habetur.

Oleum Myrrhæ destillatum, destilliertes Myrrhen-Dehl / Huile de Myrrhe distillée, quod aperit, attenuat, putredini resistit & in carie ossium atque gangræna conducit.

Oleum Myrrhæ per deliquium, sive Liquamen Myrrhæ, Huile de Myrrhe par defaillance. Eximium censetur in omnibus affectibus cutaneis, maculas delet, in specie à sole productas, scabiem herpetem & ulcera sanat, conducit egregie in fissuris mamillarum & ulceribus.

Trochisci de Myrrha, Myrrhen-Zeltlein / Trochisques de Myrrhe. Vi antihysterica pollent, menses provocant, partum faciunt & secundinas pellunt. Dantur ad scrupulum ad drachmam usque.

RESINÆ GUMMOSÆ ET SUCCI PURGANTES FORTIORES.

EUPHORBIIUM

Est substantia gummosa & resinosa concreta in guttas vel lachrymas ex pallido flavescentes, splendidas, modo rotundas, modo oblongas, ramosas & cavernosas, collecta ex tithymalo Mauritanico spinoso sarmentoso, semine tri-

triccocco ; saporis acerrimi exurentis nauseosi , odoris nullius.

Principia activa sunt Θ ia volatilia cum aliquibus fixis quæ maxime massæ nostræ sanguineæ adversantur , cum illa mixta excitant effervescentiam purgatricem. Θ ia fixa sunt in decoctis satis acribus.

Fortissime purgat , hinc specificam & potentem habet vim educendi hydropicorum aquas tam per superiora, quam per inferiora , prodest serosis melancholicis , nocet biliosis sanguineis. Vix se patitur cicurari , quod quidam tentant solvendo in Σ u Θ li , aceto , & hinc iterum inspissando, subsequente tamen nonnunquam ubi exhibetur inflammatione ventriculi & intestinorum excoriatione. Corrigitur amygdalis vel succo portulacæ.

Datur in substantia à gr. v. vij. ad x. extract. c. Σ u vini à gr. iij in robust. ad v. vij. Nunquam in pulvere datur propter causin , sed in pilulis , addito stimulo alcalico vel etiam purgante. Sic \mathcal{R} . Euphorb. gr. v. extr. coloc. g. iij. Θ Γ ri gr. i. caryoph. arom. gr. v. f. c. bals. peruv. vel elix. propr. P. pil. antihydopicæ.

\mathcal{R} . Euphorb. \mathcal{E} extr. absynth. \mathcal{E} j mell. q. s. f. bolus ad quartanam cum hydrope curandam.

\mathcal{R} . M. P. foetid. \mathcal{E} j Euphorb. gr. iij. succ. limon. q. s. f. pil. in morbis chronicis , præcipue hydrope.

\mathcal{R} . Euphorb. \mathcal{Z} j rad. ir. flor. \mathcal{Z} j ari \mathcal{Z} j f. pulvis inspergendus denudatis ossibus & cariosis, addi potest $\circ\circ$ dest. caryophyllorum.

\mathcal{R} . Extr. euphorb. admisce gr. iij. cuilibet purganti pro stimulo , in hydrope.

Pro excitandis soporosis. \mathcal{R} . ∇ serpill. organ. lil. convalli. ana \mathcal{Z} ij Euphorb. \mathcal{Z} ij f. decoct. quod naribus admoveatur.

Ad tumores scirrhosos sæpe cum fructu maximo D. Hermannus dissolvit euphorbium in oleo, tribusque vel quatuor diebus illos sustulit.

E L A-

Εὐφώρβιον, EUPHORBIVM, ab Euphorbo Juba Regis Mauritanorum Medico, & Antonii Musæ, qui Augusti Cæsaris Archiater fuit, fratre dictum, Euphorbium / Euphorbien. Cassi. EUPHORBE.

Euphorbium à TOURNEFORTIO in TRACT. DE MAT. MED. dicitur esse frutex hominis longitudinem superans, cujus radix crassa exterius fusca interior albicans existit. Truncus est nodosus, plenusque spinis, foliis vestitur rotundis sed paucioribus. Floribus gaudet pentapetalis solidis & brevibus è viridi albicantibus. Fructus est triangularis in tria loculamenta divisus, unico foeta semine. Tota planta lacte turget acri & corrosivo.

Euphorbium C. B. Pin. 387. & Dod. Pempt. 378. Tithymalus Mauritanicus aphyllus angulosus & spinosus ex quo Euphorbium officinarum Hort. Lugd. Bat. Herm.

In Africa, præsertim Lybia, hæc planta provenit. Succus ejus tantam acredinem esse perhibent, ut incolæ ejus fervorem expavescentes ovillas pelles circumligent eminusque plantam vulnerent, è quibus plagis copiosus succus defluit, qui postea concretus colligitur.

Correctionem alii instituunt cum aceto, succo citri, aliisque acidis. Interne vix debet in usum trahi & quidem non nisi valde annosum. Externe inter rubefacientia, imo vesicantia refertur. Convenit in punctura nervi. Additur linimentis & unguentis contra atrophiam, paralyin & similes artuum nervorumque affectus. Errhinum est potentissimum, si naribus indatur aut oris narium solum applicetur, vel cum saccharo vel cum amylo. Sunt qui hunc in finem Euphorbii ʒj cum rad. Ireos florentinæ ʒß commiscent. Alii Euphorbii ʒß vel ʒj in aquæ simplicis, vel liliorum convallium vel Majoranæ lbj decoquunt.

IN OFFICINIS PROSTAT



Oleum Euphorbii coctum, *Huile d'Euphorbe*, quod commendatur in affectibus nervorum sic dictis frigidis, paralyfi, in specie in catarrhis & lethargo, ut & in atrophia & alopecia, sed externo solum usu.

Oleum Euphorbii destillatum, *Huile d'Euphorbe destillée*, præterquam quod usibus modo dictis conveniat, humores crassos & pituitosos resolvit.

ELATERIUM.

Est succus ille viridis luridus & viscosus ex fructibus maturis cucumeris sylvestris asinini C. B. P. vel sua sponte vel leni compressione emissus, collectus & inspissatus, qui veterum est elaterium. Vel ex tota planta expressus coctus inspissatus coloris fusci, instar extracti, saporis amaricantis, nauseosi & vinosi.

Datur in affectibus deploratis chronicis, hydrope, cachexia, leucophlegmatia ad hydropem vergente, sursum enim & deorsum humores viscidos & aquosos expurgat.

Elaterii veterum dos. est à gr. iij ad v. recentiorum ad ʒj. quod si debite correctum sit succo limonum vel   Oli etiam delicatulis ad ʒj potest exhiberi.

℞. Elat. vulg. gr. xv. resin. Jal. gr. iij extr. troch. alhand. gr. j. f. pil. antihydricæ.

℞. Elater. veter. gr. iij conf. flor. persic. ʒj f. bolus antihydricus.

GUT.

ELATERIUM, quasi dicas exagitans turbasve ciens remedium,
getroctneter Eselskürbis, Cassi / ELATERIUM OU EXTRAIT DE
CONCOMBRE SAUVAGE.

Rrrr 2

Pro-

Probatur læve non asperum nec ponderosum, sed (verba sunt J. Bauh.) album nec aridum vel exustum, vehementer amarum & lucernæ objectum facile fragrans. Sunt qui annosum præ recenti commendant. Per longissimum enim temporis spatium virtutem suam servat. Adeo fortiter purgat, ut tunicas etiam internorum erodat, & vasorum oscula aperiat, quare vix amplius in usu: & si datur, adhiberi debet cum bdellio, tragacantha, aut lacte dulci vel mulsa, à quibus noxa illata aut inferenda vel curatur vel præservatur. Sunt qui optimam correctionem cum Spiritu Vitrioli institui statuunt. ET TMÜLLERUS suadet, ut elaterium per aliquot dies in vino infundatur, hocque postmodum abstracto admisceatur Spiritus Vini tartarizatus ad consistentiam Essentiæ liquidæ ad ℥ss ℥j propinandæ.

GUTTA GAMBA.

Est substantia gummosa & resinosa indurata, flavescent ex arbore pomifera Chinensi, Indis Coddampulli dicta & in Horto Malabarico [Tom. I. p. m. 41. ubi etiam D. Hermanni nostri literæ Columbæ datæ de hac arbore producuntur] descripta. Ex faucio enim trunco manat humor flavescent, qui collectus purgatur à fœcibus solutione in ∇ pluvia & inspissatione, sed lenissimo Δ e, alias nigrescit, in massam uniformem flavescentem, saporis primum resinosi, hinc acris caustici. Transfertur potissimum ad nos ex China, ubi affabre norunt tractare.

Virtutem suam purgantem paucae resinæ, sed largiori gummati habet inclusam, hydropicis specificam, quarum aquas tam per superiora quam inferiora educit. Datur etiam in scorbuticis, potissimum in substantia, rarius in portionibus, fiunt enim acres valde & inflammant fauces.

Datur à ℥ss ad ℥j potest & delicatulis dari, licet tormina excitet, hoc enim omnibus fere accidit purgantibus.

R. Gutt.

℞. Gutt. gamb. ʒ℥. extr. troch. alh. gr. ij syr. ros. ʒv
 ▽ Cinam. fœnic. ana ʒj M. f. mixt. purgans contra hydro-
 pem.

℞. Resin. jalap. gr. v. gutt. gamb. gr. v. vel vij diagr. gr.
 iij. ☉ Fri gr. v. ʒo d. caryoph. gt. ij syr. rhab. q. s.

[Optime exhibetur cum anatica quantitate Fri Olati &
 sic raro vomitum excitat.]

SCAM.

GUTTA GAMBA. Variis hic succus insignitur nominibus,
 SUCCUS INDICUS PURGANS, GUMMI GUTTÆ LAXATI-
 VUM, quod ad Podagram Barbaris gutta dictam conferat. GUTTA
 CAMBODIA, GOMMI GOTTÆ, GOMMI GITTA, GITTA
 GEMU, GUMMI DE GOA, GUMMI DE PERU, GUTTA DE
 PERU, quoniam etiam ex regno de Peru advehitur, GUMMI GE-
 MU, GUTTA GAMBA, GUMMI GAMANDRÆ, GUTTA GA-
 MANDRA, CHRYSOPUS. Gummi Gutta // GOMME GUTTE,
 ou GUTTE GOMME.

De ortu hujus succi inodori disputatum quam maxime fuit.
 Sunt qui pro succo composito ex scammonio & succo chelidonii
 majoris habent. Alii ex scammonio & Tithymalo, alii è Rhamno
 solutivo, alii è succo corticis frangulæ, alii è cataputiæ succo con-
 stare dicunt. ROSENBERG statuit esse lacrymam Ricini Indici
 croco Indico tinctam. BONTIUS ex Tithymali cujusdam specie
 derivari autumat, cui assentitur WEDELIUS succum hunc cur-
 cuma tingi asserens. Et licet ab authore nostro ex arbore obtine-
 ri dicatur, contradicit tamen DN. DE SYEN loco allegato, mo-
 nens Gummi Gotta ex arbore dicta profluens non esse confunden-
 dum cum vulgari, quod ex Esula Indica colligi testatur BONTIUS.
 TOURNEFORTIUS dicit esse plantam arbores scandentem, cu-
 jus caulis triangularis brachii crassitie, tumoribus spinosis obsi-
 tus, folia fundit foliis sedi majoris haud dissimilia.

Eligendum est gummi guttæ fulvum ex rubro flavescent, ni-
 tilum & sabulo carens; quod saliva solutum flavo tingat colore
 ad

ad candelam ardeat, & in aqua atque Spiritu Vini dissolvatur, quoniam duplici gaudet substantia gummosa altera, altera vero resinosa. Rejicit equidem HOFFMANNUS IN SCHROEDERUM solutionem cum menstruis aqueis factam tanquam heterogeneam & qua solummodo atomi quadam segregentur, non autem ipsum gummi vere solvatur, at hæc solutio merito conceditur, cum totam gummosam substantiam aquei liquores dissolvant, quæ non minus ac resina purgat & quidem mitius ac tutius.

Commendatur in morbis à serosa colluvie, & omnibus affectibus ab impuris humoribus in primis viis stagnantibus oriundis, hos enim efficacissime sursum deorsumque expurgat. Qui corrosivitatem ejus abhorrent, illam mitigare poterunt liquoribus acidis, ubi mitius purgat & interdum nullos vomitus excitat. Vix autem amplius in usum trahitur & pictoribus relinquitur.

SCAMMONIUM.

Est substantia resinosa nigricans, cum frangitur fulva splendens, collecta ex convolvuli specie scammonia Syriaca C. B. P. dicta, ubi vel in excavatam radicem, quæ aliquando ad capitis magnitudinem accedit, destillat succus, vel ex radice in taleolas scissa exprimitur & inspissatur, saporis acris nauseosi, odoris virosi.

Etiam si inter purgantia cholagoga sit relatum, tamen usus comprobavit esse catholicum, polychrestum, & in omnibus morbis conducere, ubi purgatione opus est. Hujus vis consistit in resina, cui acredo Cina indissolubili nexu est involuta.

Datur in substantia & extracto à ʒss ad gr. xv. robustiss. ad ʒj resin. à gr. vij. ad xv. in vitell. ovi.

℞. Scammon. crud. gr. vij. extr. troch. alhand. gr. iij.
 ʒss Cinam. gt. j. syr. cinam. ʒj ∇ borrag. fumar. ana ʒj. f.
 haustus purgans.

℞. Resin.

℞. Resin. Jalap. gr. viij scammon. gr. v. ꝯ dulc. gr. iij ꝯ cinam. gt. j. bals. peruv. q. s. f. pil.

℞. Scam. ꝯat. ꝯꝯ ꝯ dulc. ꝯj mucag. tragac. q. s. f. pilulæ
Riverio Calomelanos dictæ. v. plura in Jalappa.

A L O E.

Σκαμμωνία, σκαμμώνιον, SCAMMONEUM SCAMMONEA,
ἀπὸ τῆς σκαΐωλειν a fodienda & cavanda radice, dum succus colligitur.
Δακρυδίων, LACHRYMA, quod officinæ corrupte, DIAGRYDIUM
appellitant, PULVIS SYRIUS, à Patria, Syrische Scammonien/
SCAMMONEE.

Hunc succum fundens planta est species convolvuli, cujus cha-
racterem supra sub foldanella vide.

Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca Moris. Hist.
Oxon. p. 22. Scammonia Syriaca C. B. Pin. 294. Scammonia Sy-
riaca flore majore convolvuli J. B. 2. 163. Scammonium Syriacum
Antiochenum Lob. Icon. 620.

In calidis regionibus in Syria circa Antiochiam, in Mysia aliis-
que Asiæ regionibus, &c. reperitur.

TOURNEFORTIUS in Insula Lesbos & Samos quoque hanc
plantam offendit.

Scammonium optimum censetur, quod ex Antiochia ad nos ap-
portatur, & quod ex sola radice profluit & quidem probatur compa-
ctum, leve, tenerum, friabile, resinofum, splendens è cinereo nigricans,
amarum, odore virulento, inamoenum, in pulverem abiens album,
cum digitis tractatur, & aquæ immixtum lactescens. Improbatur du-
rum, ponderosum, nigrum & capillis plenum. Sunt quidam, qui re-
sinam prius extrahunt & caput mortuum pro sincero Scammonio
vendunt, sed fraus detegitur, illud immittendo in aquam, dum videli-
cet illa non imbuitur colore lacteo. Resolvit, stimulat, & potenter ex-
purgat humores biliosos & mucido serosos. Abhorrent quidam me-
dicorum ab usu hujus medicaminis quod ignea quasi caliditate exce-
dat, drasticam atque colliquativam vim habeat, & interdum enormes
cruciatu excitet, verum utut negari non possit, violenter ac satis vali-
de

de purgare Scammonium, interdum etiam periculosa symptomata excitare, si minus circumspēcte adhibeatur, attamen, si rite præparatum fuerit & correctum, si in debita ætate constitutis propinetur, si morborum aliarumque circumstantiarum ratio habeatur, medicamentum erit, quod egregios poterit edere effectus. In febribus ardentibus aliisque sic dictis morbis calidis exulare debet. Delicatulis & calidiorē constitutione præditis non est exhibendum. Non dandum infantibus, puerperis aut gravidis, aut viscerum imprimis ventriculi debilitate laborantibus. Sanguinem pellit, idcirco neque in hæmoptysi, neque in hæmorrhagiarum fluxu, neque in dysenteria offerendum. Flatus ciet & tormina excitat, ob visciditatem & terreas admixtas particulas, ideoque ab his liberandum & debito modo præparandum est. Dosis Scammonei propterea incerta est, quoniam unum majori resinæ copia gaudet quam alterum.

IN OFFICINIS PROSTANT

Scammonium præparatum, Dacrydium, seu corrupte, Diagrydium præparatum, præparierte Scammonien/ Diagrede, ou Dacrede préparée. Datur ad grana octo, quindecim &c.

Scammonium Sulphuratum aut Dacrydium Sulphuratum, geschwefelte Scammonien/ Scammonée, ou Dacrede Souphré, datur ut antecedens. Utrumque autem plerumque stimuli loco aliis additur purgantibus.

Resina seu Magisterium Scammonei, Scammonien-Harz/ Resine ou Magistere de Scammonée. Hæc tutius datur quam Dacrydium, eodem modo ac Resina Gialappæ in liquoribus spirituosus & aquosis & eadem dosi exhiberi potest; qua de re vide supra. Elegantes quoque pilulæ pellucidæ exinde parantur.

Pulvis Cornachini, Cornachins Purgier-Pulver/ Poudre Cornachine ou de Tribus. Ita dicitur à Cornachino qui commentarium in hunc pulverem scripsit, vocatur alias pulvis *Comitis de Warwick, Cerberus triceps, pulvis trium diabolorum.* Majoris securitatis & tormina evitandi gratia Dacrydio sulphurato, quod olim recipiebatur, substituta fuit resina. Cito & jucunde operatur, humores peccantes blande educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit, biliosos affectus curat, febrili imprimis fomiti expurgando idoneus. Dosis in infantibus grana aliquot, pueris ad scrupulum semis, adultis ad scrupulum

lum unum, drachmam semis, scrupulos duos usque: Drachma semis continet resinæ scrupulum semis.

Confectio anisi laxativa, de qua sub aniso.

Electuarium Diacitri aut *de Citro Solutivum*, laxlerende Citro-
nen-Latmberg / *Electuaire de Citron laxatif*. Dicitur Cholagogum
pituitam quoque educit, datur ad drachmas duas ad drachmas
sex.

Electuarium diaprunis laxativum de quo supra sub prunis.

Electuarium è Succo rosarum de quo sub Rosis.

Extractum Diacitri de quo sub Citro.

ALOE.

Hepatica est Aloës Asiaticæ succus gummosus & resinosus, foris fuscus intus flavescens, hepatis instar, expressus ex foliis Aloës, imo & plantis transversim radicem versus incisis, extillansque in patinas ampliores, in sole concretus & condensatus, saporis aris amarissimi, nauseosi pinguis oleosi & adstringentis, odoris fragrantis ad myrrham accedentis. Colligitur Hepatica in China non in Socotra.

Succotrina est Aloës Asiaticæ succus gummosus & resinosus ex fusco nigricans, dum fractus in lamellas splendens & pellucidus ex foliis imo & planta transversim radicem versus dissectis, sua sponte in vere ubi succi nutritii luxuriant in suppositas patinas amplas destillans, vel etiam expressus, in quibus à Sole condensatur & exsiccat; hinculterius inspissatur & quo diligentius hæc fiunt, eo pellucidior & nobilior fit, saporis & odoris cum Hepatica ejusdem. Colligitur in insula Succotra, quod in fundo ab illa fœculentum remanet, id Aloën caballinam constituit, differuntque utræque plantæ, ex quibus colligitur Hepatica & Succotrina, nonnisi loco natali.

Caballina est Aloës Asiaticæ succus nigricans gummo-
sus,

fus, prioribus ponderosior crassior ac impurior expressus ex foliis Aloës dissectis, in Sole concretus & saporis subacris amarissimi nauseosi, odoris gravioris quasi picei & myrrhati, conficitur etiam in omnibus tractibus Indiæ Orientalis maritimis.

Hepatica quæ mihi optima videtur vim purgantem habet in substantia gummosa, cui quippiam mucaginis resinosa in qua vis styptica & balsamica juncta est, purgat blande & in specie humores biliosos. Specificum habetur in affectibus capitis, in præcavenda putredine, in omnibus morbis à bile oriundis.

Ob singularem acredinem excitat hæmorrhoidum fluxum, venasque hæmorrhoidales aperit, quod tamen impeditur Aloë rosata & violata facta. Externe vulnera & ulcera mundificat, tosta & virtute purgante orbata vim adstringentem habet, & propterea in fluxibus quibusvis sanguinis specificum est.

Tardior vis corrigitur diagrydio, Pro Olato &c. correctorio aromatico vix opus habet.

℞. Aloës ʒj myrrh. ʒβ. Croc. or. gr. xv. oxym. q. s. f. pil. contra malignos morbos præcavendos.

℞. M. P. aloëtic. ʒj ambr. gryf. gr. iij Θ vol. succin. gr. v. ʒo d. serpill. gt. iij bals. peruv. q. s. f. pil. catarrhales & cephalicæ.

℞. Al. tost. rhabarb. tost. borrac. calc. ana ʒβ. f. pulv. exhibendus cum ∇ plantag. ad fluxum quemlibet, & præcipue sanguinis, hæmoptysin.

Externe fiunt emplastra sic: ℞. Myrrh. ʒβ Aloës ʒij fell. taur. q. s. f. emplastrum, quod applicatum umbilico vermes necat.

Caballinæ usus Medicus non est, Indi utuntur pro incrustandis navibus picis loco, norunt nunc eam expurgare

à fordibus , ita ut à Succotrina etiam experientissimus vix contradistinguere valeat.

MANNA.

Ἀλόη, Ὠβεί / ALOE.

Est planta flore liliaceo, monopetalo, veluti tubulato in sex partes secto, cujus fructus est oblongus, fere cylindraceus, interna loculamenta divisus, seminibusque foetus planis & quasi circularibus.

Plures equidem sunt aloës species, ast hic non intelligitur nisi Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. Aloë J. B. 3. 696. & Dod. Pempt. 359.

In regionibus Orientalibus potissimum quærenda hæc aloë, cujus succus est tantum in usu.

BAUHINUS tres aloëtici succi species, ab una eademque planta extrahi putat, modum colligendi hoc modo describens: Plantam in frustra dissectam & contusam in vas oblongum reponunt per 25. dies, ubi spuma attollitur mobilis & abjicienda, tum mediante concha superior pars succi demitur, donec diversitas succi appareat. Succus autem ille purior concretus, ALOE SUCOTRINA dicitur, succus vero, qui remanet & paulo obscurior est, ALOEM HEPATICAM efficit. Feces seu crassamentum in ALOEN CABALLINAM indurefcit. Jungitur merito BAUHINI verbis TOURNEFORTII assertum in MAT. MED. inquentis, addidici ex illustri HERMANNO Professore Botanices Leydensi, servos in provinciis Orientalibus exprimere folia Aloës, manibus in vas aliquod, postridie vero mediante concha margaritifera separare succum supernatantem, qui in peculiari concretus vase aloën constituit puriorem. Tertio die tollunt rursus alium succum, qui inspissatus aloën constituit hepaticam. Remanentia ad aloen Caballinam inservit. Hinc patere potest J. BAUHINUM non deceptum fuisse. Accedit quod Aloës etiam Succotrina soluta & per chartam bibulam filtrata relinquat mucilaginem quandam foliis aloës communem, manifesto indicio succum Aloëticum non per simplicem extillationem, sed per-expressionem obtineri.

Diversis Aloë constat partibus, gummosis atque resinosis, cum admixtis terreis. Quatenus enim partes habet acres resolubiles & gummeas, stimulat, aperit, purgat, adeoque in omni cruditate acida cumprimis & pituitosa, cachexia, chlorosi, mensium atque hæmorrhoidum suppressione proficuum est remedium; quatenus vero particulas possidet terreas, emplasticas atque resinosas, consolidat, siccat atque adstringit. Et hinc non solummodo externe in consolidandis vulneribus & ulceribus utilissimum est auxilium, & ad putredinem arcendam in condituris & balsamationibus corporum, quam maxime conveniens, sed & interne in debitis casibus & circumstantiis adhibitum, maxime proficuum. Quatenus tandem insignis est amaritiei, ventriculo est amica Aloë, vermibus admodum adversatur & pro iis enecandis tanquam specificum laudatur. Curiosum est quod Vulpes Lupi & canes, ut & volatilia, ab ejus comestione interficiantur.

Sicuti autem Aloës ab haud paucis tanquam lenissimum purgans ventriculo gratum & viscera confortans, atque vulnera consolidans, maximis extollitur laudibus, ita quoque ab haud infirmi nominis **VIRIS CARDANO**, **SCALIGERO**, **FERNELIO**, **HOFFMANNO** aliisque rejicitur, tanquam abominandum amaro, ventriculo ingratum, acrimonia sua venas vellicans, hæmorrhoides aperiens, & excessiva caliditate præcipue calidis & siccis extenuatisque corporibus adversissimum, ipsique vitæ nostræ insidiosum.

GUIDO PATINUS diabolicum medicamentum vocare solitus est pilulas aloëticas, quia sanguinem adurant, humidumque nativum horrendo modo depopulentur. His vero objectionibus respondet **ROLFINCIUS** in **TRACT. DE PURGANT. VEGET.** distinguendo inter usum & abusum. Si enim in debita accipiatur dosi, si non frequenter nimis ingeratur, si debito modo correctæ exhibeatur & debitis subjectis propinetur, nullum adfert periculum, sed commoda præstat haud contemnenda.

Si vero immoderatus, si in nimia dosi & frequenter nimis usurpetur utique noxia. Cavendum utique est, ne subjectis constitutionis siccioris ventriculo calidiore præditis, hecticis Phthysicis atque ad hæmoptysin, mensium & hæmorrhoidum fluxum præsertim nimium pronis, exhibeatur.

Aloë in usum non tam cruda vocatur quam præparata, aut in pilulas, ut amarities occultetur, redacta, aut alio modo conversa.

HINC IN OFFICINIS VARIA PROSTANT
PRÆPARATA.

Aloë Violata, Aloës Violat. Datur ad grana decem, Scrupulum unum & ultra. Hanc plurimi pilulas Francofurtenses constituere putant.

Extractum aloës resinofum, Harzigter Aloës-Extract / Extrait d'Aloës resinoux putredini resistit, convenit in cruditatibus acidis & viscidis, ventriculum roborat & alvum insuper laxat. Dosis est ad grana decem, quindecim, ad scrupulum unum & ultra: adhibetur potissimum in pilulari forma. Experientia autem sæpius comprobat, quod quo minori in dosi exhibeatur, eo melius suum edat effectum.

Extractum aloëticum gummosum, Aloës-Extract / extrait d'aloës gummeux. Hoc extractum à resinofitate torminum & tenesmi hæmorrhoidalis authore liberatum priori extracto merito præferatur pro scopo laxandi, daturque vel per se ad grana aliquot ad scrupulum unum &c. vel pro basi etiam pilularum aliarum laxantium & purgantium inservire poterit: Prostant porro varia alia extracta, quæ aloën tanquam basin maximopere agnoscunt.

Extractum Catholicum, Extrait Catholique ou Catholicon. Omnes promiscue humores evacuat, adeoque in discrasia sanguinis conducit. Datur ad grana quindecim ad drachmam semis ad scrupulos duos.

Extractum Marocostinum, de quo sub costo.

Extractum Panchymagogum, Extrait Panchymagegue: familiare est purgans ad omnes humores è corpore eliminandos, datur ad grana quindecim ad drachmam dimidiam, miscetur etiam cum aliis.

Electuarium Hieræ picræ simplex, sive Hieræ picræ Galeni. Dicitur Hieræ picra quasi Medicina sacra; GALENO non tanquam auctori, sed quod tantopere ab ipso celebrata & exulta fuerit adscribitur: Acrimonia caloreque suo, uti GALENUS loquitur, crassos & lentos succos dissecat, præsertim qui in ventriculo hærent, conducit iis, qui alvo sunt adstricta & mulieribus, quæ non

facile purgantur. Minus autem ejus frequens usus per os, cum nimiam amaritiam respuant ægroti. Asservatur etiam in officinis sola Aloë cum corrigentibus & *Species Hieræ*, *gemeine Bitter-Species / Poudre de Hiera simple* appellantur, quando autem hæ species melle excipiuntur, & in formam electuarii rediguntur, *Hiera simplex* vocatur. Species in pulvere dantur à drachma semis, ad drachmam unam. Electuarium datur ad drachmas duas ad unciam dimidiam. Ut plurimum autem ejus usus hodie in clysteribus tantum esse solet ad unciam unam & ultra.

Electuarium Hieræ cum agarico, *Electuaire d'Hiera avec l'agaric*. Bilem & pituitam educere dicitur. Dosis à drachma una ad drachmas duas. Rarius autem ob insuavitatem in usum venit, & plerumque in clysteribus ad drachmas sex ad unciam unam &c. præscribitur.

Imprimis autem Aloë vix non omnium pilularum laxantium & purgantium est basis.

Pilulæ de Aloë Violata, *Pillen von Aloe mit Violon - Saft / Pilules d'Aloës violat*, concordant & virtute & dosi cum aloë violata, unum enim idemque sunt.

Pilulæ Angelicæ, *Pilules Angeliques* quarum nomine apud nos intelliguntur sic dictæ

Pilulæ Francofurtenses, *Frankfurter-Pillen / Pilules de Francfort*. Dosis ad scrupulum unum ad drachmam semis & ultra. Notandum quam maxime de Pilulis his, quod sæpius in minori dosi assumptæ facilius suam operationem exserant. Conducit etiam ut dosis separetur, altera pars enim assumitur leviter coenando, & cum suam per noctem aut insequente mane non exserit operationem, altera exhibebitur, id quod in aliarum etiam laxantium pilularum exhibitione observari poterit.

Pilulæ Antipodagricæ, *Pillen wider die Gicht oder das Podagram / Pilules Contre la Goutte*. Dosis præservationis præsertim gratia ad grana quindecim triginta &c. sub Novilunium.

Pilulæ Aloëphanginæ, *Haupt-und Magen-Pillen / Pilules Aloëphangines*, ad evacuandum roborandumque stomachum commendantur. Dantur ad scrupulum unum drachmam semis & ultra.

Pilulæ Auræ Nicolai, *Pilules Aurées* panchymagogæ habentur, & imprimis capiti sunt dicatæ. Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

Pilula

Pilula Cochiae Rhafis, starcke Haupt-Pillen / Pilules Cochées, ad pituitam evacuandam commendantur, praesertim in affectibus capitis & nervorum. Dosis scrupulus unus, drachma semis & ultra.

Pilulae Emanuelis, Emanuels-Pillen / Pilules d'Emanuel. Nomen exinde obtinent, quod Comes quidam è gente Fuggerorum hoc nomen gerens iis frequenter usus fuit, alvum blande subducunt. Dosis ad grana decem viginti & ultra.

Pilulae Hydropicae aut Hydroticae Bontii, Pillen wider die Wassersucht / Pilules Hydragogues de Bontius. Virtus ex nomine patet, aquam ortiter educunt, commendantur quoque in obstructionibus Mesenterii & Lienis. Dantur ad grana decem ad triginta & ultra.

Pilulae Hypochondriacae Baecleri, Pillen wider die Milz-Sucht / Pilules antihypochondriacues. Conveniunt in obstructionibus alvinis & Hypochondriorum, aliisque pluribus morbis: Dantur ad grana quindecim viginti, triginta & ultra.

Pilulae Lucis majores, Augen-Pillen / Pilules Lucis majeures. Visum conservare & nervos opticos ab obstructionibus liberare dicuntur. Dosis scrupulus unus drachma semis & ultra.

Pilulae Mastichinae, de quibus sub Mastiche.

Pilulae contra obstructiones, Pillen wider die Verstopfung / Pilules laxatifs, ad alvum laxandam & obstructiones alvinas curandas & praeservandas. Dantur ad aliquot grana ad viginti.

Pilula Polychrestae, Polychrest-Pillen / Pilules Polychrestes. Commendantur ad alvum laxandam, obstructionesque referandas & laudantur in affectibus uterinis. Dantur ad grana quindecim viginti & ultra.

Pilulae tartareae Quercetani, layrende Weinstein-Pillen / Pilules de Tartre de Quercetan. In obstructionibus Lienis Hepatis & Renum, ut & affectibus hypochondriacis commendantur. Dantur ad grana quindecim, triginta &c.

Varia porro alia medicamenta ingreditur aloë, unde porro prostant

Elixyr proprietatis Paracelsi, Paracelsi Magen-Elixyr / Elixir de propriété de Paracelse. Ab authore sic dictum, qui assererat, quod quemadmodum Aloë & Myrrha, mumias custodiunt à putrefiendi

fiendi aptitudine, ita hoc Elixyr corpus vivum à putredinis labi vindicet & à peste morbisque malignis præsertim, defendat. Stomacho quoque dicatum est, anorexiam atque dyspepsiam corrigit, vermes necat, urinam menses & hæmorrhoides pellit, in affectibus Hypochondriacis conducit, icteroque medetur, & alvum laxat. Dosis ad guttas decem viginti & ultra, si autem laxare debet, ultra drachmam estsumendum. Cholericis, siccioris naturæ homines & ad hæmorrhagias inclinantes ab hoc similibusque remediis sibi debent cavere.

Elixyr dulce, vel Elixyr proprietatis dulce, Magen-Elixyr/ Elixyr doux. Vocatur ita non quod dulcem obtineat saporem, sed quod acido careat. Viribus cum Elixyr proprietatis convenit, nisi quod ob menstruum alcalisatum in morbis nonnullis conducit, ubi acidum minus convenit. Datur quoque eadem dosi. Notandum quod Elixyr proprietatis cum alcalibus præparata se misceant vino & aqueis vehiculis sine præcipitatione.

Elixyr proprietatis Rhabarbarinum Jungkenii, laxierendes Magen-Elixyr. Elixyr de propriété laxatif avec Rhubarbe. Hoc ab Elixyr dulci in eo differt tantum quod ratione menstrui mitius sit & in majori dosi assumi queat, perque inferiora purget ob Rhabarbarum; datur ad drachmas duas usque ad unciam semis in vehiculo.

Elixyr aperitivum Clauderi, eröffnendes Elixyr / Elixyr aperitif de Clauder. Virtutibus æmulatur Elixyr dulce, sed præstat in eo quod ob menstruum aqueum in subjectis, ubi spiritus exulare debet, verbi gratia in quibusdam febribus & etiam ipsis pueris exhiberi possit. Dosis ad guttas quindecim in junioribus, ad quadraginta & plures in adultis.

Elixyr Cachecticum Ettmülleri, Elixyr Cachectique d'Ettmüller. Vires ex nomine patent, obstructions reserat humoresque viscidos & pituitosos incidit. Datur ad guttas triginta, quadraginta & ultra.

Elixyr viscerale Bæcleri, eröffnendes und stärcker des Elixyr/ Elixyr visceral. Virtutibus pollet iisdem ac Elixyr dulce eodemque modo usurpatur.

Tandem notandum quod Aloë sæpius etiam dissolvatur in Spiritu Vini, quæ Tinctura in vulneribus & ulceribus gangræna & carie ossium frequentissime vel per se vel cum Tinctura Myrrhæ usurpatur.

MANNA.

Sunt grana ex albo flavescentia, pingua, figuræ variæ, quasi ex Salina quadam substantia concreta, collecta ex arboribus orni & fraxini in Calabria, Sicilia, agris Romanis, ubi sæpe coluntur, saporis subacris, subdulcis, pinguis & nauseosi, odoris nullius vel melliti.

Meminere Theologi Mannæ cœlestis, Philosophi aëreæ, Medici frumentaceæ quæ in Polonia ex seminibus alicujus graminis colligitur [etiam super folia borraginis reperitur. v. Hœfer. Herc. Med. p. m. 385.] item factitiæ à formicis alatis candicantibus in India Orientali [vid. Joh. Ott. Helbig. C. N. C. Dec. 1. an. 9. & 10. obs. 194. p. 459. & Herm. Nic. Grimm. C. N. C. Dec. 2. an. 1. & 2. obs. 151. p. 369.] sed hæc fori nostri jam non sunt. Loquimur jam de illa specie arborum in Calabria &c. ubi diebus canicularibus potissimum succo seu nutritio seu alio luxuriantes, ab hujus copia fiunt tubercula, quibus hincit cortex, ex quibus deinde profluit succus viscidus subdulcis, qui pomeridianis horis à Sole non-nihil condensatur, colligitur, & in clibano ulterius exiccatur. Non omnes indiscriminatim illæ arbores fundunt hanc mannam, sed quæ talis est, per annos quadraginta & plures mannam depromit.

Calabrina, quæ optima, fovet in substantia dulci gummosa virtutem laxantem, & in specie evacuant bilem, sed cave exhibeas iis qui bilem habent viscosam & ad icterum vergentem, ut & Hypochondriacis, Melancholicis & Scorbuticis, cum enim salia tam blanda sint, facile obtunduntur, & in corpore remanentia putrescunt. Vis ejus torminosa corrigitur cinamomo, tarda vero exaltatur Ee Fri, scammon. &c.

Tttt

R. Mann.

℞. Mann. ℥i℥. cape ex ʒo amygd. d. rec. expr. ad ℥i℥ ex
juscule ad laxandam alvum, præcipue in colica, add. sem.
foenic vel cinam. pro correctorio.

℞. Mann ℥ij Diagryd. gr. iij Crem. ꝑri. ʒj M. cape ex
vino.

Datur infantibus per se ad ʒj. vel ʒj cum gr. ij vel iij
diagrydii.

S A R -

MANNA, Manne / MANNE.

Arabes aliique Mannam esse Mel aereum de coelo deciduum cum
vulgo putarunt; sed ANGELUS PALEA & BARTHOLOMÆUS
AB URBE Monachi Franciscani, qui anno 1543. in Mesuen
commentarios ediderunt, jam eo tempore annotarunt Mannam
esse revera succum concretum fraxini, tum vulgaris, tum sylve-
stris, quæ Ornus appellatur. Hanc sententiam pluribus observa-
tionibus confirmavit DONATUS ANTONIUS AB ALTOMARI,
Medicus & Philosophus Neapolitanus, qui claruit circa annum
1558, nam superinjecto linteo per plures dies ac noctes supra fra-
xinos, ita ut ros ad eas pervenire non posset, inventa nihilomi-
nus est Manna in arboribus coopertis, quod fieri haud potuisset,
cum supra linteum ne vestigium mellis adesset. Fatentur etiam o-
mnes qui Mannam colligunt eam iterum ex iisdem arborum locis
exsudare, sensim effluere atque deinceps coagulari. In fraxini
Ornique caudicibus juxta corticem sæpius protuberant vesiculæ
plenæ liquoris albidii, dulcis, qui crassescit & in optimam Man-
nam convertitur; hoc autem evacuato alius humor tenuior ma-
nifesto emanat & in grumos concrevit. Incisis fraxinis effluit
idem liquor, & cicadæ aliaque insecta corticem ejus perforare de-
prehenduntur, ut lacrymam hanc sugant, his vero recedentibus
manat è vulneribus idem liquor in Mannam concrevicens. Cum
fabri Lignarii Ornos secant, ut ex iis pro Vini doliis circulos pa-
rent, sæpe contingit, ut ex ipsis truncis & ramis per longum fis-
sis & Soli expositis non parva Mannæ quantitas effluat, non so-
lum.

lummodo è cortice sed, & è lignosa fraxini materia. Qui porro carbonibus faciendis operam dant, igne accenso ex Ornīs, quæ prope fornacem adsunt, Mannam exsudare & coagulari sæpe conspiciunt. Notat insuper ALTOMARI, quotannis ex iisdem fraxinīs, non vero ex omnibus indiscriminatim fluere Mannam, adeo ut non desint qui easdem arbores emant, tanquam singulis annis hoc vectigal producentes, suntque eodem in loco & ejusdem speciei arbores, quæ Mannam non proferunt. Demum refert idem author, Mannam emanare ea potissimum parte ex ramis, qua foliorum pediculi iisdem annectuntur, in his vero partibus vascula tenuiora sunt & facilius rumpuntur. Neque inepta est ejusdem observatio, quod Meridie tantum, ac calidissimis diei horis Manna exsudet è foliis. Majori enim caloris gradu opus est, ut succus ad folia perveniat, & extra vasa sua deferatur. Cœlo enim sicco & mense Julio in regno Neapolitano & Sicilia sponte fluit liquoris limpidi instar & sensim concrescit. Postridie cultri ope eam colligunt, ne à pluviis & cœlo udo lique scat, & in vasis vitreis condunt, ac deinde soli exponunt in chartis nitidis, donec manibus non adhæreat, aliter enim lique sceret & candorem amitteret. Manna spontanea à die 21. Julii ad finem usque Julii effluit, nisi adveniant pluvix. Julio desinente Rustici corticem fraxinorum incidunt ad materiam usque, tunc à meridie ad sextam fluit idem liquor, & in grumos crassiores cogitur, caloris paulo intensioris ope. Quæ sponte fluit dicitur Italis MANNA DI FRONDA, eo quod è fraxini foliis sudoris instar ardente Syrio ejus guttulæ fluant, in granula magnitudine granorum tritici indurandæ. Quæ vero è vulnerato cortice emanat MANNA COACTA dicitur, ab Italis vero SFORSATELLA, & SFORSCATA seu MANNA DI CARPO.

Hanc sententiam plurimi postmodum propugnarunt, GAROBIUS, LOBELIUS, CÆSALPINUS, COSTÆUS, CORNELIUS CONSENTINUS, cæterique, qui majorem oculis fidem quam authoritati tribuerunt, nec obstat MAGNENUS, qui peculiarem quoque DE MANNA TRACTATUM scripsit. Non autem solummodo in Sicilia, Neapoli, imprimis in Calabria reperitur Manna, sed & in Oriente occurrit, quæ tamen apud nos rarior est. Datur etiam in Gallia MANNA LARICEA seu MANNA BRI-

ANSONENSIS, quæ prope Bryanonium in Delphinatu è Laricibus defluit, sed rarioris est usus, præsertim cum Manna Italica in sufficienti quantitate haberi possit.

Probatur Manna pinguis & quadantenus translucida, Mastichæ simillima, saporis saccharati & suavis, quæ tamen linguam modice mordet, recens, levis, ex albo tantillum ad subrubrum inclinans colorem, cujus grumi disrupti, intus veluti Syrupo sunt irrorati. Improbatur arida & intus veluti spongiosa, cinericei coloris, quæ morfu plane caret, rancida est nauseosa impura aut adulterata. Suspecta est quæ Sennæ folia granis suis complectitur.

MANNA alia **GRANATA** dicitur, quod minoribus constet granis, alia **MASTICHINA**, quæ Mastiches prope granis est æqualis. Communiter præscribitur nunc **MANNA CALABRINA**, **Manna/MANNE DE CALABRE**, nunc **ELECTA**, **auserlesene Manna/MANNE CHOISIE**, quæ tamen non semper æque purgare ac Manna communis deprehenditur. Mannam principia salina acidulata & mucilaginosa continere non dubitare potest, qui vel ad solum Saccharum respicit. Manna abstergit alvumque leniter subducit, ita ut infantibus recens natis cum oleo amygdalarum dulcium in pulmenti formam redacta, pro expurgandò meconio, propinetur, quo ultimo tamen casu quam maxime cavendum ne dispositio adsit ad Epilepsiam. Ob vim abstergentem in pectoris pulmonisque vitiis conducit, quia autem dulcis est facile bilescit, hinc minus prodest in sic dictis morbis calidis, febribus ardentibus & inflammatoriis, nec convenit cholericis, neque in variolis & morbillis promiscue usurpari potest.

Datur ad unciam unam, ad uncias duas & ultra. Adhibetur in jusculo, lacte, vino & aqua, decocto prunorum, passularum, decocto Caffee, decocto antifebrili, Infuso Sennæ &c.

EX MANNA IN PHARMACOPOLIIS EXTANT

Manna liquida, solvirte *Manna / Manne liquide*, Dosis est ad unciam unam ad uncias quatuor. Commiscetur etiam instar Mannæ simplicis aliis laxantibus atque purgantibus.

Manna Tabulata, & quando cremor Tartari additur, *Manna Tartarifata* dicta, tabulirte *Manna / Manne en Tablettes ou Tartarifée*. Dosis utriusque est ad unciam unam ad tres pro scopo purgandi.

Electua-

Electuarium laxativum de Manna, Manna-Lattberg / Electuaire de Manne, tanquam laxans & lene universi corporis purgans commendatur, ad biliosos & Melancholicos succos educendos, ad jejcoris renum viarumque urinalium calidam intemperiem mitigandam, obstructionemque referendam. Dosis ad unciam unam & duas.

Electuarium diacassiae cum Manna, de quo sub Cassia.

Syrupus de Manna laxativus, laxierender Manna-Syrup / Syrop de Manne. Infantibus propinatur ad unciam semis ad drachmas sex &c.

Pulicula de Manna, Manna-Müßlein / Bouillie de Manne. Laxat alvum leniter & absque multis torminibus; adhibetur praesertim in infantibus tenellis ad drachmas duas, unciam semis &c.

℞. Mannæ Calabrinæ partem unam, Nitri partes duas, inde in vesicam eamque optime ligatam impone aquæ calidæ ut solvantur, solutionem destilla per alembicum & prodibit aqua sapore amygdalarum amararum, quæ *Manna Meteorisata*, Magnatibus conducens ad unam aut alteram unciam alvum laxat.

SARCOCOLLA.

Est substantia gummosa in grumos vel sabulum concreta ex albo rufescens, quasque mannæ colore, spongiosa, lucentibus subinde micis permixta, levi concussu in pollinem abiens, collecta ex tithymalo Persico spinoso sarcocollifero, saporis amaricantis cum obscura quadam dulcedine, odoris dum incenditur ingrati.

Convenit cum gummi ammoniaco, galbano, nisi quod major insit vis cathartica, quod acredo major testatur, ob dulcedinem suam specificè convenit in vitiis pulmonum & thoracis. Externe convenit in consolidandis vulneribus.

℞. Sarcocoll. 3^{ss} extr. troch. alh. gr. iij Zinz. gr. viij syr. ros. q. s. f. pil. purgantes serum & pituitam.

℞. Myrrh. Aloë sarcocoll. ana q. v. f. pulv. pro consolidandis vulneribus.

Σαρκοκόλλα, quasi gluten carnis, CARNIGLUTINUM,
 Gummi Sarcocolla Fleischleim / SARCOCOLLE ou COLLECHAIR.

Alii hoc Gummi ex arbore aut frutice spinoso defluere putant.
 Usus internus rarior. Externe ingreditur emplastra ad vulnera & fracturas. In lacte macerata ophthalmicum est, inflammationes oculorum, albuginem, nubeculas discutiens. Conducit quoque in maculis faciei delendis, & in hæmorrhagia narium sistenda.

OPOPANAX.

Est substantia resinosa gummosa ex rufo & albo flavescens mollecule, quasi ex grumis vel sabulo crassiori in massam redacta, collecta ex radice Panacis Sphondylii C. B. P. saporis acris amaricantis ingrati, aliquatenus nauseosi, odoris fragrantis gravis.

Ad galbanum accedit, & ob intensam acredinem habet vim potentiorum alvum deponendi, serum & pituitam educendi. Externe laudatur in herniis, præcipue carnosis discutiendis & suppurandis, ut & in scirrhis, nodis & gangliis resolvendis.

℞. Opopan. ʒ℥. Castor. ʒj. borrac. gr. v. troch. alhand. gr. vj. fyr. stœchad. q. s. f. pil. uterinæ in mensium obstructione & lochiorum suppressione.

℞. Opopan sagap. galban. ammon. ana ʒij ʒo lumbr. vel philosoph. q. s. f. emplastr. ad hernias carnosas suppurandas.

SUCCI.

Ὀπωπᾶναξ, OPOPANAX, quasi succus Panacis, OPO'PANACUM, PANACIS LACRYMA, GUMMI PANACIS, Panaxsafft / Panax Gummi / OPOPANAX.

TOURNEFORTIUS in MATERIA MEDICA plantam, ex qua hic succus extrahitur, ignorari asserit. Interim plures alii ex Pa-

Panace Heracleo desumi censent. Est autem juxta ipsum Tournefortium Sphondylii species, scilicet

Planta flore rosaceo & umbellato, plurimis petalis constante, inæqualibus cordiformibus, in orbem positis & calyci insidentibus. Is autem abit in fructum compositum ex duobus seminibus amplis planis, ovatis, apice introrsum emarginato, striatis, involucrum plerumque deponentibus, lituris nigris, qua parte sibi adhærescunt, notatis.

Sphondylium majus sive Panax Heracleum quibusdam J. B. 3. p. 2. 161. Panax Sphondylii folio, sive Heracleum C. B. Pin. 157. Panaces Heraclium vel potius Sphondylium alterum Dod. Pempt. 307.

In Syria Boeotia & Macedonia reperitur. Colitur etiam in hortis.

Laudatur Opopanax etiam in affectibus uterinis, putredinique resistit. Conducit ad affectus capitis & nervorum frigidos, ad pectoris vitia & ad ventriculi cruciatus, ut & ad Obstructiones viscerum. Suffitus Opopanax in delapsu Uvulæ laudatur.

SUCCI CONCRETI MUCAGINOSI DULCES.

SACCHARUM.

Est substantia gummosa, facie Θ is contusi, excocta ex expresso succo arundinis sacchariferae. Ita fit in India Orientali & Occidentali; agri probe aratro perfossi conseruntur articulis Cannæ sacchariferae, exsurgunt hinc arundines digitos quatuor circiter crassæ, quæ dum ad altitudinem hominis ascendunt, revelluntur à radice, in constitutas vehuntur molendinas, ibidemque succus omnis ex iis exprimitur, qui nisi intra 24. horas coquatur, acescit, nec ulla arte reduci potest. Coquitur autem primo lixivio forti, ut viscositas hæc melius incidatur ad spissitudinem mellis, hinc iteratur coctio sine calce, si nimium ebullit, fervor hic supprimitur

mitur affuso oleo vel tantillo butyri, vel continua debet fieri agitatio; coctus infunditur in vasa conifera & exponitur Soli ut indurescat, talis defertur ad nos, ubi varias adhuc subit solutiones & crystallisationes.

Constat mucagine temperata dulci cum blanda acredine, quibus nominibus tam alimentum, quam medicamentum est, temperans & obtundens quævis acida, resolvit quævis rigida & aspera. Indi coquunt in aqua cum pauxillo farinæ ad nutritionem.

Promovere urinam experientia docuit, specificum est in tussi, raucedine, asperitate aliisque pulmonum vitiis. Melancholicis, hypochondriacis, hysterics, febricantibus &c. ob facilem sui acescentiam sacchari largior usus non convenit. Externe vulnerarium & opthalmicum est.

℞. Sacch. q. v. coq. c. ▽ q. s. in form. syr. vel julepi add. sacch. ℥i tantillum, cape contra inflammationem faucium cum raucedine.

℞. Spir, vin. vulgar. q. v. M. c. sacchar. & accende ∞ um, deflagret, cape hanc massam cochleatim pro raucedine & catarrhis.

Fiunt etiam clysteres cum saccharo sic pro infante, ℞. juris ping. ℥vj sacchar. ℥j stimuletur ☉e gemmæ pro alvo laxanda.

SUC-

Σάκχαρ, σάκχαρον, ZUCCHARUM, MEL ARUNDINACEUM, MEL CANNAE, ZUCCARUM, Zucker/ Sucre.

Planta Saccharifera ad Arundinem à Gramine nonnisi magnitudine discrepantem ab omnibus refertur, vocaturque

Arundo Saccharifera C. B. Pin. Arundo Saccharina J. B. 2. 351. & Raji Hist. 1278.

CANNA SACCHARIFERA Zuckerrohr/ CANNE à SUCRE
CAN-

CANNAMELE, sex vel octo pedes quandoque & ultra longa, crassissima, geniculata, foliis utrinque longis angustis, striatis obvoluta, fungosa & medullosa, intus dulcissimo succo ubertim referta, radices habet succulentas & dulces, è quibus germina erumpunt, quæ decenti & legitimo tempore transplantata virent & adolefcunt.

De Succi Saccharini coctione ita loquitur P i s o. Per canales & ductus ligneos in amplissimos æreos cacabos derivatur, in quibus continenter nunc vehementius, nunc lenius fervescit, frigidaque aspersione intensior ebullitio coercetur, ut substantia minus consumatur. Ab hoc succo in primo aheni consistente modicoque substructo igne paulo sæculentior & copiosior spuma aufertur, vocaturque Cagassa, quæ solis pecoribus escam potumque suppeditat. Sublata Cagassa liquor, quem Hispani Caldo vocant, in proximum ahenum effunditur, in quo coquitur & prægrandi cochleari crebris foraminibus pertuso à sordibus liberatur. Ut exquisitius immundities seceratur, forte quoddam lixivium, affunditur. Hinc per linteum percolatur, ac tandem succus eo pacto novissimum excrementum, si quod habet, deponit. Hæ sæces mancipiis victum sufficiunt, qui iis contenti tam improbos atque indefessos labores, exhauriunt, quippe toto semestri æstivo noctes atque dies perpetuo molendina agitantur. Vinum quoque exinde conficiunt, quod avidissime appetunt incolæ. Porro minores qui subsequuntur Cacabi alii sunt ad concutiendum alii ad coquendum parati. In quibus succus jam dictus tantisper condensatur, donec Sacchari consistentiam acquirat. Ad hæc vehementi & arduo labore primum in majoribus tum in minoribus ahenis inter coquendum capacissimis cochlearibus agitur quatiturque, & ad altitudinem viginti plus minus pedum attollitur, unde rursus in vasa prolabatur. In cacabis minoribus ob ignem intensissimum vehementioris ebullitionis habenda est ratio, statutisque temporibus olei modicum guttatim instillatur, ne ignis vehementia Saccharum aliquid detrimenti capiat. Observatu dignum si oleum majoribus inderetur ahenis, in quibus liquor primo Caldo dictus purificatur Saccharo conficiendo plane foret ineptus; vicissim si minoribus lixivium sicut majoribus infundatur, æque impossibile saccharum conficere. Si denique momentum succi Limonii vel acidi injiciatur sacchari consistentiam nunquam acquireret, sed in totum perditur. Formæ porro fictiles innumeræ, quando succum fluidum acceperunt,

ordine asseribus perforatis in amplissimis ædibus imponuntur mox superimposito luto humefacto, dicta vasa à melle quod subfusco antea colore saccharum tingebat, repurgantur. E formis excussum candidum à nigricante Mascavado dicto separatur & in frustra redactum soli sereno exponitur probeque exiccatur donec cistis recondatur. Nondum tamen sic depuratus sufficienter hic succus deprehenditur, sed novo indiget opere. Saccharo nimirum huic, verba sunt, **LANGI**, lixivium calcis vivæ affunditur, simulque aliquot albuminum ovorum, quo sordida adhærens pinguedo spumæ sub forma removeri possit, dum massa ad ignem fervet. Rursus nunc vasis pyramidalibus inversis infunditur liquor satis inspissatus, ac denuo massa quodammodo in illis refrigerata argilla latiori basi applicatur, idque aliquot vicibus, inferiori ostio aperto subducitur aqua superflua. Tertia vice reiteratur labor.

Varium prostat Saccharum vel à forma, vel a loco, unde adfertur & excoquitur atque purificatur, denominatum.

SACCHARUM MISCELLANEUM CONFUSANEUM sive **FARINACEUM**, in doliis & cistis allatum, **Casaun Zucker/ Meng Zucker/ CASSONADE** ou **CASTONADE**, quod majorem largitur dulcedinem, & Syrupi etiam exinde confecti, non tam facile, ut ita loquar, candiscentur aut in crystallos abeunt.

SACCHARUM PYRAMIDALE à figura, **Zuckerhut/ Hut Zucker/ SUCRE EN PAIN**, id quod nunc magis nunc minus repurgatum sive, ut ajunt, refinatum est, estque rursus varium. **MADERENSE** ab insula Madera dictum, præfertur, **SEBIZIO** dicente, reliquis Sacchari generibus estque ad siccas confectiones accommodatissimum.

SACCHARUM MELISIUM sive **MELITEUM** ab insula Melita seu Maltha ex quorundam opinione, vel potius ab insula quadam occidentali dictum, **Melis/ Melis Zucker oder Speis Zucker/ SACCHARUM CIBALE**, medium est inter Canarium & Thomæum; illo enim deterius, hoc melius, quia eo purius nitidius candidiusque. Friatur quidem facile sed manibus farina mediocriter adhæret, idque propter lentorem & pinguedinem aliquam, quam in se habet. Probatur quod foris & intus candicat, quod autem foris tantum est album, intus vero subrufum improbatur.

SACCHARUM CANARIUM sive **CANARIENSE**, ab insulis Canariis dictum, **Canarien Zucker**, Maderensi proximum bonitate, ut
rursus

rursus SEBIZIUS differit, optimum nivis instar candidissimum, minime lentum ac pingue, sed malleo percussum in solidas diffiliens particulas, cum dentibus atteritur quodam strepitu crepans, & si resolvatur aqueam habens claritatem. Quando & hoc adhuc despumatur & depuratur prodit

SACCHARUM FINALE sive FINUM aut FINISSIMUM à summa & quasi finem acquisita puritate & candore appellatum, SUCRE ROYAL. Ubi notandum quod Saccharum hocce ut & aliud pyramidatum quodvis charta cærulea sit involutum: porro illud observatu dignum, quod Saccharum solidius cultro rasum atque confectum, tempore nocturno scintillas igneas de se spargat. Sunt qui dicunt Saccharum finissimum non esse optimum, ob qualitatem quandam nocivam à calce viva contractam, quamvis autem hic metus non multam attentionem mereatur, interim non tantam largitur dulcedinem.

SACCHARUM THOMÆUM sive THOMASINUM, SACCHARUM RUBRUM, Thomas-Zucker/SUCRE ROUGE, ab insula à Thoma nomen habente hoc modo appellatum. Paratur tamen etiam alibi ex Syrupo Saccharino de quo mox. Solidum diu non manet, sed propter lentorem & pinguedinem humescit. Saporem cæteris quidem habet dulciorem sed minus suavem. Eligendum quod pingue densum, candidius & quod non adeo lentum, & fractu contumax, cum malleo percutitur. Abstergit & laxat, conducit in affectibus scorbuticis & hypochondriacis. Adhibetur in jusculis prunorum & passularum, immiscetur quoque clysteribus.

SACCHARUM LIQUIDUM, MELAZIUM, MEL SACCHARINUM, MEL SACCHARACEUM, Zucker-Honig/Zucker-Syrup/SYROP. Simile est Melli liquido, estque nil aliud, quam liquor ex panibus seu pyramidibus Saccharinis recens paratis effluens, vel etiam spuma Sacchari collecta denuo cocta & quantum licet purificata. Manet semper liquidum.

Saccharum Chymice resolutum exhibet phlegma, spiritum acidum & oleum, fermentatione abit in Spiritum ardentem, uti illud facile comprobari potest Cerasis Saccharo liquidiore conditis. Melli utique præfertur interim tamen & caute cum Saccharatis agendum. Cum oleo amygdalarum dulcium assumptum colicis doloribus medetur, cæteris videlicet paribus. Egregium vulnerarium simulque concretum balsamicum & putredini resistens existit, & in ulceribus putridis

conducit,convenit quoque ob vim abstergentem in nebulis & ungue oculorum. Nocet scorbuticis,biliosis flatibus obnoxiiis, atque haud raro infantibus. Gingivis infensum est, reddit halitum foetidum & dente nigros accariosos. vermes quoque alit. Clysteribus interim immiscetur ad vermes deorsum alliciendos, & anthelmintica remedia per os sumenda commode isto occultantur.

Tantus Sacchari apud Pharmacopoeos usus est in parandis Syrupis,tabulatis,trochiscis,tragematibus,confectionibus & incrustationibus radicum,seminum,corticum,fructuum florum &c. conservis, conditis, & electuariis,ut merito inter eorum Evangelistas locum obtinuerit,prouti differitaliquoties jam citatus SEBIZIUS, qui porro ita pergit. Quid de cupediariis, crustulariis, libariis, uno verbo pistoribus dulciariis dicam, qui panes suos biscoctos, sive buccellatos, panes Marci, placentas, liba, scriblitas globulos, spiras, pemmata, alia partim ex Saccharo conficiunt, partim confecta Saccharo conspergunt. In culinis quoque multum usurpatur. Sed qui omnia Saccharo condiunt coqui, absurdissime procedunt, falsum enim est proverbium, nullum cibum Saccharo corrumpi & deteriorem fieri. Saccharum Lacta coagulatione praeservat, unde offi. ex lacte paratis aliisque Lacticiis injicitur, & in cura Lactis minime omittitur: impedit etiam, quo minus Lact in butyrum cogi queat. Curiosum est quod Saccharo dissoluto, & ad liquorem rubicundum cocto, aut etiam ad siccitatem usto, aqua vel vinum insigniter colorari, usque etiam ad rubedinem queat. Qui color permanens est & ab aere noxa.

Præter supra allegatas Sacchari species alia adhuc prostant.

SACCHARUM CANDUM, CANTHUM sive CANDIDUM, vel à candore, vel ab angulosa figura dictum, LUCIDUM alias & CRYSTALLINUM dictum, estque rursus duplex ALBUM alterum clarum, & pellucidum, weißer Zucker, Candel oder Candit / SUCRE CANDI BLANC, ex Saccharo Canariensi aut alio fino crystallisatum, alterum RUBRUM, rother Candit / SUCRE CANDI ROUGE, ex Saccharo præsertim Thomæo paratum, quod priori vilius existit.

SACCHARUM HORDEATUM, Perste Zucker / Zucker Dorsch / SUCRE D'ORGE, quod cum aqua hordeata quidem debet coqui, sæpius autem cum aqua simplici paratur. Eligi debet hoc saccharum coctum recens, siccum, flavum, transparens, coloris succinei,

nei, fragile, saporis dulcis & saavis, lente in ore liquefcens. Conve-
nit in tuffi aliisque affectibus pectoris ad mitigandam acrimoniam
lymphæ & ad expectorationem promovendam. Coincidit cum hoc
ratione virtutum & præparationis.

SACCHARUM PENIDIUM, SACCHARUM PENIDIATUM PENIDIA
ALPHOENIX, Zuckerpenit/ PENIT, ou Epenides. SUCRE
TORS. Non est nisi faccharum fortiter coctum & in baculos con-
tortum. Eligendum candidiffimum, rariffimum ac leviffimum.
Alvum laxat, unde mulierculæ quædam faccharum hoc cum oleo
amygdalarum dulcium infantibus recens natis exhibent.

De Tabulis Manus Christi, Saccharo Rosato, Saccharo Cando Violato,
fuis locis dictum.

SUCCUS GLYCYRRHIZÆ.

Est glycyrrhizæ filiquosæ vel Germanicæ C. B. P. radicis
fuccus expreffus, ignis calore in spiffatus & in glebas redactus,
coloris nigricantis, faporis fubacris & dulcis, odoris debilis.
Convenit cum propria radice è qua conficitur.

℞. Succ. glycyrrh. folv. in ∇ Puleg. f. haufus contra
tuffim.

℞. Succ. glycyrrh. ʒj facch. cand. in ∇ puleg. folut. f. mor-
fui pectorales.

℞. Aur. foliat. volum. v. vel vj succ. glycyrrh. in ∇ foenic.
folut. f. pilulæ in fluxu nimio falivæ à ꝑlibus, quibus fi alvus fo-
ret adftricta add. refin. jalap. gr. v ☉ ꝑri gr ij. fic enim ubi erunt
imprægnatæ globulis ꝑij per alvum fecedent è corpore.

M E L.

SUCCUS LIQUIRITIÆ, a quo non discrepat extractum, Cūſſi
holz. Caſſi / Lacq Nigen Caſſi / Barendreck / JUS DE REGLISSE.

Advehitur vel ex Franconia vel ex Hispania, qui in baculos for-
matus est, unde Gallis dicitur JUS DE REGLISSE EN BATON,
ou d'ESPAGNE.

Hic succus ad scopos supra dictos de radice, in ore detinetur, ubi sensim liquefscens deglutitur. A quibusdam parvæ exinde formantur placentulæ.

Notat de hoc succo E T T M Ü L L E R U S, quod sæpissime variis quisquiliis inquinatus sit, adeoque opus habeat, ut solutione, filtratione seu transcolatione lento & moderato igne facta inspissatione, depuretur. Ob eandem rationem C H A R A S jubet, ut quilibet, qui Theriacum, cujus hic succus est ingrediens, conficere vult, hunc succum propriis paret manibus.

Ex Hoc Succo IN OFFICINIS PARANTUR

Trochisci Becchici nigri, schwarze Husten-Täffelein / Trochisques pectorales noirs. Conveniunt præsertim in pertinaciori tussi cui quædam vasorum læsio juncta esse videtur,

M E L.

Est substantia liquida crassiuscula ex albo flavescentis, nata in variis vegetabilium floribus & ab apibus in iisdem collecta.

Cum saccharo convenit, at temperatius, suaviorius & magis anodynum est.

℞. Mell. q. v. camphor. par. applica vulneribus mundificandis, vel add. ℞ vin. ▽ reg. Hung. vel bals. Peruv. pro eodem usu, add. virid. æris si ulcus sit malignum, add. sacch. ʒi si sit cum inflammatione.

℞. Mell. despum. ʒiij passul. major. ʒiiij liquirit ʒj sacch. cand. ʒv. vin. Hispan. ʒvj bulliant invicem f. conditum, add. ad gratiam ℞ ʒis per campan. in asthmate & tussi expertissimum.

℞. Mell. ʒβ. ▽ Cinam. ʒj. ℞ Θ *ci ʒj f. mixt. add. etiam flor. benz. ʒj.

GUM.

MÉL, Honig / M I E L.

à L A N G I O definitur, quod sit substantia liquida consistentiæ tamen crassioris coloris ex albo flavescentis, saporis dulcis ab apibus congesta intra alvea cerea quadrata,

Quid

Quid proprie mel sit, & quomodo colligatur, magnis inter auctores est dissensus. Quidam chylum apum in ventriculis earum consummatum & vomitu intra favos rejectum cum **MOUFFETO** esse contendunt. Alii cum **ARISTOTELE**, **PLINIO**, **RAJO**, **DALE**, volunt esse rorem dulcem de cœlo deciduum, eo quod rore tali deciduo integra fere apum agmina evolent, miraque industria & maxima festinatione sese melle onerent illudque ad alvearia devehant, multoties eundo & redeundo, donec ros solis fuerit dissipatus. Huic tamen sententiæ alii contradicunt, statuentes mel tantummodo florum progeniem seu succum in illorum partibus natum esse, & quidem se fundant in iis argumentis, quæ **LANGIUS** ex aliis collegit, quod apes non colligant summo mane, dum flores roscidi sunt, sed magis die fervente, quod non versus cœlum prospicientibus floribus ac foliorum partibus insideant apes, sed versus terram pendulis, imo repant ad interiora & abdita florum, quo ros qui summa tantum foliorum & florum attingit, pervenire non potuit, quod quibusdam floribus mellea dulcedo jam insit, quæ gustu deprehendi potest, v. gr. in floribus Lamii albi, Jasmini, Melianthi &c. Quærunt porro cur, si mel ex aëre venit, à certis duntaxat colligatur plantis, non à festucis aliisque corporibus, quibus apes non insidere certo constat.

Nonnulli statuunt, Mel nihil aliud esse nisi extractum seu Balsamum florum, sæpius tamen cum subtiliori & volatiliore roris substantia conjunctum. Modus generandi quoque est controversus. Chylum apum esse vomitu rejectum supra dictum. Sunt, qui apes succum melleum è floribus ore colligere quidem, attamen non ingerere sed ipso duntaxat crura & costas onerare dicunt. Alii probabilius esse asserunt, apes succum gummoso resinofum vegetabilium, quem hinc inde è floribus exsugunt, una cum subtiliore & volatiliore rore nocturno subactum colligere, sub lingua in vesicula quadam magnitudine grani Milii deponere & per fermentationem maturatum iterum evomere, & in foveis cereis recondere; ubi sensim sensimque deinde in temperatum mel perfectum abit.

Mel differt tum ratione temporis, quo colligitur, hinc aliud autumnale, aliud hyemale, quod omnium pessimum, tum pro varietate loci & plantarum. Imprimis autem ratione coloris differt, estque duplex **ALBUM** & **FLAVUM**. **ALBUM** absque adhibito igne è favis novellis per se defluit, hinc etiam **MEL VIRGINEUM** Jungfern-
Honig/

Honig/ MIEL **VIERGE**, appellatur; **FLAVUM** ex omnis generis, novis nempe æque ac vetustis favis ad ignem cum pauca aqua calefactis & in saccos immixtis exprimitur, sic nempe Mel transit remanente in sacco cera: Est autem flavum albo impurius, quia non impediri potest, quo minus aliquid ceræ quoque transeat. Notandum etiam quod Mel Virgineum quoque vocetur illud quod novellæ apes conficiunt ex flavo albicans. Mel album debet esse novum, consistentia neque crassum, neque concretum neque dilutum nimis, clarum, odoris aromatici jucundi, saporis dulcis cum grata acredine conjuncti. Flavum Mel eligendum est pellucidum, justæ consistentiæ, nec nimis crassæ nec nimis dilutæ, coloris ad aurum vergentis, odoris grati. Vitetur autem imprimis in mellis electione favus araneorum telis refertus.

Vini Mel habet singulariter penetrantem, atque abstergentem, acrimoniam in corpore temperat, partes lasas internas indeq; dolentes demulcet, nutrit, sordes & viscositates primarum viarum detergit & resolvit. Potiones mellitæ conveniunt in ventriculo copiosa crassa ac viscida pituita onerato: in affectibus pectoris & pulmonum, in tussi, asthmate & similibus affectibus profunt, conveniunt itidem in renum & partium urinariarum affectibus. Conducit Mel senibus & subjectis pituitosis, biliosis vero hypochondriacis, hystericis & Melancholicis nocet, habet enim hoc vitii Mel, quod brevi in corpore bilescat. Ingreditur clysteres & gargarismata, emollit, suppurat, vulnera & ulcera mundificat, putredinemque arcet, unde ingreditur digestiva. Olim ad edulcorandas potiones syruposque conficiendos adhibebatur, hodie in ejus locum successit Saccharum, nihilominus tamen ad condituras adhuc præsertim à pauperibus adhibetur. Ex melle cocto fiunt suppositoria.

Multa cibariorum genera ex Melle parantur Placentæ, Liba aliaque dulciariorum opera. Mel cum aqua mixtum vel simpliciter vel per coctionem Hydromel vocatur: de Aqua mulsa simplici Hippocratis aphorismus ita loquitur. Si velis nosse an mulier conceperit, aquam mulsam potui dato & si ventris tormina patiantur concepit, sin minus non concepit. In multis regionibus parantur **MULSÆ**, **MEDÆ**, **MEDONES**, **Meth/** ex aqua, Melle, & speciebus aromaticis quandoque, qui potus etiam cum tempore & per fermentationem vinosum acquirunt saporem, tantæ virtutis & efficacitæ, ut non minus ac generosissima Vina inebrient, **FRIDER.**

HOFF.

HOFFMANNUS IN SCHROEDERUM notat genuinum Turcarum Rusma è melle confici quod ad spissitudinem coctum locoque dropacis impositum cum violentia abrumpitur. Curiosum est quorundam assertum quod si in magnum cadum melle plenum panis secalini tosti tantillum injiciatur, totum mel abeat in copiosissimas formicas, quod phœnomenon quidam pro stabilienda generatione æquivoca allegant.

IN PHARMACOPOLIIS PLURES EX MELLE, quod unus etiam est ex Evangelistis Pharmacopœorum, COMPOSITIONES EXTANT

Mel anthosatum, Mercuriale, Nenupharinum, Rosatum atque *Violatum*, de quibus suo loco dictum.

Oxymel simplex, gemeiner Sauer Honig/ Oxymel simple. Commendatur in affectibus pectoris, pituitosis & asthmaticis, datur ad cochlear dimidium, ad cochlear unum, aliquoties de die.

Oxymel Scilliticum & Oxymel Helleboratum, de quibus jam sub Scilla & Helleboro actum.

Aqua Mellis, destillirt Honig Wasser/ Eau de Miel. Inseruire potest interne ad urinam & menses ciendos, ut plurimum autem usurpatur externe ad capillos adaugendos.

Spiritus Mellis, Honig-Gelst/ Esprit de Miel. Interne habetur aperitivus & diureticus, datur in julapiis ad gratam aciditatem. Externe in capillis producendis & flavedine tingendis celebratur.

Elixyr Mellis Waldschmidii, Honig-Elixyr/ Elixyr de Miel de Waldschmid. Datur in asthma præcipue stomachali & difficultate respirandi cum tussi conjuncta, ubi appetitus languet, & anxietas circa præcordia adest. Dosis ad guttas viginti, tīginta & plures,

GUMMOSA AQUOSA CRASSA.

GUMMI ARABICUM.

Est substantia in grumos variæ magnitudinis & formæ condensata, foris superficie granulata, pallide flavescent vel omnino albicans, intus pellucida vitri instar, collecta ex arbore Ægyptiaca Acacia dicta, saporis aquei viscosi lenti odoris nullius.

Gummi Arabicum optimæ notæ est vermiculatum, purius enim illud & candidius.

X x x x

Ra.

Ratione ∇ ex substantiæ in quam totum resolvitur, temperat, incrassat lympham acriorem & tenuiorem, & proinde in raucedine orta à catarrhis tenuioribus mulcet: in stranguria & acri sanguine specificum est, recentiores nonnulli commendant ad stranguriam & urinæ ardorem h. m. \mathfrak{R} . Gumm. Arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ Nuc. Mosch. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ f. pulv.

\mathfrak{R} . Gum. Arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ sacch. cand. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ ∇ sperm. ran. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ f. gargarisma ad faucium asperitatem; adde sacchar. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ si inflammatio adsit.

\mathfrak{R} . Gumm. tragac. Arabic. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ succ. glycyrrh. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ sacch. cand. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ ∇ rosar. q. s. f. l. a. trochisci vel rotulæ ad raucedinem & faucium asperitatem.

TRA-

GUMMI THEBAICUM, GUMMI BABYLONICUM, GUMMI SARACENICUM, GUMMI ACANTHINUM, Arabisch Gummi/ GOMME ARABIQUE, GOMME.

Gummi Arabicum quoniam ex Arabia felici & Ægypto potissimum adfertur, ex Acacia admodum spinosa, cujus folia adeo parva & multa sunt, ut vix numerari queant, profluere dicitur. Quod autem communiter pro Gummi Arabico divenditur, adfertur vel ex Guinea, vel est Gummi ex arboribus nostratibus, prunis, cerasis aliisque collectum. Interim tamen debet esse clarum, transparens, nitidum.

In pleuritide jubent ut recipiatur pomum excavatum & impleatur Gummi Arabico coquaturque ad ignem & coctum ita assumatur. Laudatur in hæmoptysi, mictu cruento, aliisque fluxibus. Conducit in conglutinandis ulceribus & vulneribus nec non ad immodicas gingivarum cruentationes, hæmorrhagias præterea sistit, & cum aceto solutum atque illitum serpignes curare dicitur; sicut quoque in ambustis cum albumine ovi applicitum pustulas præcavere dicitur. Si solvitur in aqua quadam ophthalmica, asperitates pruritus & dolores oculorum solvit. Ad varios denique domesticos & necessarios usus multum prodest.

TRAGACANTHA.

Est substantia gummosa, lucida, alba, tenax, levis gracilis, col-

collecta ex radice tragacanthæ, quæ in agris Massiliensibus copiose alitur, saporis subdulcis & mucilaginosi.

Crassiore mucilagine constat, quam Gummi Arabicum, cum cujus virtute cæteroquin convenit.

℞. Succ. glycyrrh. ʒj. terr. Japon. ʒj sacch. cand. ʒiij opii gr. v. mucilag. tragac. q. v. f. trochisci sublinguales ad excipiendos humores catarrhales.

RE.

Τραγάκανθα, quasi diceret SPINAM HIRCINAM, *Traganth/Bocksdorn/Bocksdistlen/Barbe RENARD,EPINE DE BOUC.*

Est planta flore papilionaceo, ex cujus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in siliquam bicapsularem, seminibus foetam reniformibus. His notis addenda sunt folia bina veluti coniugata, costæ adhærentia in mucronem sæpe abeunti.

Tragacantha Massiliensis J. B. i. 407. Tragacantha C. B. Pin. 388. Clus. Cur. post. add. 60.

Hæc arbuscula magno numero in Syria in primis circa Aleppo ut & in Candia crescit. Multum quoque in Gallia circa Massiliam reperitur. Gummi ex hoc frutice vocatur TRAGACANTHA TRAGACANTHUM, *Traganth/Tragant-Harz/GOMME ADRAGANTH.*

Gummi Tragacanthum quod flavum & nigricans est merito rejicitur. In aqua hoc gummi facile in mucilaginem resolvitur, & hujus ratione egregium est in tussi sicca, & raucedine, aliisque affectibus pectoris, pro demulcenda acrimonia, remedium, involvit, temperat, fluxus mitigat, præsertim ubi serum acre abundans est, & bilis caustica & subtilis adest, hæmorrhagias mitigat, & acrimoniam urinæ tollit, unde in dysuria, exulceratione renum, & stranguria convenit, partes exasperatas excoriatis & fissuris laborantes egregie demulcet. Convenit in fissuris manuum, pedum, papillarumque, item ad inflammationes oculorum cum lacte vel aqua rosarum. Miscetur Vitriolo ad Solem calcinato, ad pulverem sympatheticum constituendum. Pharmacopoei non possunt pulverisare hoc gummi, nisi in mortario calido aut tempore summe frigido. Cum dissolutum tragacanthum in aqua, mucilaginem aut gluten egregium nitidum & transparens exhibeat, adhibetur in variis rebus e. gr. in trochiscis &c. formandis

IN OFFICINIS PROSTANT

Species diatragacanthi frigida, kühlandes Traganth-Pulver/ Poudre diatragacanth froide. Incrassant & inviscant, unde conveniunt in defluxionibus catarrhalibus tenuibus & acris, tussi pleuritide &c. Exhibentur ad drachmam semis ad drachmam unam.

Pulticula de Tragacantha, Traganth-Müßlein/ Bouillie d'Adraganth. Convenit in doloribus abdominis & intestinorum in infantibus, ut & in tussi à materia acris in affectibus renum & vesicæ, datur ad cochlear dimidium ad unum.

RESINÆ OLEO CRASSO
CONSTANTES.

BITUMEN JUDAICUM.

Naturam & essentiam picis imitatur.

℞. Bitum. 3j ladan. ʒj. ʒ. d. caryoph. gt. vj. ʒ. fuccin q. f. f. balsam. apoplecticum.

CO-

BITUMEN BABILONICUM, ASPHALTUM, Juden Pech/
BITUME DE JUDEE.

Est Bitumen solidum, nigrum, pici nigræ simile cum splendore, ponderosum, fragile, inflammabile, odoris dum accenditur fortis & ingrati.

Sunt qui putarunt esse succum ex arboribus resiniferis in mare mortuum defluentem, alii autem melius cum LANGIO censent, scaturire ex terra sub forma fluida, sub qua etiam aquis innatare solet, donec tandem ad littora depositum concreascit densetur, ac tenacissimum reddatur. Reperitur magna in copia in mari seu Laca Aphaltite aut mari mortuo, ex quo extrahitur. Tantum foetorem ibidem exhalat ut etiam aves supervolitantes inde interemptæ in mare delabantur, in quo præterea nulli quoque pisces aut ullum aliud animal subsistere posse dicunt.

Discutit, glutinat, resolvit, attenuat & mundificat. Olim apud Ægyptios in balsamatione cadaverum plerumque usurpabatur. Hodie ei substituitur Pissasphaltum, ex hujus Bituminis cum pice commixtione ortum, ad balsama tingenda adhibetur.

CO-

COLOPHONIUM.

Est substantia resinosa, arida & indurata flavescens, ex resina vel laricis vel abietis vel terebinthi excocta, saporis pinguis oleosi & resinosi.

Lenit, temperat, emollit, simulque urinam provocat, ejusque acredinem temperat, pro quo scopo solutum cum Σ u vini exhibetur, usus externus tamen frequentior est interno.

\mathcal{R} . Colophon. q. v. Spir. vin. rectific. q. s. f. tinctura, nonnullis \odot potabile dicta, contra morbos chronicos ab obstructionibus dependentes.

\mathcal{R} . Colophon. q. v. \odot lil alb. q. s. f. liniment. ad mammas induratas, add. quoque emplastr. de sperm. ceti.

CERA.

COLOPHONIA, Colophonium/Seigen-Harz/ab usu, COLOPHONE. Remanet post destillationem Spiritus & Olei Terebinthinæ. In pulverem si redigatur, & pulvis per candelam accensam dispergatur, flammam concipit & fulgur repræsentat.

CERA.

Est substantia oleosa flavescens ex favis apum vel solis vel ignis calore extracta, saporis lenti & \odot si, odoris debilis, sed non ingrati.

Cera alba est substantia ceræ flavæ simillima, coloris albi, ex cera flava multiplici ∇ æ infusione & in Sole exiccatione in alborem conversa, saporis cum cera flava ejusdem, odoris debilioris.

Particulis oleosis mollioribus constat quam colophonium, hinc quoque potentius emollit, interne autem à nonnullis commendatur in fluxu alvi & ictero. Externus usus frequentior est in linimentis & emplastris pro basi.

\mathcal{R} . Ceræ, vitell. ovi ad duritiem coct. croc. or. gr. viij fyr. absynth q. s. f. pil. ad icterum.

\mathcal{R} \odot ceræ dest. ad gt v. exhibe cum ∇ petrosel. in passione phritica & urinæ suppressione.

RE-

Κηρός, Wachs / CIRE.

Cpes ceram pedibus suis agglutinatam in alveos apportantes, ex eadem cellulas quadratas & invicem muro quasi quodam separatas, exstruunt, in quas cellulas non tantum mel, sed & ova, è quibus novæ deinde prodeunt apes, deponunt. Cera hæc anno primo est albicans, secundo flava, tertio fusca & tandem nigra. Cera est vel nativa, vel factitia. Illa favos proprie constituit & ab aliis particulis melleis sequentem in modum, quem è COLUMELLA ac PLINIO LANGIUS annotat, separatur. Exprimitur è favis mel tuncque reliqui, postquam diligenter aqua dulci ablutæ sunt, in vas æneum conjiciuntur, adjecta aqua liquantur igne, postmodum per stramenta & juncos colatur cera, rursumque hoc modo elixatur, tandemque formis infunditur, intus prius melle illitis, & hæc cera fere solenniter flavum acquirit colorem, estque CERA COMMUNIS, das gelbe Wachs / CIRE JAUNE.

CERA ALBA ut plurimum est factitia, vel radiis solaribus ceram flavam antea cum aqua ad ignem solutam atque colatam per plures menses exponendo, vel cum Spiritu Vini ebulliendo, quam methodum docet BOYLE TRACT. DE COLORIBUS, weiß Wachs / CIRE BLANCHE.

CERA VIRIDIS est cera alba, Terebinthina emollita & viridi æris tincta, grün Wachs / CIRE VERTE; laudatur præsertim ad clavos pedum.

CERA RUBRA est cera alba Terebinthina emollita & vel radice anchusæ vel Cinnabari tincta, roth Wachs / CIRE ROUGE, qua ad sigilla utuntur.

Invenitur quoque in alveorum foribus rudis, cerosa crassaque materia, instar visci glutinosa, nunc flava, nunc nigricans, odorata, styracem vel galbanum referens. Dicitur CERA VIRGINEA & PROPOLIS, quasi suburbana, quod præ foribus alvei ab apibus ædificetur, ne ab injuriis æris lædantur.

Ad usum Medicum Citrina præfertur haud raro albæ, quia hæc non solum per diuturnam insolationem flavedine sua, sed & subtilissimis & actuosis suis partibus in tantum privata est. Adeo usitata est officinis ut vix emplastrum reperias quod non ingrediatur. Vi nempe emplastica gaudet summa & tam resinosum est subjectum, quod summe quoque corrosiva non facile attingunt. In aqua hinc forti magis indurescit, quam ut liquefide. Digerit Cera, maturat, consolidat,

dat, vique gaudet absterfiva, nervis & tendinibus denudatis laxisque applicatur, tueturque partes adversus frigoris vim. Cera alba inservit haud raro pro corpore pro balsamis. Cum Saccharo, Oleo, & Melle, constituit quatuor Evangelistas Pharmacopœorum,

IN OFFICINIS HABETUR

Oleum Cerae, Wachs-Dehl/ Huile de Cire, dum enim Cera destillatur primo phlegma & spiritus prodit subsequente liquore instar butyri sese coagulante & hinc BUTYRUM CERÆ dicto, ex quo postmodum prolicitur Oleum. Spiritus est Medicamentum aperitivum à quibusdam in dolore nephritico laudatum, exhibetur ad guttas viginti, triginta. Butyrum resolvit tumores, dolores artuum sedat, Paralyticis conducit, ad perniones & mammarum fissuras confert. Vires olei sunt anodynæ, vulnerariæ & resolutivæ, resolvit nempe & attenuat humores contumaciores ex lymphâ vitiosa ortos, laudatur & contra affectus nephriticos. Interne ingens est diureticum, ad urinam & calculum pellendum. Dosis est ad guttas duas, tres quatuor & plures.

RESINÆ ET SUCCI TERREIS CONSTANTES. SANGUIS DRACONIS.

Est substantia gummosa & resinosa, rubicunda, ex parvis quasi grumis modo in panes seu offas coacta, modo folliculis foliaceis inclusa, collecta ex trunco arboris Mexicanæ Draco dictæ, non quod illam Dracones circumvolitent, fabulosum enim illud, saporis adstringentis & viscosi. Arbores hæ nascuntur etiam copiose in insulis Canariensibus. Sunt arbores Palmarum instar, nec fructus multum abludit ab his. Colligitur etiam ex aliis Indiæ arboribus. (conf. Dale Pharmacolog. supplement. p.m. 263 qui tradit tres dari species arborum, quæ sanguinem Draconis præbent.)

Cum terreis virtute fluxus quosvis sistente convenit.

℞. Sang. dracon. ʒʒ. corall. r. ʒj. L. O. g. j. c. ▽ plantag. ʒij. ▽ Cinam. ʒiij acet. ʒij syr. myrt. ʒʒ. f. mixtura pro sistendis mensibus.

℞. Sang.

℞ Sang. dracon. myrrh. ana ʒj gumm. helen. ʒiij thereb. venet ʒvj. ʃ hyperic. par. f. balsamum ad rupturas.

Datur in substantia à ʒβ ad ʒj cum succ. acac. rob. rib. syr. cydon. &c.

℞. Sang. dracon. mastich. myrrh. ana ʒβ alum. ʒj Mell. rosat. q. f. f. linimentum in vacillatione dentium à causa scorbutica.

TERRA

αἷμα δράκοντιον, αἷμα δράκοντος, Drachenbluth, SANG DRAGON.

Olim fabulabantur ex Serpentis & Elephantis invicem pugnantium sanguine mixto componi. Plurimi ex arbore Draconis, cujus fructui figuram draconis impressam esse quidam somniant. derivant. Audiamus KÆMPFFERUM de sanguine hoc ita loquentem. Duplicem nobis exhibent sanguinem pharmacopolia, haud quaquam sola puritate, quod creditur, sed ipso genere arborum, ex quibus colligitur, differentem: unum nimirum in glebis, cujus ex occidente quoque, alterum in guttis, ut loquimur, cujus ex solo Oriente nobis fit copia. Ille in Canariensi insula manat, ex dehiscente caudice arboris pruniferae cujusdam Draco dictae, si Clusiano candori fides est; si Arabibus Persisque credimus, idem ex arbore santalina rubra prolicitur. Ex alia rursus arbore eundem succum derivari contendunt alii. Nec mirum sic dissentiri de illius natalibus. Varium enim adulterium, quin supposititium hujus nominis genus, quod arte componitur & pro encaustis & pictoribus venale prostat, variam conjecturæ & erroris occasionem ignavis rimatoribus suppeditant. De hoc vero posteriori, quem sanguinem in guttis appellant inter Nigritas Orientis Malajos Javanosque exploravi, quod artificio eliciatur ex fructu parvulo, strobili figura, arboris μονοβλάστη spinosissimæ. Eliciendi hic modus est. Reponuntur fructus in craticula supra vas amplum fictile, quod aquam ad sui dimidium continet. Quo facto, vas leviter operculatum supra prunas collocatur, eo fine ut elevatus aquæ bullientis vapor fructus emolliat atque emaciet, ita fit ut tinctura sanguinea, quæ in dissecto fructu ad oculum mihi non comparuit, calente halitu extricatus exsudet, & in superficie fructuum sistatur. Hæc bacillo abrafa in folliculos reconditur, ex folio arundinaceo complicatos, mox filo nectendos, in seriem & in aëre tamdiu suspendendos, donec inclusus

inclusus sanguis exaruerit. Ab aliis simplici coctione opus perficitur: Nimirum usque eo strobili excoquantur donec rubedinem in aqua deposuerint; hæc rejecto fructu coctione ulteriori in spissum succum redigitur, folliculis pariter involvendum. Describit deinde allegatus author ipsam plantam, quæ Palma pinus vocatur, dubius tamen adhuc.

In hæmorrhagiis vulnerum prodest. A quibusdam in casu ab alto commendatur. Sanguine hirci quandoque miscetur, eodemque etiam adulteratur.

TERRA JAPONICA seu CATECHU.

Lycium veterum: Est substantia resinosa, gummosa indurata, ex rufo nigrescentis obscuri & obsoleti coloris, expressa ex fructibus immaturis Arecæ & corticibus arboris Indicæ Catechu, quæ est certa species Acaciæ & in massam calore Δ is redacta, saporis adstringentis & austeri, postmodum dulcis & grati, odoris vel nullius vel debilis.

Et fructibus & corticibus seorsim affunditur ∇ imprægnata calce, quam Indi parant ex conchyliis, utuntur loco Θ Φ ri, quo melius terrea virtus extrahatur, confundunt solutiones & inspissant.

Constat adstringentibus simul & abstergentibus partibus, ob quas in alvi & sanguinis fluxibus, ut & in catarrhis falsis tenuibus, in asperitate, inflammationibus tollendis commendatur. In mundificandis ulceribus sordidis est etiam specificum.

Sumitur vel interne, vel detinetur in ore donec lique scat ad tollendas asperitates.

\mathcal{R} . Terr. Japon, q. v. dissolv. in ∇ add. aliquid succi liquirit. & leni Δ e denuo inspissa, adde inspissato aliquid ambrae & mosch. cum ω u rosar. solut. forma inde pilulas vei trochiscos, vocatur Catechu præparatum.

\mathcal{R} . Terr. Japon. $\mathfrak{z}\beta$ lap. hæm. præpar. $\mathfrak{z}\text{ij}$ conf. ros. Θ lat. $\mathfrak{z}\text{ij}$ L. O g. j. f. bolus in fluxibus. (De terr. Japon. conf. G. W. Wedel. C. N. C. Dec. 1. ann. 2. obs. 128.)

Y y y y

SUC.

CATCHU, Terra **CATE**, *Catechu*/Japanische Erde/*Cachou*.
 Plurimi dixerunt terram esse, quia duriuscula apparet, & linguæ applicata aliquandiu ibi remanet, non alterata. Alii vero & imprimis **WEDLIUS** terram non esse statuunt. Observavit enim hic stramen lignorumque particulas corpora aliaq; peregrina subinde incorporata esse huic concreto, dissolvi penitus in aqua fontana, solutionem evaporatam in fundo relinquere sedimentum non terreum, sed resinofum & gummosum, solutiones omnes secum ferre per philtrum particulas, contra naturam terræ solutæ, & si calcinetur in cineres in aqua solubiles converti. His adde, quæ allegat **HAGENDORN** in **TRACTATU DE TERRA CATECHU**, argumenta, nempe terram *Catechu* omnibus auscultare menstruis & cum iis promptissime in mutuos ruere amplexus, ita ut sine ulla digestionemox tinctura exinde eliciatur, id quod aliæ terrarum species haud faciunt; terram *Catechu* ad ignem positam flammam mox concipere, resinofum exsudare liquorem, inque cineres totam fatiscere &c. Nec obstat **POMET**, qui pro terra quadam è Levante seu Oriente allata ac in montium altissimorum jugis Cedris potissimum feracibus effossa habet, utpote ad quarum cedrorum radices terram hanc admodum solidam & compactam simul aliquali foetore imbutam eruere solent sub titulo *Masqui* qui. Melius cum **AUTHORE WEDLIO**, **AMMANNO**, **HAGENDORNIO**, **LANGIO** aliisque pro artificiali, vegetabili & succo quodam mixto habetur, sive ex succo *Arecæ* & corticibus arboris *Catschu* quod probabilius, sive ex succo *Liquiritiæ* & calami *Aromatici Indici*, cum succo *Arecæ*, conflato. Sicuti autem de ortu ejus ita & de ipsius patria dubitatur. Vocatur quidem terra Japonica, ast alii in Japonia illam provenire negant, & aliunde in illam inferri putant. **HAGENDORN** v. gr. censet in Catajo ortum suum habere & hinc in Japoniam transportari. **KÆMPFFERUS** de hac terra plane tacet.

Convenit hæc terra in omnibus affectibus ubi adstrictione opus est, vomitu, incontinentia urinæ, mensium fluxu, catarrhis vacillatione dentium &c. Dosis est ad scrupulum unum ad drachmam semis.

PHARMACOPOLIS INEST

Tinctura seu Essentia Catechu, *Essenz von Raschou*/ *Essence de Cachou*. Ob vim adstringentem in fluxibus alvinis & hæmorrhagiis compescendis, ad ventriculum roborandum & ad Catarrho laudatur. Dosis ad guttas decem viginti & ultra.

Trochisci de Terra Catechu, *instar Muscerdæ*, *Caschou*/ *Trochisques de Cachou*.

Cachou. Conveniunt in fœtore oris ejusque scorbuto & gingivarum erosione.

SUCCUS ACACIÆ.

Ægyptiacæ est filiquarum immaturarum acaciæ foliis scorpioides leguminosæ C. B. succus expressus coctus & induratus, saporis acerbi austeri adstringentis. Acaciæ in Ægypto duæ sunt species, alia filiquis rotundis teretibus inarticulatis, filiquis isthmo interjecto, ex hoc posteriori colligitur copiosum Gummi Arabicum vermiculatum. Descripta habetur ab Alpino.

In utriusque filiquis crassioribus reperitur substantia quædam viscida subdulcis aromatica, quam ego credo esse acaciam veterum, has enim vulgo adscribunt saporis differentias. Datur in substantia à ʒβ ad ʒj. Constat particulis acidis austeris, cum aliquibus resinosis.

Germanicæ est fructum pruni sylvestris immaturorum succus expressus coctione induratus, nigricans, saporis acidi austeri & adstringentis.

Uterque notus est vi adstringente & incrassante, ob quam in sistendis fluxibus laudatur. Germanicus differt tamen ab Ægyptiaco, vel nullam vel nonnisi parvam resinam obtinet, modus utendi item.

℞. Succ. acac. ʒj L. O. g. j. ∇ plantag. ʒiib. cinam. ʒij syr. acetos. ʒβ. f. haustus adstringens in fluxibus.

℞. Acac. Germ. ʒj solv. in decoct. cortic. gran. ʒij contra nimios menses.

Veteres tribuere vim alexipharmacam sed hoc intelligendum de medulla intra spinarum cavitates.

Pilulæ de succ. acac. cum ꝑio viridi dantur in gonorrhœa.

HYPO-

Ἀκακία vel ab ἀκάω acuo, vel παρὰ τὴν ἀκὴν, quod spinulis gaudeat. *Acacia* / ΑCΑCΙΑ.

Acacia est arbor flore monopetalo, infundibuliformi, stamini-

bus numerosis plerumque donato, & in capitulum collecto; ex floribus autem fundo surgit pistillum quod deinde abit in fructum siliquosum in plurimas veluti foveas divisum, seminibus foetum subrotundis.

Acacia vera J. B. l. 429. Acacia foliis scorpioidis leguminosa, C. B. Pin. 392. Acacia Dod. Pempt. 752. Aegyptischer Schotten oder Schlehendorn / ACACIA D'ÆGYPTIE.

In Ægypto nascitur, ubi etiam succus extrahitur, quo Ægyptii utuntur ad oculorum inflammationes, labiorum fissuras & vacillationem dentium. Laudatur in articulis debilibus, & ad dolores podagricos, si decocto hujus succi membra foveantur; & aliquid quoque succi interne assumatur, uti hoc docet & ALPINUS de PLANTIS ÆGYPTI. Recipitur in Theriacam.

ACACIA GERMANICA sive NOSTRAS est PRUNUS SYLVESTRIS, SPINUS, frutex ubivis obvius in sepibus, Schlehen Dorn / Schlehen Strauch / PRUNIER SAUVAGE

Characterem vide sub Prunis.

Prunus Sylvestris C. B. Pin. 444. & J. B. l. 193. & Lob. Icon. 176.

Flores primo vere; fructus autumnno maturescunt. In usu praesertim sunt flores atque fructus, & exinde expressus succus.

Flores Schlehenblüth / odoris haud ingrati, recentes, laxant blande, aperiunt, abstergunt, vermes necant, sanguinem mundificant, in scorbuto, scabie, hydrope & ictero conducunt. Laudantur quoque ad renes repurgandos, urinam, sabulum, & calculos expellendos. Verno tempore sapissime in fero lactis infunduntur. Et si recentes haberi non possunt, siccati adhibentur, infusum autem deinde stet per noctem.

Fructus ἀγριοκκνυμῆλα, PRUNA AGRESTIA, PRUNULA, PRUNEOLA, Schlehen / Dornschlehen / Heckschlehen / PRUNELLES vocantur, refrigerant, succant & adstringunt, habentque, inquit SEBIZIO, locum magis in officinis pharmaceuticis quam in culinis. Eduntur tamen vel per se vel melle aut saccharo dulcorata, ad ventriculum roborandum, appetitum excitandum & si idam alvum supprimendam. Exiccata pruneola hæc in collutionibus & gargarismatibus ad uvulæ, gingivarum & tonsillarum affectus usurpantur. Imprimis inferviunt ad succum exinde exprimendum, qui succo acaciæ Ægyptiacæ substitui solet.

Musculus pruno Sylvestri adnascens communiter virtute adstringente in herniis multum celebratur. Folia quoque & cortex in gargarismatibus & balneis adstringentibus adhibentur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Aqua florum Acaciarum, Schlehenblüth, Wasser/ Eau de fleurs de Prunier Sauvage, quæ in raucedine, tussi asthmate pleuritide morbis renum alvi laxitate, torminibus infantum convulsivis, & epilepsia celebratur.

Conserva florum Acaciarum, Schlehenblüth Zucker / Conserve de fleurs de Prunier Sauvage, quæ alvum blande subducit vermes, necat, & in epilepsia morbisque pectoris prodest.

Syrupus florum Acaciarum, Schlehenblüth, Syrup/ Syrop de fleurs de Prunier Sauvage. Pro Scopo laxandi & tenue serum expurgandi commendatur, à quibusdam etiam vires antepilepticæ & anthelminticæ ei adscribuntur. Exhibetur imprimis infantibus ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ & ultra.

Tandem quoque mentio facienda *Vini Pruneolorum Sylvestrium, des Schlehen Weins/ Vin de Prunelles*, ex fructibus contulis & siccatis in Vino bono infusis parati, quod contra calculum celebratur, stomachum roborat, coctionem promovet, alvum sistit, & urinam pellit.

HYPOCISTIDIS SUCCUS.

Est plantæ spuriae quasi ex Cisti radice enascentis & hypocistis dictæ succus expressus inspissatus, niger, saporis austeri acidi adstringentis; nascitur ut plurimum in Insula Creta. Ex Cisti foliis colligitur Ladanum.

Convenit cum superioribus, vim etiam habet levem anodynā à $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

℞. Succiacac. hypocist. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. roob. rib. q f f. bolus vel cum ∇ rosar. portulac. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. f. haustus in fluxibus alvi.

HYPOCISTIS, quoniam sub Cisto ex ejus radice nascitur, Hypocist/HYPOCISTE.

Est planta flore monapetalo, campanulato, multifido, cujus posterior pars abit in fructum mollem, intus veluti radiatim divisum & seminibus foetum.

Hypocistis Cretica flore purpureo Tourn, I. R. H. p. 48. Hypocistis Officinatum C. B. Pin. 465. & J. B. 2. p. 1. 7. Orobanche quæ Hypocistis dicitur Raji Hist. 1228.

Planta hæc quæ instar Orobanches, sub cisto assurgit non solummodo in Candia sed & in aliis regionibus calidioribus, Gallia, Galloprovincia, Languedocia &c. reperitur. Aprili & Majo ex eadem succus exprimitur, qui in morbis, ubi adstrictione opus est, locum habet. Ingreditur Theriacam Mithridatium & varia emplastra adstringentia.

SUCCUS SALE SALSO CONSTANS NONNIHIL LAXANTE.

TARTARUS ALBUS ET RUBER.

Est substantia sabulosa, indurata, modo ex rufo cinerea, modo ex rufo candicans, intermixtis salinis quibusdam micis, nata ex vini recentis vel musti particulis terrestribus fermentationis ope præcipitatis & coagulatis, saporis subacris acidi & nauseosi, odoris nullius.

Ob sal falsum ex alcali multo & acido paucò constans virtutem tam incidentem diureticam & laxantem alvum habet, in specie medetur obstructionibus morborum chronicorum, præcipue ubi simul opus laxante.

Datur cremor à ℥j ad ʒj imò ʒiij, solvitur enim cito in ventriculo etiam debili. $\overline{\text{r}}$ us $\text{\textcircled{t}}$ latus a ℥j ad ʒß.

$\overline{\text{r}}$. $\overline{\text{r}}$. præpar. ʒß. $\overline{\text{r}}$. $\text{\textcircled{t}}$ lat. ʒß. M. f. pulv. in febribus ad laxandam alvum.

$\overline{\text{r}}$. $\overline{\text{r}}$. præpar. ʒj coq. cum juscule pulli, cape ad alvum laxandam in obstructionibus morborum chronicorum.

Τεύξ, TARTARUM, TARTARUS, vel à τείρω, affligo vel à τήρω in carcere custodio, vel à ταραύσσω καὶ ἀήρ, quod aer ibi sit turbatus, Weinstein/TARTRE.

Vocabulum hoc, quo Chymici quoque quemcunque succum & residentiam in fundo stabulantem, quasunque quoque limositates, viscositates & impura sedimenta insigniunt, tripliciter alias sumitur. 1. Pro acido vini ab omni vinorum genere inseparabili, nunc magis nunc minus fixo, 2. pro fecibus vini & 3. proprie pro concreto isto salino doliorum lateribus adhærente. Sal acidum non adeo paucum inest, & partibus Salinis intertextæ sunt partes terrestres fixæ, ut & oleosæ multæ. Pro diversitate Vini vel ALBUS est vel RUBER. Eligitur pro usu Medico præcipue albus, qui continua serie coagulatus doliorum lateribus adhæret, maxime ponderosus, duritieque sua non cedens lapidi, & ab ea, qua vinum tangit parte, pluribus apicibus adamantis ad instar acuminatis splendet, quique confractus non apparet instar spongiæ porosus aut terra refertus, sed qui substantia est solidissimus & in medio seu centro albescit. Ruber æque posset usurpari, rejicitur is qui in frustulis minimis & variis quoque quiquisiliis refertus cernitur, & floss audit. Cum in omni tartaro sit pars terrestrior & feculenta, ab eadem liberandus est, antequam in usum

Medicum trahatur, id quod fit per solutionem & iteratam coagulationem, unde

IN OFFICINIS

Cremor Tartari, partes Weinstein-Pulver/ Creme de Tartre.

Cryalli Tartari, præpariter Weinstein/ Crystaux de Tartre. Cremor & Cryalli Tartari nec à se invicem nec à tartaro discrepant, crassos ac viscidos humores incidunt, aperiunt, alvum blande subducunt, in obstructionibus viscerum, affectu hypochondriaco, hydrope cachexia, scorbuto, febribus &c. conducunt: ventriculum roborant & appetitum excitant. Dosis per se ad scrupulum unum drachmam unam, drachmas duas. Sunt qui ad podagram laudant, quo in casu ad duas vel tres uncias assumunt. Notandum quod in aqua frigida tartarus non dissolvatur, & quod in liquore calido solutus, quamprimum refrigescat, ad fundum præcipitetur, quia licet multum salis continet, hoc tamen adhuc implicitum est terræ & oleo.

Sal Tartari fixum, Weinstein-Salz/ Sel de Tartre, quod in vitris optime clausum, si in forma sicca illud conservare volumus, custodiri debet, alias facile liquescit. Hoc Sal naturæ alcalinæ est insigne digestivum & deobstruens, referans obstructiones jecoris, Lienis, renum & ureterum, datur ad ℥ss, ℥j & paulo ultra. Purgantibus ad aliquot grana additur. In aëre facile liquescit in liquorem, unde emergit

Oleum Tartari per deliquium, Weinstein-Dehl/ Huile de Tartre par defaillance, quod Spiritui Vini rectificatissimo non jungitur. Quod si autem cum aqua fuerit solutum facile est connubium. Improperie autem vocatur ob viscositatem oleum, quia flammam non concipit & nihil aliud est, quam Sal tartari resolutum potestque leni evaporatione rursus in Sal redigi. Interne non multum usurpatur, externe vel per se vel cum aliis mixtum, faciei maculas delet, pustulas aufert, impetigini medetur, pro dealbando facie adhibetur, scabiem sanat & ulcera sordida mundificat. Apud Chymicos usus ejus insignis est in præcipitatione solutorum ab acidis, in solutione sulphuris & extractionibus è vegetabilibus parandis. In volatilisatione Salis Tartari fixi multi desudarunt. TEICHMEYERUS id præstari posse dicit, si oleum tartari per deliquium destilletur, remans Sal rursus in aëre solvatur, & denuo destilletur, continuando hunc laborem donec omne transierit, sed quid inde.

Sal Tartari volatile ex fecibus vini, flüchtig Weinstein-Salz/ Sel volatil de Lie de Vin. Vire ei adscribuntur diaphoreticæ & diureticæ, commendatur in affectibus soporosis, apoplexia &c. Datur ad grana sex, decem quindecim.

Tartarus Solubilis, Sal vegetabile. Tartarus tartarifatus, Vegetalisd Salz/ Sel Vegetal ou Tartre soluble. Egregium est medicamentum in dissolvendis cruditatibus ventriculi & Hypochondriorum. Habetur pro insigni aperitivo & diuretico. Purgantium operationem citra tormina eximie promovet. Dosis est ℥ss. ad ʒi. Solvitur in quocunque liquore etiam in aqua frigida unde nom en traxit.

Tartarus Vitriolatus cum Spiritu Vitrioli & Sale tartari paratus, Tartre Vitriolé. Insigne est digestivum ad omnes fere obstructions solvendas, conducit in obstructione Lienis, suppressioneque mensium, in ictero, hydrope, febribus &c. maximi est usus. Dosis ad ℥ss. ℥j. 3℥.

Tartarus Vitriolatus Tachenii, Weinstein mit Vitriol præparirt/immerito alteri præfertur.

Tartarus Emeticus, Brech. Weinstein/ Tartre Emetique. Vires ex nomine patent. Datur ad granum semis, granum unum, duo, quatuor: Quod si præmittatur purgans & post horam unam aut alteram subjungatur tartarus emeticus, in refracta dosi, elegans effectus sequitur. Paratur communiter ex partibus æqualibus crySTALLORUM tartari & croci metallorum, aut in Gallia partes duæ Tartari & una tantum croci assumuntur, unde mitior evadit sed in majori dosi usurpatur.

Terra foliata Tartari, arcanum Tartari, Sal essentielle Tartari, Terre feuilletée de Tartre. Sanguinem purificat, obstructionsque corrigit, hinc non contemnendum est antihypochondriacum, prodest in arthritide calculo & omnibus morbis ab obstructione ortis. Dosis ad grana quinque ad scrupulum & ultra. Facile in aëre liquefcit, hinc in forma liquoris quoque prostat. *Liquor scilicet terræ foliatæ tartari per deliquium, Liqueur de terre feuilletée par defaillance.* Dissolvitur quoque cum aqua, & tunc prodit *Liquor terræ foliatæ tartari limpidus, Liqueur de terre feuilletée claire.*

Tinctura Salis Tartari, Weinstein-Salz-Tinctur/ Teinture de Sel de Tartre, quæ est insigniter aperitiva, obstructions reserat, vias urinarias abstergit, urinam ciet & sanguinem purificat. Dosis ad guttas decem viginti triginta & ultra.

Spiritus Tartari rectificatus, rectificirter Weinstein-Geist/ Esprit de Tartre rectifié. Incidit, attenuat, resolvit, obstructions reserat, sudores ciet, atque urinam movet, in mensibus retentis, paralyfi, ictero convenit. Dosis ad ℥j ad 3j.

Oleum Tartari foetidum, stinckend Weinstein-Dehl/ Huile de Tartre fœtide. Interius rarissime vel nunquam usurpatur. Unguentis ad scabiem additur, tumores duros resolvit, dolores artuum contumaces valida frictione inunctum mitigat, membris paralyticis inservit, egregium est vulnerarium mundificandi vi præditum. Mulierum Hystericarum naribus admoveatur.

Pilula Tartaræ Quercetani, de quibus sub aloë.

Mixtura simplex, seu Spiritus de Tribus, Mixture simple ou Esprit de Tribus. Vires habet incendiendi, attenuandi, tenuitateque substantiæ per totum corpus absque molestia penetrandi. Commendatur in Epilepsia, pleuritide, obstructionibus viscerum, affectibus hypochondriacis & melancholicis, imprimis in febribus ardentibus & malignis auxiliares præstat operas, earum materia dissipat & per diaphoresin à centro ad superficiem pellit, & absumit, inde & diaphoreticum in peracutis à Paracelso dictum. Dosis ad ℥j. ℥ij. in vehiculo appropriato.

Liquor Spleneticus ex Tartaro & Nitro Schrœderi, Liqueur de Tartre & de Nitre de Schrœder. Insigne est deoppilativum Lienis aliarumque obstructionum mesenterium maxime infestantium, adeoque utile in hypochondriaca scorbuticaque affectione ac mensium obstructione, & affectione nephritica, Dosis cochlear semis ad unum vel ad 3ij. 3℥ cum aliis appropriatis vehiculis.



PARS SECVNDA. CONTINENS REGNUM ANIMALE.

PARTES ANIMALES SALE VOLA-
TILI OLEOSO CUM MULTIS TERREIS
CONSTANTES.

CORNU CERVI.

HUjus substantia vel cruda vel præparata Θ e alcalino
& multa terra constans, vi incidente & absorbente
omnia acida & viscida pollet, decoctum hujus tem-
perat, est anodynum & blandum simul sudoriferum,
hinc confert in malignis, acutis, variolis, morbillis, diar-
rhœa, dysenteria, epilepsia & pluribus aliis affectibus ab
acido.

Datur crudum & præparatum à ʒʒ. ad ʒj.

℞. C. C. præp. gr. xv. \odot r. foliat. par. exhibe contra tor-
mina infantum.

℞. C. C. præp. ʒj. \circ Nuc. Mosch. expr. ʒj. L. O. gr.
ij. conf. fl. ros. ʒiʒ. syr. acetos. citr. q. s. f. bolus in quolibet
fluxu.

℞. C. C. præp. ʒʒ. Castor. gr. vij. Θ vol. C. C. gr. v. M.
f. pulv. exhibendus ex ∇ Card. B. & Cent. min. contra vario-
las & morbillos.

℞. Rasur. C. C. ℥ij. coq. in ∇, cape decoct. ad temperandam sanguinis acredinem, cui add. syr. rosar. vel violar. vel rub. id ad ℔j. ℥j. f. Julepus.

℞. Rasur. C. C. ℥iiij. rad scorzon. ℥iiij. ras. lign. fassafr. ℥j. f. decoct. sudorif. in malignis pro potu ordinario.

℞. us C. C. datur à gt. v. ad xxx. in convenienti vehiculo.

℞. ℞. us C. C. succinat 3℔. cape ex ∇ cinam.

℞. ∇ Cinam. 3℔. ℞. C. C. succinat. essent. castor. ana 3℔.

L. O. gr. j pro uteri vitiis.

Pulv. dentifricius: ℞. C. C. ust. Corallor. of. sepiæ, pumic. ana ℥j. oö lign. rhod gt. ij. M.

CRA.

Ελαφός, CERVUS, Hirsch/ CERF, foemella ejus vocatur Cerva, Hirsch, Kuh/ Hinde/ Wilde/ das Thier/ Biche, Pulli vero vocantur HINNULI, Jung-Hirsch/ Hind, Kalb/ Hirsch Kalb/ FAONS. Hic autem de Cervo Mare potissimum est sermo, qui varie quoque, praesertim etiam ratione cornuum discrepat.

Definitur Cervus à GRAB, in Ελαφωγραφία, seu descriptione Cervi, quod sit Brutum quadrupes, bisulcum, natura ferum, cornibus bimum simplicibus ac rectis, deinde ramosis praeditum, quotannis deciduis, pilo molli spadiceo colore, rancorem edens, timidum, velox ac vivax, in locis montosis ac sylvestribus degens, à Deo in multiplicem hominis usum primæva creatione formatum.

Cervi rancorem edunt, graviter rudiunt, glocitant sitibundi, imprimis cum libidinis æstro perciti agitantur, id quod sub finem mensis, Augusti, circa Ægidii festum, fieri solet, ubi plurimi Cervi salaces Zelotæ vehementer quandoque inter se pugnant & vulneribus se invicem conficiunt. Quando conceperunt foemellæ, separantur Mares, & Mares seniores cum maribus, foeminæ vero cum foeminis & maribus junioribus degunt ac pascuntur. Circa octavum

unum atque nonum à conceptu mensem, cum horribili clamore, modo unum, modo geminum edunt partum.

Adeo vivax dicitur Animal esse cervus, ut centum & ultra annos supergrediatur. Infinitum fere homini præstat usum Cervus, tum ipse integer ac vivus, tum ejus externa & interna pars, sive oblectamentum, sive vestimentum, sive alimentum & Medicamentum spectes.

Hic de usu Medicinali sermo erit, ubi vix non integrum Pharmacopolium contra quosvis morborum insultus auxilia subministrans, in Cervo latens deprehenditur. Prodeunt primo loco Cornua, quibus Mares, non vero fœminæ, ordinario exornantur. Anniculo Cervo cornua nondum nascuntur, nisi quod cernatur excrescentia cornea aut protuberans quoddam, quod breve hirtumque est, cute quasi vestitum & lanugine tenui & molli hispidum. Bimis Cornua demum proveniunt, primo quidem simplicia & recta, trimis bifida, quadrimis trifida & sic ad sextenarium procedit numerus. Ex quo tempore per numerum ramorum non nisi difficulter cervi cognoscere ætatem, & tantummodo dentibus aut plane absentibus aut paucioribus, adminiculis sive ramis inferioribus deficientibus, licet, dum deinde in insignem quandemque excrescunt magnitudinem & ramis non amplius cognoscibilem. In Typhis cervorum *Den Hirschfolben/ Cornichons* ou cornes nouvellement sorties, têtes ou cru de Cerf, cum cornua adhuc sunt molliora, color rubens & sanguineus videtur, annosioribus vero in cornubus in superficie conspicitur magis puniceus aut ex flavo pallens aut nigricans, juxta apicem vero albus; intrinsecus autem gryseus & partim ater, partim vero albus vel mixtus.

Cornua singulis annis ante vel circa Veris tempus deponunt Cervi, qui postmodum sese tamdiu occultant, donec nova prodierint cornua & satis firma, pastum euntes nocturno solum tempore. Curiosum est, quod Cervi juniores ante eruptionem cornuum castrati cornua deinde non acquirant, si autem cornuti jam castrentur nunquam deinde eadem deponant. Perhibetur quoque de Cervis, quod è depositis cornubus vel dextrum, vel juxta alios sinistrum, omni modo, ne inveniri facile possint, occultent, unde de rebus & locis abditis in proverbio dicitur, quo Cervi amittunt & deponunt cornua.

Hæc cornua jam delectamentum, alimentum & medicamentum constituunt. Par cornuum majorum termino tecnico venatorio ein Gehirn/ oder Geweihen/ Corne de Cerf, crassitiem autem eorum ubi majores extant Stangen/ minores ex his erumpentes Zincken/ appellant. Communiter autem Hirschhorn vocantur, Emolliuntur cornua coctione longiori ad octo horas usque protrahita, in aqua, addito præsertim cineris modico, unde varia postmodum exinde res fabricantur, ne dicam de aliis usibus æconomicis.

Ex Typhis Cervorum, ut GRABA loquitur, seu tenellis & adhuc lanuginosis cornibus insigne paratur edulium, Magnatibus sæpe numero & delitiosis Hominibus oppido voluptuosum.

I N O F F I C I N I S R E P E R I T U R

Aqua Typhorum Cervi, Hirschsolben, Wasser/ Eau de cru ou tête de Cerf, quæ à multis, tanquam alexipharmaca & febribus ardentibus vel malignis dicata, vel per se ad aliquot cochlearia aut vehiculi loco cum aliis propinata, aut cum aliis juncta, deprædicatur.

Ipsam Cornu Cervi vix non pro panacæa habetur, & ab haud paucis summæ eruditionis & judicii Viris Unicornu & lapidi Bezoar vel præfertur, vel saltem æquiparatur.

P R O S T A N T I N O F F I C I N I S P H A R M A C E U T I C I S V A R I A E X I N D E P R Æ P A R A T A .

Cornu Cervi philosophice præparatum, weiß gekochtes Hirschhorn/ Corne de Cerf préparée sans feu ou philosophiquement, quod ad affectus ab authore allegatos ad 3ß. & ultra datur.

Cornu Cervi ustum, gebrandt Hirschhorn/ Corne de Cerf brulée, quod præter virtutes allegatas vi adstringente, anthelmintica, alexipharmaca & antifebrili gaudet. In decoctis pro potu vel per se, vel cum aliis frequentissime usurpatur. Minutissime tritum vocatur *Cornu Cervi præparatum, præparirtes Hirschhorn/ Corne de Cerf préparée*, datur ad drachmam usque.

Magisterium Cornu Cervi, Magistere de Corne de Cerf, quod tamen vix amplius in usu.

Sal volatile Cornu Cervi, flüchtig Hirschhorn, Salt/ sel volatile de Corne de Cerf. Spiri-

Spiritus Cornu Cervi volatilis rectificatus, rectificirter Hirschhorn-Geist / Esprit volatil de Corne de Cerf rectifié. &
Oleum Cornu Cervi, Hirschhorn-Dehl / huile de Corne de Cerf.

Spiritus & sal volatile sunt medicamentum penetrantissimum, alexipharmacum, cephalicum, antapoplecticum, antepilepticum, uterinum & antasthmaticum. Spiritus exhibetur ad guttas quinque, decem, viginti & ultra, sal autem volatile siccum ad grana quinque, decem &c. porrigitur. Oleum foetidum vix aliter quam externe, in roborandis partibus paralyticis, item in excitandis mulieribus Hystericis usurpatur.

Liquor Cornu Cervi Succinatus, Hirschhorn-Geist mit Agstein / Esprit de Corne de Cerf avec le sel volatil de Succin ou Carabe. Conducit in corrigendo acido præprimis puerorum, in motibus convulsivis & epilepticis ut & morbis soporosis prodest. Datur ad guttas aliquot, ad quindecim & ultra.

Aqua Cornu Cervi Citrata, Hirschhorn-Wasser mit Citronen / Eau de Corne de Cerf Citrée. Waldschmidium authorem agnoscit, Analeptica deprædicatur & æstum sedans, vires quoque alexipharmacæ eidem adscribuntur. Exhibetur cochleatim aliisque mixturis immiscetur.

Imprimis autem ex *Rasura Cornu Cervi*, dem geraspelten *Hirschhorn / Rature de Corne de Cerf*, quam etiam vel in pulvere, vel in decoctis adhibent, celebris est & à pharmacopolis & à coquis præparata, *Gelatina sive Galreda Cornu Cervi, Hirschhorn Galrey / Gélée de Corne de Cerf.* Convenit in multis & magnis morbis, ubi humectandum, refrigerandum, confortandum & adstringendum. In Hæctica, Phthisi, alvi fluxibus &c. Dosis cochlear unum vel alterum, vel per se, vel in juscule. Poterit instillari succus Citri, aut edulcorari saccharo, vel majoris confortationis gratia adjici confectio alkermes. Sunt etiam, qui hanc Gelatinam cum aqua & vino parant. Ubi nutriendum & demulcendum simul, egregie conducit *Gelatina Cornu Cervi Amygdalata*, dum Amygdalæ dulces ex-corticatæ cum gelatina calida contunduntur & emulgentur, ubi deinde consistentiam paulo crassiolem colore albicante resplendentem nanciscitur. Usus in supra dictis similibusque affectibus non plane spernendus est. Fuere equidem, qui in Gelatina nihil solidi

P A R S S E C U N D A.

inesse putarunt, ast falso, contrarium enim testatur *Gelatina Cornu Cervi sicca*. Quodsi enim Gelatina ad ignem lentum evaporetur, remanet pulvis fuscus, qui eo in casu, ubi diffusior gelatina locum non habet, & imprimis ubi mucus ventriculi & intestinorum videtur abrasus vel imminutus, convenit vel sicca assumptus in forma, vel in pauca quantitate liquoris dissoluta, ubi glutinis ad instar comparet.

Præter cornua plures aliæ partes ex Cervo in usum trahuntur *Medicum, v. gr. LACHRYMÆ, Hirschthränen/LARMES DE CERF*, in angulis oculorum concrecentes, quas alii, sed falso, pro lapidis cujusdam venditant specie, magnique in expellendis præsertim venenis faciunt.

COR CERVİ, Hirsch-Herz/ Cœur de Cerf, quod multi, ex nescio qua superstitione, pro peculiari magnarumque virium analeptico habent, & exinde varias compositiones antihecticas & confortantes parant.

OS DE CORDE CERVİ, Hirsch-Creuz/ Os de Cœur de Cerf, quod nihil aliud est quam arteriarum, in basi cordis concretio ab initio cartilaginea, mox ossea facta, coloris albicantis, figuræ irregularis, crucem plerumque referens, odore & sapore destituta. Insignis huic ossi assignantur virtutes, alexipharmacæ, cordiales & totum corpus confortantes, ita ut in omnibus compositionibus bezoardicis olim reperiretur, ad uterum quoque & fœtum roborandum celebratur. Datur ad ʒi. ad ʒß. Externe quoque tanquam amuletum in hæmorrhagia nimia deprædicatur, quem in finem etiam vel potui injicitur, vel in pulvere naribus inflatur. An autem peculiare quid præ aliis ossibus possideat, vix credibile est. Taceo nunc lapidem in corde aliisque partibus reperiundum. Ex sanguine parant quidam spiritum diaphoreticum & alexipharmacum, alii eundem sanguinem exsiccatum in dysenteria contra calculum & ischuriam laudant.

PRIAPUS CERVİ, Hirschruthen/ Priape de Cerf, adversus morsus venenatos, in peste, contra pleuritidem colicam &c. commendatur, pellit urinam & calculum & in mictu cruento laudatur, specificum habetur antidysentericum, ad partum promovendum adhibetur, & imprimis ad venerem excitandam celebratur, contra sterilitatem suffitus ejus membris genitalibus excipitur. An alia virtus

virtute, quam sua substantia gelatinosa & sale volatili agat saniores judicent. Pro scopo aphrodisiaco deprædicantur quoque multum **TESTICULI CERVINI**, *Hirsch. Seylen.*

SEVUM, SEBUM CERVINUM, *Hirschen. Unschlitt / Suif de Cerf.* Penetrat, attenuat, dissolvit, emollit, demulcet & dolores sedat atque tumores, conducit ad perniones, laudatur in hernia, in excoriatione perinæi multum celebratur, egregie quoque prodest in clysteribus ad alvi fluxus & dysenteriam. Hæc jam de Cervo dicta sufficiant.

CRANIUM HUMANUM.

Respondet virtute Cornu Cervi, etiam specificum habetur in epilepsia, datur in substantia à ℥j ad ʒj.

℞. Cran. human. ʒß. cap. cum ∇ ʒuof. meliss. vel. fl. lil. ad Epilepsiam.

℞. Cran. human. ʒj. usneæ cran. hum. gr. x. L. O. gr. j. N. M. tost. ℥j. f. pulv. ad dysenteriam.

EBUR.

Hirnschahl / CRANE HUMAIN.

Sunt multi, qui in ossibus humanis peculiares quærunt virtutes, & prouti ex diversis desumuntur partibus, differentibus quoque viribus gaudere illa ossa putant, aliis ossa ex eadem constare materia, & iisdem per consequens facultatibus absorbendi, adstringendi, exsiccandi, acrimoniam mitigandi, alvum sistendi & transpirationem insensibilem atque sudorem promovendi pollere pronuntiantibus. Curiosi interim, ne dicam superstitiosi, eligunt præprimis cranium humanum & quidem non morbis defunctorum, sed violenta morte interemptorum, rotæ impositorum, de patibulo suspensorum aut in præliis occisorum. Eligunt nonnulli solum os triquetrum a nonnullis crux dictum. Sunt qui pro scæminis anteriorem cranii partem, pro maribus posteriorem colligunt.

Super-

Superstitio est porro insignis, quod potus ex cranio humano per aliquot dies haustus scrophulas curet, aut quod bibentes ex eodem cranio immunes sint ab armis.

In cranio aëri exposito muscus nascitur, quem *USNEAM CRANII HUMANI*, *Moos von Menschen-Hirnschaalen* / *USNE'E* ou *MOUSSE de CRANE HUMAIN*, appellant, nunc faciem, ut *LANGIUS* loquitur, villorum seu capillorum, nunc crustarum præ se ferens, coloris ex viridi incani, saporis terrei ac subadstringentis, odoris expers. Quoniam rarior hæc est usnea ideoque arte factam quidam substituunt. Recipiunt nempe, teste *ERTMÜLLERO*, muscum è lapidibus grandioribus, eumque mense Aprili collectum & leviter exsiccatum pulverisant grosso modo in mortario vitreo, irrorando cum vino malvatico, ut pultis consistentiam acquirat, postmodum hunc pulverem cum cultro illinunt Cranio rota fracti cadaveris admodum subtiliter, ubi sensim exaruerit denuo repetunt, ponunt sub dio seu cælo aperto radiis solaribus, quoties vero pluviae superveniunt dimovent à loco, aliquoties hæc reiterando, usque dum efflorescat, & postmodum usneam inde colligunt. Sicuti autem cum ossibus ita & cum hac usnea multa superstitiosa & impia perpetrantur. Recipitur in Unguentum armarium, & ad firmandum corpus vel per se vel cum Zenith juvenicularum usurpatur. In Medicina ejus virtutes cephalicæ & antepilepticæ deprædicantur multum, ast si quæ sunt, non aliunde dependent, quam à vi absorbente siccante & adstringente, quam etiam ob rationem fluxus hæmorrhagicos compescit.

IN OFFICINIS REPERIUNTUR

Cranium humanum raspatum, *Geraspelt Hirnschahl* / *Crane humain raclé.* &

Cranium humanum præparatum, præparirte *Menschen-Hirnschahl* / *Crane humain préparé.* Datur ad drachmam usque.

Magisterium Cranii humani. Magistere du Crane humain, sed vix usurpatur.

Sunt qui spiritum exinde & sal volatile eliciunt, alii quintam essentiam extrahunt. Sed possumus his remediis utique carere.

EBUR.

EBUR.

Plus terræ, sed minus Ois volatilis habet quam Cornu Cervi, unde potentius est in absorbendo acido, commendatur etiam specificè ad nimium mensium & album fluxum & præcavendum abortum, datur ut cornu cervi.

℞. Ras. ebor. ℥ij. camphor. gr. vij. f. pulv. cape ex ∇ rofar, nymph. ana ʒiʒ. ad menses decolores albos.

℞. Ras. ebor. succin. præp. C. C. præp. ana ʒj. mastich. ʒʒ. lign. aloës ℥j. Nuc. Mosch. ʒʒ. f. pulv. ad fluorem album, cape vel ex decocto vel vino fassaf.

UNI-

ELEPHAS, ELEPHANTUS, Elefant / Elephant / Helsing / ELEFANT, ELEPHANT.

Est animalium quadrupedum bellua maxima, aspectu horrenda, altitudine quatuor quinque ad octo & ultra ulnas adæquans. Caput habet grande admodum, sed deforme, auriculis demissis, oculis in se quidem magnis, sed ratione capitis parvis, proboscide sive promuscide, quam alii etiam manus vocant, in quam nasus diducitur, gaudet longissima, carnea, nervosa, flexibili, duobus foraminibus non tantum in extremitate prædita, sed & per totam longitudinem pertusa, qua veluti manu utitur tum ad cibos colligendos orique admovendos, tum ad injurias arcendas, & ad corpus suum defendendum. Dentibus porro, præter illos, qui in ore latitant, instruitur binis instar dentium aprinorum extra os produntibus. Durissimum tergum rarissimus pilus contegit, cruribus crassis equidem sed nihilominus contra falsam vulgi opinionem flexibilibus præditum, vivax, ferum sed domabile & docile, coloris cinerei rarius albicantis, ordinario vocem edens gracilem, & quasi luctuosam, quandoque horrendum murmur & quasi mugitum, reperiendum in India Orientali præsertim insula Ceylon, ubi omnium nobilissimi existunt. Quod si de hujus animalis variis qualitatibus docilitate, astutia, robore, ut & de fabulis quæ de eo spargun-

sparguntur, differere vellemus, longum nimis foret, interim de elephante conferri poterunt peregrinationum scriptores, ut & STURMIUS in dissertatione de elephanto per Europam ad spectantum circumducto, præsertim cum in usum Medicum non suppeditet nisi DENTES, quos EBUR, *Helffenbein/ivoire* appellant. Sunt autem, definiente LANGIO, prominentiæ ossæ ex elephantis maxilla superiore, aut uti alii volunt ex ipso cranio prognatæ, ex basi ampliori cava in cuspidem desinentes solidissimam, reflexæ diversæ magnitudinis, longitudinis, crassitie & ponderis, pro ætate ipsius bestię, exterius coloris subfusci, interius albicantissimi, odore & sapore carentes.

Commendatur Ebur in fluxibus alvi, epilepsia, vertigine venenis atque vermibus, ad tormina infantum in pulve quoque celebratur. Adhibetur in decoctis pro potu, & gelatinæ quoque exinde confici possunt. Usurpatur ejus præsertim *rasura*, *geraspelt Helffenbein/ivoire rapée ou raclée, Rasure d'ivoire*.

IN OFFICINIS PROSTAT

Magisterium Eboris, Magistere d'ivoire, quod autem non multum in usum trahitur.

Ebur ustum, sive *spodium ex Ebore*, *gebrandt Helffenbein/ivoire brulé* ou *spodium*, quod absorbet & adstringit. Datur ad ℥j. 3℔. Non confundi debet cum spodio Minerali.

Quanti usus sit apud Toreutas & quam elegantia exinde parentur vasa & instrumenta in vulgus est notissimum.

UNICORNU VERUM.

Cum ebore convenit, decantatum tamen est in epilepsia puerorum item torminibus, & convulsionibus.

℞. Ebor. unic. crystall. mont. præpar. ana ʒj. L. O. gr. v. N. M. tost. ʒj. f. pulv. in cholera dandus ex ∇ Menth. Cinnamon. & syr. portulac.

℞. Unic. 3℔. Θ vol. C. C. gr. viij. datur ex ∇ chærefol ʒi℔. c, syr. Card. B. ʒij. contra variolas & morbillos.

UN-

MONOCEROS, Einhorn / LICORNE.

De hujus natalitiis veteribus non bene constitit. Habebant enim pro cornu animalis cujusdam quadrupedis, Equo similis Ungulis fissis & unico cornu in fronte donati. Alii aliter quadantenus hoc animal figuratum esse voluerunt. Ast tale unicornu non nisi in Utopia reperitur. Recentiores sane, imprimis WORMIUS & BARTHOLINI aliique plures, verum illud animalis unicornu habitum esse DENTEM BALENÆ NARHVAL dictæ, reperiundæ cum in mari boreali tum etiam in Islandiæ Groenlandiæque aliarumque vicinarum insularum littoribus esse dicunt. SACHSIUS in MONOCEROLOGIA, contra BARTHOLINOS negat esse dentem, sed revera cornu, quoniam non datur animal unico dente præditum, quoniam radix unicornu neque acuta, neque cornu multum tenuior, secus ac in aliis dentibus, sed ejusdem fere cum hoc crassitudinis, neque deorsum, neque sursum vergit, sed recta linea in sinu suo ad oculorum orbitam excurrit, neque os hoc in palato, ubi prensatio & incisio ciborum fieri potest & debet, sed extra è nare lanceæ oblongæ instar progreditur. Manet igitur nostræ belluæ quocunque etiam modo cornu ex proboscide seu nare exeat & in cranio generatum & affixum sit, Unicornu gloria ejusque cornu Unicornu nomen illibatum. Sunt tamen adhuc alii authores, qui diversa animalia unicornu superbire putant, qua de re conferri meretur BROUVNE in PSEUDODOXIA EPIDEMICA, præsertim cum Unicornua etiam reperiantur diversa, quædam enim quasi Torno elaborata cernuntur, alia vero glabra existunt. Hoc certum, quod illud Unicornu, quo pro usu Medico utimur ex Cetaceo animali sit depromptum. Est autem candidum, teres, striatum, & tornatile, aliquot ulnas plus minus longum, ad Ebur accedens, durum, grave, intus etiam quoad partem excavatum, odoris & saporis nullius. Variis in locis elegantia & grandia asservantur cornua: iis superbiunt Venetiæ, fanum S. Dionysii in Gallia, Antwerpia, Argentoratum & Magnatum aliorumque Musea, magno quoque pretio acquisitis, quasi ex animali terrestri depromptis & admirandis virtutibus præditis. Ast ex eo tempore, quo Unicornu origo innotuit, ejus etiam existimatio multum cecidit, sicuti quoque ejus tantis laudibus ad cælum fere elata virtus alexipharmaca, contra omnia venena utilis, in dubium fuit vocata, nullaque alia con-

cessa, quam quæ aliis cornubus aut dentibus competit, virtus videlicet absorbens acidum, & acre mitigans & lenis diaphoretica. Datur non ad grana aliquot sed ad ℥j. ʒß. &c. in morbis etiam spasmodicis.

UNGULA ALCIS.

Cornu Cervi per omnia respondet, epilepsiæ vero unicè videtur dicata esse. Datur ut cornu cervi, incenditur quoque ad arcendos insultus epilepticos.

℞. Ungul. alc. rad. pœon. sem. pœon. visc. quern. ana ʒj. ☉ vol. C. C. ʒß. f. pulv. ad epilepsiam, cape ex ungu ceraforum nigrorum.

℞. Ung. alcis. castor. ana ℥j. M. f. pulv. ad epilepsiam foeminarum pro ij. dosibus.

BLAT.

ALCE, Elend / ELAN.

Est animal cervo simile, paulo tamen crassius & altius. Humeros habet depressiores & humiliores partibus posterioribus. Capite aliquantulum prono incedit. A summo capite usque ad humeros & maxime in cervice pilos habet prolixos, color plerumque vergit ad cineream albedinem, pro vicissitudine tamen anni pili varias subeunt mutationes. Caput est oblongum ac gracile, si conferatur cum toto corpore. Labra magna, prominentia, & crassa, maxime superius, qua de re retrograditur in pascendo. Os habet longum, dentes non admodum magnos nec longos, aures prolixas latasque. Fœmineus sexus cornibus caret, Masculinus multifida ac ramosa habet, sed non tam longa & frondosa ut Cervi vulgares, lata tamen & instar magnæ avis alæ extensa mucronibusque quibusdam divisa, pondere duodecim fere librarum si matura sunt aut præ maturitate deciderunt; mutat enim illa statim temporibus, ut Cervi solent, decidentibus sponte pristinis & novis sub-

subnascentibus. Est præterea obeso & grandi ventre, fere ut vacca. Cauda mirum in modum brevis. Ungulæ bifidæ, ut cervis & bo-
bus, unde & inter bisulca quadrupeda numeratur. Ita describitur
à SCHOTTO in PHYSICA CURIOSA, quocum conferri meretur
BACCIIUS & WIGANDUS de alce, aliique Historiæ Naturalis
scriptores.

Simplex dicitur esse animal & valde timidum, cum tamen ve-
locissime currat. In regionibus præsertim septentrionalibus, Lithua-
nia, Moscovia, Suecia reperitur. In usum Medicum ex hoc ani-
mali trahuntur potissimum Ungula & Cornua.

UNGULA ALCIS, *Elends Klauen* / *ONGLE d'ELAN*, cor-
nu colore & compage refert, sapore destituta ut & odore, nisi ra-
spetur. Optima censetur à vivo animali abscissa; & à quibusdam
quæ masculi est eo tempore capti, quo animal ruit in Venerem.
Epilepsiæ præter alias rationes, etiam propterea dicata esse cense-
tur, quoniam ipsum animal se ea liberet. Fabulantur enim Al-
cem singulis diebus corripere hoc malo, & levare dextri posterioris
pedis ungula sinistræ auri immissa: alii dicunt id fieri pede sini-
stro in aurem dextram immisso; consulatur WIGANDUS allega-
tus, mirum quod homines imperiti ejusmodi nugas ausi fuerint
comminisci & in vulgus scribere, pronuntians. Non solummodo
autem interne ad malum caducum & alias convulsiones tremo-
rem apoplexiam usurpatur, sed & de collo suspensa gestatur aut an-
nulis exinde factis digiti ornantur, circa quos notandum ab Agyrtis
sæpius substitui annulos ex ungula bovina, qui autem dum radun-
tur foetent, qui foetor in ungula alcis deest. Adhibetur quoque in
suffumigiis tum ad dictos affectus tum etiam ad passionem Hyste-
ricam. Ad eundem scopum quidam CORNU quoque Alcis
Elends Horn / *Corne d'Elan*, utuntur, ubi nonnulli dextrum præfe-
runt. Potest exinde elici Gelatina æque ac ex Cornu Cervino.

BLATTA BYZANTINA.

Est substantia testacea ad corneam accedens, oblonga
spadicea, pinguis, nata in conchis rubri maris, orificium vel
aperturam conchæ claudens, saporis & odoris dum accen-
ditur

ditur castaneam æmulantis. Ab ungula alcis nil differt, at-
tamen paulo majore dosi data solvit alvum, datur ut un-
gula alcis.

℞. Blatt. byzant. ung. alc. troch. d. charab. ana ʒʒ. injice
prunis, hauri fumum ore & naribus ad arcendum epilepti-
cum insultum.

Recentiores hanc blattam pro ungue odorato veterum
habent, æmulatur enim figuram unguis animalis.

Blatta Bifantia, Indianische Muschel-Schablen / Blatta Byzan-
tina.

Reperitur in India Orientali inter nardum unde ejus odor
bonus quem tamen cum tempore amittit. In Medicina vix usur-
patur.

MANDIBULÆ LUCII PISCIS.

Sunt ossa mandibulæ inferioris, saporis & odoris nullius
evidentis, integra capita profunt, palmam oculis & præri-
piunt in pleuritide & peripneumonia.

℞. Mandib. luc. pisc. C. C. præp. ana gr. xv. Θ vol. C. C.
gr. iij. f. pulv. cap. ex ∇ flor. sambuc. contra pleuritidem,
add. essent. castor. ʒj. ∇ flor. chamom. ʒiʒ. syr. artemis. ʒiij.
exhibe contra colicam convulsivam.

℞. Mand. luc. pisc. dent. apri. ʒ diaph. ana ʒj. Θ vol. C. C.
gr. vj. f. pulv. cap. ex Emuls. sem. Card. ben. mar. papav. alb.
ana ʒij. c. f. q. ∇ flor. pap. rhœad. f. emuls. contra pleuritidem
& peripneumoniam.

℞. Mandib. luc. pisc. succin. præp. ana ʒj. f. pulv.
cap. ex ∇ flor. nymph. contra gonorrhœam & fluorum al-
bum.

DENS

LUCIUS, Λύκος, **LUPUS PISCIS**, **REX**, **PRÆDO**, **TYRANNUS AQUARUM**, *Secht* / **BROCHET**.

Definiēte SCHWENCKFELDT piscis est voracissimus & edacissimus, fluviiis, lacubus, piscinis aliisque aliis dulcibus aquis peculiaris. Color ei per dorsum fuscus, ad latera subflavus, ventre albo, squamis minutis densissime compactis. Pinnae ad branchias & ventrem binæ, totidem ad caudam supra & infra unica dilute fusca. Branchiæ senæ utrinque ternæ. Oculi nigri, Iris aurea. Cor sub branchiis minutum sature rubet. Hepar longiusculum simplex, cui anteriore loco fel jungitur majus cæruleum. Ventriculus oblongior intestinis replicatis continuus. Splen latiusculus cordis figuram fere æmulatur sanguinei coloris. Vivacissimi sunt pisces & diu conservari queunt. Partum numerosum edunt Lucii. Non solum aliis piscibus, sed & sui generis insidiantur. Vescuntur quoque aliis animantium cadaveribus in flumina & piscina coniectis.

Discrepant Lucii, tum ratione locorum, in quibus degunt, tum etiam ratione magnitudinis, unde quoque diversa obtinent nomina.

Qui Lucii in fluminibus puris rapidisque educantur, carnem habent duriusculam ac friabilem, uti SEBIZIUS differit, εὐπεπλον item, εὐχυμον & excrementis vacantem. Qui in stagnis lacubus & piscinis aluntur, limosum virus redolent, mali succi sunt, carneque constant glutinosa & excrementitia. Delicatissimi sunt LUCIOLI præsertim NOVELLI, quos HORNOS Heurling vocant. Annosi Lucii duri sunt & concoctu difficiliores. Variis modis à coquis præparari & condiri solent Lucii, de quibus vide supra allegatum SCHWENCKFELDT, & artis coquinarie scriptores.

Ex hoc pisce plures partes in usum trahuntur Medicum. Cor antipyreticum, fel ophthalmicum, Pinguedo tussi mederi dicitur, hinc plantis pedum & pectori infantum præcipue inungitur: foveis quoque à Variolis replendis dicatur. Officulum cruciforme in capite reperiundum interne ad epilepsiam, appensum ad incantationes prodesse fertur.

Mandibulae Lucii piscis imprimis præparatae, præparante Secht.
Fissel / Machoires de Brochets préparées ad affectus inflammatorios re-
num

num & vesicæ, ut & ad secundinas promovendas adhibentur. Externe ad ulcera inveterata & synoviam usurpantur.

DENS APRI.

A mandibulis lucii piscis nil differt, & cum his simul datur. ℞. Dent. apr. ʒij detur ex ʒo lini rec. expr. ʒiij per vi-
ces ad expectorationem & concoquendam materiam in pleu-
ritide.

In inflammationibus internis. ℞. Dent. apr. 3ʒ. Θ vol.
C. C. ʒʒ. ex ∇ papav. scabios. ana ʒj.

OS

APER, quasi Afer, sive Asper, VERRIS SYLVATICUS, καπρὸς, PORCUS AGRESTIS MAS, ein wild Schwein / ein Hauer / Sanglier. Ejus fœmella vocatur SUS FERA, ὡς ἀγρὶς, SCROPHA SYLVESTRIS, wilde Sau / Beer. Mutter / PORC SAUVAGE; Juniores autem vocantur PORCELLI SYLVESTRES, junge Frischling.

Aper fera est cuivis nota, uti SCHWENCKFELDT dicit, quam non solum natura obdurata pelle pilisque hirsutis vestivit, verum etiam ipsa luto se loricat, ne facile lædi possit. Nisi lethale acceperit vulnus Venatorem conculcat si ipsum ferire nequiverit. Dentibus aper armatur magnis & ad incidendum aptis. Venatoribus Wehren / Wassen / Hau. Zähne / audiunt, quibus percutiunt; scrophæ autem iisdem destituuntur & potius mordent. Hi dentes apri præprimis præparati, præparierte wilde Schweins. Zahn / dens de Sanglier préparés, in usum trahuntur Medicum: agunt absorbendo, acrimoniam humorum demulcendo, aperiendo & sudorem ciendo. Dosis ad ʒj. usque. Laudantur quoque in aliis inflammationibus angina &c. Jecur præterea apri adversus serpentum morsus & alvi fluxus commendatur, fel strumis discutiendis est dicatum. Vesica assa ad incontinentiam urinæ celebratur. Eadem porro cum lotio addita pinguedine in fumo suspensa, ut unguenti crassitiem acqui-

acquirat, Herniis mire prodesse si illinatur Venatores, teste allegato authore, observarunt. Ex carne Aprugna delicatissima fieri fercula notissimum est. Consulantur Doctores Culinarii.

OS SEPIÆ.

Piscis est, qui in pedibus habet succum nigerrimum instar atramenti, quem Chineses cum brodio oryzæ vel alterius leguminis inspissant & formant, & in universum orbem transmittunt, sub nomine atramenti Chinesis.

Est substantia testacea candida, levis, utrinque tumida, parte superna duriuscula, inferna fungosa mollecula, leviter aspera, friabilis, nata in dorso piscis Sepia dicti, saporis aliquantum salis & subacris, odoris nullius.

Vi absorbente & præcipitante potentius est quam oculi ☿, in specie laudantur in gonorrhœa, fluore albo & omnibus cæteris fluxibus, intensiorem vim adstringentem acquirit, si ei affundatur ℞ us Oli, eoque iterum abstracto, residuus pulvis reservetur usui, qui à ʒj ad ʒss datur. Specificum est in quavis sistenda gonorrhœa.

℞. Os sep. borrac. calcin. ʒss. Nuc. Mosch. ʒss. conf. ros. r. nymph. ana ʒj syr. nymph. rosar. ana q. s. f. f. Elect. in gonorrhœa.

℞. Os sepia. C. C. ust. pumic. præp. ana ʒiij. Mosch. ʒss. insperg. ℞ rosar. q. s. f. f. pulv. ad dealbandos dentes.

OCU.

Σηπία, Blackfisch / Blackfuttel / Meerfuttel / Meerspinn /
SEICHE, BOUFON.

EX RONDELETTI libro de piscibus ita describi potest. Piscis est marinus litoralis, aliquando ad duorum cubitorum magnitudinem

dinem accedens, tenui sed satis firma cute contectus, foris car-
noso corpore, intus quid solidum quod σήπιον vocant continente.
Capiti affixos habet pedes octo rotundos, crassiores initio, deinde
paulatim gracilescentes, omnes interiore in parte δυκοτύλης, id est
duplici acetabulorum ordine, quibus cedentia comprehendat &
comprehensa firmiter premat retineatque. Iisdem pedibus sive
brachiis natat cibosque ori, juxta quod sita sunt, admovet.
Præter hæc duas promuscides, longiores pedibus, tenuiores ro-
tundas, ubique læves præterquam in extremo, utroque binis ace-
tabulis aspero, quibus sepia capiant orique è longinquo cibos
admovent, iis etiam quoties tempestates urgent ad Saxa aliaque
adhærentes se veluti anchoris stabiliunt. In pedum promuscidum-
que medio veluti in centro rostrum & os sepia situm est, duabus
cartilaginibus duris altera superiore altera inferiore constans, co-
lore & figura avium carnivorarum vel psittaci rostro plane simile.
Rostrum membrana quadam crassa carnosaque veluti annulo un-
dique ambitur & firmatur, qua disrupta rostri partes disjun-
guntur. Intus linguæ vice est caro fungosa. Oculi majusculi
sunt, inter hos cartilago est cerebri parum continens. Os œso-
phagus excipit id est gula longa & angusta, quæ per μύτιν tendit ad
ingluviem. Est autem mutis in mollibus, quæ visceribus carent,
sub ore membrana humidum quid continens. Gulam sequitur
ingluvies, cui jungitur ventriculus. A ventriculo intestinum te-
nne gula crassius, partem superiorem repetens ad os fertur. Qua
vero ad superiora revolvitur, vesica est sive membrana, in qua
humor niger, quem CICERO atramentum appellat, continetur, cui
intestinum subjicitur; ejus membrana meatus vesicæ obductus
est, ut idem sit & atramenti & excrementi exitus, per fistulam quæ
in supina est parte inter alveum & os prope alveum latior prope
os angustior: hac effluit atramentum, quod in sepia plurimum est,
Græci θολόν appellat. Vesiculam collo dependentem habet atro
liquore plenam. Hunc capta sepia effundit obscurato circum
mari & tenebris affusis latitare, fugare venantis aciem struens.

*Ossa sepia, Blackfisch. Schuppen oder Weiß Fischbein / Os de
Seiche, commendantur in fluore quoque albo & in pulveribus den-
tificiis. Dosis ossis sepia ʒj. vel ʒij. &c. Adhibentur ab auri-
fabris aliisque ad parandas varias formas, quibus aurum argentum-
que infunditur.*

OCULI CANCRI.

Sunt lapilli crustacei, duri, albicantes, glabri, orbiculati, piso majores, aut utplurimum pisi majoris partem dimidiam adæquantes, una parte compressi & sinuati, altera convexi, nati utrinque unus in ventriculo cancri fluviatilis astacei, saporis & odoris nullius evidentis. Scilicet circa dies caniculares languere incipiunt, non nutriuntur, exanimantur fere, in eorum ventriculo reperitur materia quædam lactea, quæ sensim post 6 vel 8 dies concrevit in lapillos, qui deinde sensim iterum consumuntur, & ut probabile est in restaurationem cedunt, exuvias enim tum depouunt & resumunt.

Incidendi discutiendi & absorbendi virtute superant cornu cervi, pellunt quoque urinam & sudorem, in sanguine congrumato dissolvendo specificam habent virtutem, in sananda hectica peculiare quid obtinent.

℞. Ocul. ☿i ʒij. Corall. præp. limat. ♂tis ana ʒiʒ. rad. ari ʒj f. pulv. in bulimo & fame canina ad absorbenda acida.

℞. Ocul. ☿. ʒj. ☉ abs. ʒʒ. Nuc. Mosch. gr. vij. f. pulv. digestivus diurnus, add. L. O. gr. j. f. pulv. digestivus nocturnus.

In febribus intermittentibus. ℞. Oc. ☿. præp. ʒj. Rez. min. vel ♂ diaph. vel arcan. dupl. Mynf. gr. xv. ☉ absynth. vel ammoniac. ʒj. ood. caryoph. vel junip. gt. j. M.

Famosus ille pulvis contra casum fit h. m. ℞. Ocul. ☿i ʒj sperm. cet. mum. sang. dracon. ana ʒʒ. cape in acet. dest. ʒj ▽ chærefol. ʒij.

Familiaris mihi est in Nosocomio pulvis sequens antihecticus. ℞. Ocul. ☿. rad. ir. flor. ana ʒj. flor. ☿is ʒj. antihect. Poter. ʒj L. O. gr. j.

ASTACUS seu **GAMMARUS**, **GAMBARUS**. Hic intelligitur à nobis potissimus **GAMMARUS FLUVIATILIS**, improprie **CANCER** dictus, cancer caudatus, Astaco marino colore & forma, ut **SACHSIUS** IN **GAMMAROLOGIA** loquitur, quam simillimus, magnitudine saltem differens. *Krebs / Fluß-Krebs / Bach-Krebs / ECREVISSE.*

Liceat hic descriptionem Cancris paulo quidem prolixiorē, ex **SCHWENCKFELDT** quoad maximam partem desumptam, apponere. Astacus est animal Amphibium, crustaceum exangue. Corpus ei longiusculum, crusta tenuiore intectum, fusci coloris, concoctum toto rubente. Cornua ante oculos duo habet initio articulata, longa, tenuia, quæ sensim adeo gracilesunt, ut tandem in tenuissimum Cirrum desinant, in omnemque partem pili instar flecti queant. E media fronte existit aliud parvum latiusculum utrimque ferratum. His subsunt Cornua veluti Cirri, quatuor alia, forma quidem similia, sed multo tenuiora, brevissima, quibus pisciculos, ut opinatur author, allicit & venatur. Supra hæc oculi apparent parvi, cornei, semper prominentes & exerti ex obliquo mobiles. Frons acuta & aspera veluti aculeus eminet. Oris lateribus ex parte inferiore juxta pedes ori proximos, appendices binæ frequenter hirsutæ veluti parvi pedes ad tutelam adnascuntur & veluti branchiæ os circumdant. Pedes in ventre enascuntur deni, in obliquum flexi, utrimque quini, quorum anteriores bini grandes & crassiores chelis magnis seu forcipibus grandioribus quasi denticulatis æqualibus sæpissime tamen inæqualibus donantur, quatuor ad grandes dispositi, utrinque bini bisulci seu bifurces & hirsuti, chelis glabris rostris avium similibus, quarum superior pars movetur, inferiore immobili, reliqui quatuor posteriores simplices & indivisi ex toto pertendunt. Flectuntur omnes in obliquum, Chelæ vero introrsum. Chelis ori cibos admovent, pedes autem habent ad ingressum necessarios, quia in terra quoque victum quaritant. Chelis porro stirpes apprehendunt & apprehensi hærent, ne ex vehementi inundatione aquarum pereant. Chelæ hæc deperditæ renascuntur. Pedes Gammarorum foris ossei, intus tamen carnosii. Cauda, quæ & collum *τεράχυνλον* vocatur, lævis sine aculeis, ex quinque tabellis contexta, in quinque pinnas extremitatibus hirsutis natandi causa desinit, quibus in natando quasi remo utitur,

tur, estque in hac robur totius corporis, in cujus supina seu inferiore parte appendices quædam hirtiunculæ ex utroque latere quatuor, pinnis similiter hirtiunculis, in quas foeminæ foras pariunt, ovaque deponunt, quibus etiam duplices sunt ad contingenda & conservanda ova, Mari simplices & parvæ. Inter caudam supernam & pedes novissimos, veluti calcaria majuscula prominent acuta, quæ femina parva habet & leviora. Motu & progressu retrogrado astacos sive cancos fluviatiles moveri communis est opinio. Id quod tamen negat SPERLINGIUS, dicens. Duces itineris astaci oculi sunt, cum horum positu si concordet progressus, motus in anteriora fit non in posteriora. Cancrorum oculi non in rectum, sed in obliquum dispositi sunt, hos sequitur cancer & ratione sui corporis recta progreditur, non enim cum SCALIGERO dicendum, oculos propter progressionem in latus iis flecti, sed quod contrario fiat modo; propter oculos enim progressionem fieri in latus, quorum dispositio non sit arbitraria sed naturalis ac necessaria. Porro Dentes bini magni in intimo pectoris orificio ad latera positi, in ore caruncula linguæ specie: sequitur gula brevis, hanc ventriculus membraneus excipit, cujus ostio tres infixi sunt denticuli duo adversi, reliquus infra, inde intestinum in ventriculi latere simplex pari semper crassitudine in caudam terminatum, qua excrementa excernit, & ova edit. Præter ista meatus est, qui à pectore pendens in anum terminatur, in feminis vulva est, in maribus seminis receptaculum, hic juxta carnis cavum continetur, ita ut media caro inter intestinum & meatum sita sit, meatu carnis cavum intestino connexum contingenti. Hoc meatu mas à femina differt. Nam in utroque à pectore pendet, tenuis est candidus, humorem quendam pallidum intra se continens, capitis collique testa subtus tota perforata apparet, quam etiam quotannis deponunt & renovant. Quamvis autem hæc SCHWENCKFELDTII descriptio, quam SACHSIUS exacte sequitur, quoad magnam partem vera, differentia tamen insignis adhuc deprehenditur ab aliis, præsertim ratione partium genitalium quibus inter se discrepant cancri. Curiosus in hac re fuit scrutator, WILLISIUS & imprimis PORTIUS Neapolitanus Medicus Viennensis in EPHEM. NAT. CUR. D. 2. anno 6. obs. 19. de cancri fluviatilis partibus genitalibus, ex quo sequentia delibare forsan non inju-

cundum erit. Artus cancrorum à cauda nascuntur minores, præter majores brachia crura aut pedes alias vocatos: Mares habent in cauda horum artuum quinque paria, quæ in fœminis sunt tantum quatuor. Primum par artuum in cauda marium longius, durius & reliquis firmitus semper conversum est ad ventrem, cumque ortum habeat à prima intersectione ossium in cauda, protensum jacet inter quatuor crura, hoc est inter majores artus qui caudæ proximiores sunt. Cartilaginosi sunt artus isti, finiuntque in figuram, quam faceret contorta in cylindrum plana cartilago. Cum jam in Gammaro vasa ad crura tendant & in cruribus aperiantur, in quibus foramina adsunt, per quæ semen effunditur, Primum par minorum artuum potest, dum movetur, titillare ostiola, quibus adaperitis copiose semen erumpit. Secundum par artuum minus firmum & minus longum primo est, estque in nonnullis primo simile, in aliis assimilatur potius reliquis tribus paribus, quæ languidiora sunt, molliora & breviora & iis similia, quæ observantur in Gammaro fœmina, cujus quatuor tantum sunt paria minorum artuum in cauda, qui bifidi sunt & quælibet pars iterum subdividitur, desinuntque in fibras mollissimas & quacunque flexibiles, è quibus dum tempus est pendent ova, hosque artus minores in fœmina uteri forsan vice, fibrillas autem placentæ uterinæ assimilari posse censet author. Perspectis majoribus artubus observantur foramina, per quæ ova pariuntur. Scilicet in tertio pari majorum artuum, quod languidulas habet forcipes & medium est inter reliqua quatuor paria, quorum duo chelas etiam habent, reliqua duo versus caudam non habent, sunt fenestrellæ binæ, sive bina adsunt foramina figuræ non exacte sphaericæ, unum in dextro tertiorum artuum, aliud in sinistro, in quæ terminantur canales membranacei ab ovariis diducti. Atque ideo ova descendunt per canales istos tandem per foramina, quæ sunt in artubus mediis in tertio nempe brachiorum pari, egressum in lucem inveniunt. Artus hi majores medii octo habent articulos numerato etiam eo, quo brachium ventri conjunctum est, & quilibet artuum ex octo componitur ossibus fistulosis, musculos plerosque in eorum cavitate includentibus. Unum tamen exiguum nimis est, interponiturque inter secundum & quartum ossa, quæ nonnunquam in natu majoribus in unum coalescunt & ex tribus fit

os unum. Inter primum articulum, quo brachium unumquodque tertii paris ventri adnectitur & secundam articulationem est os primum in ordine ossium brachii, in quod inseritur canalis ab ovario illius lateris diductus & in eo terminum habet. Quæ quidem foramina unum in dextro brachio, aliud in sinistro obducta apparent membranula quadam, in morem turgidæ vesiculæ aliquantulum extuberantis, quam tamen propter musculosas fibras contrahi, dum ova pariuntur, atque sic adaperiri foramen probabile est. Estque in hac membrana observatu dignum, quod ex ea tantum parte quæ respicit forcipes, ossi sive labio foraminis annexa, ex alia vero parte, quæ respicit ventrem cancri, libera sit & soluta ab omnibus aliis partibus, ut pateat proinde via ovis. Sed cum extrinsecus hujus membranulæ color similis sit membranularum, quibus musculosa substantia, quæ conspicitur inter aliquos articulos, contegitur, facile poterit iste color alicui imponere, qui nihil cogitans de canali, qui absconditur membranula illa, ex hac coloris similitudine poterit credere solidum musculum aliquem lusu quodam naturæ ocludere foramen, cum revera membranula abscondat quidem viam, per quam ova emittuntur, sed aperiatur ad latus. Estque membranula veluti velum expansum claudens foramen illud. Quod si velum contrahatur, patet via & foramen adaperitur. In sicco animali, quoniam velum hoc non turget, neque expansum est, fovea apparet in foramine intus ducens. Est medium hoc par artuum simile aliis, nisi quod primum par forcipes habeat majores & validiores, sicuti etiam omnia ossa in eo sunt majora, & validiora; & postrema duo paria forcipes nullas habent. Est item medium hoc par artuum in foeminis simile omnino medio pari artuum cancri masculi, nisi quod in cancro mare nulla appareat neque in primo, neque in reliquis ossibus exsculpta fenestrella, nullumq; appareat ovale foramen. Atque ideo, si quis hujus rei notitiam habeat, omissis aliis signis, quibus foeminæ à maribus distinguuntur, tantum ex eo quod adsint vel non adsint foramina ovalia in medii artuum pari, certo certius pronunciare poterit in cancris, hoc animal est foemina, hoc est mas. Ab ovariis autem antequam coeant in unum corpus subrotundum, canales procedunt alter ad dextrum latus, alter ad sinistrum. Ac canalis unusquisque progreditur inter processus costula-

stularum, inde ultra pergens intrat in fistulosum os brachii & terminum habet in foramine insculpto in hoc eodem primo osse brachii. Ova in ovariis fere semper occurrunt. Nam antequam omnia vetera ova in lucem prodeant, novorum ovorum albicantia rudimenta apparent. Membranula una & altera, quæ unum atque alterum foramen obtegit, per quod ova eduntur, partus tempore & nonnullis diebus post absolutum partum, omnium veterum ovorum minime tenta sed conspicitur languida & flaccida tanquam nimis defatigata in opere & apparet humida. Tempus autem hujusmodi partus est mensibus Novembris & Decembris circiter, ac etiam per mensem Januarium ac Februarium, rarius per Martium mensem conspiciuntur ova pendula à minoribus artubus caudæ. Ovariis superincumbit cor, quod sedet in parte superiori in medio ovariorum, ut si dorsum incidatur Gam-mari inter caudam & curvam quandam lineam in dorso insignem, testa-que illius partis auferatur, appareat cor palpitans superincumbere ovariis, quæ cordi tanquam stratum subjecta sunt. Cordis autem substantia est albicans, & vasa, quæ ab illo nascuntur, sunt etiam albicantia & vix distinguibilia ab aliis membranulis & musculosa aliarum partium substantia nisi motu & palpitatione. Motu enim & palpitatione cordis apparent ortus & progressus vasorum à corde, & apparent ortus & progressus vasorum minorum à majoribus vasis. Cæterum in Cancris maribus cor testibus superincumbit, testesque cordi substrati sunt, qui attentius inspecti apparent veluti parvi glomi tenuissimorum albicantium filamentorum. Suprema testium pars constat ex vasis anfractuosis, sinuosis & cellulosis. A testibus tenui principio ortum habent vasa spermatica, quæ progressu majora sunt & corporatiora, & seminis; quo mensibus iisdem, quibus fœminæ pariunt, & in cauda gestant ova, albo colore maxime conspicua sunt, nam mense Majo vasa seminalia sunt flaccida, languida & fere vacua semine. Postrema autem pars seminalium vasorum prope crura minus amplum ductum habet, & minus candida apparet, sed est carnosior & firmior, quam media pars neque tam facile disrumpitur. Longa & tortuosa via, multis revolutionibus vasa hæc terminum habent in quinto pari majorum artuum, dextrum in dextro femore, sinistrum in sinistro. Ac in primo osse utriusque cruris est pars, quæ

quæ parum exporrecta in cylindri figuram foraminulum habet, quod obtegitur caruncula quadam ex extuberanti membranula, quæ ductus pars est carnosior. Ex uno latere est pilus quidam majusculus in radice, sed desinens in cuspidem acutam, ut caruncula cum isto pilo faciat speciem partis extremæ in cauda nonnullorum scorpionum, videtur videlicet caruncula veluti granum milii habens e latere cuspidem quandam. Ubi cancer siccus est & aridus contracta etiam & siccata caruncula, apparet parva fovea in osse. Cum vasa turgent agitato & molestato cancro facile semen albissimum è miliari grano erumpit, dissecto etiam cancro compressione facta vasorum & protrusione crura versus lacteum semen è cruribus erumpit. Quamvis autem organa propagationis & generationis sic constructa sint in cancris, attamen pronunciat **P O R T I U S**, difficulter inveniri posse rationem, qua maris semen in foeminæ corpus ejaculari infundi vel intrudi possit; sed neque ex ipsa constructione hæc eadem ratio infundendi semen in corpus foeminæ videtur impossibilis. Forsitan etiam edita jam ova superinsperso foecundantur semine, ex aliorum opinione. Multi asserunt quod mas in coitu ascendat supra dorsum foeminæ, ea vero statim supinam se vertat, atque ita mas coeat cum ea confri-cando se ad eam.

Valde sunt libidinosi, ut unus mas in una caverna vel tres habeat foemellas, pro quibus vehementer pugnet, & alter alteri ob id forcipes frangat. Ovula matura per loca superius allegata excernuntur & sub cauda tam diu detinentur affixa, donec parvi astaci sive Cancelli excludantur. Mas præter signa superius data cognoscitur cauda rotundiore & pleniore, foeminæ vero cauda tenuis magis lata atque depressa existit.

Reperiuntur Gammari, **S E B I Z I O** docente, ubique fere præsertim in Europa, ubi fluvii, torrentes, lacus & rivi. Vivunt rebus variis, herbis, ranis, etiam carnibus & excrementis animalium. Ex aquis pabulatum sæpius progrediuntur in terram. Hinc etiam diu extra aquam servari possunt vivi, dummodo herbis alantur. In terra & riparum cavernis domicilia hyberna sibi extruunt, & hie-matum concedunt, subventante vere copias rursus educturi, ut vicinas terras deprædentur, quamvis etiam tempore hyemali prodeant de suo cubili pastum. Æstate quoque latibula quærunt præsertim
d
abjecta

abjecta veteri crusta, donec nova tractu temporis in debitam exsiccetur soliditatem & indurescat. Habent quoque Gammari hanc prerogativam, ut forcipes vel amissi vel fracti rursus renascantur. Capiuntur vel manibus vel nassis allekti variis escis imprimis ranarum carnibus, & coxis.

Astaci seu Gammari fluviatiles vulgo cancri differunt præcipue magnitudine, loco & colore. Unum genus minus est, saxatile, supina parte albicans, prona nigricans, elixum undiquaque non rubescens, sed quodammodo album præsertim in supina chelarum parte permanens. Appellatur hi CANCRI PETROSI, Stein-Krabs / Thul-Krabs. Alterum genus majus est, sed & nobilius, & nomine Krebs simpliciter, vel etiam Edel-Krebs insignitur. Quod Lacustres attinet, illi tanquam inferiores non multum curantur. Colorem potissimum triplicem præ se ferunt Astaci, nunc cæruleum, nunc ferrugineum, nunc nigricantem, cocti autem præsertim nobiles rubescunt. Quo majores sunt eo quoque excellentiores habentur. Apicii præferunt fœmellas & imprimis illas, quæ ova rubicunda sub cauda gerunt, die Duschelmäuser; delectantur quoque iis, qui crustam veterem deposituri nova sed molli & eduli cinguntur lorica, die weichen Krebs. Vere & autumno pinguescere & meliores esse dicuntur, Novilunio emaciatos, plenilunio refertos esse censent, Communiter de esu cancrorum dicitur.

Mensibus in quibus R. non bonus est cancer.

Quod tamen apud nos non æque valet, cum mense Septembri, Octobri, Novembri adhuc maximo comedantur cum gustu. Hieme utique macri sunt & non bene sapiunt. Præfertur caro in caudis & chelis. Carne, ut SEBIZIUS inquit, constant dura crassa & frigida. Longiore mora in ventriculo noxam inferre possunt. Cocti digestique satis alunt liberaliter, sanguinem producant non facile dissipabilem, pituitosum tamen, sed Hecticis & Tabidis utilem. Apparantur modis variis. Elixantur, friguntur & ex crusta nudatis multa conficiuntur eduliorum genera. Imprimis autem tum pro gulæ blanditiis & scopo alimentario tum pro usu Medico humectante, acrimoniam involvente & demulcente offæ & juscula Cancrina die Krebs, Suppen und Krebs-Brüh/

Brüh/ multum deprædicantur. Juscula parantur ex tribus quatuor vel quinque astacis viventibus, vel etiam in lacte aut aqua fervente suffocatis, quibus abscindi prius caput & intestinum extrahi debet, contusis & in juscule carnis vel pulli tam diu coctis, donec bene rubescat, quo viso colatura instituitur, & addito pro re nata vel sale vel Butyro vel Maci &c. hauritur juscule, quod magis reddi potest medicatum, addendo varias herbas, & animalia, cochleas, &c. pro diversa intentione Medici.

Destillantur quoque ex Gammaris *aquæ antiseptica* variæ. In gargarismate medentur inflammationibus faucium, succus quoque expressus ex cancris contusis tum internè tum externe adhibetur. Chelæ atque crustæ virtute gaudent absorbente & diaphoretica nec multum discrepant à lapidibus cancrorum, de quibus mox sermo erit. Cinis cancrorum combustorum laudatur in cancro & morfu canis rabidi. Imprimis autem in usum Medicum veniunt, sic dicti **Oculi CANCRI**, non quod oculi sint, sed quod quadantenus oculi repræsentent figuram; vocantur alias etiam **LAPILLI CANCRORUM**, *Krebs-Augen/ Yeux d'Ecrevisse*. **HELMONTII** observationes de ortu horum lapillorum hæ sunt. Mares quotannis ægrotare incipiunt à mensis Junii medio, foemellæ dein in Julio ante Testarum exuvium. Sunt per dies novem & amplius velut semiexanimæ ac immoti. Ea tempestate stomacho illorum obducitur membranula nova, inter quam & stomachum veterem est liquor quidam lacteus, qui sensim exterius in globum stomachi convexum, qua parte attingit, obducitque stomachum veterem, contrahitur utroque latere in concavum statimque lapidescit. Ideoque (quod juxta **SACHSIUM** pene incredibile) vetus sive interior stomachus sensim in mucilaginem alimentariam absimitur, exteriorque ac novus alter stomachus in vicem absumpti succedit. Siquidem isti lacti ad stomachi veteris convexum subnato obtenditur statim pellicula per modum lacti tepenti solitum, crescitque Lac istud inter utramque præfatam membranam, utriusque scilicet stomachi. Quæ cuncta ducentis forte cancris dissectis dietim, (ut **HELMONTIUS** ipse loquitur) observavit jucunda admiratione. Tandem residua pars lactis cancro cedit in alimentum. Postremo etiam uterque lapis iterato sensim dissolvitur & in nutrimentum paulatim abit. Nihil autem Can-

icr edit aut in ejus stomacho reperitur, quantisper isti lapides sunt in stomacho ejus, vivitque 27. circiter dies tam ex veteri suo stomacho sensim absumpto, quam ex usu resolutorum postea lapidum. HELMONTII pronunciato accedit etiam WEPFFERUS alique plurimi. Oculi Cancris ex vivis desumpti ad colorem cæruleum vergunt, & omnium optimi existimantur, ex coctis vero albescent. Solent adulterari vel creta vel imprimis materia terrestri illa, ex qua fistulæ fumo Nicotianæ hauriendo destinatæ conflantur. Cognoscuntur autem facile, quod in concavitate quasi sigillum habeant, superficie gaudeant lævigata polita & compacta, interna facies sit albissima & ex lamellis sibi instratis composita, linguæ quoque lapilli veri fracti non adhærent, calcinati vero saporem quasi igneum imprimunt. Virtutes satis exposuit author; illud solummodo monendum à quibusdam oculos cancrorum vel præferri vel saltem æquiparari Lapidi Bezoar. Curiosum quidem est, sed facile explicandum, Lapillos cancrinos in aceto vel solummodo aceto conspersos motu locali promoveri, ex natura lapillorum alcalinorum, & menstruo acido in motu semper existente & in alcali agente.

IN OFFICINIS PROSTANT

Oculi Cancris præparati, præparierte Krebs-Augen/ Yeux d'Ecrevisse préparées. Dantur vel cuspidatim vel ad ℥j. ʒj. &c. Multi crudos pulverisatos præparatis præferunt. Non autem exhibendi sunt, nisi in vehiculo aqueo pro scopo absorbendi. Alia ratio est, si in corpus tertium pro scopo incidendi & aperiendi illos velimus redigere.

Solutio aut sal Oculorum Cancris, solvirte Krebs-Augen/ solution d'yeux d'ecrevisse, cum hæc solutio, in substantiam redacta siccam, jam sit corpus neutrum non opus est, ut in præscribendis formulis de novo jubeamus acido saturari lapillos hosce.

Magisterium Oculorum Cancrorum, Magistere d'yeux d'ecrevisse. Datur ut antecedens solutio ad ℥ss. ad ʒss. Vires utrique adscribuntur nescio quæ cordiales, roborantes, atque veneno resistentes.

SANGUIS HIRCI.

Est sanguis hirci exsiccatus, quem Helmontius & alii prius plantis aromaticis, lithontripticis alendum voluere, hinc angendum insigniter, & intra extremas angustias pone aurem incidendam esse arteriam & colligendum sanguinem, alii hujus testiculis resectis diligenter colligunt, sed hoc perinde est, constat enim sale volatili copioso, terræ incluso. Ob copiosum salem volatilem alcalicum & terram parciorem superat oculos Si, præcipue virtute discutiendi, incidendi & urinam movendi.

℞. Sang. hirc. ʒʒ. cape ex ∇ flor. papav. contra pleuritidem & peripnevmoniam, ex ∇ chærefol. ad sanguinem congrumatum dissolvendum.

℞. Ocul. Si sang. hirc. ana ʒʒ. cape ex aceto ad sanguinem congrumatum resolvendum.

Boc's Bluth / Sang de Bouc.

Hircum vulnerariis præsertim plantis nutriunt. Ex vana ista opinione, quod sanguinem hircinum adamantem emollire dixerint, profluxit, quod etiam virtutem Lithontripticam eidem adscripserint, quam alii quam maxime rident. Ad sanguinem congrumatum dissolvendum, commune est remedium. Datur ad ʒj. usque, miscetur frequenter cum oculis cancri, spermate ceti & sanguine draconis. De ipso Hirco suo loco erit sermo.

MUMIA.

Est substantia resinosa, indurata, nigra, splendida saporis subacris, amaricantis & resinosi. Accedit virtute discutiendi & incidendi ad sanguinem hirci, aut ob resinosas simul ipsis adjunctas mulcens est anodynum.

d 3

℞. Oc.

℞. Oc. Si. ʒj. rhabarb. sperm. cet. mum. sang. hirc. ana ʒß. f. pulv. ad sanguinem congrumatum dissolvendum, datur ex aq. chærefol. in empyemate. [Mumiam nunquam interne exhiberem.]

℞. Mum. suber. ust. terr. Oli dulc. ana q. v. add. succ. plantag. q. f. f. liniment. in sistendo fluxu hæmorrhoidum.

MUMIA VERA, Mumien/ MUMIE.

Intelligitur hic proprie Mumia Ægyptiaca, sive corpus humanum vel integrum vel in partes divisum Bitumine Judaico Myrrha, Aloë aliisque conditum & à putredine præservatum, cum autem rarior Ægyptiaca sit, ideo ut plurimum substituitur artificialis, quare etiam ejus usus internus ab authore dissuadetur. Laudatur interim à quibusdam in phthisi & pectoris affectibus, in referendis visceribus mensium obstructione & Lienis deoppilatione. Virtutes quoque traumaticæ insunt, ut & adstringentes. Externe pulvis Mumie vulneribus inspergitur. Dosis est pro usu interno ad ʒj. usque & ultra. Ingreditur essentiam vulnerariam, quæ

IN OFFICINIS PROSTAT ET DICITUR

Essentia Traumatica Wedelii, Wund. Essenz/ Essence vulnereaire.
Vires ejus prædicantur insignes in hæmoptysi, vomitu cruento, mensibus immodicis, dysenteria &c. vel per se vel cum aliis. Dosis guttæ viginti triginta & ultra.

MARGARITÆ.

Sunt partes rotundæ vel angulosæ, albæ pellucidæ, saporis terrei, excrementitiæ scirrhusæ, conchæ, neque enim in omnibus reperiuntur, tunc enim sunt insipidæ, cum alias sint sapidissimæ, quando nullas habent perlas. Præ oculis cancrorum nihil habent peculiare, nisi quod ob substantiam mol-

molliorem in ventriculo magis convincibiles & subtiles, quare in phthisi & hectica commendantur.

℞. Margar. præp. ʒʒ. spec. diamb. ʒj. cape ex Emuls. seq.

℞. Amygd. dulc. ʒʒ. aq. Meliss. ʒij. aq. rosar. cinam. ana ʒʒ. f. emuls. add. conf. alkerm. ʒʒ. exhibe contra virium lassitudinem & languorem, in hectica, phthisi, tabe.

℞. Margar. ʒj. Θ absynth. ʒj. piper. alb. gr. vij. f. pulv. contra febres intermittentes.

Margaritæ in calcem redactæ sunt specificum in quartana, quod mihi & Medicis Orientalibus per experientiam constitit. Ita: ℞. Calcis margarit. ʒʒ. sacch. ʒni ʒj. Θ*ci ʒj L. Q. gr. j. f. pulv. vel ℞. Marg. calcin. ʒʒ. Θ abs. gr. xv. Nuc. Mosch. tost. ʒʒ. ʒo caryoph. gt. j. (Mater perlarum est testa valida & ponderosa, extus rugosa, & aspera non striata, intus lævis argenteo colore prædita, & hæc testa ejusdem naturæ & qualitatis esse videtur cum margaritis, nisi quod sit substantiæ durioris & solidioris, hinc non necesse est, ut margaritæ in calcem pro pulvere antifebrili redigantur, sed ex matre perlarum optime fieri potest, eodem modo, sicuti ex conchis vulgaribus paratur specificum antifebrile Crollii.)

BE-

Margarithis, Märyarithis, MARGARITA, MARGARITUM, UNIO, quod nulli duo plane similes in eadem concha reperiantur. *PERLÆ, Perlen / PERLES.*

In peculiaribus conchis Margaritiferis reperiri nullum est dubium, quis autem proprie earum sit ortus, discrepant authores. Sunt qui cum PLINIO conchas ad superficiem maris elevatas à rore cœlesti depluente imprægnari, & menstruo spatio margaritis gravidas reperiri, putarunt. Alii perlas, eodem ac calculos modo

do gigni censentes, à superflua materia novarum laminarum re-stitutioni dicata oriri docent. Nonnulli pro lepra, aut cum au-
thore nostro pro excremento concharum habent. Quidam à suc-
co nutritio stagnante in senio confectis aut alio morbo laboranti-
bus conchis certis in maribus aut locis reperiundis exsurgere au-
tumant. Recentiorum quorundam ea est opinio, ac si margaritæ
nihil aliud sint, quam ovula ex quibus novæ deinde producantur
Conchæ margaritiferae, quæ sententia ulterius utique meretur
examen.

Non autem ex unius generis Concha extrahuntur perlæ, si-
cuti quoque non in uno eodemque reperiuntur loco. Superbit
imprimis margaritis ferax Oceanus Orientalis atque Occidentalis,
nec quidam fluvii atque rivi in ipsa quoque Europa, Silesia, Bo-
hemia, Livonia &c. tam pretioso thesauro se destitui monstrant.
Imprimis tamen in usum Medicum priores duæ species cedunt, de
quorum piscatura consulantur scripta à peregrinantibus variis in
lucem edita.

Non autem usurpantur pretiosissimæ illæ margaritæ magni-
tudine, colore albicante & rotunditate quam maxime resplenden-
tes, *UNIONES*, *Zahl-Perlen*/dictæ, sed minores imo haud raro
minimæ angulosæ admodum, quas *Saat-Perlen*/ *SEMECE DE*
PERLES appellitant. Præferuntur Orientales. Absorbent aci-
dum, præcipitant, & virtutes nescio quæ cordiales cephalicæ aliæque
admirandæ adscribuntur. Hinc quidam suas essentias perlarum
v. gr. cum vino Tockaviensi paratas, quidam suum Lac perlarum
magnificis extollunt titulis, quod si autem res debito examine-
tur modo, aut à menstruo aut ab aliis additis potius, talia remedia
virtutem suam accersere eaque ad emungendam potius crumenam
excogitata esse patefit. Quomodocunque enim perlas examines,
attamen insigniores quam oculos cancri aliaque ostracodermata vi-
res possidere vix deprehendes.

IN OFFICINIS PROSTANT

*Margaritæ Orientales & Occidentales præparatæ præparierte Orien-
talische und Occidentalische Perlen / Perles Orientales & Occidentales
préparées, dantur ad ʒj. ʒss. & ultra.*

Species diamargariti frigida, Fühlendes Perlen-Pulver. Cordiales atque alexipharmacæ habentur. Dosis ℥ss. ad ℥ij.

Aqua perlarum sive *confortativa usualis*, *Perlen-Wasser* oder *Krafft-Wasser*, *Eau de Perle* ou *confortatife usuelle*. Hanc plebi & mulierculis tantopere decantatam aquam de fastigio suo velle deicere esset crabrones irritare. Adhibent quippe in omni debilitate & languore virium, spiritus, ut loquuntur, animales puriores reddit, sensuum internorum & externorum organa reficit, atque ita quasi generale confortans omni sexui ætati & morbo accommodatum existit remedium: si quæ vis confortans inest, illa maximam partem debetur aquæ Cinamomi. Exhibetur cochleatim.

Tabulæ manus Christi perlatae aut *Saccharum perlatum*, de quo sub saccharo. Plures interim, ex nescio qua persuasione, compositiones ingrediuntur Perlæ.

MATER PERLARUM, *Perlen-Mutter*/Nacre de PERLE ou *Mere de Perles*, est species concharum bivalvium, figuram quasi planam & circularem obtinens, ita dicta quod vel perlas quandoque in se contineat, vel splendore suo præsertim interno perlas imitetur. Inservit non solummodo ad varia exinde paranda cochlearia &c. aspectu tactuque haud injucunda, sed & in Medicina tanquam corpus alcalinum, acrimoniam mitigans & adstringens locum habet, & si non plane iisdem ac margaritæ facultatibus, saltem haud adeo minoribus gaudet.

A PHARMACOPŒIS OSTENDITUR

Mater perlarum præparata, præparierte *Perlen-Mutter*/Nacre de perles préparée. Dosis ad drachmam usque.

Solutio sive sal Matris perlarum, solvirte *Perlen-Mutter*/solution de Nacre de perles.

Magisterium Matris perlarum, Magistere de Nacre de perles. Et his quoque compositionibus alexipharmacæ & cordiales tribuuntur vires. Dosis ad ℥ss, ʒss & ultra.

BEZOAR ORIENTALIS ET OCCIDENTALIS.

Orientalis est substantia lapidea, foris splendida, glabra,
e qua-

quasque lævigata, coloris foris atro virentis, intus obscure cinerei, forma modo rotunda, modo oblonga, tereti vel ovali, magnitudinis variæ, compacta ex pluribus lamellis sibi invicem incumbentibus, ostendens in meditullio cavitatem notabilem, continentem paleas, pilos, fibrillas, aliaque similia, nata in ventriculo caprarum sylvestrium Indicarum, saporis & odoris nullius evidentis.

Occidentalis est substantia lapidea, Orientali fragilior & laxior, foris scabra & minus lævigata, coloris modo ex viridi nigricantis, modo cinerei, ex multis quasi tunicis sibi invicem incumbentibus compacta, forma ut plurimum rotunda, magnitudine varia, habens in meditullio cavitatem, includentem paleas, pilos &c. nata in ventriculis caprarum Peruanarum & Mexicanarum.

Non in omnibus reperiuntur, sed partes excrementitiæ earum quæ morbosæ sunt videntur, uti notavimus de margaritis. Est hoc proprium in India Occidentali, quod vix animal reperiatur, in quo non generentur lapilli tales, & omnes sub hoc nomine ad nos deferuntur, paucioribus Æthiops volatilibus gaudet, quam Orientalis.

Uterque cum margaritis & oculis ☿ convenit, sed substantia subtilior est, & in melancholia, febribus malignis pro sudorifero habetur, in virium languore ab acido præcæteris laudatur. Datur à ʒj. ad ʒʒ. imo ʒj. nisi pretium obstaret. Refertur quoque inter anthelmintica, forte quatenus acida imbibit, quæ nidus sunt vermium.

℞. Lap. bez. ʒj. absynth. gr. xv. ꝑdulg. ʒʒ. f. pulv. contra vermes ex ▼ graminis vel hyperici vel decocto filicis.

℞. Lap. bez. ʒj. ☉ volat. succin. gr. vij. f. pulv. dandus ex u lil. convall. contra epilepsiam.

℞. Lap. bez. ʒj. Croc. ʒt. ʒ℞. Ө vol. C. C. gr. v. Croc. or. gr. viij. f pulv. in melancholia ex aq. fumar.

DEN.

BEZOAR derivant quidam à voce Arabica vel Chaldaica Bel, quæ Dominum significat & Zoar venenum, quasi Dominus veneni, Bezoar / BEZOAR.

Audiamus de lapide Bezoar Orientali laudatissimum KAMPFFERUM. Patria hujus lapidis præcipua est Persidis provincia LAAR, aliæque. Genitrix est fera quædam montana caprini generis, quæ Capricerva aut juxta alios Cervicapra vocatur. Animal pilis brevibus ex cinereo rufis vestitur, magnitudinem capræ domesticæ ejusdemque barbatum caput obtinens. Cornua fœminæ nulla sunt vel exigua; hircus longiora & liberalius extensa gerit, annulisque distincta insignioribus, quorum numeri annos ætatis referunt: annum undecimum vel duodecimum raro exhibere dicuntur, adeoque illum ætatis annum hæud excedere; reliquum corpus à cervina forma colore & agilitate nihil differt. Timidissimum & maxime fugitivum est animal, inhospita asperrimorum montium tesqua incolens, & ex solitudine montana in campos rarissime descendens. Non autem in omnibus, quas inhabitant, regionibus lapides in hisce gignuntur animalibus. In hircis lapides majores & frequentius inveniuntur quam in fœminis. Lapidem ferre judicantur annosi, valde macilenti, colla habentur longiora, qui gregem præire gestiunt, circumspectius incedunt & insidias magis atque sodales metuunt, quod idem de fœminis affirmatur. Supercilia quoque ac lineamenta frontis insigniter nigricantia lapidis præsentiam confirmare dicuntur, imprimis autem linguæ solito asperiores præsentiam lapidis restantur. Locus natalis est pylorus sive productior quarti, quem vocant, ventriculi fundus; cujus ad latus plica quædam, sive scrobiculus mucoso humore oblitus lapillum suggerit. Utrum casu hic sibi hospitium paret, jam alibi formatus, an in eo loco generetur, sive illapsus retineatur & augmentetur non constat. Credunt, quos plicarum alveoli non satis amplectuntur, elabi pyloro posse & cum excrementis

excerni, quin formatos interdum dissolvi rursus, præsertim longiori animalis inedia. Certum insuper esse dicit author, Lapidem in loco natali viventis bruti dum latent, nondum gaudere petrosa duritie, sed molliores esse & quodammodo friabiles. Hoc propter recenter exsectus ne improvide frangatur, vel attactus nitorem perdat, ab inventoribus ore recipi consuevit & in eo foveri aliquandiu, donec induruerit, mox Gossypio involvi & asservari. Asservatio ni primis diebus caute fiat, periculum est, ne adhuc dum infirmior importuna contrectatione rumpatur aut labem recipiat. Generationem fieri concipiunt, cum resinosa quædam ex herbis depastis concoctisque substantia ventriculorum latera occupat, quæ egestis cibis jejunoque viscere in pylorum confluens, circa arreptum calculum, lanam paleamve consistat & coaguletur. Ex primo circa materiam contentam stramine, efformandi lapidis figura pendet; cujus anguli blanda compressione, quam à cavitate hospitii patitur, in pulvinatam cogitur lævitatem, nisi etiam rotunditatem obtineat ex motu, tum fermentantis alimenti, tum visceris peristaltico, qui eum continuo agitabat; dum interim accessione novi glutinis, lamellis aliis atque aliis per intervalla temporum augetur, & in aliqualem molem accrescit. Hos jam veros esse asserit lapides, sed rarissimos, magno constantes pretio, & in Pharmacopoliis Europæorum non facile reperibiles. Extrahuntur videlicet ejusmodi lapides etiam ex aliis brutis sylvestribus Indiæ Orientalis, capris, imprimis vero Simiis, quem ultimum quidam præferunt.

Occidentalis Bezoar in similibus fere animantibus producitur, & ex certis quibusdam vegetabilibus potissimum oriri ab authoribus existimatur. Huic autem semper præfertur Orientalis. Uterque adulterari solet vel aliis lapidibus vilioribus, vel creta vel cineribus testarum, ostrearum aliisque ingredientibus &c. Notas hinc bonitatis sequentes tradunt, quod lamellatim Bezoar lapis debeat esse concretus, quod cavitas interna non debeat esse plane vacua, quod in aqua per noctem infusus illius limpiditatem non turbet, duritiem non amittat, nec pondere augeatur, quod volæ manus vel chartæ cinere aspersæ vel creta aut calce viva oblita affricus, lineam inducat luteam, vel ex luteo viridantem, quam notam Persæ omnibus præferunt. Addunt quidam, quod legitimus lapis exinde

exinde cognoscatur, quando acus candens intrudi possit. Juxta KÆMPFFERUM autem fallax bonitatis testis est, quia adulterini ex resinosa constructi materia acum utique admittent; legitimi vero plerique ita indurati sunt, ut acum candentem respuant. Non est quoque nota factitii lapidis, si interiores laminæ deterioris substantiæ & coloris fuerint, ea enim ex diversitate alimenti disparitas provenit, dum genitrix bestia locum pastus mutat. Pro genuinis lapidibus Orientalibus eos habet modo dictus author, qui inter resinæ & lapidis substantiam ita ambigunt, ut confusi in acido nitri vel salis spiritu dissolvantur, ac menstruum colore satis rubente simul ac virtute sua imbuant, qua ratione etiam exinde paravit liquorem bezoardicum.

Lapidis hujus virtutes, ut ex nomine patet, ad quævis venenorum genera deprædicantur. In peste, morbis contagiosis, febribus ardentibus, malignis, variolis & morbillis sacra quorundam, imprimis muliercularum est anchora. Laudatur in pleuritide, peripneumonia, ictero uter, morbis, partu difficili, melancholia, cancro scabie &c. Persæ facultatem declinandi morbos & prolongandivitam eidem tribuunt. Sunt qui in potu infundunt aut de collo suspendunt. Licet autem hic lapis laudabile medicamentum sit, ubicunque absorbendum acidum, vel acrimonia temperanda, vel humores resolvendi, tantus tamen non est faciendus, ut omnibus reliquis bezoardicis remediis præferatur, præsertim cum in tam exigua soleat exhiberi dosi, quæ revera, si aliquid exinde expectare volumus, adaugeri debet. Cæterum in plures eundem recipitur compositiones, vix autem aut raro saltem ab ipsis præscribitur Medicis, imitantibus hac in re Medicos Persiæ, qui raro quoque eodem utuntur, quamvis à vulgo ibidem maxime celebretur. In absorbendo & transpiratione promovenda non minori virtute præditus videtur Lapis Bezoar fossilis, in Sicilia ut & Gallia, Languedocia, circa Monspelim reperiundus.

DENTALI. ENTALI. UMBILICUS MARINUS.

Sunt conchæ maritimæ. Alkali volatili & terra gaudent
e 3

dent & ad acida infringenda veluti oculi cancrorum exhibentur, sed ob substantiam duriores postponuntur oculis ☿, certis tamen in casibus.

℞. Dental. tere in pulv. exhib. 3℔. cum aq. dest cinamom. vel alia ad absorbenda acida. Versa in calcem fiunt specificum contra quartanam, v. c.

℞. Calcis hujus 3℔. ☿ absynth. 3℔. quibus addi potest sacch. 5ni L. O. exhibetur ex vino absynthite.

PAR-

DENTALIUM, DENTALE, à figura dentis, quam æmulatur, Zahn. Schneck. Est, definiente LANGIO, conchula parva, oblonga, candida, exterius aspera intus lævissima, tubuli in modum excavata, altera parte dentis canini ad instar acuminata, transversalibus lineis per incerta intervalla cincta. Capiuntur in mari Britannico. Refutat hinc eos, qui conchulas illas dentiformes exterius æque ac interius læves dentalia vocant, aut qui conchulas illas convexas ex una parte, altera vero depressas, & rima dentata ornatas, pro veris dentalibus venditant, quæ conchæ frænis quandoque ornatus causa affiguntur. Dicuntur quibusdam Schlangen, Köpffgen.

ENTALI, ANTALE, ANTALIUM, ENTALIUM, eodem LANGIO & WORMIO notante, sunt proprie conchulæ parvulæ ejusdem substantiæ cum venereis aut potius cylindricis, niveæ, læves, rimulam habentes. SCHROEDERUS describit esse testaceum quoddam marinum, instar parvi cornu longiusculum, rectum & cavum, foris striatum intus læve, raro longitudinem digiti superans. In usum Medicum non trahuntur, nisi quod in unguentum Citrinum recipiantur.

UMBILICUS MARINUS, BELLIRICUS MARINUS, BELLICULUS MARINUS, Meer. Bohnen/ NOMBRIIL MARIN. Ita dicitur à figura, qua umbilicum æmulatur, LAPIS MARGARETHÆ, OCLUS LUCIÆ, & MARINUS, faba marina. Est operculum cochleæ coelatae, substantia solida intus eburnea, figura

ræ subrotundæ & quasi ovalis, cujus in altera superficie plana subfusci coloris spiralis linea apparet, adeo ut tota massa in orbem videatur reflexa, altera vero facies aliquantum labrosa in margine, depressa vero circa centrum videtur, coloris ut plurimum est eleganter rubicundi, quem viridis circa centrum deturpat. Reperitur ad littora maris Adriatici.

PARTES ANIMALES SALE VOLATILI OLEOSO CUM ODORE FRAGRANTISSIMO CONSTANTES.

MOSCHUS.

Si optimus, debet esse. 1. ex ferrugineo nigricantis coloris. 2. unctuosus. 3. saporis grati & amaricantis. 4. odoris fragrantis non adulterati.

Est substantia grumosa pinguis & unctuosa, sanguini congrumato similis, collecta ex Dorcadis seu capræ Moschiferæ Asiaticæ folliculo, sito in abdomine inter umbilicum & pudenda, coloris ex nigro ferruginei, saporis subacris, amaricantis, odoris fragrantis & grati.

Ob volatilem salem spiritibus analogum obtinet in specie virtutem analepticam, cardiacam, confortantem, & empromoventem, sanguinem congrumatum dissolventem & hysterica passionem tollentem.

℞. Mosch. ʒss. ambr. gryf. ʒiʒ sacch. cand. q. f. ʒo citr. gt. v. cinam. gt. ij. caryoph. gt. j. M. f. pulvis analepticus cardiacus ad ʒj. cum vino vel syr. chermes exhibendus.

℞. Mosch. gr. iij. detine sub lingua, si ex accepto vulnere thoracis nullus sanguis effluit, illicò sanguis fluere incipiet.

℞. Ladan. ʒiij. styr. cal. ʒj. benz. ʒij flor. benz. ʒj. Mosch. ʒss. ambr.

℞. ambr. gryf. ʒʒ. ʒʒ. Cort. Citr. rec. express. gt. xxv. mucag. tragacanth. cum ▽ ros. fact. q. s. f. pomum ambræ odoriferum analepticum.

℞. Mosch. gr. v. extract. castor. inspiss. ℞. mac. gr. iiij. f. pil. deaurentur fortiter ad promovendum conceptum.

℞. Coagul. lepor. gr. v. Mosch. gr. j. Elect. diasatyr. ʒj. ambr. gr. iiij. ʒʒ. majoran. gt. iiij. syr. gran. cherm. q. s. f. Elect. paulo ante coitum.

ZI-

Μόσχον, Moschon, Moschum, Moscus, Muscus, Muschus, Bisam / Bisem / Bysem / Musc.

Quæstio magna fuit, ex quo animali & ex quibus partibus depromatur Moschus. ANIMAL MOSCHIFERUM vocatur CAPREA DORCAS, CAPREOLUS, GAZELUS, vel GAZELLA, CAPRA MOSCHI, MOSCHIUS. Bisam Thier.

SCHROECKIUS Filius in HISTORIA MOSCHI, quamvis duplex animalis Moschiferi genus esse credat, verum tamen ex capreolorum genere esse probat, cute variegata, capite lupino, duobus ex ore terram versus protensis dentibus, & infra umbilicum folliculo quodam instructum esse docens. Folliculus hic extus pilosus magnitudine sua adæquat ovum gallinaceum, & in cavitate sua nucistam facile continere valet, non tam carnosæ, quam membranaceæ substantiæ ductu peculiari, orificio suo & musculo sphinctere munito gaudens, ne prodige profundatur Moschus ibidem contentus. Interiori vero superficie adhuc specialem habet pelliculam Moschum cingentem, in qua præter vasa sanguifera circa meatus Moschiferi orificium complures glandulas ad Moschi procul dubio secretionem facientes reperire licet, in quas pilorum orificium illud cingentium, radices implantantur. Reperitur hoc animal potissimum in Tartaria China & India. Ex hoc jam folliculo depromptum concretum odoriferum humana præsertim ope exemptum SCHROECKIUS præfert, non tamen penitus

tuſ rejectis aliis ex ſanguine renibus vel teſtibus paratis maſſis, modo fragrantia nativa cominus gravi, eminus vero ſuavi ſe commendent. Debent autem folliculi integritas, amaror &c. conſpirare.

Circa Moſchi uſum caute procedere debemus præſertim in mulieribus. Sanguinem impetuoſum admodum reddit & hæmorrhagias narium facile excitat. Novi ipſe ſubjectum quoddam, quod quotieſcunque Moſcho infecta vel bellaria vel potulenta aſſumit, hæmorrhagia narium corripitur. Inter Cephalica interim, ut & alexipharmaca recenſetur remedia, ſtomacho quoque benefacit & in colica prodeſt. Aſſervatur Moſchus optime in ſuis folliculis aut in vasis plumbeis, ut odor & vis diſſipabilis detineatur. Moſchus ut & Zibethum cum tempore amittit odorem ſuum, quem tamen recuperat, ſi irroretur urina pueri vel ſi ſuspendatur in latrina. Haud paucas Moſchus ingreditur compoſitiones, quæ exinde completæ nominantur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Species Diamoſchu dulcis, köſtliche Biſam-Specerey/ Poudre Dia Moſchu dulcis. Commendantur ad affectus cerebri præſertim frigidos, Vertiginem, Apoplexiam, palpitationem cordis, & affectus melancholicos. Doſis ad ʒj. ʒij.

ZIBETHUM.

Eſt ſubſtantia unctuoſa flavescens pallida, melli vel butyro forma & conſiſtentia ſimilis, ſaporis ſubacris, odoris fragrantiffimi, collecta ex folliculo animalis Zibethici vel majoris vel minoris, ſito intra anum & pudenda, in fœmina, in mâre inter penem & teſtes.

Hujus uſus potius externus quam internus, quia multum pinguedinis habet naſeoſæ, eſt nempe antepilepticum, antihyſtericum, nervinum & anodynum.

℞. Zibeth. gr. iij. Caſtor. ʒj. conſ. fl. anth. ſyr. matricar. q. ſ. ſ. Electuarium antihyſtericum.

℞. ʒ majoran. gr. iij. Zibeth. ʒβ. ʒ pin. recenter express. q. f. Mosch. gr. v. f. unguentum quo inungatur penis.

℞. Zibeth. ʒβ. ʒ laur. expr. ʒβ. camph. ʒβ. f. liniment. in colica.

℞. Mosch. gr. iij. Zibeth. ʒβ. ʒ pin. recenter express. q. f. ambr. gryf. ʒj. f. unguentum quo inguina & lumbi sunt inungenda ad ♀em stimulandam præcipue in feminis.

CAS.

HYÆNA ODORIFERA, CATUS ZIBETHICUS, Zibeth. Raß/ CIVETTE.

CASTELLUS in tractatu de Hyæna odorifera duplex describit animal, Arabicum alterum, alterum Americanum; Hoc, FABRO exponente, caput non crassum, sed tenue & acutum habet, ut rostrum caninum potius quam Felinum esse iudicares, quod cum labris suis subrubet. Orbitæ circa oculos, qui minus truces sunt nec magni admodum, albicant. Cæterum subcineritii coloris est caput & pili in barba vix ulli. Collum quoque longius pulchro quodam ordine alternis nigriusculis & albicantibus fasciis velut totidem torquibus arte appictis exornatum. A capite ad dorsum per colli longitudinem supernam similium colorum lineæ excurrunt. Dorsi medium à collo ad caudam linea nigricans pilosa valde distinguit. Maculis, in corpore cinereo minus obscuro, nigricantibus, rotundis & ovalibus ordinatim secundum rectam lineam versus caudam productis insigniter decoratur, ita ut superiores, dorso quippe viciniore, sint majores, mediocres paulo inferiores & quæ in imo sunt ventre sensim evanescant. Caudam gerit alternis similiter, ut in collo dictum, fasciis nigrescentibus ac cineritiis distinctam, ac satis longam, sub cauda tria foramina eminenter visui se præbent, anus scilicet, locus in quo Zibethum colligitur & extrahitur, ac vulva, medium tamen cæteris duobus majus apparet. Hyæna autem odorata Africana Lupum potius æmula-

amulatur quam Felim, capite enim est oblongo & rostrum acuminatum, non obtusum ut Feles, habet, item dentium formam ut canum: duorum palmorum altitudine erat animal à CASTELLO dissectum, tantundem erat corpus à scapulis ad caudam, caudæ vero longitudo quanta totius corporis, collum etiam longitudine superabat semipalmam, capitis longitudo duplex erat ad latitudinem. In barba & genis pilos habebat duros, albos, & longos felium ritu; rostrum pilis denudatum, nares nigricantes & sub oculis maculæ nigræ, oculi splendentes & subrubentes nec hilares, sed potius tristes & depressi magis, quam eminentes erant. Aures parvæ sunt orbiculares ad Melis seu Taxi formam, in ipsis similis pilus nec mollis nec asper. Corpus habet albicans & cinereum Lupi colore maculis aspersum nigris, crura & pedes parvi potius quam magni breves quam alti & pilo nigro obsitii, pedum digiti quatuor simul & insuper parvus pollex interne situs nec longe distinctus. Ungues sunt caninæ, nigræ, breves, crassæ & obtusæ, minimum aduncæ. Sub cauda immediate est excrementorum meatus, proxime collocantur testes, in maribus tum vas Zibethicum & sub hoc sexus masculinus & fœmininus. Vas Zibethi positum est inter genitale & testes, quos satis magnos ac evidentes habet & inodoros, & ab his vasa seminaria admodum crassa feruntur ad genitalis radicem ad latera pseudo uteri, sub quo vesica parva. Genitale totum occultatur in corpore felium modo, dum vivum animal quiescit apparetque sola glans. Totius corporis pili sunt longi rudes & asperi apri modo & in cervice ac per dorsi spinam pili adsunt nigri, prælongi, ac duriores, quos erigit iratum animal uti sus. Cauda est oblonga & bene pilosa usque ad terram pertingens, variis distincta maculis. Reperiuntur animalia hæc in pluribus Indiæ tum Orientalis tum Occidentalis locis. Membrum Zibethicum primo adspectu fœminea vulva videtur, lineam enim oblongam habet & labia crassa, quod si manibus tangatur, tactu sentitur ovi parvi magnitudine veluti cartilaginofum corpus & duriusculum, in quo cum parum digitis diducitur & dilatatur, apparent duo foramina iis, quæ sunt in naribus similia, sub quibus cavitates quædam sunt sedes Zibethi. Hæc vascula si digitis magis pressa deducantur apertis omnino foraminibus totas cavitates demonstrant, loculique perfecte patent, quorum cavitas

tanta est, quanta sufficeret ad continendum Amygdalæ nucleum; in his oculis nullus porus, nullus meatus apparet, post dissectionem corpus duriusculum ovi magnitudine, quod cartilagineum tactu videtur, in duos utriculos olivæ magnitudine & nequaquam cartilagineos, sed carnosos & minutis albis duris glandulis seu granulis insertos distingui observatur, duriore autem multum quam testes sunt substantia, omnino tamen inter se distinguuntur hi folliculi, membranis tamen unitis & interior quidem communis existit ambobus utriculis, qui exsiccati etiam mire redolent Zibethum.

Ex hoc jam vase colligitur istud odoramentum, quod ZIBETH, ZIBETTUM, ZIBETHUM, CIVETTA, Zibeth / CIVETTE dicitur, adeoque neque semen est neque excrementum, sed inservit, CASTELLO opinante, vel ut irritentur animalia ipsa ad coitum, vel ut odor iste inserviat animali ad venandum, & ad se allicienda alia animalia. Cum repleti fuerint utriculi substantia Zibethi, animal ipsum inquietum est, & semet exonerare satagit, unde videtur dicendum ab ipsius acri qualitate turgere, vexari & pungi, atque ad excretionem proritari, delectarique videntur cicurata animalia, dum folliculi ii auriscalpio exinaniuntur.

Zibethum optimum illud est, quod leonino aut subpallido colore gaudet, pingue, moderate liquidum, cum tempore crassescens, papyro impositum & affricum solubile sine corpore, quo ipso distinguitur ab adulterino. Adulteratur autem vel butyro vel caseo, adipe rancido &c. Sunt qui foemininum Zibethum longe præstantius quam Masculinum esse asserunt.

Zibethum in magna quantitate male olet, in exigua vero copia bene. Quod concernit Zibethi virtutem antihystericam, quam maxime respiciendum est ad idiosyncrasiam. Non autem naribus est admovendum, sed sinui muliebri aut umbilico applicatur. Commendatur quoque ad sterilitatem & appetitum Venereum præsertim in mulieribus excitandum. In torminibus ventris infantum umbilico inungitur. Alias Zibethum ingreditur balsama, unguenta, & suffumigia. Sunt, qui dicunt Zibetho inuncto omnes pediculos fugari. Optime solvitur cum saccharo aut spiritu vini.

CASTOREUM.

Non sunt testiculi Castoris, sed excrescentiæ quædam glandulosæ inter pudenda, quæ in medio foveant materiam melleam, quæ est quasi quinta essentia. Sic multa alia animalia iisdem tumoribus, qui cum genitalibus nullum plane commercium habent, gaudent, uti capræ moschiferæ, quæ tamen simplicem tumorem habent, felis Zibethi qui duplicem habent, quorum ex glandulis liquor etiam pinguis emanat. In Canada mures sunt aquatici, qui valde conveniunt cum Castoribus, habent etiam tumorem unicum, qui excissus spirat moschum fragrantissimum, sed tamen nihil moschi reperitur etiam in tumore ipso.

Testiculi castoris foras non propendent, sed sunt in ipso abdomine.

Est substantia glandulosa, oblonga, rotunda nata in inguine subtus testiculis ovi magnitudine, vestita pellicula crassa & impleta liquore oleoso & ceroso tractu temporis seipsum exsiccante, saporis acris amaricantis nauseosi, odoris gravis.

Ratione Θ is volatilis penetrantissimi pinguedini inclusi specificè convenit in morbis ab acido austero ortis, morbis soporosis, passionibus colicis, hysteris, convulsivis, in virginum cachexia, in singultu, cardialgia, palpitatio-
ne, variolis & morbillis. Essentiam Castorei ex oleo spicæ dissolut. in colica convulsiva cum successu exhibuit D. Hermann. dos. à gt. x. ad xx. Externe naribus admotum torpidus spiritus in morbis soporosis excitat.

Datur à \mathfrak{z} j. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. in majori dosi datum alvum solvit.

\mathfrak{z} . Castor. \mathfrak{z} j. L. O. gr. ij. \circ d. chamom. gt. ij. ocul.

f 3

\mathfrak{z} . $\mathfrak{z}\text{ss}$.

℞. 3℔. M. f. p. divid. in duas part. æq. ad omnis generis dolores ex acido.

℞. Castor. ʒj. scammon. præp. gr. xv. f. pulv. dandus ex oxym. contra morbos soporosos.

Ego mihi paravi nobilissimam essentiam sequentem:
℞. Rad. ari. ʒij. pyretr. 3℔. castor. ʒij. — ☉ *ci q. f. f. essent.
in aphonía, applica cum linteaminibus vel detineatur in ore.
it. in tussi.

PARS

Κάστωρ, ab insigni ventre, CASTOR male à castratione vel exsectione testiculorum dicitur, CANIS PONTICUS, cum circa Pontum frequens reperiatur, Φιβέρος, vel à teneritudine pilorum mollissimorum, vel quod circa amnium ripas & oras, tanquam extremitates sive fibras conspiciantur, FIBER, Biber / CASTOR, OU BIEVRE.

Est autem Castor, deficiente JOH. MARIO in CASTOROLOGIA à FRANCO aduucta & in lucem emissa, animal quadrupes adæquans magnitudinem felis, quod tam in aquis quam terra vitam degere potest, & fructibus atque arborum corticibus piscibus cancris ranisque se satiat, præprimis ulmis; pedes anteriores sunt instar canum, quibus terram fodit, ac posteriores consimiles anserum pedibus, quibus in aqua natat atque eam dividit, caput non admodum dissimile muri montano. Cauda non solummodo caudam piscis, sed fere integrum piscem refert, depressa est, & pilis in totum nudata, quatuor circiter digitos lata cinericii coloris, multis rugis & anfractibus gyrisque effectis instructa est, excavata quasi. Aquis quidem immergitur, sed non diu sub iis manet, & quando amnem transnatat, erecto super aquam capite trajicit. Amat loca avia, ut ab injuriis & aggressoribus tutior esse possit; aditus ad cavernas, quas mirifice præsertim in litoribus exstruit, sub aqua patet, & sursum fodiunt, contignationes aliquot cum lignis anterioribus pedibus dentibusque suis fabricat, ut testes oculati nec satis mirari nec ejusdem astutiam narrare possint. Admi-

randā

randæ sunt, quæ de Castoribus in Canada recensentur. Habet hoc animal ferum, & vix ad mansuetudinem domabile, dentes longos & acutos, quibus omnia perforat, quicquid invenit, & etiam aliorum animalium ossa, quæ comprehendit, confringit. Non longe à domicilio imprimis tempore hyberno & nocturno ad capiendum pabulum secedit. Acribus quatuor suis dentibus fortiter pugnat, æstro cientur Venereo ineunte æstate, foemellæ mense Decembri catulos modo unum modo duos tresve edunt. Pellis cinerea est ad nigredinem tendens, pilis nitidis mollioribus.

Capiuntur Castores à venatoribus non tantum pro usu alimentario, oeconomico, sed & Medico. Caro, notante SEBIZIO, dura est & insuavis coctioneque corrigenda, Cauda nihilominus lautiorum conviviorum mensis apponitur. Iis etiam, quibus per certum temporis spatium carni usus est interdictus, conceditur hoc animal amphibium, cujus caro & cauda variis modis apparatus, variisque condimentis imbuitur. Pisces sapit Castor. Nutri-mentum non adeo laudabile præbet, & difficilioris est digestionis. Pelles ad pileos, vestes, &c. usurpantur.

DENTES CASTORIS, cum aliorum animalium dentibus absorbendi, aperiendi, & diapnoica virtute in morbis inflammatoriis, febribus, ictero, motibus spasmodicis &c. coincidunt.

Imprimis autem ex Castore in usum venit sic dictum CASTOREUM, *Κασόριον*, Bibergeil / CASTOREUM. Vulgare somnium est, castorem, dum ipsum prosequuntur Venatores, sibimet ipsi morfu resecare testiculos, cum tamen constat illos spinæ dorsi in corpore adeo adhærere, ut sine vitæ dispendio eximi nequeant, insuper ita parvos esse, ut Galli Gallinacei testiculos vix superent. Rectius itaque LANGIUS aliique cum authore nostro à testiculis Castoreum distinguunt; supra allegatus MARIUS ita loquitur; Intra posteriores pedes duæ crumenæ vel folliculi conspiciuntur ac prominent, quorum unus alteri major, ex quibus nonnunquam melleus effluit liquor, quam Castor ipse lambit, talesque folliculi in maribus pariter ac foeminis conspiciuntur, uno loco insiti ovi anserini magnitudinem referentes & sic Castoreum & abusive testes sive testiculi vocantur. Licet enim in maribus penis & foeminis vulva infra has duas crumenas reperiantur ac pendeant, nihilominus hæ crumenæ nullum meatum in pudendo habent, qui alias omni-

omnibus in animalibus extat. Caterum in mari testiculi in spina rectissime animadvertuntur ac conspiciuntur teste ipso cultro meo Anatomico. Sunt tamen alii, qui hic addunt, hos sacculos per peculiaria vasa excretoria in foemellis in vulvam, in maribus vero aliorum se exonerare extra corpus. Castoreum eligi debet carnosum, ponderosum, odoris gravis & penetrantis.

Castoreum adhibetur in affectibus abdominis, torminosis & flatuosis. In passione Hystrica sacra quandoque anchora existit, sive externe sive interne usurpatum. Foetum pellit, mensesque ciet, in sistendis quoque mulierum doloribus post partum datur. In paralyfi & epilepsia commendatur, in Lerhargo quam maxime celebratur. Externe adhibetur in tinnitu aurium ut & in auditus difficultate, partes nervosas roborat, in convulsionibus & spasms prodest.

I N O F F I C I N I S P R O S T A N T

Axungia Castorei, Bibergeil, Schmalz / Axonge de Castoreum, ou Liqueur onctueuse de Castor, quæ separatim asservatur.

Aqua Hirundinum cum Castoreo, Schwalben, Wasser mit Bibergeil / Eau d' Hirondelles avec Castoreum. In convulsionibus, vertigine, apoplexia, similibusque affectibus, palpitatione cordis, & imprimis passionibus Hystricis, iis, quibus permissum est dare liquores, sale volatili oleoso Castorei imprægnatos, conducit. Dosis cochlear unum atque alterum. Hac occasione notandum, quod haud raro in aquis hystricis Castoreum in nodulis suspensum præscribatur.

Balsamum Hystricum, Mutter-Balsam / Beaume Hystrique. Naribus, temporibus, Vertici & Umbilico applicatur.

Extractum Castorei, Bibergeil, Extract / Extrait de Castoreum, quod ad affectus soporosos, convulsivos & uterinos ad aliquot grana adhibetur.

Essentia Castorei, Bibergeil, Essenz / Essence de Castoreum. In antedictis conducit affectibus. Externe in auditu difficili, tinnitu aurium, loquela amissa & membris paralyticis prodest. Interne datur ad guttas viginti, triginta & ultra.

Oleum Castorei, Bibergeil, Oehl / Huile de Castoreum, quod in affectibus convulsivis paralyticis & uterinis deprædicatur.

PARS ANIMALIS SALE VOLA- TILI CUM MULTA PINGUEDINE CONSTANS.

SPERMA CETI.

Optimum est quod eximitur ex certis cavitatibus processuum cerebri Orcæ piscis, parte postica utrinque unus, it. canibus Carchariis Indis, item ex aliis piscibus majoribus Indiæ Orientalis.

Est substantia gummosa, alba, tenera, mollis, pinguis oleosa, quasi ex parvis raris furfuraceis squamis composita, balænarum, orcarum, præcipue ceti dentati & aliorum piscium vel post mortem effusa & in maris superficiem acta, vel studio ex cranio sectove cerebro exempta, beneficio lixivii sæpius purificata, quousque ad albedinem redigatur, saporis pinguis butyracei & viscosi, odoris grati debilis, quod in superficiem maris eructatur, invenitur rarius.

Salem suum volatilem castoreo blandiorem substantiæ pingui habet inclusum, unde præter virtutem discutientem & diureticam obtinet singularem vim anodynâ, hinc audit anticolicum, antipleuriticum, antihystericum, antiasthmaticum, anticatarrhale, in sanguine & lacte congruato discutiendo præ cæteris specificam habet virtutem.

Datur ʒj. vel 3ʒ. c. vitell. ovor.

℞. Sperm. Cet. 3ʒ. castor. gr. vij. f. pulv. contra pleuritidem, exhibe in vitello ovorum, superbibendo aquam chærefolii.

g

℞. Sperm.

℞. Sperm. cet. 3℔. ʒ diaph. gr. xv. cape contra lac con-
grumatum.

℞. Emplastr. d. sperm. cet. applica mammis ad lactis
discussionem.

Sequens cataplasma in coagulato lacte & hinc mam-
mis tumidis commendatur. ℞. Sperm. cet. 3j. croc. or. 3℔.
cum mica panis & vino generoso f. cataplasma.

A N I

Wallrath / BLANC de BALEINE, NATURE de BALEINE.

De ortu spermatis ceti discrepant veteres & recentiores. Pu-
tabant enim olim esse semen aut genituram Balænarum, quæ post
coitum è pudendis muliebribus rursus elabatur, unde & nomen
habet. Fuere, qui ambram albam vel repurgatam esse putarunt,
alii ad bituminosa retulerunt corpora, quorum materia aliunde
in mare influens, in hoc, admixtione salis ejus, & salsedine ali-
quali & viscositate imbuatur. Cum autem adiposum quid po-
tius & pingue sit, videtur utique esse ex animalium classe, & in
specie aquatiliū, id quod rancor facilis, piscosus sapor, sequax
liquabilitas, & odor, quem spirat, gari, manifeste declarat. Ma-
teria autem hæc spermatis Ceti è capite Balænarum præprimis pro-
venit, & tam est ipsum pingue cerebrum, quam oleosus huic ce-
rebro circumfusus liquor. Hoc autem Balænarum genus vocatur
Orca, Byaris, Cachalot, *Pottfisch*; incolit præcipue Borealem Ocea-
num, circa Norwegiam, Islandiam, Groenlandiamque. Capite
prægrandi instructa bellua, adeo ut tertiam totius piscis sæpe par-
tem adæquet, dentes obtinet mediocres. In horum jam piscium
craniis tanta reperitur copia spermatis Ceti, ut ex uno dissecto
plures amphoræ depromptæ fuerint. Nunc autem immediate è
cranio tum vivorum & occisorum, tum demortuorum colligi-
tur; nunc vere mari innatans deprehenditur. Reperitur autem in
mari quando aut Cete pugnando cum aliis occubuit, aut quando
hanc materiam certo tempore per appropriatos meatus evacuarit.
Quod innatat mari, plerumque ignobilius est, quod autem è cra-
niis

niis extrahitur purius, nobilius, & pretiosius existit. In TRANS-
ACTIONIBUS ANGLICANIS Viri eruditi testantur, cerebrum hujus
piscis cum lixivio aliquo forti coqui, usque donec omni humi-
ditate deposita in consistentiam abierit spissam, saponiqueformem,
quam in ollis convenientibus asservant, quousque refrigerata fue-
rit, tumque, supernatante oleo remoto, residua solida massa rur-
sum funditur, frigorisque ope condensatur, tandem cultellis con-
venientibus in lamellas tenuissimas divellitur. ET TMÜLLERO
vero, teste in DISSERTATIONE DE CEREBRO ORCÆ sive SPER-
MATE CETI, tantummodo in lixivio è calce viva & cineribus
facto, postquam prius ab ipso per transcolationem per saccum pi-
losum oleosa substantia omnino separata fuerit, maceratur, usque
dum in hanc prædictam substantiam abierit. Sperma ceti variis
adulteratur modis, facile enim illud ex aliis majorum piscium ce-
rebris impostores illud conficiunt. Pinguedo quoque oleosa ex
fauciatis mortuisque Balænis emanans marique innatans, & hujus
falsedine pariter ac frigore densata spermatis loco à quibusdam di-
vulgatur. Quin & adeps pinguis Ceti aut Omphacio præparatus,
aut in loco frigido reconditus, hinc expressione à tenuiori parte
separatus aut lixivio dissolutus, aliove modo subactus, pro sperma-
te Ceti intemerato venditur. Reperitur autem Sperma Ceti in
masculorum tantum craniis, cum foeminarum cerebrosa substantia
liquidioris instar sit pinguedinis, oleum in usum lucernarum sug-
gerentis.

In catarrho suffocativo remedium est quam maxime laudabi-
le, præsertim si Venæsectio præmittatur, in doloribus spasmodicis
abdominis & imprimis in doloribus quoque arthriticis non absque
successu adhibetur. Externe ad tumores & inflammationes mam-
marum vel per se vel cum aliis applicatur. Quidam Cicatriculis
post ablationem pustularum in variolis Sperma Ceti inungunt, aut
ipsis etiam pustulis variolosis illinunt ad temperandum acorem in
variolarum pustulis cutis corpus fibrosum exedentem, & in foveas
excavantem. In unguentis porro commendatur ad nervos con-
tractos & ad spasmum, ut & ad morbos pectoris, imprimis tussim,
ubi mulieres adhibent sparadrappum factum ex charta per Sperma
Ceti in oleo dissolutum trajecta. In usum quoque cosmeticum ve-
nit cum oleo Tartari per deliquium vel aliis subactus, glabram
enim

enim & nitidam cutim reddit ac maculas faciei tollit. Notandum tandem, quod intus assumptum virtute anthelmintica & aphrodisiaca gaudere dicatur.

Dari potest vel cuspidatim vel ad ʒj. usque. Exhibetur in lacte vel jussculo calido, vel cum Syrupo Violarum, vel Syrupo Capillorum Veneris aliove pectorali. In pulverem quoque redigitur cum Saccharo vel simplici vel candifato, imprimis violato. Vel cum Trochiscis de confectione Alkermes. Ut autem eo melius pulverisari possit, humectatur parumper oleo amygdalarum dulcium.

IN OFFICINIS CELEBRE EST

Emplastrum de Spermate Ceti, Wallrath, Plaster / Emplatre de blanc de Baleine. Sanguinem & Lac imprimis coagulatum resolvit. Hinc mammis puerperarum impositum, omnibus ex lacte doloribus & tumoribus etiam duris imo scrophulis & strumis ab authore MYNSICHTO dicatur, Quandoque tamen effectus non respondet.

ANIMALIA SALE VOLATILI BLANDO CONSTANTIA.

SCINCUS.

Est animal quadrupes oviparum, lacertæ simile, nisi quod dorsum habeat latius magis glabrum & minus ferratum, cute squamosa albicante tectum, cœsia à capite ad caudam decurrente linea, in aquis degens, potissimum maris rubri, intestina rejiciuntur & exiccatur.

Sale volatili blando scatet, ob quod diureticum est, an vero habeat simul vim alexipharmacam, aphrodisiacam & adversus lepram uti veteres putarunt, experientiæ committendum, interne datur à nonnullis ejus caro ad excitandam fem.

℞. Carn.

℞ Carn. scinc. formicar. alat. ana ʒj. Elect. diasatyr. ʒiiij. fyr. cherm. q. f. f. Elect. ad proritandam fem. add. semen eruc. & erys. pro stimulo.

Cineres cum ☉e volatili conjuncti laudantur in hydrope & in nephritide.

Σκῦνϙ, Stincus, Zincus Marinus, Crocodilus minor, Meer-
stinx / Scinc Marin.

Vescitur herbis odoriferis: ex Ægypto & India ad nos exenteratus adfertur. Sunt qui inter partes Scinci distinguentes renes cæteris præferunt, alii vanè. Dosis est ad ʒj. Ingreditur Theriacam & Mithridatium, ut & Electuarium diasatyræ.

LUMBRICI TERRESTRES.

Sunt animalia apoda, exossia, digitum longa, crassitie pennæ anserinæ, mollia & carnosæ, coloris dilute sanguinei, collo rubicundis angulis cincto, saporis nullius evidentis terrei.

Constant ☉e diuretico & diaphoretico, hinc in specie ad arthritidem & colicos dolores commendantur, in hunc finem dantur intra, & extra applicantur.

℞. Lumbric. terr. viv. ʒj. affund. vin. f. ▽ gramin. f. infusum diureticum.

℞. Lumbric. terr. viv. q. v. applica parti arthriticæ & inprimis vaga afflictæ.

℞. Rad. helen. ʒiʒ. lign. sassafr. ʒij. herb. capill. Mij lumbric. vivor. ʒiiij. passul. min. ʒiʒ. coq. ex ▽ f. apozema ad morbos scorbuticos & arthriticos.

℞. ☉ Lumbric. terr. factum per coctionem, adde ☉ proprium destillatum per retortam, applica partibus arthriticis.

Ἰνὴ ἔρτεα, VERMES TERRÆ, LUMBRICI à lubricitate,
INTESTINA TERRÆ, Erd-Würm/ Regen-Würm. VERS
DE TERRE, LOMBRICS.

Insecta hæc reptilia oculis & auribus destituta, colore, differentes, dum alii sunt rubicundi, alii albidii, alii lividi, é quibus tamen priores eliguntur, hyeme sub terra latent, vere & æstâte delabentibus potissimum pluviis e latibulis prodeunt, ita ingredienti, ut præcedenti parte priori, quod reliquum est corporis, ad illam contrahant, atque hoc pacto ex uno in alium locum feruntur, dicente SCHWENCKFELDT.

Lumbrici præter citatas ab authore virtutes, discutunt, obstructions reserant, in ictero & Hydrope conducunt, ut & in morbis spleneticis. Nervos roborant unde in Paralyfi Apoplexia &c. laudantur, item in convulsionibus & spasmodis & in morsu canis rabidi deprædicantur. Adhibentur præparati seu cum Vino loti & postmodum leni calore exsiccati. Commendantur ad aurium affectus, comedones abigendos, & in panaritio vivi applicantur ibique relinquuntur, donec moriantur.

IN OFFICINIS PROSTAT

Oleum Lumbricorum, Regentwurm-Öhl/ Huile de Lombrics, ou
VERS DE TERRE. Interne laudatur ut singulare vulnerarium, externe anodynum, in spasmodis & contracturis scorbuticis, in nervorum vulneribus & puncturis.

Spiritus Lumbricorum, Regentwurm-Spiritus/ Esprit de Vers de
Terre.

Sal volatile Lumbricorum, flüchtig Regentwurm-Salz/ Sel volatil de Vers de Terre. Spiritus & salis usus est diaphoreticus & diureticus, Arthriticis imprimis tam interne quam externe commendatur. Laudatur quoque in rheumatismis, contusionibus, luxationibus atque paralyfi. Spiritus per os datur ad guttas decem viginti & ultra, sal autem volatile ad grana tria ad decem.

ANIMAL CAUSTICUM ET ACERRIMUM.

CANTHARIDES.

Sunt animalia oblonga, alata parva, vaginipennia, aureo colore viridantia, saporis primo nullius, hinc acerrimi picei, caustici erodentis, odoris cum recentes sunt foetidissimi, inveniuntur maxime in regionibus calidioribus, Hispania, Gallia, etiam in Germania super cynoglossam, sed earum virtus brevi perit, acerrimæ tamen etiam sunt, ubi recentes, ut plurimum gaudent fraxino, ut & ligustro.

Vis caustica consistit in Θ e, infusa enim fiunt caustica ex vino & ω u vini, sed simplici tantum non rectificato, alias Θ non solvitur, & s. q. cantharidum, hinc forte cuiusdam error, qui sumsit forsitan rectificatum ω um vini, vel quantitatem cantharidum non satis largam, ut scripserit infusa ipsorum non satis esse caustica. Cæterum quæ Olaus Borrichius fecit experimenta sunt optima. (Conf. act. Hafn. Volum. IV. obs. 80. p. m. 185. & Vol. V. obs. 89. p. m. 216.)

Harum vim diureticam & simul causticam & vesicatoriam, non ab imaginariis illis aculeis, sed ab Δ is seu Θ is particulis acerrimis dependere evincunt tum autopsia, tum experientia, à Segero aliisque tradita. [Conf. etiam Ehrnfrid. Hagendorn. C. N. C. Dec. II. ann. 1. obs. 163. p. 388. ubi de virtute liquoris ex cantharidibus prolecti agit.] Quamvis tamen earum usus ob vim causticam renes & vesicam exulcerantem suspectus est, tamen in morbis nonnullis ad urinam movendam, ad corrigendam gonorrhœam virulentam exhiberi potest, incipiendo à dosi minori, scilicet à gr. β . & si fiat cum ægri levamine ad gr. j. vel ij.

Fre-

Frequentior earum usus est externus in excitandis vesicis, ad capitis, aurium & oculorum dolorem, it. ad suffusiones & tumores oedematosos.

Absque summa necessitate vix dantur interne, nam comperi vel quartam grani partem aliquando renes inflammasse, unde diureses copiosæ, dolorificæ, imo cruentæ. Vid. Wedel. Amœn. Mat. Med. Vis nimia caustica temperatur lacte vaccino vel o lini expresso.

℞. Canthar. gr. j. datur in Emuls. semin. 4. frigid. maj. ad diuresin excitandam.

℞. Canthar. ʒj. Vin. rhenan. ʒiiij. f. infus. cujus cochl. β. vel j. cum vino vel decocto diuretico potest permisceri & per vices exhiberi, præcipue hydropicis ad urinam movendam, quod commendatur à Willisio. [Conf. Th. Bartholin. Cent. V. Histor. 82. p. m. 159.]

Pro Vesicatorio dantur si recentissimæ gr. v. si annosiores ʒβ. ad ʒj. Vesicatoria conveniunt in oculorum inflammationibus, à lymphæ coagulo, in capitis dolore, morbis soporosis, surditate. Fiunt pone aures, in nucha, dorso, lumbis, brachiis, femore, sura &c.

℞. Canthar. ʒj. pulp. ficus q. s. f. Vesicator.

℞. Canthar. ʒj. ferment. pist. ʒj.

℞. Canthar. ʒj. Empl. Citr. ʒβ. Thereb. q. s. f. vesicator. sub forma emplastr.

℞. Infus. Cantharid. ʒβ. ▽ Nymph. portulac. gramin. ana ʒij. o thereb. gt. v. exhibe successive hoc infusum ceu extremum remedium in gonorrhœa virulenta inveterata cum ulceribus sordidis, per penem etiam injicitur.

Hæc salia caustica minime infringuntur ab acidis, quidam possident unum foetidissimum Cantharidum, qui sanguini affusus fluiditatem ipsi reddit.

PAR-

Kanθarides, quasi parvi Scarabæi, *MUSCÆ HISPANICÆ*,
Spanische Mücken / *MOUCHES CANTARIDES*.

Statis temporibus fere per universam reperiuntur Europam. Fraxinum deperire Cantharides adeo certum est, ut viderim, excelsam arborem exinde demortuam; amant etiam herbas odoriferas. HAGENDORNIUS in CYNOSBATOLOGIA ex vermibus intra Cynosbati spongas generari asserit has Muscas, quod tamen negat LANGIUS, statuens ex aliis regionibus turmatim ad nos accedere, & licet in oris his nostris coire videantur, ova tamen non ponere, nec pullos excludi, sed omnes unius ejusdemque magnitudinis conspici.

Calcinantur quoque Cantharides, quæ aceti vapore enecantur, & ad grana duo, tria in Lue venerea, calculo, morfu canis rabidi & hydrophobia laudantur. Dum ad vesicas excitandas adhibentur, quæstio est, an totæ quoad corpus alas pedes & caput, an vero abjectis alis & pedibus assumi debeant. Recte LANGO nimis scrupulosi videntur, qui unam aut alteram partem abjiciunt, cum levis aut nulla ratione particularum causticarum intercedat differentia inter singulas partes, conferri quoque hac de re meretur WEDELIUS in AMOEN. MAT. MED. sunt qui pro corrigenda Cantharidum virulentia addunt semen Ammeos, Sinapi Euphorbium, acetum &c.

Quod emplastra Vesicatoria concernit, quilibet fere Chirurgus habet peculiare.

IN OFFICINIS QUOQUE ASSERVATUR

Emplastrum vesicatorium, *Blasen- oder Blattern ziehendes Pflaster* / *Emplatre Vesicatoire*.

Cum Cantharides tam infestæ sint partibus urinariis, tum usu interno, tum externo, ita ut dolores intensissimos & mictum etiam cruentum excitent, earum quoque antidotum notandum, quod Lac est, tam vaccinum, quam aliud quodcunque largius haustum, tum externe in balneis & injectionibus usurpatum. Conveniunt quoque emulsiones ex seminibus quatuor frigidis paratæ ut & omnia mucilaginosæ. Dolores ab apposis Cantharidibus excitati non melius sopiuntur, quam unguento sambucino cum balsamo sulphuris commixto. Curiosum utique, si verum est, quod, si pol-

lex pedis oleo inungatur, in quo cantharides fuerunt digestæ, mira excitetur erectio membri genitalis.

PARTES ANIMALES OLEOSIS CRASSIS CONSTANTES.

ICHTHYOCOLLA.

Est substantia ex albo flavescens glutinosa excocta ex pisce Huso dicto, cujus ventriculus, intestina, vesica coquantur, quousque in tenues possint diduci lamellas, post contorqueri & cogi in spiras, saporis glutinosi, odoris nullius.

Pinguibus glutinosis seu mucaginosi cum paucis volatilibus constat, & propterea tanquam temperans & anodynum sumitur, in specie in dysenteria, diarrhoea, temperanda & incrassanda lymphæ acri Jungitur decoctis & clysteribus.

℞. Rasur. C. C. ℥iiij. ichthyocoll. ℥ij. coq. c. s. q. ∇ commun. in consistentiam gelatinæ. Hujus cape ℥j. ∇ cinam ℥ij. ∇ Cichor. ℥j. syr. violar. ℥j. M. f. julapium in febribus ardentibus & malignis.

℞. Mucag. ichthyocoll. tragac. g. arab. ana ℥j sacch. alb. in ∇ puleg. solut. f. trochisci contra acrem lympham, catarrhos falsos, inflammationem faucium & tussim.

Egregii fiunt clysteres ad demulcendum acre dysentericum. ℞. Lact. chalybeat. ℥viiij. ichthyoc. ℥ij. coque ad solutionem, add. Bals. Peruv. ℥j. vitell ov. num j.

ANI-

ICHTHYOCOLLA piscis, Huso, Piscis exos, Hausen/
Husen.

Juxta

Juxta RONDELETIUM Cetaceus piscis est, cartilagineus sine ossibus ullis, aut spinis, sine squamis. Capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito, è superiore maxilla quatuor apophyses carnosæ dependent, oculos parvos habet, pro corporis magnitudine. Carne est prædulci & glutinosa admodum, ob id salituræ idonea, qua melior redditur rubescens & durior.

Piscis quidem est marinus, sed timidus & mitis: in aquas dulces frequenter adscendit. Capitur imprimis in Danubio. Quandoque viginti quatuor pedes longus est, & aliquot centenas libras pendens. Carnem Husonis in dorso sapere ajunt carnem vitulinam, in ventre suillam. Lactibus ejus nil dulcius aut delicatius esse ferunt. Ova quoque in cibo expetuntur. Apponitur mensis recens, & salitus sed prius aqua maceratus.

Non solum ex interaneis, sed & corio, pinnis, cauda excoquitur gluten, quod ICHTHOCOLLA, GLUTEN PISCIIUM, COLLA PISCIIUM, Fischleim/ Haufblasen/ COLLE DE POISSON vocatur.

Usurpatur paulo rarius in Medicina. Inservit ad parandum istud glutinis flavi genus, Mund-Seim/ quo in ore liquefacto chartæ glutinantur. Ad vina clarificanda quoque adhibetur; dum enim ibidem dissolvitur, secum deinde rapit ad fundum partes crassiores vinum turbidum reddentes. Quidam usurpant ad gelatinas: chartæ porro glutinandæ & aliis rebus firmandis conducit. Ingreditur Ichthyocolla varia emplastra.

ANIMAL SANGUISUGUM.

HIRUDINES.

Sunt animalcula apoda, exossia, longa, lubrica, lineis & punctis nigris variegata, ore trifulco; vivunt in palustribus.

Applicantur utero, podici, vasis hæmorrhoidalibus, brachiis, pedibus, temporibus aliisque partibus ad extrahendum sanguinem, maxime in hæmorrhoidibus cœcis tumidis

midis & dolentibus. Cum distentæ apparent sanguine, nec sua sponte volunt decidere, asperguntur ☉ Pri per deliquium, vel sale quocunque.

PARS

Βδέλλα ἀπὸ βδέλλειν, ab exfugere SANGUISUGA, Blutsau-
ger/Blutigel/ SANGSUE.

Hirudines aliæ sunt majores equinæ dictæ, quia novem equum fugentes eundem occidere possunt, aliæ minores. Rejiciendæ sunt, quæ in paludosis & putridis generantur aquis, magna capita viridia habent, & lanugine lineisque cæruleis in dorso ornata sunt. Præferendæ vero, quæ fluentibus aquis innatant, tenuiora ac longiora ac capita exiliora habent, dorsum viride maculis nigris vel lineis flavis signatum & ventrem rubicundum, quoad reliquas vero partes flavedine tincta comparent. Recens captæ non statim sunt applicandæ, sed per aliquot dies in aqua pura detinendæ, ut ab impuritatibus noxiis liberentur, & esurientes magis reddantur, quem in finem etiam ante applicationem quidam illas ex aqua eximunt, & in capsula lignea per aliquot horas detinent. Pars cui admovendæ sunt, panno lineo vel spongia aqua calida imbuta fricatur, ac foveatur, partim pro munditie concilianda, partim pro parte parumper rubificanda. Si adhærescere detrectent, locus lenissime ad effluxum alicujus guttulæ sanguinis scarificatur, vel sanguine columbino aliove aut lacte illinitur. Si applicantur, digitis duobus anterioribus linteo molliter comprehenduntur. Sunt qui pro evacuatione adjuvanda caudam præscindunt, tum major quantitas per vulneratum corpus extillat. Quod si hæmorrhoidalibus vasis applicentur, bene cavendum, ne in anum irrepant, quod si autem illud contingat statim clysteres saliti in copia sunt injiciendi, donec expulsæ rursus fuerint.

PARS

PARS ANIMALIS TERREIS CON- STANS CUM PAUCO SALE VOLATILI.

FOLLICULI SERICI.

Sunt vesiculæ pallide flavescentes, ovi columbini magnitudine, textæ ex filo serico continuato sæpe replicato, ex bombycum ore emisso, saporis & odoris nullius evidens.

Ob paucum Θ volatile cardiaci habentur. Externe cinis eorum vulneribus mundificandis inspergitur.

\mathcal{R} . Ciner. follic. seric. \mathfrak{z} j. $\textcircled{\text{O}}$ l. Hungar. g. 'iij. insperge vulneribus.

Ædes sericæ, sepulchrum sericeum, Seidenbälglein. Quoniam in usum plane non amplius trahuntur, ideoque non opus est multum de eisdem & Bombycibus sermonem facere.





PARS TERTIA.

R'EGNUM MINERALE

EXHIBENS.

MINERALIA SALE VOLATILI
SALSO CONSTANTIA.

SAL AMMONIACUM.

EST substantia alba crystallina, salina, ex quintuplo urinæ humanæ, una parte salis communis, & dimidia fuliginis parata, saporis acris & urinosi. Omne est factitium, ipsi Arabes rident nativum dari.

Ob sal falsum obtinet vim diureticam, stomachicam, antifebrilem. Datur in substantia à ℥ss. ad ʒss. jungitur variis specificis.

℞. Θ*ci ℥j. ꝯr. Θlat. gr. xv. Θ absynth. ℥j. f. pulvis digestivus.

℞. Sal. Ammon. Nitr. depur. ana ʒss. rad. liquir. ir. flor. ana ʒj. f. pulv. contra phthisin dos. ad ℥j. ex jusculo pingui.

℞. Sal Ammon. ʒss. Corall. ℥j. ʒo d junip. gt. ij M f. pulv. antifebr. ad ij. doses.

℞. Gumm. Ammon. ʒj. tragac. ʒj. empl. d. mucilag. ʒij. sal. ammon. ʒiij. ʒo succin. q. f. f. emplastrum imponendum ad tumores viscerum.

In ophthalmia à Catharrhis. ℞. ∇ foenic. ʒj. sal. ammon. gr. v. f. collyr. addi potest sacch. ʒni. Flores sublimati pro-

proficui sunt, in iisdem affectibus, in quibus Sal. Spiritus totus est alcalinus, excepto phlegmate, convenit hinc in omnibus morbis provenientes ab acido, egregium est antifebrile.

℞. —us sal. ammon. ʒij. ▽ Card. Bened. ʒiiij. syr. absynth. ʒʒ. Θ absynth. ʒʒ. L. O. gr. j. f. mixtura in febris.

BO.

SAL AMMONIACUM, vel ab Ammonis oraculo, circa cujus delubrum olim effodiebatur, vel quod sub arena reperiri credebatur, **SAL ARMONIACUM** quasi Armeniacum, **SAL SOLARE**, **AQUILA COELESTIS**, **FULIGO MERCURIALIS ALBA**, **SAL MERCURIALE PHILOSOPHORUM**, *Salmiac* / **SEL AMMONIAC**.

Distinguunt inter Sal Ammoniacum veterum & recentiorum, illud ex urina animantium cum terra conjuncta & confermentata, àque radiorum Solarium æstu coctis in Lybia repertum fuisse tradunt, hodie autem inveniri negant. Hodiernum Sal Ammoniacum factitium est.

Sal ammoniacum eligi debet candidum, nitidum, siccum ac purum, saporis acris ac penetrantis, sub forma panum planorum atque rotundorum, exterius quidem grysei interius vero albicantis coloris & consistentiæ crystallinæ. Quod si depuratum cupis hoc sal, solve in aqua simplici, solutionem filtra & vel ad siccitatem evapora, vel post phlegmatis quoad partem exhalationem repone in locum frigidum, ut concreascit in crystallos hexagonas.

Sal hoc humores resolvit, incidit, dissipat vimque diaphoreticam possidet. Externe in gangræna, in angina &c. adhibetur, oculorum unguēs nubeculasque discutit, in simplici aqua solutum & instillatum. Ad unguēs oculorum in equis infallibile dicitur esse remedium. Exinde paratur sic dicta *Aqua Sapphirina Chirurgorum*, nempe Sali Ammoniaco in pelvi ænea aquam affundunt, additaque modica calcis vivæ quantitate simul agitant, & per noctem

item stare sinunt, quæ in multis oculorum affectibus egregie prodest.

IN OFFICINIS PROSTANT

Flores Salis Armoniaci simplices, Salmiacblumen/ Fleurs de Sel Armoniac. Dantur ad grana tria, decem & ultra.

Flores Salis Armoniaci cum cineribus clavellatis, Salmiacblumen mit Potasch/ Fleurs de Sel Armoniac avec des cendres gravelées. Magis sunt volatiles.

Flores Salis Armoniaci cum Marte aut lapide Hæmatite, Salmiacblumen mit Eisen- oder Blut-Stein/ Fleurs de Sel Armoniac avec du Mars. Penetrantiores habentur simplicibus. Ex capite Mortuo post sublimationem horum florum, per deliquium obtinetur

Liquor Martialis stypticus, qui ad aliquot guttas instillatus liquori terræ foliatæ tartari ex tempore elegantem *Tincturam Martialem* exhibet.

Sal Anglicum volatile, Englisch Salz zum riechen/ Sel volatil d'Angleterre, usurpatur externe naribus admovendo, pro excitandis Lypothimicis & refocillandis ægris.

Spiritus Salis Armoniaci cum calce viva, aut urinosus Salmiac-Geist mit ungeleschem Kalck/ Esprit de Sel Armoniac volatil avec de la Chaux vive. Nephriticus est & calculum præcavet, resolvit massam sanguineam fluidamque reddit ac tenuem, unde in apoplexia epilepsia spasmus convenit. Est quoque remedium sudoriferum & antifebrile. In suffocatione uterina tam interne exhibitus, quam naribus admotus laudabilem edit effectum. In affectibus chronicis; spleneticis, scorbuto, malo Hypochondriaco datur ad guttas decem triginta & ultra. Ebrietatem arcet & abigit. Externe inservit ad mensium obstructionem per certum instrumentum admissus, dolores quoque podagricos & arthriticos lenit, inservit etiam tanquam præcipitans solutorum in acidis. In vitro angustioris colli ad excitandos ægros naribus admovetur. Cum autem hic spiritus admodum volatilis paucio tempore debilis evadat, præstat ex tempore pulverem salis armoniaci cum pulvere calcis vivæ nondum extinctæ miscere, qua ratione longe fortius nares percellentur.

Spiritus Salis Armoniaci cum cineribus clavellatis, Salmiac-Geist mit

mit Potaschen gemacht / *Esprit volatil de Sel Armoniac avec de cendres gravelées.* Easdem ac prior vires obtinet, & pro usu interno magis adhibetur. Spiritus hic non solum Flores suppeditat, sed & in crystallos abit, & cum spiritu Vini rectificatissimo congelatur. Ex capite mortuo elixiviat Sal aliquod febrifugum Sylvio Medico quondam Parisiensi usitatissimum, ad ʒj. &c. datum.

Spiritus Salis Armoniaci anisatus, Salmiac Geist mit Anis gemacht / Esprit de Sel Armoniac anisé. Usus ejus in pectoris affectibus demulcendis, præsertim, qui causam viscidam agnoscunt, unde in asthmate pituitoso & affectibus à flatibus oriundis conducit, flatus nempe egregie discutit. Dosis pro ratione ætatis ad guttas quinque viginti triginta &c.

Spiritus Salis Armoniaci succinatus, Salmiac Geist mit Agstein / Esprit de Sel Armoniac avec l'ambre jaune. Remedium nobile cephalicum, nervinum & antepilepticum, datur ad guttas decem viginti triginta & ultra.

Cum spiritu Salis Armoniaci & æquali quantitate spiritus Vini rectificatissimi ex gummi Ammoniaco efficax in asthmate pituitoso, hydrope &c. paratur essentia.

Ex capite mortuo spiritus Salis Armoniaci cum calce viva parati in aqua per horas aliquot decocto obtinetur liquor, qui cum oleo Tartari per deliquium in coagulum albicans spissum satis abit, quod rursus resolvitur affundendo acidum.

BORAX.

Est substantia pellucida glaciei instar, alumine durior, ex lapide nitroso vel chrysocola calcinata & in ∇ dissoluta, cocta & in crystallos concreta, saporis acris salini & nitrosi. Scilicet in India Orientali eruuntur ex fodinis terræ nitrosæ, quæ leviter calcinatæ in pulverem tritæ coquuntur affusa aqua, vel lixivio forti, hinc exponuntur ut concre-
scant in crystallos, quæ rarius in India ulterius præparantur, sed huc locorum translata ulterius solvuntur, crystallifantur, donec pelluciditatem adipiscantur.

Urinam, menses, foetum potenter promovet, recipitur quoque inter compositiones aphrodisiacas. Dosis à ℥j. ad ʒss.

℞. Borac. ℥j. cinam. ʒss. M. f. pulv. exhibetur in decocto puleg. vel rorismar. ad remoram mensium, additur gt. j. ʒo cinamom.

℞. Myrrh. ℥j. succin. alb. gr. xv. Croc. or. gr. v. borac. gr. vij. f. pul. cap. & superbibatur ▽ cinamomi.

℞. Borac. ℥j. Tinct. Castor. ʒj. ʒ vol. succin. ʒss. ▽ Cinam. ʒj. puleg. ʒij. syr. cinam. vel menth. vel aurant. ʒj. f. mixtura in uteri vitiis.

℞. Borac. Venet. ʒj. ʒ vol. succin. ʒss. Croc. ʒt. aperitiv. ℥j. ʒo cinam. gt. ij. sacch. cand. q. f. ad menses provocandos.

℞. Elect. diasatyr. ʒij. borac. ℥j. f. bolus ad ōem stimulamdam.

Borax calcinata ad expulsiōem omnis salis & acidi volatilis, specificē convenit in fluxibus alvi, seminis, & est nihil aliud quam terra styptica, datur à ℥j. ad ʒss. in conserva rosar. vel per se, vel congeneribus. sic. ℞. off. sep. præp. borac. calcin. Nuc. mosch. tost. sacch. ʒni. ℥j. f. pulv. qui propinatur ex vino rubro, vel alio decocto adstringente.

CHRY-

BORAX vocatur etiam CHRYSOCOLLA, AURICOLLA, GLUTEN AURI, CAPISTRUM AURI ab usu, Borax/ BORAX.

Distinguunt communiter inter Boracem nativam & factitiā. Hujus compositionem LENTILIUS in Ephemeridibus Nat. Cur. sequentem tradit, ℞. Lactis vaccini destillati ℥ij. Mellis despumati ʒjv. croci ʒij, nitri purificati, ita ut nullam amplius acrimoniam

niam habeat, sed subdulce sit, ℥bjv. incorporentur omnia cum lacte dissolvendo ad ignem; demum mitte in olla vitreata in locum humidum & frigidum per mensem, lapis deinde in fundo repertus iterum sic depuretur, ℞. dicti lapidis ℥bj. aquæ simplicis destillatæ ℥bjv. ad ignem omnia dissolve, simulque despuma & cum nulla spuma superfuerit, refrigerata jam aqua effundatur, & invenies boracem. Alii autem cum authore nostro boracem omnem putant esse naturalem. Agricola dicit esse sal nativum in terra repertum, ex quo Venetiis paretur postmodum Borax; LISTERUS, TOURNEFORTIUS aliique ex Sale quodam fossili Indico Tincal dicto obtineri putant. CÆSALPINUS, ex cremato quodam lapide candido & fissili Boracem ortum trahere asserit. Alii ex Chrysocolle nativa parari censent. Res nondum omnimodo decisa.

Ad venerem stimulandam ejus aliquot grana in ovo sorbili exhibentur. Externe in ulceribus sordidis & excrescentiis carniū absumendis ut & ad scabiem laudatur. Virtute quoque cosmetica gaudet. Ingreditur unguentum Citrinum. Usurpatur ad fundenda metalla & auri atque argenti combinationem: Item ad delendas literas & maculas atramento factas. Ingrediens est remedii quod dicitur

Pulvis ad dystokiam, Pulver die Geburt zu beförderen / poudre pour les accouchemens difficiles. Datur vel cuspidatim vel ad scrupulum unum, drachmam semis &c.

CHRYSOCOLLA CRYSTALLINA.

Est substantia crystallina alba, condensata velut borax, facta ex chrysocolle nativa, dissoluta & concreta in crystallos, saporis borace acrioris salini, odoris nullius. Principia eadem quæ boraci, nisi quod inclusa terræ copiosiori. In usum cedit pictorum & aurifabrorum ad consolidandum aurum & argentum.

MI-

Χρυσοκόλλα, AURICOLLA, AURIGLUTINUM, CAPISTRUM

STRUM AURI ab effectu, VIRIDE TERRÆ, VIRIDE MONTANUM, Berg-grün / Stein-grün / Schiefer-grün / Berg-Boras / Kupffer-grün.

Est substantia metallica admodum solida, coloris viridicantis nunc saturatoris nunc dilutioris, ex mineris præsertim ærariis educta. Reperitur in Oriente, Macedonia, Cyprio, Hispania, Hungaria, Silesia, Misnia &c.

In usum Medicum vix venit, nisi quod à quibusdam ad ulcera maligna & contumaciter resistentia à quibusdam celebretur. Evolvatur BAUSCHIUS de Cœruleo & Chrysocollo.

MINERALIA SALE SALSO FIXO CONSTANTIA.

SAL COMMUNE.

Est vel marinum, vel fontanum, Sal marinum paratur coctione ignis vel solis, ubi in maritimis per paratas foveas & canales deducitur aqua marina, ubi accedente sole quicquid humiditatis est avolat & consumitur, reliquum à vento frigidiusculo ultro inspissatur & concrescit in crystallos.

Vim habet diureticam incidentem, & simul est ciborum condimentum catholicum, stomachicum, ob vim abstergentem & potenter discutientem, additur stimuli loco clysteribus.

℞. Θ decrepitat. piper. alb. ana, applica uvulæ prolapsæ & inflammatae.

℞. Decoct. Emollient. ℥viii. add. Θ comm. zij. f. Clysto.

℞. Sal. comm. ℥ss. sal. vol. succin gr. v. aq. chærefol. ℥iij. fyr. dialth. q. s. f. haustus diureticus.

Externe

Externe usurpatur in doloribus colicis, artuum, capitis &c. ubi decrepitatum in sacculis calefactum imponitur, forte quia humorem in poris istis in se suscipit.

℞. Sal. commun. ℥j. sal. gemm. gr. xv. sal. succin. volat. ℥ss. ex vin. diuretic. ℥v. vel vj f. haustus antihydropsicus egregius, add. roob vel syr. juniper. ℥j.

S A L

Αλς, Salt / SEL.

Sal est substantia plus minus albicans, crystallina, angulosa, cubica, facilis solutionis in aqua & linguam sapore acri & salso afficiens.

Longum nimis foret, si modum Sal tum ex aquis marinis, tum ex fontibus salinis extrahendi describere vellemus, sufficit dicere quod sicuti sal marinum calore solis mediante, ita sal fontanum ope cocturæ ex muria, dissipata prius motu lapsuque magna aquæ sylvestris sive heterogenæ Sulciæ sive Solæ, ut loquuntur, mixtæ quantitate, obtineatur. Sal Marinum obscurius est & ex albo nigricat, potest tamen per repetitam solutionem & coctionem depurari & dealbari.

Eligendum Sal albicans in granis præsertim majoribus, admodum acre, quæ acrimonia in marino ut plurimum major.

Sal, dicente SEBIZIO, optimum, usitatissimum summeque necessarium ferculorum pene omnium condimentum est. Nam vel lautissimi cibi sine sale sentiuntur fatui, & sine salis conditura nulli palato arrident. SALERNITANI ita canunt,

*Vas condimenti præponi debet edenti,
Sal virus refugat, recte insipidumque saporat,
Non sapit esca probe, quæ datur absque Sale.*

Unde semper in mensa apponitur, nam
Omnis mensa malè sternitur absque Sale.

Et juxta alios

Sal primo poni debet, primoque reponi.

Non bene mensa Tibi, ponitur absque Sale.

Ominosum adhuc quibusdam videtur, si vel mensa salis sit expers, vel si Sal in eadem evertatur. Sal autem est ejusmodi condimentum, quod cujuslibet ætatis sexus complexionis & conditionis hominibus, non secundæ modo sed etiam adversæ valetudinis tempore, conveniens est, charum, gratum atque acceptum. Ad piscium, carniū, butyri, casei, panis, omniumque propemodum ferculorum condituram & ad arcendam putredinem adhibetur, ne dicam de aliis usibus quibus sal dicatum est. In Medicina multiplicem præstat utilitatem. Convenit in cruditatibus ventriculi, appetitu prostrato. Externe in suppositoriis, oris collutionibus, dentifriciis &c. adhibetur. In ulceribus putridis mundificandis & tumoribus discutiendis conducit ad scabiem pruritus & impetiginem prodest, ambustis quoque medetur & sanguinem extravasatum discutit. Labiis affricatum aut ori inditum Lipothymiam arcet & tollit. Sicuti autem debito usu quam maxime existit laudabile, ita vicissim ejus abusus maxime noxius. Hæcticis, Melancholicis, atque Cholericis nocet, scorbutum infert, ad calculum disponit, sitim causatur, & juxta SALERNITANOS

*Urant res salsæ visum semenque minorant,
Et generant scabiem, pruritus sive rigorem.*

Sal porro Chymicis quoque inservit operationibus, antequam autem usurpetur, calcinandum est atque decrepitandum, sive liberandum à partibus aquosis, quæ per ignem expulsæ strepitum istum edunt.

IN OFFICINIS PROSTANT

Spiritus salis, Saltz-Geist/ Esprit de sel. Spiritus hic acidus obtinet virtutem aperientem, & diureticam, appetitum restaurat & in hydropse atque Hernia commendatur, laudatur quoque ad calculum comminuendum, lumbricos enecat febribusque medetur. Externe gangrænam refrænât & carnem putridam absūmit, à quibusdam quoque cum aquis appropriatis mixtus in doloribus podagricis

cis commendatur. Dosis est ad guttas tres, sex, decem &c. pro ratione ætatis. Rarius autem interne usurpatur. Magis scilicet in usum internum trahitur.

Spiritus salis dulcis, versüßter Salz, Geist/ Esprit de sel dulcifié. qui odore & sapore admodum suavis & gratus est, constituit remedium egregium stomachicum, appetitum dejectum cruditates nidorosas, vomitum & nauseam corrigit, & in ante dictis affectibus prodest. Datur ad guttas decem, viginti, triginta, & ultra pro ratione circumstantiarum.

Sal Catharticum amarum, Englisch Purgier. Salz / sel purgatif amer. Datur ad drachmas duas ad unciam unam & ultra sed rarius.

SAL GEMMÆ.

Est substantia alba, crystallina salina, eruta ex terræ fodinis, saporis acris & falsi.

Sale communi potentius est, cæteroquin cum ipso convenit, hincque hydropicis datur ʒß. Ut plurimum tamen externe datur in clysteribus, gargarismatibus.

℞. ▽ portulac. plantag. vel succi semperviv. ana ʒiiij. sal. gemm. ʒij. syr. violar. q. s. ad grat. pro gargarism.

NL

SAL NATIVUM, SAL CÆDUM, SAL CRYSTALLINUM, SAL GEMMEUM, SAL FOSSILE, Stein Salz/ Berg Salz/ Sel gemme.

Effoditur ex montibus aliisque terræ visceribus, variis in regionibus Asia, Africa æque ac Europa, Hispania, Catalaunia, Germania, Hungaria, Transylvania, Polonia &c. Extrahitur in frustis majoribus minoribusve. In sua fodina molle esse dicitur & leve, extra autem in momento durescere & gravitare, ita ut unicum frustum, quod in fodina ab unico homine tractabatur, extra vix quatuor

tuor

tuor boves movere possint. Figura quoque hujus salis, si crystallifetur cubica est. Non tam prompte in aqua dissolvitur ac sal commune, cum quo tamen ratione usus culinaris coincidit. Eligendum potissimum quod colore crystallino albicante instar gemmæ, unde & nomen traxit, resplendet. Datur enim & sal rubescens, croceus, purpureus &c.

Sunt authores qui inter Sal Gemmæ & Sal cædum sive fossile distinguunt, & non omnino absque ratione.

NITRUM.

Est substantia alba, crystallina salina, ex terra pingui salsa & nitrosa cum urina vel aqua in lixivium cocta, in crystallos concreta, saporis amaricantis & acris. Scilicet in tractibus Bengalenfibus inveniuntur terræ nitrosæ, saporis falsi acidi subacris, cui lixivium forte ex salicibus, vel ∇ vel urina affunditur, coquitur, inspissatur & exponitur ut concreseat in crystallos. Deinde repetita apud nos filtratione, concretionem magis exaltantur, purificantur, tumque nitrum depuratum dicitur. Efflorescit etiam aliquando ex rupibus & parietibus antiquis, ex alcali calcis & acido aëris.

Sale falso mediæ naturæ inter volatile & fixum constat, gaudet virtute diuretica, refrigerante, temperat nimiam acredinem bilis, sedat sitim, & sanguinis phlogoses, præcipue in malignis, est quoque antaphrodisiacum.

℞. Nitr. sal. ammon. ana ʒij. liquir. ir. florent. ana ʒß. f. pulv. antihecticus dos. ʒj.

℞. Sem. agn. cast. Nitr. depur. ana ʒij. camph. ʒß. L. O. gr. iij. f. pulv. contr. nimiam salacitatem.

℞. Fol. salv. Mij. sem. nasturt. ʒij. flor. malv. hortens. Miß. rad. polypod. ʒiij. coq. in ∇ fontan. ℞. Colatur. ℥ij. add. Mel. ros. ʒiß. Nitr. præp. ʒiij. M. f. gargarism. pro ex-
fione,

sione, inflammatione & affectu scorbutico gingivarum, faucium & laryngis.

In hæmorrhagia narium, nitrum in aqua solutum & naribus haustum profuit.

Lapis prunellæ nitro gravior est & temperatior, alias cum ipso convenit, estque nihil aliud quam Nitrum cum sulphure depuratum. dos. ʒj.

℞. Lap. prunell. ʒj. Θ absynth. gr. v. ocul. ʒ. gr. x. ʒ. junip. gt. ij. M. f. pulv. exhibendus hora j. ante paroxysmum febrilem.

ALU.

Νίτρον, NITRUM. Hoc vocabulum ob vim abstergentem *ἀνίρω*, quidam derivant, alii à nitore, quo præcipue crystallisatum resplendet, deducunt, alii à Nitria Ægypti provincia, in qua olim copiose proveniebat, dictum volunt. Dicitur & SAL NITRUM, SAL PETRÆ, quod in Rupium murorumque superficiebus erumpat; CERBERUS CHYMICUS, SAL INFERNALE, ANATRON, SAL HERMAPHRODITICUM &c. quoque audit. *Salpeter* / SALPETRE, NITRE.

De generatione Nitri inter se non conveniunt authores, quidam in terra generari, alii in hac ab aëre educi aut in eadem separari affirmant, videtur autem utrumque posse admitti, cernimus nimirum tum in stabulis jumentorum & aliorum animalium urina stercorebus & fimo prolutis, ab aëre etiam remotioribus, copiosius Nitrum erui. Sicuti etiam ex terra cellarum profundarum extrahitur. Efflorescit porro in parietibus lapideis & muris, & in terra, è qua Nitrum jam elixiviatum fuit, si aëri per tempus exponatur, ita ut pluvix non accedere queant, novum rursus nitrum innascitur.

Nitrum, præter Nitrum antiquorum, quod non adeo cognitum est, reperitur potissimum triplex, quod ex terra extrahitur, quod muris lapideis adhærescit, & quod scopulis & rupibus adnascitur.

In usum autem imprimis cedit prima species. Sequenti autem modo fit ejus extractio. Assumuntur lapides aut terræ pingues redditæ à stercorebus vel urinis animantium, vel è vetustis ædificiis extractæ, vel per longum tempus aëri expositæ, pulverisantur grosso modo, induntur vasis ligneis, superinfunditur aquæ tantum, quantum vas capere potest, postquam per integrum diem stetit aqua super terras & lapides, effluere permittitur ex epistomio, prope fundum vasis, lente & guttatim, hic liquor imprægnatus Nitro ad ignem ad medietatis consumptionem coquitur, postea per cineres repurgatur, sequenti modo, nimirum in vas aliud in fundo plurimis foraminibus pervium & cineribus repletum infunditur & transcolatur, hic labor sæpius reiteratur, donec liquor maxime clarus sit, postea denuo coquitur & quando supra cultrum effusus margaritæ similis est, stetque non defluat, sed congelascat in petras, fortemque odorem spiret, in pluribus vasis ligneis vel metallicis ad coagulandum vel crySTALLISANDUM in loca frigida reponitur, ubi in crySTALLOS hexagonas spiculorum instar acuminatas abit. Liquor à crySTALLIS decantatus, quem Nitromitram seu Nitri Matrem appellant, iterum cineribus detergitur & coquitur adque coagulationem reponitur, hæcque operatio tamdiu continuatur, donec omne Nitrum fuerit extractum.

Per Chymiam quadruplex ex Nitro prolicitur substantia, aquea, acida, alcalina & terrea, ita tamen ut aquea & terrea exiles satis & magis passivæ habeantur. Sunt qui Nitro etiam sulphur inesse volunt, eo quod ex ipsorum sententia aliquid inflammabile insit, verum negatur Nitrum per se esse inflammabile, neque enim crucibulo immissum per longum temporis spatium in ardentissimo igne detentum, flammam concipit. Nec spiritus rubicundi in destillatione Nitri prodeuntes magis inflammabiles sunt, quam ipsum Nitrum, ne dicam jam de eo, quod sulphur opacitatem inducat, aciditatem obtundat & magis calefaciat, cum Nitrum pellucidum refrigeret potius. Hæmorrhagias sedat tam interne quam externe adhibitum. Laudatur in Cephalalgia, deliriis, Mania. Conducit in Nephritide & calculo, urinam pellit, motus spasmodicos demulcet, imo in ipsa diarrhœa præsertim biliosa quandoque locum invenit. Adhibetur in inflammationibus faucium & angina, in gargarismatibus, additur quoque remediis topicis

picis anodymis & refrigerantibus, combustis quoque medetur, ut & scabiei, ulceribus cacoëtheis & fistulis. Illud notandum quod ubi alvus laxior est, circa ejus usum internum, caute sit versandum. Notissimum est Nitrum ingrediens esse primarium pulveris pyrii. Chymicis inservit in calcinationibus, sublimationibus, dissolutionibus, præcipitationibus, fusionibus &c.

IN OFFICINIS PROSTANT PLURA

Nitrum depuratum, purificiter *Salpeter*/ *Salpetre ou Nitre depuré*, per repetitam solutionem atque crystallisationem, ut quam maxime liberetur à sale marino, quod in crystallos cubicas abit, cum nitrum hexagonas obtineat, & hoc pro usu Medico debet recipi, præstatque sæpius lapide prunellæ. Datur ad ℥j. ʒj. &c.

Nitrum præparatum, *Nitrum Tabulatum*, *Crystallus mineralis*, *Lapis* aut *Sal Prunellæ*, præpariter *Salpeter*/ *Salpeter. Tâsselein* / *Sel prunelle*, ou *Cristal Mineral*. Adhibetur tam interne, quam externe in supra dictis affectibus, præsertim tonsillarum, faucium & angina. Dosis ad ℥j. ʒj. & ultra.

Nitrum perlatum, *Salpeter mit Perlen præparirt*/ *Nitre préparé avec des perles*. Refrigerat & vires cordiales obtinere dicitur, commendatur in febribus continuis & malignis. Dosis est ad grana quinque scrupulum unum &c.

Sal polychrestum, *Polychrest-Salz*/ *Sel Polychrest*. Vires obtinet detergentes & viscidum incidentes. Hinc optimum purgantibus sociatum addit stimulum, alias & per se ad scrupulum ad drachmam usque & ultra exhibitum alvum laxat, in febribus intermittentibus insigne est deobstruens atque diureticum.

Nitrum fixum, *Sal Nitri fixi*, fixiter *Salpeter*/ *Nitre fixe*, & ejus per deliquium

Liquor Nitri fixi, solviter flüßiger *Salpeter* / *Liqueur de Nitre fixe*. Symbolizant cum sale & oleo Tartari per deliquium, eodemque modo usurpantur.

Spiritus Nitri acidus, *Salpeter-Geist* / *Esprit de Nitre*. Menstruum est corrosivum.

Spiritus Nitri dulcis, versüßter *Salpeter-Geist* / *Esprit de Nitre dulcifié*. Stomachicus est & carminativus, colicæque medetur unde vocatur spiritus Anticolicus, conducit etiam in passionibus

bus Hysteriis & virtutem diureticam possidet. Dosis est ad guttas viginti triginta & ultra.

Aqua Fortis, Scheid-Wasser/ Eau Forte. Ut corrosivum menstruum inservit solutionibus metallorum mineraliumque. Ex hac aqua, quæ Argentum tantummodo solvit, aurum autem non aggreditur, cum sale communi vel gemmæ vel etiam sale ammoniaco paratur *Aqua* sic dicta *Regia*, *das Gold-Wasser/ Eau Regale*, quod aurum dissolvit, intacto fere argento.

Arcanum Duplicatum, Sal Cachecticum Nitratum, Panacæa Holsteinensium. Polychrestum dicitur esse remedium in quavis febre intermittente, malo Hypochondriaco, melancholia Hypochondriaca, aliisque morbis chronicis mensiumque affectibus. Lymphæ quoque vitia & copiam, nunc diaphoretica, nunc diuretica vi corrigit. Blandam insuper virtutem anodynâ & somniferam possidet, unde in vigiliis diuturnis à quibusdam adhibetur. Datur ad ℥j. ʒß. &c.

Liquor ex Nitro & Tartaro Schræderi, de hoc sub Tartaro.

Magnesia alba, Panacæa solutiva, Panacæa antihypochondriaca, Englisch Exier-Pulver/ Magnesia. Remedium est alcalinum aptum, ut ZWINGERUS loquitur, omnem acorem, acredinem & faldedinem viscidam humorum in corpore absorbendi, invertendi, edulcorandi ac blando motu ut plurimum è corpore educendi. Mundificat quoque sanguinem atque ad balsamicam suam dulcedinem reducit. Dosis ad ʒß. ʒij. prout nunc pro scopo alterandi, nunc pro scopo laxandi datur. Exhibetur vel in jusculo vel infuso Thée, vel aqua, sive fontana simplici sive destillata, aut aqua minerali, vel etiam in emulsione amygdalarum dulcium. In affectibus obstinatis per decem quindecim & ultra dies usurpatur. Magnum esse absorbens atque præcipitans nullum est dubium. Hoc tamen habet vitii, quod pruritus ani tenesmodem quandoque vix tolerabilem haud raro producat.

ALUMEN RUPEUM ET ROMANUM.

Est substantia modo alba modo ex albo rubicunda,
pel-

pellucida, crystallina, ponderosa, glaciei instar, ex lapide aluminoso rocha dicto calcinato & cum aqua cocto, in crystallos variæ magnitudinis & formæ concreta, saporis acris, urinosi & adstringentis.

Constat Θ e falso p. m. corrosivo, magis tamen ad acidum inclinante, tum volatili tum fixo, ut & terra styptica, quæ elixiviato alcali & acido plane dulcescit. Vim habet diureticam & antifebrilem, simulque relinquit in recessu vim adstrictoriam: Externe laudatur in ophthalmia & absumendis carnibus fungosis vulnerum & aliarum partium.

\mathcal{R} . Alum. nitr. Nuc. mosch. ana \mathfrak{z} j. M. f. pulv. fumendus hora j. ante paroxysmum febrilem, si febris non cederet adde L. O. gr. j. & sacch. \mathfrak{z} ni \mathfrak{z} ss. sic enim certissime febris profligabitur.

\mathcal{R} . Alum. \mathfrak{z} j. lap. lyncis. Θ absynth. ana \mathfrak{z} ss. L. O. gr. j. f. pulv. in febribus intermittentibus.

\mathcal{R} . Alum. nuc. mosch. ana \mathfrak{z} ss. M. f. pulv. in febribus intermittentibus infantum, pro duabus dosibus.

\mathcal{R} . Alum. crud. \mathfrak{z} j. Miv. cydon. \mathfrak{z} j. f. bolus adstringens præcipue contra vomitum ventriculi add L. O. gr. j. Vel

\mathcal{R} . alum. \mathfrak{z} ss. terr. sigill. Corall. præpar. ana \mathfrak{z} j.

\mathcal{R} . Alum. crud. \mathfrak{z} ss. flor. aquil. salv. ana Mij rad. ir. florent. \mathfrak{z} iiß. Myrrh. \mathfrak{z} ij Mell. rosat. q. s. f. linimentum ad dentium vacillationem.

\mathcal{R} . Alum. sal. piper. ana q. v. applica uvulæ inflammatae.

ALU-

ALUMEN. Dicitur ita à lumine, quoniam pellucidum & fere glaciale est. $\Sigma\tau\upsilon\pi\lambda\eta\gamma\iota\alpha$, \mathfrak{A} loun/ Alun.

k 3

Alu-

Alumen duplex est, nativum è terra, ita statim sub forma crystallorum extractum quale in Regno præsertim Neapolitano occurrit, aut factitium, quod vel ex aquis aluminosis excoquitur, vel ex mineris, lapidibus terrisque aluminiferacibus excoquitur. Id quod e rupibus aut terra sui generis extrahitur, vocatur ALUMEN RUPEUM, seu ROCHAS. Non solum autem in Italia, sed & in Anglia, Germania, Bohemia &c. reperitur.

Alumen Romanum ad rubedinem declinat, alterum albicans magis est.

Ob vim astringentem in vomitu pertinaci, diarrhœa aliisque fluxibus tum simplicibus tum sanguineis commendatur, cum nucem moschata ad hæmorrhagiam narium interne propinatur. In mensium nimio fluxu quotidie ad ʒß. assumendum laudatur. Externe inservit in vulneribus mundificandis & in ulceribus profundis atque malignis. Ad vaginæ quoque prolapsum quarundam mulierularum est remedium. Conducit in scabie & pruritu, item ad hæmorrhagiam. Decoctum Aluminis cum æquali parte Myrrhæ cum linteolis applicitum in fluore albo benigno conducit. Quædam defloratæ ad sophisticationem virginitatis eo abutuntur.

IN OFFICINIS PROSTAT

Alumen ustum, gebrandter Alaun / Alun brûlé. Quod ad carnes luxuriantes absumendas præsertim, à quibusdam quoque ad dentes abstergendos adhibetur.

Phlegma Aluminis, destillirt Alaun-Wasser / Phlegme d'Alun. Refrigerat & sitim sedat, atque adstringit; usurpatur præsertim in Julepis. Exterius conducit in laxitate gingivarum & scorbuto oris.

Alumen Saccharinum, Alaun-Zucker / Alun de Sucre, à figura, qua comparet, dictum, paratur ex Alumine albumine ovorum & aqua Rosarum, inservit iisdem usibus.

De Alumine tandem notandum, quod ejus mechanicus quoque celebris sit apud Tinctores, Aurifabros, Bibliopegos aliosque opifices usus.

Prostat quoque aliud aluminis genus quod SCISSILE, ALUN SCISSILE dicitur. Est concretio lapidea non adeo compacta, sed levi opera in lamellas ad tractum fibrarum rectilinearum abiens, sapo-

saporis adstringentis, odoris nullius. Non multum autem in usum venit.

ALUMEN PLUMOSUM.

Est substantia media inter terram & lapidem ex viridi canescens, pinguis, ex numerosis tenuibus fibris plumosis vel lanuginosis sibi invicem incumbentibus & facile separabilibus compacta, eruta ex terræ fodinis substantiæ subadstringentis subacris.

Transfertur ex Rhodo & Creta insula magna in copia ad nos, habentur ibi montes integri. Differt ab Asbesto, qui ex Japonia & China ad nos adfertur, similis etiam materia circa Oxoniam reperitur, unde chartas scriptiles conficiunt.

Ob acutissimas suas particulas cuti inspersum pruriginem excitat, in quem finem membris paralyticis solet applicari ad vellicandos nervos, & torpidum spirituum animalium motum corrigendum, cum tinctura Castorei, spiritu vini camphorato &c.

ALUMEN PLUMEUM, Federweisser Alaun / ALUN DE PLUME, differt ab asbesto sapore non solummodo, sed etiam quod flammam non concipitat.

MINERALIA SALE SALSO VOLATILI ET CORROSIVO CON- STANTIA.

CALX VIVA.

Est substantia lapidosa, ex albo cinerea, ex calcario
lapi-

lapide ignis violentia in calcem exusta, saporis acris & mordacis.

Multo sale alcalico prævalente & paucò acido, utroque tamen volatili & simul corrosivo cum multa terra constat; hinc in vulnerum acido destruendo, gangræna tollenda & sphacelo compescendo, item in nervis vellicandis & paralyfi tollenda, ut & in ambustis & hydrocephalo externe usurpatur.

Latet in calce viva admirandum contra calculum & podagram remedium, ita ut ab externo ejus usu in podagra jam inveterata nodi & tophi feliciter dissipati fuerint. vid. Stiffer. dissert. d. arthrit.

Recipitur à nonnullis inter injectiones contra gonorrhæam & clysteres contra colicam cum alvo adstricta.

℞. Ras. lign. sassar ʒj. sem. anis. ʒiij passul. ʒβ. liquirit. ʒij. ▽ calc. vivæ ℥ij f. infusum ex mente Willisii [Pharm. Rat. f. 4. c. 4. p. m. 98. & 99.] contra diabetem ex acido in sanguine orto. Cujus dos. cochl j.

℞. Calc. viv. ℥ij. ꝯr. crud. ʒiiij. alum ʒj. coque cum ▽ fontan. ad coagulum usque, cui affunde spir. vini rectificat. f. tinctura, cujus gt. xx. in urinæ suppressione, item nephritide dantur.

℞. Lixiv. calc. vivæ, impone capiti contra hydrocephalum.

℞. ▽ calc. vivæ ʒiiij. aloës myrrh. ana ʒβ. mell. ʒvj. f. injectio contra gonorrhæam.

Si justa dosi exhibeatur egregium est in febribus desperatis. v. c. ℞. Calc. viv. gr. x. ad xv. Ocul. Si. ʒj. f. pulv. nonnulli audaciores ad ʒj. ascendunt, cum sacch. ʒni ʒβ. & L. O. gr. j pro robustis. [Sed audacia imò temeritas erit in tali qui hoc remedium præscribet.]

℞. Rad. ari. pyretr. carlin. ana ʒβ. ▽ calc. vivæ q. s. f. infu-

infusum, quod petiis exceptum applica membris paralyticis ad concitandum spirituum affluxum.

AR.

CALX VIVA, ungeleschter Kalch / CHAUX VIVE.

In calce tales adesse partes, quæ Naturam salium alcalium fixorum imitantur, & omnes effectus talibus salibus alias attributos acidum scilicet absorbendi & corrigendi &c. exserunt, nullum est dubium. Salia autem talia in ipsa calce existere nondum est probatum, neque effervescencia & ebullitio in calce viva, dum cum aqua miscetur, à salium diversorum pugna deducenda videtur. Forsan melius derivaretur a materia mundi subtilissima in lapide, per tostionem omni humiditate privato, inclusa, quæ deinde, ruptis ab affusa aqua vinculis, turmatim egrediens, & conjuncta cum iis partibus, ejusdem materiæ, in aqua existentibus, tantum producat motum cum summo calore, ob partes terrestres concitatas, conjunctum. Quod si enim à salibus accersenda esset, vix ratio dari posset adæquata, cur non semper calx ita ebulliret.

IN OFFICINIS PROSTAT

Aqua benedicta Chirurgorum, Aqua calcis vivæ, ungeleschter Kalch, Wasser / Eau de Chaux. Desiccatur egregie & resistit gangrænæ, inflammationes arcet, ardorem vulnerum & ulcerum demulcet, scabiem curat, serpiginem, guttam rosaceam & aphthas tollit, tumores hydropicorum minuit, in tumoribus & ulceribus antiquis præsertim pedum confert. Pro ratione circumstantiarum nunc cum saccharo Saturni, nunc cum Myrrha, camphora, aloe scordio & spiritu Vini &c. miscetur. Si libræ uni hujus aquæ grana quindécim aut viginti Mercurii sublimati corrosivi adduntur, exurgit aqua sic dicta *Phagedenica*, quæ carnes luxuriantes absument, ulcera antiqua mundificat, & gangrænæ resistit, præsertim, si cum spiritu Vini misceatur.

Aqua Sapphirina Chirurgorum, etiam ex aqua calcis vivæ paratur, vide Sal Armoniacum.

1

AR.

ARSENICUM ALBUM ET RUBRUM.

Album est substantia ponderosa, albicans, gypsi instar condensata, foris crystalli instar splendens, facta ex auripigmenti cum salis communis anatica portione, saporis acerrimi & exurentis.

Salibus Θ sis, Δ eisque volatilibus acerrimis exedentibus constat, humanæ naturæ averfissimis. Extrinsecus tantum adhibetur ad absumendas carnes, clavos, scirrhos, pilos, item ad ulcera serpentia & cancrofa. Interne non sine summo periculo in febribus intermittentibus usurpatur.

\mathcal{R} . Vitriol calcin. \mathfrak{z} iiij. arsenic. sulphur. ana \mathfrak{z} j. sal. gemm. \mathfrak{z} ss. misc. & cum aceto in vase clauso calcina, calx inspergatur ulceribus cancrofis.

\mathcal{R} . Arsenic. alb. irroretur cum aceto, impon. clavis & scrophulis absumendis, interim vicinæ partes muniantur emplastro de mucilaginibus.

Arsenicum rubrum seu sandaracha Græcorum est substantia metallica condensata, ponderosa, ex flavo rufescens & splendens, facta ex auripigmento in ollam clausam injecto & ad rubedinem calcinato seu cocto, saporis exurentis.

Usurpatur à pictoribus, potest tamen in casu necessitatis substitui arsenico albo.

Oleo per deliquium utimur in \mathcal{S} o aperto.

A U.

ARSENICUM vocatur alias REALGAR, RISOGALLO,
Katten-Gist/ ARSENIC. Discrepat quam maxime ratione colo-
ris. ARSENICUM ALBUM, weißer Arsenick / ARSENIC BLANC.
Odo-

Odorem, dum accenditur, spargit ad allium accedentem. Mineræ arsenicales variæ sunt. Imprimis tamen copiosissime reperitur in ista vena, quæ Metallurgis Cobaltum & Cadmia fossilis Metallica audit. Sulphur arsenicale sæpius in ipsis fodinis insensibiliter è mineris suis exhalans gravem subinde spirat odorem, adeo ut manifeste noceat fossoribus imprimis nondum assuetis. Magis vero sentitur fœtor iste ad fornaces, in quibus cremantur mineræ arsenicales, quod si nimirum incautius quis paululum accesserit, brevissimo temporis spatio damnum sentit infallibile, hinc etiam ordinarie metallarii, qui aliquandiu in fodinis laborant, & qui ad fornaces & domunculas, in quibus flores arsenicales sublimantur, hærent & versantur, viva sceleta referunt, pallidique incedunt & plane exsucci.

Quo autem sub fumi seu exhalationis forma emissum à crematis mineris arsenicum obtineatur, ædes lignæ affixæ sunt caminis, ubi adhærescit, unde & vocatur *Hüttenrauch*; Ex hoc polline *Hüttenstaub* dicto deinde arsenicum solidum conflatur liquefactione.

ARSENICUM RUBRUM, rother Arsenick / Berg, røthe / rother Schwefel / Feuer-Schwefel / Rothoperment / *Arsenic rouge*, est vel nativum vel factitium: licet rubrum visu compareat, si tamen teratur, aut cum aqua misceatur, flavescit.

Datur etiam ARSENICUM CITRINUM, Reiß gelb / Roß gelb / Rausch gelb / *Arsenic jaune*, quod ex sublimato auripigmento cum sale & sulphure obtinetur.

Vires Arsenici quod attinet, præsentaneum est venenum, ita ut pauca grana faucium stomachique erosionem inducant brevique interimant. Recte hinc judicat STAHLIUS Arsenicum & Arsenicalia Medicamenta non esse honesti viri remedia, nam usu tam interno quam externo maxima produxere mala. Provoco ad experientiam & Medicorum conscientiosorum fidem.

AURIPIGMENTUM.

Cum arsenico omnino convenit, & eodem modo externe usurpatur.

AURIPIGMENTUM, ita dictum à colore aureo, *Opment/*
ORPIMENT, ORPIN.

Est substantia metallica, ponderosa, friabilis, coloris è viridi flavescens, interspersis quibusdam flavescens venulis ac stellis, saporis acris, odoris ingrati, sulphurei. Constat sulphure & multis particulis arsenicalibus, usurpatur præsertim à pictoribus. Depilatorium constituit, præsertim cum calce viva mixtum, sed caute agendum. Decoctum hoc ex auripigmento & calce viva cum aqua factum, literas & picturas cum aceto Lythargyrii chartæ inscriptas, antea invisibiles, reddit conspicuas & nigricantes. Adhibetur hinc ad sic dictum atramentum sympatheticum.

CINNABARIS FACTITIA.

Est substantia metallica, solida ponderosa, rubicunda, numerosis subinde decursantibus fibris seu striis, splendentibusque micis interpolata, facta ex una parte sulphuris & tribus mercurii vivi, vi ignis sublimata.

Datur à gr. iij. ad v, robustissimis tamen, & qui aliis mercurialibus non moventur, cum conserva melissæ, theriaca. Sale enim volatili corrosivo tam sursum quam deorsum vehementer purgante constat. Frequentior ejus usus est externus in suffimigiis ad excitandam salivationem, & curandam luem veneream, & scabiem Gallicam, callosque absumendos.

℞. Cinnabar. factit. gr. iij. succ. liquir. q. s. f. pil. ad vomitum & salivationem promovendam.

℞. Cinnab. factit. ℥ij. vel iij. adde si lubet thuris, styrac. balsam. Tolut. ana ʒv. M. f. pulv. insperge per vices carbonibus ignitis, quibus in sella foraminata æger locatus & operculo tectus, capite excepto, supersedeat, ita ut fumus totum corpus pervadat, & sudores expectet, hac fumigatione per 4 ad 8 dies continuata prodit salivatio & ulcera cutis Gallica exsiccantur.

℞. Fo-

℞. Folior. nicotian. concis. ʒj. cinnab. factit. ʒβ. inde tubulo tabacali & hauri fumum ad salivationem.

Cinnabaris nativa alia est, quæ modo in ☉i modo in ☾ti fodinis reperitur, ex qua fit mercurius vivus; per se non utimur, nam à ventriculo solvi non potest.

MER.

CINNABARIS, Zinnober/ CINABRE, VERMILLON.

Duplex est Cinnabaris, altera nativa, artificialis altera.

HÆC CINNABARIS FACTITIA vocatur etiam CINNABARIS VULGARIS, gemeiner oder gemachter Zinnober/ Schuster- und Mahler Zinnober/ CINABRE ARTIFICIEL. Ab AGRICOLA aliisque casu dicitur esse inventa, cum enim Alchymistæ argento vivo adjicerent sulphur, ut ex iis efficerent aurum & argentum, in hoc pigmenti genus incidere, quod omni plane odore & sapore caret. A Pictoribus Sutoribus Ceraque sigillatoriæ confectoribus multum usurpatur. Circa usum Cinnabaris hujus Medicum dubii hærent authores, quibusdam ejus usum suadentibus, & æque ac Cinnabarim nativam & Antimonii innoxie assumi posse statuentibus, aliis vero eadem ac sublimatum & præcipitatum argentum vivum symptomata post se trahere asserentibus. In dubio melius est illo non uti, quamvis ratio nondum adeo clare compareat, cuius tam noxia existat. Ex hac Cinnabari, quæ eum in finem quoque præparatur, ut Mercurius vivus commodius transportari queat, mixta cum tripla parte calcis vivæ aut anatica Limaturæ Martis, destillatione per retortam in recipiens vas aqua plenum rursus revivificatur Mercurius pulcherrimus. Notante illustri LEMERY ex quavis libra Cinnabaris, uncia tredecim argenti vivi obtineri debent.

CINNABARIS NATIVA, quæ ANTRAX, MINIMUM NATIVUM, SANDIX, Berg-Zinnober/ CINNABRE MINERAL dicitur,

Est substantia metallica, solida, ponderosa ac rutilans elegantissima ex scarlatino vel purpureo cum splendore, è mineris Cinnabarinis seu mercurialibus sublimationis subterraneæ ope elevata,

saporis & odoris nullius, constans ex sulphure & Mercurio vivo cum terrestri materia instar lapidis compactis. Reperitur in diversis Europæ locis Gallia, Hispania, Germania, Hungaria, Carinthia &c. Præfertur tamen omnibus Hungarica. Quod usum Medicum hujus Cinnabaris attinet, vim antepilepticam, cephalicam, nervinam, antispasmodicam, anticatarrhalem & anodynā possidere dicitur, humores fluxiles reddit, tenues & acres corrigit, in colica, arthritide vaga præsertim, vertigine, febribus, variolis, morbillis &c. deprædicatur. Externe ad luem Veneream scabiem &c. laudatur. Quæstio autem fuit an tuto intra corpus assumi possit, suspecta namque est quibusdam, ob sulphur arsenicale, quod in mineris se associare potest. Hinc præparatur prius vel decoctione cum aqua rosarum Borræginis &c, vel lotura simplici cum aqua colligendo semper pulverem subtilissimum. Quidam postea spiritum Vini rectificatissimum desuper deflagrant. Optimam ejus per repetitam sublimationem institui depurationem multi authores asserunt.

IN OFFICINIS PROSTAT

Cinnabaris nativa præparata, præpariter Zinnober / Cinabre préparé. Datur ad grana quinque scrupulum unum &c.

Specificum Cephalicum Michaelis, Dr. Michels Haupt: Pulver / Poudre Cephalique spécifique. Laudatur in omnibus capitis affectibus ut & nervorum, in Cephalalgia, epilepsia, convulsionibus, spasmis, tremore, vim quoque cordialem obtinere dicitur, & in palpitatione cordis laudatur. Prodest in febribus continuis, variolis atque morbillis, commendatur quoque in colica. Datur ad grana decem, drachmam semis &c.

MERCURIUS SUBLIMATUS.

Est substantia alba crystallina, ponderosa, splendens, sublimata ex part. j. ꝑ vivi & duplo Oli calcinat. & Eis. saporis acerrimi & exurentis. Constat Ꝑe Eso volatili acerrimo & corrosivo vomitum & sedes vehementer causante, insequente salivatione, quare interne rarissime exhibetur,

betur, nam venenis acerrimis merito annumeratur, externe vero in ulceribus Gallicis & sordidis mundificandis locum habet.

Adjungitur loco stimuli unguento Neapolitano ad salivationem promovendam. v. c. ℞. Ung. Mercurial. ℥ij. ꝯ-
-ti gr. v. f. unguentum pro excitando fluxu salivæ.

℞. ꝯ-
-ti gr. ij. includ. succ. glycyrrh. f. q. f. pil. involvantur auro foliato, deglutiantur, & superbibatur ▽ destillata menthæ vel jusculum pingue largiori dosi ad vomitum promovendum & salivationem. N. hoc tantum robustissimis exhibendum esse, & qui blandioribus non moventur.

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS, Corrosivischer Sublimat oder Corrosivisch sublimirt Quecksilber / MERCURE SUBLIME CORROSIF.

Corrosionem hujus sublimati cum Dn. LEMERY plurimi à cuspidibus acidis, corpori Mercurii infixis recte deducunt. Mercurius namque subtilissime licet divisus, semper tamen figuram suam rotundam retinet, quando jam calore ignis in infinitos globulos discerpitur particulæ acidæ aquæ fortis, spiritus Nitri, & salis præsertim additi, undique eos penetrant, suis cuspidibus implicant, ut ex utrisque massa ista compacta formetur. HATSOECKER in OBSERVATIONIBUS PHYSICIS singulos globulos Mercurii dicit parva habere foramina, in quibus particulæ salinæ figuntur. Hinc cum omnes globuli Mercuriales, particulis acidis tanquam acubus acutissimis & scindentibus conspersi sint, & velut echinati, non mirum est, quod dilacerent atque discindant, præsertim dum vel assumptus vel externe applicitus humiditati atque calori conjungitur, hoc enim modo globulorum excitatur motus, qui deinde cum impetu voluti ope cuspidum instar cultello-
rum partes, quas pertranseunt, dilacerant, discindunt, inflammant, ipsamque mortem inferunt. Quod si ergo quis Mercurium

cor-

corrosivum assumpserit, necesse est, ut quam primum opponantur remedia, quibus inviscari & obtundi possunt particulæ acres, salinæ, quibus etiam parietes ventriculi obliniantur atque defendantur, qualia sunt oleosa, oleum olivarum, oleum amygdalarum dulcium butyrum &c. & quidem in tanta copia ingesta, ut vomitum quoque cieant. Lac porro hic conducit tum naturale tum artificiale, ut & juscula pullorum cum seminibus quatuor frigidis. Sunt qui crystallum optimum antidotum esse perhibent. Cavendum autem est à remediis acris Theriaca, Mithridatio, Orvietano &c.

Mercurius corrosivus non raro adulteratur arsenico, id quod cognosci potest terendo vel fricando illum cum sale tartari, quod si namque nigrescat, absque ullo dubio arsenicum est commixtum, si vero flavescat, bonus est.

Cum calce viva constituit aquam Phagædenicam.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

Fit ex affusa aqua forti Mercurio vivo, qui hinc coit in magma, quod in igne reverberii ad rubedinem tendit. Mitior est multo quam mercurius sublimatus, unde iterne exhiberi potest, cum circumspectione tamen, tum ad vomitum & sedes, tum ad salivationem promovendam. Externe stimuli loco additur unguentis pro sordidis ulceribus mundificandis.

℞. Merc. præc. rubr. gr. iij. theriac. ʒʒ. f. bolus ad excitandum vomitum & salivationem.

℞. Pil. Mastichin. ʒj. Merc. præcip. gr. j. ʒo succin. q. f. f. pilulæ in dolore capitis ex lue venerea.

℞. Ung. Mercurial. ʒiiij. Merc. præc. rubr. ʒj. f. unguentum ad promovendam salivationem.

Mercurius præcipitatus albus mitior est rubro.

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER, rother Präcipitat/
MERCURE PRECIPITE' ROUGE.

Improprie præcipitatus dicitur. Habet vim catharteticam auferendi excrescentias carnosas, quas blande & sine dolore corrodit, unde fistulis, pustulis, carunculis, & aliis defœdationibus conducit.

Pro usu interno commendant ut spiritum Vini alcoholisatum aliquoties desuper accendamus, & deflagrare sinamus, quo mitior evadat. Vocatur deinde Arcanum Corallinum.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, weisser Präcipitat/
MERCURE PRECIPITE' BLANC. Adhibetur quoque à quibusdam ad salivationem excitandam, ad grana quatuor, ad quindecim, vomitum movet atque secessum. Sed caute agendum. Externe adhibetur contra lichenes & ad pruritus, in emolliendis tumoribus induratis, tophis præsertim Venereis & in scabie profunda.

MERCURIUS DULCIS.

Est substantia alba crystallina, splendens, sublimata ex Mercurii sublimati & Mercurii vivi anatica portione, saporis & odoris nullius.

Inter Mercurialia temperatior est & blandior, adeoque & pueris tuto exhibetur, purgat blande per inferiora & cæteris purgantibus loco coadjuvantis adjungitur, imo & diagrydio pro correctorio: in lue & ea curanda singulis diebus vel biduis exhibetur ad excitandam salivationem, laudatur quoque in expellendis lumbricis.

Datur à ℥ss. ad ℥j. & ʒss. in bolo vel pilulis, & quibus ad promovendam salivationem datur, cum antimonio diaphoretico vel sale volatili.

℞. Merc. dulc. ℥ss. Ocul. ʒ. gr. xv. ʒo cinam. gt j. f. pulv. digestivus præmittendus purgantibus.

℞. Rad. Jalap. ʒj. Merc. dulc. ℥ij. sacch. cand. ʒv.
m ∇ flor.

▽ flor. hyperic. q. f. f. rotulæ purgantes cōtra vermes.

℞. Merc. dulc. gr. xv. † diaphor. ℥β. f. pil. cum succo glycyrrh. vel f. bolus c. theriaca vel conserva flor. anthos, ad salivationem singulis diebus exhib.

℞. Pil. Mastich. ℥j. Merc. dulc. gr. xv. bals. peruv. q. f. vel extract. castor. f. pil. purgantes anticatarrhales.

℞. Merc. dulc. ℥j. Myrrh. ℥β. Castor gr. v. ꝰ sabin. gr. ij. troch. alhand. gr. j. f. pil. cum extracto castorei ad menses promovendos.

Riverius in suis scriptis sæpe meminit Calomelani & est hoc: ℞. ꝑ dulc. ℥j. diagryd. gr. vij. f. pulv.

MER.

AQUILA ALBA, versüßter Sublimat / MERCURE SUBLI-ME' DOUX.

Mercurius dulcis datur quoque in scabie ferina, hemiplegia, epilepsia inveterata, & obstructionibus, massam sanguineam purificat. Exterius in scabie & aliis cutis infectionibus, pustulis venereis aliisque exulcerationibus prodest. Dulcis autem vocatur, non ob saporem, sed quia partes acidæ, quæ corrosionem effecerant, dispersæ & infractæ fuerunt per additi Mercurii mediante trituratione atque igne in motum acti corpuscula. Quia autem non omnes partes acidæ plane fuerunt destructæ, hinc remanet ipsi vis purgans, quam amittit si sexies & ultra sublimetur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Pilulæ Mercuriales cum Mercurio dulci, Mercurial-Pillen mit versüßtem Sublimat / Pilules Mercurielles avec le Mercure doux. Inserviunt in morbis venereis, usurpari tamen etiam possunt in obstructionibus, & morbis catarrhalibus; ad grana duodecim, scrupulum unum &c.

Trochisci Hermetici Scretæ, Wurm-Zeltlein mit Quecksilber/
Tro-

Trochisques contre la vermine. In vermibus & morbis inde oriundis conducunt. Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

Panacæa Mercurialis, Panacee von Quecksilber, Panacée Mercurielle. Laudatur in morbis venereis, rheumatismis inveteratis, obstructionibus, scorbuto, scrophulis scabie, ulceribus antiquis & vermibus. Datur ad grana sex, triginta &c. Sunt qui ea utuntur ad salivationem excitandam.

MERCURIUS VIRIDIS.

Fit ex Mercurio & cupro solutis in aqua forti, quæ deinde abstrahitur, pulvis deinde aceto irroratus viriditatem induit.

Principium activum est falsum Emeticum, mitius tamen Mercurio sublimato, specificum est in gonorrhæa virulenta, ratione forte cupri propter terram vitriolicam, dos. gr. iij. ad v. quam non excedere debemus nisi salivationem excitandi animus sit.

In principio gonorrhææ ℞. ꝑ vir. gr. iij. extract cathol. ʒj. thereb. q. s. f. pil. Deinde his succedere poterit seq. ℞. rhabarb. ʒj. ꝑ vir. gr. iij. & ubi simul conjunctus ardor, sacch. ʒni ʒʒ. thereb. ʒʒ. f. massa ex vitello ovi continuetur hoc, quousque foetor cessarit. Hinc adstringatur Rhabarb. Nuc. Mosch. tost Borrac. calcin. terr. Oli dulc. ana ʒj. ꝑ vir. ʒj. f. pil. pro singulis dosibus ꝑij. virid. gr. j.

In ulceribus penis feci inde candelas cum felici successu: ℞ Merc. virid. q. pl. ʒo ʒni q. s. ceræ par. f. candela cum suo elychnio, ut pro lubitu possit extrahi peni intrusa.

TUR-

LACERTA VIRIDIS, grüner Präcipitat / MERCURE PRECIPITE VERD.

Gonorrhœam nimiam tollit insufficientem vero promovet.
 Inservit etiam ad luem veneream, ulcera venerea phimosis &c.
 Purgat per superiora & inferiora.

TURBITH MINERALE.

Fit ex \odot Oli & ÿ io, ubi post abstractionem in fundo remanet pulvis albissimus, qui deinde ∇ ablutus mox flavescen-
 tem induit colorem.

Principium activum est falsum, causticum, emeticum
 catharticum, operatur paulo blandius sublimato & præci-
 pitato.

Datur à gr. iij. ad v. v. g. R. Extr. Cathol. \mathfrak{z} j turb. min.
 gr. iij f. pil. vel cum conserva flor. persicor. bolus.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS, TURPEI HUM
 MINERALE, Mineralisches Turbith von Quecksilber, TURBITH
 MINERALE OU MERCURE PRÉCIPITÉ JAUNE. A quibus-
 dam commendatur in Hydrope.

MINERALE SALE VOLATILI AL- CALICIS AFFINI CONSTANS ABS- QUE TERRA.

MERCURIUS VIVUS.

Est substantia metallica mobilis fluida, ponderosa, ex
 innumeris tenuissimis globulis conflata, coloris ex cæsis al-
 bicantis, facta ex cinnabaris minera destillatione per descen-
 sum. Invenitur & natus, sed hic tantum inter rara asser-
 vatur.

Alcalica

Alcalicæ Naturæ Mercurium esse, probat 1. ejus effervescentia cum acidis 2. quoniam in omnibus morbis ab acido ortis v. c. Lue ꝑea egregie convenit. Volatilitas autem ejus fit manifesta ex eo, quod Δ i impositus facile in auras abire solet. Crudus vel interne vel externe usurpatus salivationem excitat, & vermes necat, qui ejus auram ferre nequeunt. In morbis ꝑeis curandis specificum est. Ratione gravitatis suæ, in colica, iliaca passione, & alvi fœcibus induratis cum fructu exhibetur.

℞ Merc. viv. ʒss. succ. glycyrrh. q. s. f. pil. singulis diebus exhibendæ, donec appareant futuræ salivationis signa, pro lue ꝑea curanda.

℞ Merc. viv. ʒss. detur ex melle ad enecandos lumbricos.

℞ Merc. viv. ʒj. affund. ∇ gramin. & pone in digestionem, exhibe decantatum infantibus contra lumbricos.

℞ Saturni ʒij. Mercurii ʒj. liquecant super igne, forma globulos, qui in colica passione à fœcibus induratis sumuntur, superbibendo ʒo amygd. d. ʒj. & ultra.

℞ Merc. viv. ʒij pingued. porcin. ʒj. f. ung. quo inungatur corpus singulis biduis ad salivationem excitandam, donec salivationis signa appareant, in robustis augendus ꝑ ad ʒj. pro correctorio adde aliquid camphoræ, & si vis ʒo laurin. idem unguentum necat quoque pediculos.

MINE.

MERCURIUS, ὑδράργυρος, HYDRARGYRUM, ARGENTUM VIVUM, AQUA ARGENTEA, ARGENTUM AQUEUM, AQUA NON MADEFACIENS MANUS, SERVUS FUGITIVUS, Quecksilber/ lebendig Quecksilber/ MERCURE, ARGENT VIF.

Argentum vivum excepto auro corpus est ponderosissimum,

metallis imprimis vero auro summopere amicum, igne in fumum facile resolubile, sed mox rursus in pristinam abiens figuram globulosam. Ex particulis autem lævibus exilibus solidis & sphaericis dependet ejus fluiditas, gravitas atque volatilitas.

Olim hoc corpus metallicum inter metalla ipsa, ut unicuique planetæ suum assignaretur corpus fossile, referebatur, at cum & ductilitate & malleabilitate destituatur, ideoque ex metallorum numero eximitur. Corpus est quam maxime mobile & fluidum, ob soliditatem & figuram rotundam in minutissimis etiam moleculis reperibilem, quam ob causam etiam manibus contrectantibus non adhæret, quare non est corpus humidum.

Quidam Mercurium ex aqua & sale atque terra subtili perlata constare dicunt, alii acidum, alii vero sulphur ipsi attribuunt. At demonstrantur talia principia. Ex partibus homogeneis semper solidis & globulosis constare nullum dubium est.

Duplex habetur ARGENTUM VIVUM, NATIVUM, quod in forma viva è mineris eruitur, dicitur alias MERCURIUS VIRGINEUS, quod ignem nondum sit expertus, gediegen Quecksilber/ atque ARTIFICIALE, quod excoquitur ex minera Mercuriali, quæ cinnabarina dicitur. Reperitur in variis Europæ etiam Germaniæ locis, imprimis tamen in Hispania & Hungaria. Mercurius ex mineris extractus in capsulis ligneis transportatur, aut redigitur in Cinnabarim, ex qua deinde rursus extrahitur.

Mercurius frequenter vel scatet impuritatibus noxiis, vel adulteratur commixtione plumbi mediante præsertim bismutho. Censetur Mercurius bonus, qui per retortam propulsus nil recrementi relinquit, & qui in cochleari argenteo evaporationi super prunas expositus, maculam relinquit flavam aut albicantem, non nigram aut fuscam. Curiosiores fumum exhalantem examinant, quod si enim fuerit viridis ad luteum inclinans, judicant solaris naturæ esse Mercurium, si cœrulescit, Luna intus latitat, si ad rubedinem & fuscum colorem vergit, de Venere participat, si albicans extiterit fumus, natura Jovialis, si vero cinereus Saturnina colligitur, & si denique colorem ex atro luteum refert, Martem inesse perhibent. Notandum quoque, quod Mercurius carbonibus ardentibus expositus de metallis commixtis se participare testetur, si strepitum edat. Ut Mercurius à sordibus liberetur varios adhibens

bent modos. Instituitur enim repurgatio vel simplici transpressione per corium mundum, qua fecibus crassis in corio remanentibus Mercurius transit, vel lotionem cum aceto simplici aut sale acutato, vel per lixivium alcalinum aut saponariorum, vel cum spiritu Vini sæpius instituta, donec liquor affusus colorem obscurum aut nigricantem non amplius assumat. Quidam elegantissime Mercurium purificant cum aqua forti, ubi quidem insignis quantitas de Mercurio absorbetur, reliquum autem quam maxime resplendet. Optimum est illum per destillationem per retortam addendo corpora alcalina calcem vivam, cineres clavellatos, Limaturam ferri, repurgare. Ex cinnabari quoque artificiali pulcherrimus obtinetur.

Curiosum est corpus hoc grave admodum nihilominus aquis innatare posse. Quod Phænomenon Agyrtæ nescio pro quo Arcano venditant. Fundamentum effectus in acu polita in aquæ superficie hærente quærendum. Recipe itaque Mercurium, & cum pauca aqua in mortario lapideo in minutissimas moleculas redige. Has insperge chartæ bibulæ, ut humiditas absorbeatur, quo facto moleculas minimas, politas, siccasque cum cultello, penna alioque instrumento saliva parumper madido, leni manu superficiem aquæ impone successive, sic argentum vivum in copia quoque natum posse percipies. Sunt qui Mercurium cum oleo quoque terunt, ut eo minus ab aqua possit complecti.

Mercurio utuntur tum Medici tum Mechanici. Ab his adhibetur ad deauranda vasa, præsertim argentea, mediante scilicet amalgamate, quod insignem aliumquoque possidet usum; metallorum separationem, confectionem speculorum, Barometrorum &c. Medicis inservit interne pro mundificatione sanguinis. De actione Mercurii in corpore audiri meretur HOFFMANNUS in NOTIS AD POTERIUM ita differens. Mercurius appropriatum & potentissimum luis gallicæ alexipharmacum est humores coagulatos promptissime fundit & colliquat, & obstructions in angustissimis tubulis egregie resolvit. Operatur & partium subtilitate summa & gravitate maxima. Est quippe fluidorum omnium gravissimus, quare etiam minutissimæ ejus partes respectu aliorum fluidorum & sanguinis semper specie sunt graviores, unde magno impetu & vi sanguinis partes movet, & ab ipsis motis vehementioris motus gradum acquirit, ut adeo minutissimos poros subeundo firmissimas

mas obstructions referare queat. Dum autem textura sua faciles in amplexus spicula salina arripit, hinc salia acia corrosiva in Lympha & sanguine lue venerea infectorum obvolitantia imbibit & arripit, unde spiculis sic armatus salinis glandulas vasa & fibras vellicat, unde hæc mediante influxu spirituum copiosiore inflata & contracta premunt liquida in iis contenta, ut non tantum salivalis latex, sed & serum per sudorem vomitum & alvum non raro excernatur, ubi autem vasa excretioni apta non existunt, ibi notabilis observatur turgescencia. Lympha itaque quo magis foeta salibus corrosivis, acetosis, ut in cachecticis & scorbuticis, hoc facilius virulentam induit naturam, dum sic brevi stamina fibrosa partium corrodit, vel fortiori irritatione convulsione, inflammationes spasmos, hæmorrhagias excitat. In unguentis atque suffumigiis, juxta eundem HOFFMANNUM, semper citius & vehementius operatur, quam si intus adhibeatur, dum tali ratione immediate fluoribus corporis communicantur ejus moleculæ, quæ alias difficillime cum chylo miscentur, & sanguini substantialiter propinantur. In passione Iliaca caute procedendum in exhibitione Mercurii, ut in debita & sat magna exhibeatur quantitate, præmisso præsertim oleo amygdalarum dulcium. In eo casu, ubi superior pars intestini inferiorem intravit, aut ubi inflammatio, aut hernia in corpore latens adest, ibi minime locum invenit. Ad vermes decoquitur vel in aqua simplici, vel graminis vel portulacæ &c. Externe scabiem sanat, fugatque pediculos, ubi mentio facienda cinguli sapientiæ, quod nihil aliud est, quam pannus lineus unguento Mercuriali illitus. Applicatur lumbis. Discutit tumores scirrhosos & strumosos. De collo in avellana suspensus à peste præservare & lactis proventum promovere dicitur. Pro usu quoque cosmetico à quibusdam commendatur. Nocet Hypochondriacis, spleneticis atque scorbuticis. Inimicissimus est nervis dentibus, gingivis, tonsillis & partibus circa palatum existentibus. Rugas Mercurius cosmeticus producit atque cito senescere facit. Iis qui ab assumptis Mercurialibus male se habent, tremore percelluntur &c. Aurum exhibetur cum successu. Quam facile enim cum eodem se uniat patet vel exinde, quod si curæ salivationis subjecti in ore detineant, aut secum gestent, Monetam auream, ea albescat totaliter, qui color removetur facile, expellendo hydrargyrum mediante ignis calore.

Circa

Circa fixationem Mercurii mire sese torserunt & adhuc torquent quidam Chymici. Summe difficilem, si non plane impossibilem esse, certo constat.

Interim curiosi cum viridi æris, sale, aceto & aqua ferrariorum Argentum vivum in solidum redigunt statum, coloreque aureo mediante Curcuma tingunt, ut annuli exinde fundi queant,

IN OFFICINIS PROSTANT

Pilulae Mercuriales cum Mercurio vivo, Mercurial-Pillen von lebendigem Quecksilber / Pilules Mercurielles avec l'argent vis. Inserviunt præsertim in morbis venereis. Dantur ad scrupulum ad scrupulos duos.

Unguentum Neapolitanum, Neapolitanische Salb / Onguent Neapolitain. Conducit ad scabiem, impetigines, herpetem, pruritus cutis, pediculos necat etiam inguinales, pulices atque cimices interficit, quem in finem illinitur lectorum fulcris. Inservit quoque frictioni pro salivatione excitanda.

Unguentum pediculorum, Laub-Salb / Onguent contre les poux. Virtus ex nomine patet.

Æthiops mineralis cum & absque combustionē paratus, Mineralisches Wurm-Pulver / Æthiops mineral fait avec du feu & sans feu. Est specificum ad expellendos vermes, remedium, datur ad scrupulum drachmam semis &c. per aliquod tempus, interponendo semper laxantia. Conducit quoque in gonorrhœa virulenta & scabie. Potest quoque exinde sublimari cinnabaris.

Notandum tandem quod Medicamenta Mercurialia præsertim interna neque præparari neque exhiberi debeant in vasis aut cochlearibus metallicis.

MINERALE SALE VOLATILI SULPHUREO CUM TERRA CONSTANS.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Est substantia metallica solida, ponderosa, obscuri cœrulei plumbei coloris cum longioribus radiantibus striis concoloribus & aliquando rufescentibus compacta, concreta ex ejus minera liquata, & in figuram pyramidalem ut plurimum effusa, saporis & odoris nullius evidentis.

Partibus Δ eo alcalinis cum multa terra minerali constat, ob terram acidum imbibentem & evertentem, datur crudum in epilepsia, orta præcipue à vitio ventriculi, & cruditatibus primarum viarum. Ob Δ volatile aliqui addunt decoctis in morbis chronicis.

\mathcal{R} . \dagger crud. gr. iij. rad. pœon. \mathfrak{z} j. f. pulv. contra epilepsiam, dandus ex ω -u cerasorum nigrorum.

\mathcal{R} . Candel. ex cera alba factam cui admisce \dagger crud. vel hujus loco crocum metallorum, inde meatui urinario ad tollendas carunculas.

In Dysenteria maligna multi assumunt \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} j. ex conserva rosarum.

Potiora medicamenta, quæ ex antimonio parantur, describuntur in Collectan. Chymic. Leydens. p. m. 23. usque ad 54.

MI-

ANTIMONIUM, quidam dictum putant, ἀπὸ τοῦ ἀντι καὶ μόνον, quod ipsi adversetur solum & sine aliorum metallorum consortio nasci, alii ab ἀντιμένειν, quod in igne perduret, vel quod corpora firmet & contra morbosos insultus defendat, derivant. Quidam
jocose

jocose à Monialibus quas faciem stibio fucare non deceat, deducunt. Alii jocando ulterius Antimonium quasi anti & Moine appellatum esse volunt. Fabulantur namque Monachos quosdam, qui se eo pinguescere voluerunt, incauto usu fuisse interemptos. Vocatur alias *stibi*, à *stibw*, *stibw* denso, firmo, *stibw*, *stibw*. Stibium, *Spieß*, *Glaß* / ANTIMOINE. Chymicis LUPUS, MARCASITA, MAGNESIA SATURNINA, SATURNUS PHILOSOPHORUM, PROTHEUS, PRIMUM ENS & RADIX METALLORUM audit.

Effoditur Antimonium pluribus in regionibus, in Gallia, Italia, Germania, Hungaria, Transylvania &c. laudatur autem quam maxime Hungaricum. ANTIMONIUM alterum est FOSSILE, quod vel filici vel lapidi duro aut pyritæ aut fluoribus hexagonis sociatum effoditur, & MINERA ANTIMONII vocatur. Alterum fusum existit. Nimirum ex minera antimonii cruda in ollis excoquitur, atque in massas pyramidales fusum ad nos advehitur. Differt à minera puritatis gradu & ab exhalationibus noxiis, quibus minera quandoque scatet, liberatum existit.

Ufus Antimonii multus est in depurando auro aurifabris. Inservit stannifusoribus, ad stanno argenti sonum conciliandum. Ferri liquationem juvat, saturnum indurat, æri & mixturæ, unde campanæ & specula conficiuntur metallica &c. conjungitur. Insignem quoque hoc metallum in Medicina habet usum, nullum enim ex omnibus fere mineralibus reperitur concretum, ex quo tot tantarumque virium præparantur medicamenta. Licet enim à quibusdam Chymicæ osoribus rejectum fuerit, atque pro venenoso declamatum; insons tamen omnino est, tum ipsum antimonium crudum, tum ex eo præparata, præsertim si bene præparata à sapiente Medico præscribantur. Crudum interne commendatur ad Epilepsiam, contra Luem Veneream, ubi decocta extant specifica cum aliis antivenereis. A quibusdam ad dysenteriam, hydropem, lepram laudatur. In sanguine depurando conducit, virtute gaudet adstringente & roborante. In febribus ut & in morbis arthriticis, arthritide vaga &c. mire deprædicatur. Ipse sanctè testari possum, me usum Antimonii crudi in febribus, arthritide scabiæ &c. in haud paucis subjectis admodum proficuum deprehendisse. Usurpatur vel in pulvere, vel redigitur in pilulas vel in decocto adhibetur,

vel in morsulos cogitur, Celebres sunt *Morsuli KUNCKELIANI* sequentes.

℞. Pinear. mundat. pistac. decortic. Amygd. dulc. ana ʒiſſ. Confect. cortic. aurant. ʒj. Antim. Hung. ʒſſ. cum ſ. q. Sacchari in aqua rosar. solut. & ad consist. tabul. coct. ſ. Morsuli no. 12. de quibus unus in tres partes divisus per diem comedendus est.

Valet quoque Antimonium ad pinguefacienda bruta, equos imprimis & fues.

PRÆPARATA ANTIMONIALIA, PRÆTER INFERIUS RECENSENDA, IN OFFICINIS SEQUENTIA EXTANT.

Regulus Antimonii simplex, Spieß-Glas-König / Regule d'Antimoine. In usum internum minime venit, licet vi vomitoria insigni gaudens. Quod si tamen eo quis uti velit, adhibeatur solummodo in infuso. Inservit ad pocula & pilulas Emeticas perpetuas exinde formandas, & ad varia alia Medicamenta Antimonialia præparanda.

Regulus Antimonii Jovialis, Spieß-Glas-König mit Zinn / Regule d'Antimoine Joviale, ex quo paratur

Specificum Antihecticum Poterii, Pulver wieder die Dorrucht / Specificque antihectique de Poterius. Commendatur in hectica, phthisi, affectibus uteri, febribus continuis atque malignis. Dosis ad grana sex ad scrupulum unum. Si majori dosi datur aliquando vomitum movet atque secessum. In hectica atque phthisi hoc utuntur modo, ut à granis quinque ad sex & ultra eousque ascendant, donec æger nauseam ab eo percipiat, tunc ab eadem dosi paulo remittitur, atque ita continuatur singulis diebus talem dosin propinando, donec observetur operari per urinas.

Regulus Antimonii Martialis, Spieß-Glas-König mit Eisen / Regule d'Antimoine Martial. Ex hoc regulo facilius parantur pocula Emetica, exinde conficitur

Specificum stomachicum. Poterii, Poterii Magen-Pulver / Specificque stomachale de Poterius. Stomacho potissimum est dicatum, transpirationem insensibilem promovet, sanguinem purificat, acidum absorbet, in affectibus hystericis conducit, hæmorrhagiis confert. Dosis grana sex ad drachmam semis.

Regulus Antimonii Medicinalis, Regule d'Antimoine Medicinal. In febr-

febris quibusvis intermittentibus & continuis, variolis & morbillis, scabie & aliis cutis vitiis commendatur. Datur ad grana tria, quinque, viginti & ultra, dosi autem majori sæpe vomitum movet. Ex hoc regulo & radice contrayervæ, quoad maximam partem, suam obtinet virtutem.

Pulvis Bezoardicus Rollwagenii, Rollwagens Gist-Pulver / Poudre Bezoardique de Rollwagen. Laudatur in diversis generis febribus continuis & ardentibus, variolis & morbillis, ut & ipsa dysenteria. Datur infantibus & adultis cuspidatim ad duas vel tres scilicet cultri cuspides, sive ad scrupulum unum ad drachmam semis bis vel ter de die.

Scoriæ Reguli Antimonii, scories de Regule d'Antimoine. Hæ minime abjiciendæ sunt, nam præterquam quod vapor ex decoctis ad partes genitales admissus, in sexu sequiori menses cieat, parantur quoque exinde *Tinctura Antimonii*, & ex earum decocto

Sulphur Auratum Antimonii, Schwefel-Pulver auß Spieß-Glas / Souffre doré d'Antimoine, quod obtinet vim cathartica per superiora & inferiora. Datur ad grana duo ad sex, sed rarissime. Figitur à quibusdam spiritu Vitrioli, ut magis diaphoreticum evadat. Chymici decoctum scoriarum Antimonii quater quinquies & ultra præcipitant, sicque semper sulphur mitius purgans & tandem plane diaphoreticum nanciscuntur.

Pulvis Carthusianorum sive Kermes minerale, Mineralisches Brech-Pulver / Poudre de Chartreux ou Kermes Mineral; sulphur hoc auratum mitigatum, ad mentem GLAUBERI præparatum, & in Gallia à DN. LIGERIE, qui illud Monachis Carthusianis, unde nomen traxit, communicarat, introductum, laudatur insigniter ob partes suas alcalinas sulphureas & balsamicas. Creditur sanguinem, præsertim per insensibilem transpirationem, mundificare ejusque fluorem conservare. In cruditatibus primarum vi-rum agit leniter per superiora æque ac inferiora purgando. Per diuresin quoque operari fertur. Adhibetur in febribus intermittentibus & continuis, hydrope, vertigine, apoplexia aliisque capitis & nervorum affectibus, in urinæ difficultate, sabulo. Dosis est à grano uno ad tria quatuor quinque pro ratione circumstantiarum.

Antimonium diaphoreticum, Schweiß-treibendes Spieß-Glas / Antimoine diaphoretique. Sanguinem mundificat vim habet diapnoi-

cam, diaphoreticam & alexipharmacam, hinc in cruditatibus acidis, soda, scabie, febribus intermittens continuis & malignis, pleuritide erysipellate &c, usurpatur. Dosis est ad scrupulum drachmam semis &c.

Diaphoreticum sive *Bezoardicum Martiale*, sive *pulvis Cachecticus Ludovici*, *Schweiß-treibendes Spieß-Glas mit Stahl präparirt* / *Diaphoretique ou Bezoar Martial*. Prodest in morbis cachecticis & febribus cum diarrhœa conjunctis, item in dysenteria Epidemica. Datur ad scrupulum ad drachmam semis.

Nitrum Antimoniatum fixum, *Nitre fixe d'Antimoine*. Refrigerat, urinam atque sudorem ciet, simulque leniter alvum laxat, conducit in febribus & faucium inflammationibus. Dosis est ad grana sex, ad scrupulum, immiscetur etiam gargarismatibus & Epithematibus atque clysteribus.

Antimonii flores, *Spieß-Glas-Blumen* / *Fleurs d'Antimoine*; vehementer per superiora & inferiora purgant. Dosis grana duo, quatuor, nunquam autem per se debent exhiberi, sed in vino infunduntur & vinum solummodo bibitur.

Butyrum Antimonii, *oleum Antimonii glaciale*, *Spieß-Glas-Butter* / *Beurre ou Huile glaciale d'Antimoine*. Vim obtinet causticam, carnem exedit & ulcera callosa abstergit.

Mercurius vita, *Pulvis Algaroth*, *Mercure de vie* ou *poudre d'Algaroth*. Nihil aliud est quam Antimonium corrosivum & per aquam præcipitatum. Vires obtinet per superius & inferius guttur purgandi. Dosis granum dimidium granum unum, duo, tria. Ob vim autem drasticam maligna sæpius symptomata secum trahentem, haud raro evadit Mercurius mortis aut vitæ æternæ. Leni fusione abit in vitrum succineum.

Bezoardicum Minerale; *Mineralisch Bezoar-Pulver* / *Bezoar Mineral*. Diaphoreticum est atque alexipharmacum, unde in febribus continuis, malignis, epidemicis, contagiosis multi usus est. Dosis ad grana quinque ad scrupulum unum & paulo ultra.

Cinnabaris Antimonii, *Spieß-Glas-Zinnober* / *Cinnabre d'Antimoine*. Habetur pro specifico in affectibus capitis atque nervorum, in vertigine, convulsionibus, epilepsia, febribus continuis & malignis, in morbis contagiosis, & iis omnibus, ubi serum acre & austerum peccat, & coagulationem sanguinis minatur. Conducit

in morbillis, variolis, nervosarum partium doloribus, arthritide, paralyfi &c. Operatur ut plurimum per sudorem. Dosis est ad grana sex ad scrupulum, drachmam semis &c. Loco Cinnabaris nativæ ingreditur ut plurimum specificum Cephalicum Michaelis, de quo sub Cinnabari. Ex hoc Cinnabari tanquam basi constat

Pulvis ad palpitationem cordis ruber, rothes Hert. Pulver / poudre rouge contre les palpitations du cœur. Pro confortante atque cordiali remedio usurpari poterit. Datur ad ℥j. ʒß, sumitur etiam cuspidatim.

Clyssus Antimonii, Clyssus mineralis, Clyssus mineral, attenuat, aperit, per alvum, per urinam, & per sudorem expurgat, convenit in exæstuatione sanguinis, hinc in febribus continuis, ardentibus etiam & malignis prodest. Immiscetur vel potui ordinario vel Julapio. Dosis guttæ tres ad decem viginti & ultra.

Tinctura Antimonii, Spieß = Glas = Tinctur / Teinture d'Antimoine. Sanguinem purificat, acidum absorbet, obstructions tollit. In mensium obstructionibus, melancholia hypochondriaca, passione hysterica, scabie, scorbuto conducit. Vim obtinet sudoriferam, convenit in Catarrhis, Gonorrhœa virulenta & Lue venerea. Dosis ad guttas decem triginta & ultra. Quod si dimidia pars spiritus Vini abstrahatur, obtinetur

Tinctura Antimonii concentrata, concentrirte Spieß = Glas = Tinctur / Teinture d'Antimoine concentrée, acerrima & longe efficacior. Quod si jungatur cum essentia Lignorum concentrata, obtinebis remedium in affectibus Venereis convenientissimum & aliis Tincturis antivenereis vix cedens.

MINERALIA SALE VOLATILI PURGANTE CONSTANTIA CUM TERRA ADSTRINGENTE.

LAPIS LAZULI ET ARMENUS.

Lapis Armenus est substantia lapidea ad metallicam accedens duritiem, pallide cœrulea cum quadam viriditate ex
par-

parvis quasi grumis & intercurfantibus quibusdam argenteis micis compacta, eruta ex fodinis argenti.

Lapis Lazuli est substantia lapidea ad metallicam accedens duritiem, saturate cœrulea, cum splendentibus quibusdam aureis micis, armenio lapide durior & compactior, eruta ex fodinis auri.

Uterque possidet virtutem purgantem & emeticam & specificè in morbis soporosis, mania, apoplexia, ut & in quartana singulariter commendatur.

Tostus seu ignitus ex quo expulsa sunt salia volatilia, totus adstrictorius est.

Dos. à ʒʒ. ad ʒj. sed raro, interdum enim in minima dosi purgat, interdum in maxima dosi non operatur.

VI.

LAPIS ARMENUS, λίθος ἀρμενιάκος, LAPIS ARMENIUS, à regione, ex qua ad nos olim afferebatur, dictus, Armenier-Stein/ Armenischer Purgier-Stein / PIERRE ARMENIENNE.

Ex Armenia hodie vix amplius obtinetur, imo sunt, qui dubitant olim hunc lapidem ibidem fuisse repertum. Invenitur in Germania, Franconia, Misnia, Bohemia, Hungaria, Polonia &c. Differt à lapide Lazuli, quod sordibus magis scateat, minusque cœruleus existat. Lapis hic lotionè à sordibus depuratus, suppeditat illud pigmentum, quod vocatur Berg-blau / blau Berg-grün / blau-grüne Erde / blau Schiffer-grün / CENDRE VERTE OU VERD DE TERRE, VERD D'ASUR. In usum Medicum vix unquam cedit.

LAPIS LAZULI, LAPIS CYANEUS, LAPIS CÆRULEUS, Berglasur / Lasurstein / Lasurblau / PIERRE d'AZUR.

Lapis hic, quem durioresse lapide Armeno asserunt, vix amplius in Medicum recipitur usum, quam ut ingrediatur decantatam confectionem Alkermes, de qua sub Chermes actum.

Inservit

Inservit itaque potissimum, ut exinde vel aurum extrahatur vel nobile atque pretiosum præparetur pigmenti cærulei genus, quod vocatur **ULTRAMARINUM**, *Ultramarin/ OUTREMER*. Ubi bonitatis notas sequentes observant, si nempe lapis cum sputo vel aqua madefactus in pannum albißimum colorem violaceum spargat, si inter prunas ardentes candefactus colorem postquam refrixit, retineat, si super ferrum ignitum projectus & in aceto albo extinctus acerrimo, colorem non mutet, imo intensiorem acquirat, & si pulvis lapidis, super ferrum ignitum sparsus & colorem & consistentiam lapidis retineat, tunc ad parandum Ultramarinum censetur bonus, secus si instar ceræ fluat. Paratur autem hoc cæruleum pigmentum, calcinando lapidem & lævigando in porphyrite, commiscendo cum massa ex pice cera atque oleo composita. Affunditur deinde aqua ut pulvis cæruleus alcoholisatus dissolvatur & ad fundum præcipitetur, qui collectus deinde servatur.

VITRUM ANTIMONII.

Est substantia ponderosa solida vitri instar, hyacinthini obscuri coloris, facta ex antimonio calcinato & fuso, saporis nullius evidentis.

Constat Θ e alcalino, qui per superiora & inferiora contenta vehementer expurgat, præcipue bilem. Raro datur in substantia, frequenter in infuso, ubi menstrui ratio est habenda, non ipsius vitri antimonii

\mathcal{R} . Vit. antim. \mathfrak{zj} . affund. vin. hispan. q. v. infusi hujus filtrati cape \mathfrak{zj} . vel \mathfrak{zjss} . vel per se vel cum syr. vel ∇ cinamomi, vel quovis alio correctorio, ad vomitum & sedes movendos.

CRO.

VITRUM ANTIMONII, Glasß von Epieß, Glasß / VERRE D'ANTIMOINE.

Præ-

Præfertur illud quod Hyacinthino resplendet colore, rothgelbes Glasß von Spieß Glasß / VERRE D'ANTIMOINE DE COULEUR DE HYACINTHE.

In substantia nunquam interne debet exhiberi. Uladislaus quartus Poloniae Rex ab usu vitri hujus incaute propinati è vivis fuit sublatus, teste BARNERO. Data autem fuerant sedecim grana.

Quoad usum infusi hujus antimonialis, non consideranda quantitas vitri, sed liquoris; scrupulus enim unus vitri antimonii æque integram mensuram ac unciam unam vini inficere potest. Admiratione utique hic dignum, quod ejus, ut & aliorum vomitoriorum antimonialium, Reguli v. gr. Croci metallorum &c. vis emetica exhauriri nequeat, & ea vel millies etiam infundi queant, ut nihil plane virium vel parum admodum decedat. Dosis vini, in quo infusum stetit hoc vitrum, est ad unciam semis, unciam unam, unciam unam semis ad uncias duas ad summum in robustissimis. Excessu hoc vinum Emeticum facile abit in vinum Emeticum; ut cum PATINO loquar. Notandus hic calix vomitorius RULANDI, dum ex ligno juniperino torno elaborato, implicatur pix cui pulvis vitri fuit permixtus. Externe infusiones vitri inserviunt quoque pro scopo ophthalmico.

IN OFFICINIS PROSTANT EXINDE

Elixyr Emeticum, Brech-Elixyr / Elixyr Emetique. Purgat per vomitum & secessum, dosis in adultis à guttis viginti, ad triginta, aut quadraginta in juscule vino aut liquore alio appropriato. Convenit in Hydrope, Ictero, febre quartana, & viscerum obstructionibus. Septem grana cum dimidio vitri antimonii, per acidum Vitrioli fixati, respondent circiter drachmæ uni liquoris.

Syrupus Emeticus, Brech-Syrop oder der Städlerin Safft / Syrop Emetique. Dosis est ad drachmas duas ad drachmas sex ad summum.

CROCUS METALLORUM.

Mitior est quam vitrum ḡij, datur eodem modo.

℞. Croc. metallor. gr. iij. detur ex melle seu oxymell.
ad vomitum, ℞. Croc.

℞. Croc. Metallor. q. v. affunde vin. Hispan. part. ij. vel iij, filtrati exhibe ℥j. vel ij. eodem modo quo infusum vitri ℥ij exhibetur. Hoc infusum stimuli loco adjungitur clysteribus contra colicam, & morbum apoplecticum, item ad collyria exhibetur.

In Colicis passionibus cum scybalis durissimis.

℞. Decoct. Emoll. & carminativ. ℥viiij. infus. ℥ij. ℥ij. Θ commun. ℥ij. f. Clyst.

MI-

CROCUS METALLORUM, Safran von Spieß-Glaß / SAFRAN DE METAUX LAVE.

Nihil aliud est, quam Hepar Antimonii edulcoratum seu aqua sæpius lotum. In substantia rarissime dari debet, Exinde paratur

IN OFFICINIS

Tartarus Emeticus, Brech-Weinstein / Tartre Emetique, de quo sub Tartaro.

Oxysaccharum Emeticum Ludovici, saurer Brech-Zucker / Oxysaccharum Emetique. Est elegans vomitorium. Exhibetur infantibus, verbi gratia trimestri ad grana duo circiter, anniculo ad grana sex, septem octo &c. Adultis ad drachmas duas, unciam semis, ad drachmas sex ad summum, Drachmæ uni respondet granum unum croci metallorum,

MINERALIA SALE ACIDO
CUM PAUCO ALCALI CON-
STANTIA.

VITRIOLUM ALBUM. HUNGA-
RICUM. ROMANUM.

Vitriolum album est substantia salina alba, Θ is instar concreta, facta ex decocto vel lixivio terræ vitriolicæ, saporis acris subacidi & adstringentis.

Hungaricum est substantia metallica transparens ex viridi cœrulea, ex terræ vitriolicæ decocto vel lixivio in crystallos concreta, saporis cum albo ejusdem.

Romanum seu Cyprium est substantia crystallina cœrulea, transparens &c.

Vitrioli genera omnia constant sale acido tam volatili quam fixo p. m. corrosivo cum paucis alcali & terra metallica. In sale fixo alcali juncto consistit vis emetica, in terra vis adstrictoria. Album mitius est ad vomitum. Cætera vitriola fortiora sunt, & ad externum potissimum usum.

℞. Vitriol. alb. ʒj. cape ex ∇ Muls. ad ʒiiij. vel cerevisia, vel vino ad vomitum ciendum.

℞. Vitriol. alb. gr. iij. ∇ fœnic. ʒj. f. collyr. ad oculorum suffusionem.

℞. Vitriol. alb. insperge vulneribus mundificandis.

℞. Vitriol. Hungar. applica ulceribus sordidis, ejusdem virtutis est & Vitriolum Romanum.

℞. Vitriol. Roman. ʒij. ∇ commun. ℥j. coque, injice in vesicam, ad mundificandum ulcus colli vesicæ ad mentem Foresti.

CHAL

Χάλκαιος, quasi æris flos, VITRIOLUM a vitri nitore, vocatur etiam ATRAMENTUM, ATRAMENTUM SUTORIUM, Vitriol/
Rupffer-Wasser / VITRIOL. Alchymistæ hoc nomen mysterio-
sum esse pronunciant, & singulas literas ita explicant. Visita in-
teriora terræ, rectificando invenies optimum lapidem, veram Me-
dicinam.

Vitriolum, sapore pontico nauseoso & austero præditum, scatet ut plurimum particulis ferreis æneisve, aut alio quopiam me-
tallo vel materia metallica nonnihil terrestri.

Vitriolum vel in fodinis ipsis concretum est, aut ex terra in ca-
vernīs destillat stiriarum forma, vel ex aquis Vitriolicis per evapora-
tionem paratur, vel ex lapidibus Chalcantosis aut terra vitriolacea
excoquitur. Vitriolum variat ratione Metallī quod continet. Cu-
preum cœrulescit, ferreum viridescit, si de utraque minera partici-
pat, utrumque quoque colorem exhibet, & vocatur Hermaphroditi-
cum.

Vitriolum commune Goslariense est viridantis coloris. Vitrio-
lum album sæpius est factitium, ex Vitrioli viridi calcinato ad albe-
dinem, factum. Vitriolum ad atramentum conficiendum adhiberi
res est notissima. Ob summam nauseam & violentiam, interne ra-
rissime adhibetur. Commendatur interim à quibusdam ad vermes.
Vitriolum præsertim album, errhinum est, si solutio ejus naribus at-
trahatur. Curiosum est, quod dum aliquid vitrioli in ore detinetur,
postmodumque fumus Tabaci hauriatur, dulcis percipiatur
sapor.

IN OFFICINIS PROSTANT

Vitriolum vomitivum sive *Gilla Theophrasti*; Brech-Vitriol / Vi-
triol Emetique, ou *Gilla de Vitriol*. Vomitus fortiter ciet
& non nisi in affectibus herculeis & subjectis Athleticis usurpari de-
bet. Dosis est ad scrupulum semis ad drachmam unam.

Phlegma Vitrioli, destillat Vitriol-Wasser / Phlegme de Vitriol. In
nimia sanguinis ebullitione & in intemperie uti loquuntur calida, bi-
liosa in febribus &c. ad plures guttas commendatur. Inservit quo-
que ad Tincturas ex floribus extrahendas.

Spiritus Vitrioli, Vitriol-Geist / Esprit de Vitriol. Usurpatur po-
tissimum in Julapiis ad aliquot guttas vel ad gratam aciditatem,

pro siti & æstu sedandis. Alias pro menstruo corrosivo inservit.

Oleum Vitrioli. Vitriol-Oel / Huile de Vitriol. Usurpatur quidem à quibusdam tanquam causticam ad absumendas carnes luxuriantes & excitandos fonticulos. Magis autem tanquam menstruum summe corrosivum adhibetur.

Caput mortuum Vitrioli, Colcothar Vitrioli, Colcothar / roth calcinirter Vitriol / Tête morte de Vitriol ou Colcothar, quod adstringit. Per elixivationem extrahitur Sal Vitrioli vomitivum Angeli salæ, quod ad ʒß, ad ʒß. ab authore mire laudatur in affectibus soporosis. Remotis postmodum etiam partibus metallicis remanet terra Vitrioli dulcis quam pro scopo adstrictorio interne & externe laudant.

Ex vitriolo quoque paratur decantatissimus iste *Pulvis Sympatheticus, Sympathetisch Pulver / Poudre de Sympathie.* Usurpatur præsertim externe ad hæmorrhagias sistendas quasvis etiam in subiectis remotis modo de ejus sanguine in lintheaminibus obtineatur, qui ultimus tamen effectus nondum satis experimentis comprobatus.

Habemus quoque exinde paratos *Liquores stypticos.* WEBER hic est

℞. Vitriol. Hungar. Aluminis ana lbß. Phlegmat. Vitrioli lbjv. coque tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta. Liquorem frigefactum filtra & à crystallis subinde natis separa, adde singulæ libræ liquoris Olei Vitrioli ʒj. serva pro usu.

Aqua styptica, Dn. MATTE LA FAVEUR, distillatoris quondam Monspeliensis, à CHARAS ita describitur

Dissolvantur in sufficienti quantitate aquæ communis vitrioli libræ viginti quinque, dissolutio hæc per linteum crassius traducta igni imponatur excepta cacabo æneo, post nonnullas ebullitiones remotumque ab igne vas, illico liquori affundatur libra una spiritus aceti præcipitandæ causa in vasis fundum partis terrestris Vitrioli, improprio sulphuris nomine donatæ; demum liquore per decem aut duodecim horas quiescente, quo pars terrestris universa illuc confluat & congregetur, liquor supernatans decantandus erit, postea probe eluto, dulcorato & exsiccato supra cineres calidos pulvere in fundo subsidente, hujus unciz octo immittantur retortæ vitreæ super affusisque

sisque spiritus Vitrioli optime dephlegmati libris octo, commissa-
que retorta Balneo Mariæ, suscipienda erit destillatio igne gradatim
adhibito, mitiori initio tandem vehementissimo, pergendo eousque
donec ex retorta nihil amplius extillet. Demum sponte refrigeratis
vasis effracta retorta, contusaque massa superstite, hæc matratio in-
datur quod post affusum spiritum Vini cum sale Tartari rectificat-
um, donec illi superemineat quinque vel sex transversis digitis,
coopertumque matrarium appositum alembicum cœcum accuratissi-
me loriatum, id exponendum erit Balneo digestionis per viginti
quatuor horas, postmodum Spiritus Vini, cui intensissimus color
rubicundus conciliatus, calide per chartam emporeticam transmit-
tendus, qui demum per alembicum vitreum eductus, leni evapora-
tioni subjiciatur ad siccitatem usque subsidentia, in fundo relicto
pulvere candicante cujus uncia uni affundantur aquæ pluvie uncia
quatuor. Mixtura autem hæc per aliquot dies soli exponatur fil-
tretur liquor aquam stypticam exhibens ad quamvis hæmorrhagiam
compescendam.

Describitur porro *alia* dicti authoris aqua, ab eodem CHARAS,
sequenti modo. Vitrioli libræ septem vel octo decoquantur in
aquæ libris sedecim, dissoluto autem vitriolo & ab igne remoto su-
perfundatur semilibra aceti, demum sponte subsidentibus materiis
decantatoque liquore pulvis in fundum præcipitatus eluendus erit
dulcorandus & exsiccandus, quo postea retorta vitrea ima parte so-
lum luto incrustata excepto, superinfusoque duplo pondere spiritus
Vitrioli optime rectificati instituenda erit. Destillatio igne nudo,
sed moderato ad siccitatem usque materiæ quæ cineritii coloris
evadet. Postea effracta retorta, contrita massa crucibulo immitten-
da erit super candentes carbones, spathula ferrea continue commo-
vendo quousque flavescensem colorem nanciscatur. Tunc in mor-
tarium conjicienda erit optime conterenda, hujus uncia duæ matra-
tio excipiendæ, additis aquæ communis libris tribus, præmissaque
per horam digestionem, liquor hic per chartam emporeticam trans-
mittendus; in lagena vitrea densa accurate occludenda asservandus,
quamvis hæmorrhagiam exterius adhibitus cohibens.

CHAL.

CHALCITIS.

Est substantia metallica ponderosa dura, glabra, rubicunda, æri similis, multis intercurfantibus splendidis fibrillis, eruta ex venis æris, saporis acris & adstringentis.

Cum vitriolo convenit, ast in externo usu potentior est. Chalcitis quæ nunc in officinis habetur, nihil aliud est quam vitriolum ustum, & servit in officinis ad inducendam theriacæ nigredinem.

Χαλκίτις λίθ. ♂, à χαλκός æs, quoniam de cupro participat, atramentum rubrum Hart/roth Ultrament / Calcite ou Colcothar naturel.

Chalcitis ad ignem liquecit & in liquoribus aqueis facile dissolvitur, Charas perperam Vitriolum ustum ad rubedinem vice Chalcitidis in Theriacam recipi dicit. Quamvis enim vi alexiteriæ Chalcitidi assignatæ non nimium adhæreat, attamen propterea chalcitidem ingredi putat, ut efficaci vi juvet conjunctionem & unitatem facultatum cæterorum omnium simplicium Theriacam ingredientium, beneficio videlicet fermentationis quam aciditate sua promovet, plusquam quodvis aliud medicamen Theriacam subiens. Reperitur in Germania, Suecia &c.

VIRIDE ÆRIS.

Sale falso caustico gaudet, & ad ulcera mundificanda usurpatur, absomit quoque excrescentias carnis præternaturales.

℞. Mell. rosat. misce c. virid. æris q. s. applica vulneribus fordidis.

℞. Virid. æris arsen. alb. ana q. v. excipe tantillo ceræ & olei, applica verrucis & clavis pedum tollendis, seu solve cum aceto & applica.

ÆRUGO, Grünspan/ VERDET, VERD DE GRIS.

Est substantia, LANGIO definiente, grumosa, condensata, cæruleo viridis, saporis acris pontici, summeque adstringentis & nauseosi, odoris specifici. Ærugo vel nativa est, quæ ex marcaffitis æreis, aliisque lapidibus efflorescit, vocaturque *Berg-grün/ Kupffer-grün/* vel potissimum factitia ex cupro corroso, mediantribus præsertim vinaceis, in quibus sepelitur, producta, quæ methodus præsertim in Gallia viget. Admiscetur variis emplastris & unguentis pro cura ulcerum & vulnerum sordidorum, ut & ad cicatrices inducendas. Conducit quoque in fistulis & cancro.

IN OFFICINIS REPERIUNTUR

Flores viridis æris, seu viride æris crystallisatum, Grünspan-Blumen/ Fleurs de verd de gris.

Spiritus Asthmaticus Michaëlis, Lufftmachender Spiritus / Esprit contre l'asthme. Non tantum in asthma sed tanquam spiritus acido volatilis in aliis affectibus pectoris humoralibus, ubi satis est resolutivus, convenit. Datur ad guttas quinque triginta &c. in aqua spirituosa.

Emplastrum ad clavos pedum, Krähen-Augen-Pflaster / Emplâtre pour les cors des pieds.

Emplastrum viride, Grün-Pflaster/ Emplâtre vert, detergit & consolidat vulnera & ad clavos pedum conducit.

Unguentum Ægyptiacum simplex, gemeine braune Reinigung oder Wund-Salb / Onguent Ægyptiac simple. Valentissimum est ad saniem siccandam, sordes detergendas & carnem luxuriantem absumendam, ulceribus malignis putridis & sinuosis convenit. Prodest quoque in gingivis tumentibus & ulcerosis, præsertim si rosacei Mellis uncia v. gr. uni admisceantur drachmæ duæ unguenti Ægyptiaci.

Unguentum Ægyptiacum Magistrale seu compositum, starke Reinigung-Salb/ Onguent Ægyptiac Magistral. Commendatur in gangræna & sphacelo, omnibusque aliis ulceribus valde putridis & sinuosis, putredini siquidem resistit & carnem mortuam à sana separat exsiccat ac detergit, carnem quoque luxuriantem absumit. Habet tamen & hoc vitii, quod nisi corruptæ carnis copia adsit absque doloribus acerbissimis vix applicari queat.

MINERALE OLEOSIS SEU PINGUIBUS CUM ACIDO VOLATILI CONSTANS.

SULPHUR.

Multis pinguibus & paucis acidis gaudet, ob pinguedinem temperat & mulcet, & proinde in phthisi, tussi, colica aliisque casibus laudatur; infringit quamcunque acrimoniam nimiam præcipue bilis. Externe temperat & absorbet quælibet acria, scabiem & pustulas generantia.

Datur crudum in substantia seu ejus flores à ʒj. ad ʒss. Præscribitur & specie fumi, quo aquæ perfumantur, & à ʒis acido imprægnantur.

℞. Sulph. crud. ʒj. cape ex ovo forbili ad tussim, & phthisin singulis diebus seu cape ex pulpa passularum & syrupo papaveris.

℞. ▽ scabios. ʒvj. asthmat. ʒiij diacod. ʒj. cape cum flor. ʒis ʒj. pro tussi add. rad. ir. florent. ʒj.

℞. Rad. ir. flor. rad. ari. ʒis ana ʒj. f. pulv. add. flor. benz. gr. vij.

℞. Flor. ʒis ʒj. Zedoar. gr. vij. L. O. gr. j. elæosacch. chamom. ʒj. f. pulv. contra colicam.

℞. ʒis q. v. M. c. ʒo laurin. f. ung. pro scabie add. si opus ʒ viv.

℞. ʒ ʒss. fulig. ʒss. f. pulv. in doloribus post partum.

MI-

Θείον, Schwebel / Schwefel / SOUFFRE, SOUPHRE.
Est corpus minerale, solidum, ponderosum, è partibus pingui-
bus

bus seu sulphureis inflammabilibus cum sale acido & tantillo terræ junctis constans, coloris flavi vel subfulci, vel quodammodo viridescens, odorem de se spargens, præsertim accensum, singularem ac virosum, pulmonibus infestum.

Duplex est NATIVUM & FACTITIUM. NATIVUM Græcis dicitur *θεῖον ἄπυρον*, Latinis, SULPHUR VIVUM, VIRGINEUM, lebendiger Schwefel / SOUPHRE VIVE, hoc e terra effoditur non in profundioribus cuniculis, sed in aëre aperto propter halitus sulphureos, quos copiose effundit. Hujus fragmenta sunt dura, exterius subcinerea, interius subflava atque splendentia aut etiam pellucida quando sunt puriora. Reperitur in Islandia, Italiæ plurimis in locis præcipue in Phlegæis campis inter Puteolos & Neapolim, in Germania aliisque Europæ locis. Certe totus terrarum orbis sulphure abundat, plus tamen in hoc quam in illo loco. FACTITIUM SULPHUR, *θεῖον πεπυρομένον*, IGNEM EXPERTUM, SULPHUR COMMUNE gelöschter Schwefel / SOUPHRE COMMUN dicitur, & excoquitur tum ex aquis sulphureis, tum eliquatur e gleba effossa, tum e pyrite aut minera sulphurea extrahitur. Liquefactum postmodum in MAGDALEONES, Zapffen oder Stangen / SOUFRE EN BATON OU EN CANON, formatur. Sulphur aliud alio impurius magisque aut minus flavum existit. Ex sulphure & squama ferri concoctis in urceolos transfusis, sulphureque hinc inde obductis, componitur SULPHUR ignobilius CABALLINUM, Ross-Schwefel / appellatum.

Sulphur aperit, incidit, putredini & venenis quibusdam resistit, provocat sudorem. Pectori dicatum est, unde communiter Balsamum & anima pectoris audit. Conducit in asthmate & pluribus pectoris affectibus. Convenit in morbis & febribus catarrhalibus. In mensium suppressione atque partu difficili à quibusdam laudatur. Pulverem pyrium ingredi omnibus notum, æque ac illud, quod vina eo condiri soleant, sed bene observandum, ne quid nimis. Fumo Sulphuris maculæ à cerasis, moris &c. in lintheaminibus, ennibus & ore productæ facile delentur.

IN OFFICINIS PROSTANT

Flores Sulphuris, Schwefel-Blumen / Fleurs de Souffre. Dosis est ad scrupulum ad drachmam semis.

Lac sive Magisterium sulphuris, Schwefel-Milch / Lait ou Magistere de souphre. In supra dictis affectibus ad sanguinem itidem purifican-

ficandum & putredinem arcendam datur ad scrupulum semis, scrupulum unum &c. sed caute.

Balsamum Sulphuris Rulandi, Rulands Schwefel-Balsam/ Beaume de souffre de Rouland. Discutit atque resolvit, digerit atque ulcera mundificat, dolores quoque mitigat, & imprimis ad ambusta conducit, præsertim cum unguento Sambucino mixtum.

Balsamum Sulphuris Anisatum, Schwefel-Balsam mit Anisöhl/ Beaume de Souphre Anisé. Pectori est dicatum imprimis autem ad ejus ulcera laudatur, commendatur etiam in asthmate morbisque frigidis atque flatulentis. Datur ad guttas tres ad guttas decem in vehiculo.

Balsamum Sulphuris Terebinthinatum, Schwefel-Balsam mit Terbenthinöhl/ Beaume de Souphre avec l'Huile de Terebenthine. Exulcerationibus tam externis quam internis conducit, in Gonorrhœa prodest, præservat à putredine, hinc etiam in peste & morbis malignis laudatur.

Emplastrum Diasulphuris Rulandi, Schwefel-Pflaster/ Emplatre de Souphre de Rouland. Deterget, mundificat & omnis fere generis ulcera curat, putredini resistit, & præterea insigniter resolvit, quam virtutem in strumis præsertim dissolvendis exserit. Beato Parenti meo ut & mihi sequens *emplastrum strumale* usu comprobatum fuit.

℞. Emplastr. diasulphur. Rulandi ʒvj. ungu. bubul. combust. ʒiij. Malaxentur cum oleo lacert. Convenit impositum Luna crescente, usurpando simul quotidie mane & vesperi ʒß. vel ʒj. pulveris strumalis, qui in rotulas quoque facile converti potest.

Spiritus Sulphuris, Schwefel-Geist/ Esprit de Souphre. Refrigerat, sitim sedat, & ebullitionem massæ sanguineæ mitigat, hinc in febribus continuis & ardentibus laudatur, vi quoque diuretica gaudet. Spiritus hic gratior spiritu Vitrioli admiscetur præprimis Julapiis ad aliquot guttas vel gratam aciditatem.

Tinctura Sulphuris, Schwefel-Tinctur/ Teinture de Souphre. Interne commendatur in affectibus pectoris ad guttas quinque viginti &c. externe in affectibus fistulosis cancris & aliis vitiis cutaneis convenit.

MINERALIA FIRMIORIBUS PARTICULIS CONSTANTIA.

AURUM FOLIATUM.

Sunt substantiæ lamellatæ tenuissimæ, ex auro inter bina coria malleo cuso & in lamellas redactæ, commendatur ad compescendam salivationem nimiam à ꝑio ortam.

Eo involvuntur pilulæ, ingreditur quoque confectio-
nes & pulveres.

℞. Aur. foliat. q. v. succ. glycyrrh. q. f. f. pil. ad cohibendam salivationem ex ꝑio, his solet addi resin. jalap. gr. v. troch. alhand. gr. j. si alvus adstrictior.

℞. Aur. fol. num. v. ung. camphorat. ℥ij. quò inungatur corpus ad nimiam salivationem compescendam.

℞. Aur. fol. q. v. sacch. in ▽ lavend. f. q. solut. ℥j. f. rotulæ ad compescendam salivationem.

MINE.

AURUM ita dictum vel à splendore, vel ab ejus inventore. *Χρυσός* Græce dicitur, Chymicis SOL à similitudine, quam cum Sole cœlesti habet, REX METALLORUM appellatur, Gold/ Or. Est metallum omnium purissimum, gravissimum & ponderosissimum, ex partibus arctissime sibi cohærentibus constans, omnia ignis examina fere sustinens, maxime ductile & malleabile, colorem fulvum præ se ferens. Auri pondus tantum est, ut ejus pes cubicus Parisinus libras 1368. pendeat. Maxima ejus ductilitas bracteatoribus nota est, à quibus in libris ex intestino recto animalium præsertim boum atque vaccarum, mirum in modum in lamellas diducitur, sicut à fili ductoribus in stupendam longitudinem extenditur.

AURUM aliud dicitur NATIVUM, *ἀπυρον*, VIRGINEUM, ignem non expertum, *gediegen Gold* / quod è terra effoditur, aut lotione è fluminibus auriferis obtinetur. Aliud vero FACTITIUM ex mineris diversi generis prolectum & ignem expertum. Non solummodo in Peru, Arabia, &c. reperitur aurum, sed & in Europa, Hungaria &c. præsertim in fodinis ut & fluminibus, Rheno aliisque plurimis invenitur.

Aurum depuratur vel lotione à sordibus externis, vel cupellatione ab aliis metallis imperfectioribus dictis, vel per Antimonium, aut per aquas stygias ab Argento, vel per cæmentationem.

Auri quantus usus sit in re politica, superfluum est dicere. In Medicina maximæ à quibusdam confortativæ, & nescio quæ aliæ, adscribuntur vires. Unde Tincturæ Solares, aurum potabile varium &c. tantis extolluntur laudibus, quæ tamen remedia vix non semper sunt imposturæ. Iis conducere, qui Mercurium in nimia quantitate usurparunt, largiendum utique, pilulæque AUR O FOLIATO, *den Gold-Blättlein* / OR EN FEUILLE, quæ nonnisi ex auro purissimo confici solent, ad conservandam figuram rotundam recte cinguntur. Reliquis autem remediis tum liquidis tum solidis, nonnisi splendoris & pretii, aut forsan, ut interni corporis parietes dearentur, frustra adduntur.

IN OFFICINIS INVENITUR

Aurum fulminans, *Schlag-Gold* / Or *fulminant*. Præter vim fulminantem in minima quoque quantitate dum calori exponitur insignem, vires quoque Medicas obtinet, diaphoreticum enim est atque catharticum, & præsertim in epilepsia puerorum à torminibus alvi excitata convenit. Datur ad granum, grana duo & paulo ultra.

Bezoardicum Solare, *Göldisch Bezoar-Pulver* / *Bezoar d'Or ou Solaire*. Ad salia heterogenea massæ sanguineæ demanda in febribus continuis tam malignis quam aliis laudatur. Vires obtinet cordiales, & alexipharmacas. Commendatur ad arthritidem vagam, podagram inveteratam, scorbutum, luen veneream, lepram, Dosis ad ℥ss. ʒj. ʒss.

MINERALIA TERREIS CONSTANTIA.

LAPIS CALAMINARIS.

Est substantia media inter lapidem & terram, consistentiæ friabilis laxæ, modo ex rufo modo ex albo flavescent, effossa ex fodinis metallicis maxime cupri, saporis nullius evidens. Hujus usus est in exiccandis vulneribus & ulceribus præcipue intertrigine.

℞. Lap. calam. 3^{ss}. croc. ꝑt. 3j. Cret. albiss. Ceruss. ana ʒj. f. pulv. pro intertrigine infantum.

℞. Lap. calam. q. v. misc. c. ʒo lini, applica herpeti.

LAPIS CALAMINARIS vocatur etiam LUPI SPUMA, CADMIA FOSSILIS, ad differentiam Cadmiæ, quæ vocatur, Cobaltum, Galmeystein / PIERRE CALAMINAIRE OU CALAMINE.

Metalli expers est & dum accenditur fumum eructat luteum. Reperitur in Metallifodinis Germaniæ, aliisque locis.

Interne nunquam debet usurpari. Externe in ulceribus adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Ingreditur unguenta epulotica & sarcotica. Fusores eo utuntur ad æs & aurichalcum conficiendum, cuprum nimirum pallere facit. Vi quoque gaudet ophthalmica insigni, in ophthalmia, Epiphora & defluxionibus conducit.

IN OFFICINIS PROSTAT

Emplastrum gryseum, sive de lapide Calaminari, Galmey, Plaster / Emplâtre gris ou de pierre Calaminaire. Ulcera explet siccat & cicatrice claudit, in excoriationibus perinæi conducit.

CRY.

CRYSTALLUS.

Est substantia solida, densa, albicans, glaciei instar pel-
lucida, dura, eruta è terræ fodinis, vel summis montium jugis,
saporis & odoris nullius.

Ob potentem vim absorbendi acida laudatur in epile-
psia, & à nonnullis in cardialgia à bile æruginosa. Datur
ad ʒj.

℞. Crystill. præpar. ʒj. — ceras. n. ʒj. ▽ flor. til. ʒij.
cape pro epilepsia, sed plus tribuendum vehiculo quam
pulverī.

℞. Crystill. præpar. ʒj. C. C. Corall. anā ʒʒ. L. O. gr. ij.
f. pulv. pro ij. dos. in cardialgia.

℞. Crystill. præpar. Croc. ʒt. ana ʒʒ. ʒo d. lign. sassaf.
gt. j. f. pulv. contra icterum, si sit à bile tenuiore & acriore.

℞. Crystill. præpar. ʒj. lign. aloës ʒʒ. conf. anthos ʒʒ. f.
bolus in fluore albo.

Denique in defectu lactis mulierculæ vel interne sumunt,
vel externe appendunt dorso. ℞. Crystill. præpar. lac. Dæ
ana ʒj. ▽ fœnicul. ʒij. f. haustus.

FRAGMEN-

Χρύσαλλος, σελλόμερον ὕδωρ, CRYSTALLUM, CRYSTALLUS
MONTANA, Berg. Crystallen / Crystall / CRYSTAL.

De ortu hujus lapidis olim fuit disceptatum: quidam esse aquam
frigoris ope congelatam docuerunt, sed cum è cryptis terræ æque
eruat ac in summitatibus montium, ad profundissimas tales fo-
dinas tantum gelu penetrasse credibile non est. Accedit quod cal-
cinata crystillus in calcem abeat quod de glacie sperari nequit.
Sunt, qui persuadere voluerunt à fulmine eam cadere ac gigni, un-
de etiam Straalen / Straalstein / à quibusdam Alpicolis vocatur.
Ast instar aliorum lapidum crystillum quoque crescere diffuse sa-
tis

tis ostendit HOTTINGERUS in dissertatione inaugurali de Cry-
stallo & STENO de solido intra solidum. Reperitur in variis Eu-
ropæ locis, Helvetia præprimis in Alpibus &c.

CrySTALLUS caloris impatiens figuram utplurimum obtinet
hexagonam, superficiem vero lævigatam. Pellucida utplurimum
est, interdum tamen etiam colorata, sicuti quoque in ejus figura
quandoque variat natura. Curiosum est vel aquam vel aliud so-
lidum corpus Crystallo innasce, curiosius autem longe Crystal-
lum Crystallo obtegi. Varia ex crystallo parantur vasa & orna-
menta, pocula, scyphi, patinæ, cochlearia, candelabra &c. Quoad
usum Medicum, adstringit, unde in omni fluxu alvi præsertim bi-
lioso celebratur. In Cholera habetur specificum & verum Mer-
curii sublimati corrosivi antidotum. Laudatur porro in calculo.
In torminibus infantum & vaporibus inde obortis prodest. Den-
titionem infantum promovet ad masticandum data, adhibetur in
pulveribus dentifriciis. Observante HEER lac auget & minuit
pro diversa applicatione; si dorso applicatur Lac retrahit, si Tho-
raci & collo auget. Globuli crySTALLINI in ore ac manu detenti si-
tim tollunt & febricitantibus levamen afferunt.

IN OFFICINIS PROSTAT

*CrySTALLUS montana præparata, præparirte Crystallen / Crystal præ-
paré; datur ad ʒß. & ultra.*

FRAGMENTA LAPIDUM PRETIOSORUM.

Ad acida primarum viarum absorbenda efficacia sunt,
hinc forte est, quod in lypothymia, palpitatione cordis &
aliis affectibus laudantur.

Fragmenta quinque lapidum pretiosorum, sunt Sapphyri, Gra-
nati, Smaragdi, Hyacynthi, Sardæ seu Carneoli.

GRANATUS.

Sunt lapilli ex fusco rubicundi, seu ex rufo nigricantes, parvi angulosi, granis mali punici similes, collecti ex variis terræ lapidosæ locis.

Iis in diarrhœis desperatis feliciter usus fuit Herman-
nus h. m. ℞. Granat. ʒj. conserv. rosar. ʒj. f. bolus.

Granaten/ GRENAT. Est vel Orientalis qui major elegantior & pretiosior est adeoque instar aliarum gemmarum in annulis gesta-
tur, vel Occidentalis qui potissimum in usum Medicum venit. Re-
peritur in Gallia, Hispania, Germania, Bohemia, Silesia &c. No-
lo dicere de ejus virtute roborante & lætitiâ conciliante: quic-
quid agit, agit absorbendo & adstringendo. Colorem ejus ab au-
ro procedere vel exinde apparet, quod aurum ex his lapillis extra-
hatur. Prostat Lapis *Granatus præparatus, præparite Granaten/*
Grenate préparé.

HYACINTHUS.

Sunt lapilli ex flavo rubicundi, pellucidi, ignis instar
fulgentes, granatis rubedine dulciores, collecti ex variarum
regionum variis fluviis vel eorum ripis.

Confectio de Hyacintho cardiaca est, quatenus absor-
bet acida, quæ spiritus possunt tenere ligatos.

RU-

HYACINTHUS vocatur quoque RUBINUS FLAVESCENS,
Hyacinth/ HYACINTHE.

Duplex quoque est Orientalis, qui excellentior, & pretiosior,
& Occidentalis, in Silesia præsertim & Bohemia reperiendus.

Et huic lapidi nescio quæ vis somnifera, pestem pellens, à
fulmine præservans &c. affingitur, absorbet & adstringit.

IN

IN OFFICINIS PROSTAT

Lapis Hyacinthus præparatus, præpariter Hyacinth / Hyacinthe préparé.

Species de Hyacintho completæ & incompletæ, Hyacinthen Pulver mit und ohne Bisam und Ambra / Poudre de Hyacinthe complete & incomplete. Exinde cum Syrupo florum Tunicæ fit

Confectio liquida de Hyacintho completa & incompleta. Confection de Hyacinthe complete & incomplete. Utrique compositioni tum speciebus tum confectioni attribuuntur vires cordiales, stomachicæ cephalicæ alexipharmacæ adstringentesque in fluxibus alvi & vomitu sistendis. Dosis specierum est ad ℥j. ad 3℔. confectionis vero ad 3℔. ad ℥jv. Sæpissime miscentur aliis.

RUBINUS.

Sunt lapilli pellucidi rubentes, laccae granulatae similes, collecti ex arenis ad ripas fluminum, de collo gestatus subinde colorem perdit, ut & corallia ab effluviis acidis, quæ in se recipiunt, unde lixivio alcalico iis, uti coralliis color restituitur.

RUBINUS à colore, CARBUNCULUS, PYROPUS, ANTHRAX, Rubin / RUBIS, CARBONCLE. In Regionibus Orientalibus potissimum reperitur hæc gemma admodum pretiosa. Absorbet & adstringit. Vires cæteræ imaginariæ sunt. Ex hoc rubino aliisque gemmis in officinis extat Rubinus præparatus, præpariter Rubin / Rubis préparé & Julepus gemmatus completus & incompletus, Edelgestein, Syrop Julep de pierres pretieuses complet & incomplet. Vires obtinet cordiales, stomachicas & adstringentes non tam à gemmis, quam ab aliis ingredientibus dependentes.

SAPPHIRUS.

Sunt lapilli pellucido diaphani, modo cœrulei, modo pallidi,

pallidi, collecti vel ex arena ad fluminum ripas, vel ex terris lapidosis.

Oleum s. Q. E. Sapphiri commendatur in morbis malignis, sed nota si flores chamomillæ destillantur in vase cupreo cum pauxillo Ois ammoniaci vel o thereb. tum eandem exhibebunt tincturam, quam falso Sapphiri nominant.

κυανθ, σάπφειρθ, Saphir / Saffier / SAPHIR. Reperiuntur in Oriente, item in Europa, Bohemia, Silesia, Misnia, Anglia &c. Gemma pro diverso suo colore & magnitudine plus minus æstimanda absorbet ut reliqui lapides & adstringit, vi ophthalmica præditus esse dicitur. Si circulus cum Sapphiro circa oculos ducatur eos à variolis tueri fertur. Virtus castitatem servandi æque vera est, ac mutatio coloris & dissolutio hujus lapidis in coitu. Prostat *Sapphirus præparatus, præpariter Saphir / Saphir préparé.*

SARDIUS.

Est lapis opacus, colore Hepati similis, in superficie variis subinde albicantibus vel etiam coeruleis striis notatus, collectus ex saxis quibus adnascitur.

Hæmorrhagiam sistit manu solum si retinetur.

SARDUS à Sardinia, CARNEOLUS à colore, Carneol / CAR-NIOLE.

Loturam carnis fere refert. Reperitur in Oriente ut & Europa, Bohemia, Silesia, Misnia &c. Nulla alia quam præcedentes lapides gaudet virtute. Sigillis insculpendis inservit.

SMARAGDUS.

Sunt lapilli pellucidi, virides, reliquis gemmis molliores, collecti ad fluminum ripas.

Con-

Contra pavores nocturnos infantum laudatur à **Ti-
mæo.**

SMARAGDUS à splendore **LAPIS PRASSINUS**, **NERO-
NIANUS** aut **DOMITIANUS**, **Schmaragd/ Emeraude.** Est rur-
sus vel Orientalis vel Occidentalis in Europa & America reperiun-
dus. Ratione virtutis Medicæ coincidit cum reliquis pretiosis hæc
gemma: Virtutes etiam imaginariæ plures eidem adscribuntur. *La-
pis Smaragdus præparatus, præpariter Schmaragd/ Emeraude préparé.*
Curiosum est hunc lapidem & ejus mineram, quæ utplurimum
substituatur, candefactam, egregium constituere in Tenebris phos-
phorum.

TOPASIUS.

Sunt lapilli pellucidi, transparentes, aurei coloris, ad
Solem radios de se spargentes, collecti vel ex terris lapidosi
vel ex arenis.

TOPAZIUS, **Topas/ TOPAZE.** Orientalis Europæo mol-
liori in suo genere præfertur. Absorbet & adstringit, *præparatus-
que, præpariter Topas/ Topaze préparé*, à quibusdam adhibetur.
Quæ autem hæcenus de lapidibus his pretiosis dicta sunt, de vir-
tute Medica fuerunt prolata, non de pretio ipsarum gemmarum.

OSTEOCOLLA.

Est substantia mediâ inter terram & lapidem, alba, fria-
bilis, multis tuberculis exasperata, crustacea, oblonga, ex
basi crassiori in obtusum desinens mucronem, excrescens ex
arenis, aliisque locis lapidosi, saporis nullius evidentis
terrei.

Præter facultates terreis communes obtinet singulare
quid in generando callo, laudatur & in fluore albo & feбри-
bus intermittentibus.

℞. Osteocoll. ʒj. cape ex haustu vini, vel ex aceto ad consolidanda ossa & generandum callum.

℞. Osteocoll. magister carniol. corall alb. Smaragd. ana q v. exhibe ʒj. ex vino sassafr. contra fluorem album.

℞. Osteocoll. ebor. succin. præpar. ana ʒiʒ. conf. anthos f. bolus.

OSTIOCOLLA quasi COLLA OSSIIUM, OSTEOLITHUS, LAPIS SABULOSUS, LAPIS OSSIFRAGUS, Beinleim/ Bruchstein/invenitur multum in Germania, præsertim in eo tractu Rheni, quem die Berg-Strasß appellat.

OLAUS WORMIUS margæ speciem per terræ meatus transcurrentem, & in talem figuram concretam arbitratur. IMPERATUS FERRANDUS autem cênsset Osteocollam esse radicem mutatam in lapidem cæmentitium, mollem substantiæ sabulosæ. For- san, ut LANGIUS docet, circa radicem sabulum aut terra condensatur, hinc semper cavitas intus conspicitur, quatenus diuturnitate temporis frustum illud ligneum absumptum fuit. Ad fracturas applicatur quoque externe, cavendum autem ne abusu superfluous generetur callus; sunt qui ad herniam quoque commendant.

TUTIA.

Est substantia metallica ponderosa, crustacea, corticis instar, intus lævis ex flavo cinerea, extus numerosis exasperata tuberculis, ex cœruleo pallido cinerea, congesta è fuligine æris in fornacibus metallicis cum cadmia liquati & vel fornacibus vel ferreis pistillis, quibus æs agitur adhæret.

In inflammatione oculorum & hæmorrhoidum, ut & in vulneribus curandis & ulceribus siccandis adhibetur, adhibetur externe tantum.

POM.

TUTHIA, NIHIL GRYSEUM, CADMIA BOTRITES, TUTIA ALEXANDRINA, Tutien / Tutie. Saporis est acris & odoris expers. Tutia à mulierculis ad intertriginem infantum ab acrimonia Urinæ ortam usurpatur. Olim ex Alexandria afferebatur, hodie in Germania, Suecia &c excoquitur.

PROSTAT Tutia præparata, præparierte Tutien / Tutie préparée.

POMPHOLYX.

Est pulvis tenuissimus farinaceus albicans, favillæ instar, sublimatus ex cadmia & ære coctis in fornace, saporis nullius evidentis.

Convenit omnimode cum tutia.

℞. Tut. ʒβ. os sep. ʒj. sacch. cand. ʒj. ℥l. alb. ʒj. f. pulv. subtilissimus inspergendus oculis inflammatis, vel add. ▽ plantag. fœnicul. rosar. & fac colyr.

℞. Tut. insperge vulneribus sordidis ad ea mundificanda.

℞. Ung. de tut. ʒj. sacch. ʒni ʒij. ꝯ viv. ʒj. Camph. ʒβ. opii ʒj. ʒo lin. q. s. f. liniment. ad hæmorrhoidum dolorem, intrudendum penicillo convenienti in anum.

Similia medicamenta parantur etiam ex NIHILO ALBO quod est spodium Græcorum. Nam spodium Arabum est ebur ustum.

PUMEX.

CADMIA, CAPNITIS, seu FURNARIA, NIHIL ALBUM, Nil, weiß nichts / Nichts. CALAMINE BLANCHE; Pompholyx & Nihil album ita distinguuntur à quibusdam, ut favilla quæ ex ære resoluta fertur sursum in operculi cavitatem eamque implet Pompholyx dicatur, si vero olla operculo tecta haud fuerit & favilla cum ligno aut cinere in sublime lata parietibus fornacum adhæreat, spodium constituit parum à pompholyge differens, nisi quod

quod non adeo tenuium sit partium. Pro usu ophthalmico frequentius usurpatur quam tutia.

IN OFFICINIS PROSTAT

Unguentum diapompholygos, Augen-Salb/ trocknende Kühl-Salb/ Onguent de Pompholyx. Prodest uceribus calidis, ac iis quos humores acres & salii infestant, refrigerat, siccant & consolidat, nec non cicatricem inducit, absorbet acidum acre & salsum ulcerum putrefactivum. Commendatur ad Epiphoram oculorum.

Unguentum Nihili ad oculos, weiß Nichts, Sälbel/ Onguent de calamine blanche. Calidas oculorum fluxiones demulcet, ac sistit eorundem rubedinem, nec non dolores inde natos aufert.

PUMEX.

Est substantia lapidea levis, porosa, cinerea, nata ex scoriis montium ignivomorum in mare projectis à Eibus erosis & porosis redditus & in littus propulsis, saporis & odoris nullius evidentis.

Ob scabras particulas sordes dentium absumentes ingreditur quoque pulveres dentifricos, ad dealbandos dentes. Nonnulli etiam hunc lapidem præparatum, ut Timæus, ad nimios alvi fluxus sistendos propinant.

℞. Pumic. ʒʒ. Corall. rubr. albor. ana ʒiʒ. alum. ʒj. rad. ir. florent. ʒj. f. pulv. dentifricus, adde olea destill. & ambram pro odore.

℞. Off. sep. C. C. ust. pumic. Corall. r. ana ʒj. Nuc. Mosch. ʒʒ. f. pulv. irroretur tinctura coccinell. vel ipsis in substantia, vel santalo rubro ad colorem rubrum conciliandum, adde mosch. & ambram & si causa simul peccat scorbutica add. ꝑ ammoniac. ʒj vel ꝑ cochlear.

Externe usurpatur in intertrigine, exulceratione cutis & ulceribus manantibus. ℞. Pumic. lap. calamin. ana ʒj. tere in pollinem & insperge.

Eodem

Eodem modo usurpatur SPONGIÆ LAPIS, qui nascitur fruticis instar ex saxis, conchis, aliisque marinis.

Kloepis quasi verrucalis, *Bims* / *Bimsenstein* / *Kragstein* / *Pierre Ponce*.

Hic lapis pumex à spuma quasi spumex dictus effoditur quoque è terra, v. gr. apud Confluentiam in Germania.

Laudatur pumex quoque in strumis & scrophulis abigendis, ut & in Lue Venerea curanda. Ad lævigandam cutim & pilos quoque abradendos olim adhibebant. Chartarum & membranarum confectores alique opifices hoc lapide frequentur utuntur.

LAPIS SPONGIÆ à porositate substantiæ ita dictus vocatur quoque SPONGITES, CYSTEOLITHOS, *Schwamm-Stein* / *PIERRE D'EPONGE*.

Est lapis porosus, friabilis, ex cinereo fuscus, odoris nullius, saporis arenosi & quodammodo salis, invenitur quoque ejusmodi concretum lapidosum in ipsis spongiis. Commendatur imprimis ad strumas. Quidam etiam ad calculum laudant.

MINERALIA PARTICULIS TERREIS CUM ALCALI CONSTANTIA.

CORALLIA RUBRA, ET ALBA.

Rubrum, est substantia lapidea ramosi fruticis instar excreta rubicunda, per longitudinem exiguis striis donata, nata in scopulis, lignis conchis aliisque submarinis.

Album est substantia levis porosa, ac cortice suo quo tegitur molliculo ferrugineo liberata &c.

Nigrum frequenter in China reperitur.

Corallia semen non habent, quod enim intra poros coral-

coralliorum albidum & viscosum reperitur, aqua potius marina est.

Falsum est Corallia sub aquis esse mollia, induere durtiem ab aëre, erroris causa hæc videtur, teguntur cortice molli poroso, qui ad tactum facile cedit, imo ab ipsis aliquando tempestatibus discutitur, sed rejecto cortice contrarium videmus.

Utrumque in terra, acida absorbente, paucum alcali includit respectu Oculorum ☿i; laudatur in sistendo vomitu, fame canina, fluxu alvi, in sistendis mensibus, palpitatione cordis, febribus &c.

℞ Corall. 3j. ☉ absynth. 3℔. succ. limon. 3ij. ∇ Cinam. 3ij. f. potio ad Vomitum sistendum, add L. O. gr. j.

℞ Corall 3j. Crystall. præpar. 3℔. C. C. ust. 3℔. L. O. gr. j. f. pulv. divid. in ij. doses ad cardialgiam.

℞ Corall. præpar. 3j. sal. ammoniac. 3℔. o. junip. gt. ij. L. O. gr. j. f. pulv. antifebrilis.

Tinctura Corallorum à nonnullis sequenti modo paratur. ℞ Corallor. in pollin. subtiliss. tritor. q. pl. affunde o. thereb. junip. vel butyr. relinque in digestionem, sic omnis rubedo extrahitur ex coralliis, decantant menstruum, & huic affundunt rum vini, qui omnem tincturam in se suscipit, sed objiciunt tincturam hanc etiam ab his mensuris posse provenire, quod ut eluderem sequenti processu modo: Recepi butyrum non salitum, huic toties affudi rum vini, quousque butyrum orbatum omni colore, butyrum affudi coralliis, atque sic omnem extraxit rubedinem, quam in se deinde recepit omnem affusum alcohol vini & sic veram obtinui tincturam corallorum.

Κοράλλιον, CORALLUM, quasi maris filia aut puella, λίθον δένδρον, quasi arbor lapidea, Corallen / CORAIL.

Coralla plurimi recentiorum cum TOURNEFORTIO ad vegetabilia referunt, dicentes esse plantam, natam in fundo maris, foliis carentem, cujus quidem nec flos neque semen sit cognitum, rupibus &c. affixam aliqualem radicem, cortice vestitam & in ramos divisam. Extremitates horum ramorum molles esse perhibent, parvorum globulorum seu ribium ad instar rotundas, in sex cellulas divisas, repletasque humore albicante, crasso, acri adstringente. Hos globulos autem capsulas seminales esse putant, asserentes succum quem fundunt, producere plantas corallorum in omni corpore, cui illabitur, unde cum conchas, tum ollas in mare dejectas, tum crania demortuorum in mare conjectorum coralliis exornata cernere est. Ipse possideo egregiam concham turbinatam substantia non solum corallina totam obductam, sed & ramo exinde enascente egregie præditam. Notant porro de cortice, quod is sit lubricus fere oleosus seu crusta quasi tartarea, rubicundi in coralliis rubris, in albis vero candicantis coloris, & ob hujus corticis lubricitatem plantam sub mari totam mollem, postmodum demum in aëre indurescere sed falso creditum fuisse. Huic vero sententiæ alii acriter se opponunt, probareque conantur, Corallia non ad regnum vegetabile, sed ad minerale & quidem ad lapides pertinere, quia carent radice & per contiguitatem adhærent corporibus, quibus insident, nullum adesse semen, carere foliis & cortice, flores & fructus Corallorum, quos Massilienses Pharmacopœi vendunt, tantum extremitates esse hujus concreti subrotundas, & tandem innasce non tantum lignis, verum etiam aliis solidis corporibus, è quibus nutrimentum acquirere non possunt. Rationes hasce allegat LANGIUS ex BOCCONE; interim nondum hæ objectiones adeo confirmatæ sunt, ut Corallia è numero plantarum omnimodo debeant proscribi. Reperiuntur Corallia variis in maribus, imprimis etiam Mari Mediterraneo ad littora Provinciæ, Massiliam, item ad Siciliæ oras, & copiosissime in fundo Maris rubri, ita ut, referente ERTMÜLLERO, in ejus fundo tantæ sylvæ corallorum reperiantur, ut ne piscibus quidem aditum concedant.

Dantur quidem plures species Corallorum, nigrum egregie
 1 2
 quan-

quandoque resplendens, quale frustum elegans inter curiosiora mea asservo, rubrum extus intus vero nigrum, imprimis tamen in usum Medicum trahuntur **CORALLIA RUBRA**, rothe Corallen/ **CORAIL ROUGE**, & **CORALLIA ALBA**, weisse Corallen/ **CORAIL BLANC**. Corallia acida in primis præsertim viis occurrentia absorbent, conducunt in soda, ructibus acidis, malo Hypochondriaco, aliisque affectibus chronicis, torminibusque & motibus epilepticis infantum. In fluxibus quoque sanguineis, gonorrhœa &c. profunt. Coralliis porro imprimis rubris virtutes cordiales atque cephalicæ, ob nescio quod sulphur generosum ibidem inexistens, tanquam summe Arcanum remedium, attribuuntur. Externe quoque contra incantationes fascinationes atque terricula-menta a superstitionis celebrantur. Quem in finem etiam in collo & brachiis gestantur, ubi tamen magis ornatus gratia inser-
viunt.

IN PHARMACOPOLIIS PROSTANT

Corallia alba præparata, præparirte weisse Corallen/ Corail blanc préparé.

Corallia rubra præparata, præparirte rothe Corallen/ Corail rouge préparé. Dantur ad ʒß. & ultra.

Solutio five Sal Corallorum, solvirte Corallen/ solution de Corail. Dosis ad grana quinque ad ʒj. &c.

Magisterium Corallorum, Magistere de Corail. Magnæ his præparationibus adscribuntur confortandi quidem virtutes, ast quales exinde expectandæ, saniores facile perspiciunt.

*Syrupus Coralliorum, Corallen-Syrup/ Syrop de Corail. Syru-
po huic acidulo vires adscribuntur cordiales, hepaticæ & adstrin-
gentes, ita ut etiam in fluxu hepatico & dysenterico commende-
tur. Laudatur quoque ad præcavendum abortum. Datur ad un-
ciam unam usque per se, vel miscetur cum aliis.*

*Tinctura Corallorum, Corallen-Tinctur/ Teinture de Corail. Revera est pomum Eridos inter Medicos & Chymicos, dum alii istam summis extollunt laudibus, alii vero eam vix non omni-
modo rejiciunt. Minime quippe conveniunt, quale nam men-
struum assumi debeat, alii spiritum fuliginis, spiritum roris Maja-
lis, spiritum panis, spiritum lignorum, alii spiritum Mellis, spiri-
tum*

tum Nitri dulcem &c. pro dissolutione corallorum recipiunt, ex quibus deinde rursus coagulatis cum alcohol vini extrahunt tincturam. Nec authoris nostri cum butyro facta extractio pluris facienda videtur. Interim has Tincturas miris laudibus extollunt; mundificare enim sanguinem, obstructions viscerum referare, cordis palpitationi, syncopæ, melancholiæ, hydropi calculo & vix non omnibus morbis mederi, vires confortare, longævitatē & ipsam quasi immortalitatem conciliare, venditant. Sed sicuti hæc virtutes satis hyperbolicæ sunt, ita quoque maxime dubium est, an verum corallorum sulphur possit extrahi, nam licet corallia rubra colorem suum in certis rebus deponant, eundem nihilominus mox recipiunt, modo immergantur urinæ animalium aut sepe- liantur in ovili.

UNICORNU FOSSILE.

Est substantia media inter terram & lapidem, exustis ossibus similis, cortice exteriori duro, flavescente aut subcinereo vel nigricante, medulla molli alba friabili, linguæ firmiter adhærente, saporis adstringentis & exsiccantis.

Convenit cum coralliis, specialiter laudatur in variolis & morbillis cum fluxu alvi, præscribitur ut corallia.

℞ Unicorn. fossil. ʒj. C. C. ʒij. terr. sigill. ʒß. f. pulv. polychrestus diaphoreticus conveniens in malignis, add. Θ C. C. it. camphor. vel L. O.

℞ Unicorn. fossil. certic. ovor. ana ʒj. elæosacch. cortic. aurant. f. pulv. ad fluxum mensium.

BO.

CORNU FOSSILE, EBUR FOSSILE, CERATITES, germanen Einhorn / UNICORNE MINERAL.

De hujus natura adhuc dum litigant authores. Sunt, qui statuant esse concretum terreum, seu margam quandam à succo quodam

dam salino in substantiam osseam mutatam. Alii vero dicunt esse dentes aut ossa animantium marga obducta, vel in lapideam substantiam per longitudinem temporis, dum à diluvio usque originem hujus unicornu deducunt, mutata. Et certe quod attinet hanc ultimam sententiam, adeo non videtur esse ridenda, cum detur ejusmodi cornu aut ebor fossile, cujus una pars manifeste est petrificata, altera vero continua cornea, ita ut exinde Gelatina potuerit excoqui; cujus rei fidem instituta quoque experimenta faciunt. Generosissimus maximeque strenuus Eques DN. JACOBUS SAMSON de RATHSAMHAUSEN ab Ehenweyer DN. in Nonnenweyer Musarum amantissimus & magnus literatorum Mæcenas in curiosissimo suo Museo asservat Ebur fossile sive Dentem elephantinum petræfactum superiori anno in Rheno prope Nonnevillam suæ jurisdictioni subjectam repertum. Longitudo ejus in curvitate est. 3. pedum Regionum cum $3\frac{1}{2}$ poll: circumferentia in extremitate crassiore ped. circiter. 1. in parte vero angustiore versus cuspidem, qui non adest, $8\frac{1}{4}$ poll: existit. Cavitas interna tota repleta est marga, ut & quoad partem, externa, substantia partim fere lapidea partim vero & quoad maximam partem ossea existit, quæ dum raditur vel accenditur Ebur ordinarium spirat, & decocta, aquam lentore & Gelatina inficit. Idem expertus est in alio pulcherrimo frusto, curiosissimus & experientissimus Medicus DN. MAUGUE, Regis Galliæ Consiliarius & omnium Nosocomiorum Regionum per Alsatiam Inspector. Invenitur Unicornu fossile variis Europæ in locis, sylva Hercynia, Saxonia, Moravia & imprimis etiam in Ducatu Würtembergico, prope Canstadium, ubi variis quoque figuris maculatum è terra eruitur.

Ratione virtutis convenit partim cum aliis ossibus, partim cum aliis terreis absorbentibus. Datur ad ʒj. & ultra.

BOLUS ARMENA: VULGARIS: ALBA.

Bolus Armena est substantia terrea ex flavo pallide rubicunda, ponderosa, pinguis, facile friabilis, ex terræ fodinis effossa, saporis adstringentis & pinguis.

Vulga-

Vulgaris est substantia terrea rubicunda &c. saporis terrei & adstringentis.

His accedit alba, differt tantum colore.

Optima vero Armena, cujus terræ pinguedo cum paucō sale volatili, ſtialibus accedit, hinc sudorem movet, & simul adstringit, & contra eosdem affectus, ad quos corallia, exhibetur.

℞. Bol. armen. diascord. Fracast. ana ʒj. fyr. Card. bened. q. s. f. f. bolus in malignis.

℞. Bol. armen. ʒj. conserv. rosar. q. s. f. f. bolus contra sputum sanguinis.

℞. Bol. armen. acet. dest. q. s. f. f. catapl. applicandum fronti, ad sistendas hæmorrhagias.

℞. Bol. armen. Cret. alb. Croc. ſt. ana f. pulv. ad intertriginem.

TER-

BOLUS ARMENA, à loco natali Armenischer Bolus / Bol d'ARMENIE.

Referunt duas ejus dari species, alteram glebosam non signatam aut in formam artificiosam redactam, alteram in massam oblongam quadratam, cui sigilla duo Turcica sunt impressa, redactam, quam ultimam etiam quidam pro vera terra Lemnia habent,

PROSTAT

Bolus Armena preparata, præparirter Armenischer Bolus / Bol d'Armenie préparé, Exhibetur ad ʒj. ʒij.

Bolus vulgaris rubra & alba, rother und weisser Bolus / Bol rouge & blanc; non tam in usum Medicum cedit, quam potius pro intermedio in destillatione spirituum acidorum inservit.

TER-

TERRA LEMNIA ET SIGILLATA.

Est substantia argillacea sebacea, pinguis, ex flavo rubescens, eruta ex terræ visceribus in insula Lemno & in plantulas coacta, saporis pinguis & adstringentis.

Terra sigillata est substantia argillacea sebacea &c. cujus variæ dantur species.

Cum bolo symbolizant, qua tamen sunt pinguiore & præstantiores.

℞. Terr. sigill. troch d. charab. ana 3^{ss}. Corall. r. ʒj. L. O. gr. ij. f. pulv. vel cum conserv. ros. bolus.

℞. Terr. sigill. ʒj. L. O. gr ij. ʒo cinam. gt. j. miv. cydon. q. f. f. bolus ad vomitum nimium.

℞. Terr. sigill. affund. — Oli & Otri donec in pulvem abeat, sicca, & post repone in cellam ut abeat in liquorem, qui liquor stipticus appellatur, hujus cape ʒj. vel per se vel ex syrupo cydoniorum, ad omnem hæmorrhagiam & fluores, utere quoque externe ad hæmorrhagias.

BLUM.

TERRA LEMNIA à loco natali, insula Lemno, quæ hodie Stalimene, Lemnische Erd/ **TERRE LEMNIA.**

Rarior paulo hæc est terra quoniam semel tantum in anno, & quidem summa cum circumspectione foditur. Olim signum Capræ erat impressum, hodie sigilla aut literæ Turcicæ sunt impressæ.

TERRA SIGILLATA ita à sigillo impresso dicta, gesiegelte Erd/ **TERRE SCELLE'E.** Diversis in locis Germaniæ reperitur diversoque colore prædita est. Imprimis autem duplex in usum Medicum trahitur, **STRIGENSIS** altera flava, pinguis, lubrica, viscosa, saponi similis & butyri fere instar in aqua diffluens, perfusa

par-

particulis ramosis aureis, unde & axungia Solis vocatur; Altera LIGNICENSIS ob colorem candicantem Axungia Lunæ dicta. Datur & RUBRA. Virtute fere coincidunt, & dum creduntur vi alexipharmaca pollere in variolis, morbillis & febribus exanthematicis, à mulierculis semper decoctis pro potu immiscentur.

PLUMBUM.

Est substantia metallica solida, flexibilis tamen, ex certa minera in furnis fusa, & per canales in proxima vasa effusa. Utimur tantum ejus præparatis.

LITHAR.

Μόλυβδος, PLUMBUM NIGRUM ad differentiam stanni, quod quidam plumbum album vocant, Chymicis SATURNUS audit, Bley/ PLOMB.

Est metallum ponderosum, molle flexile malleabile, ad ignem facile fusile, colorem nigricantem præ se ferens, sonum nullum edens, omnia metalla præter aurum & argentum absorbens. Est vel nativum vel excoctum ex mineris plumbariis, ex Galena v. gr. seu Molybdæna, quæ est vena plumbi juxta argenti venas reperiunda coloris diversi nunc, aut flavi &c. Ubi notandum quod MOLYBDÆNÆ nomine etiam veniat PLUMBUM SCRIPTORIUM, Das Wasser-Bley oder Meiß-Bley/ CRAYON, quod est lapis multo lævior ac friabilior plumbi minera, quod crudum Itali à Germanis petunt, illudque expolientes denuo remittunt referente HOFFMANNO IN CLAVE AD SCHROEDERUM.

Qui mineras plumbi tractant, doloribus colicis convulsivis & artuum paralyfibus non raro sunt obnoxii.

Plumbum spleni à quibusdam dicatur. Refrigerat, adstringit, incrassat, libidinem reprimit, ulcera carnibus implet, cicatrice obducit, excrescentiisque liberat, in ulceribus cancris, in ambustionibus, inflammationibus erysipelaceis convenire perhibetur. Internus autem plumbi usus rarus aut nullus debet esse, remedia enim saturnina non adeo tuta esse experientia comprobavit. Quoad
usum

usum externum autem optime usurpatur, ita ut non immerito à PARACELSO, quarta Chyrurgiæ columna vocetur, absorbendo enim acidum vulnerum ulcerumque egregiam navat operam.

OFFICINÆ ASSERVANT

Plumbum ustum, & lotum, gebrandt Bley/ Plomb brulé, exsiccat, immiscetur emplastris & unguentis.

Emplastrum è plumbo sive saturninum, Bley = Pflaster / Emplatre saturnin. Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes tumores, vulnera & ulcera maligna foetida & corrodentia, ut & tumores cancrum imitantes.

LITHARGYRIUM AURI.
ARGENTI.

Auri est substantia metallica, modo in glebas modo in pulverem redacta, ex fulvo splendescens, cum splendescen-
tibus quibusdam aureis micis, cocta in fornacibus ex Hno , dum \odot eo purificatur, imo etiam argentum, dum diutius tractatur in igne.

Argenti est substantia metallica ponderosa, cinerea, cum micis Dteis , cocta ex Hno dum D eo purificatur.

Usurpatur externe ad exsiccanda ulcera it. in intertrigine, inflammatione.

\mathcal{R} . Litharg. \triangle tragacanth. ana $3j$. $\circ\circ$ rosat. q. s. cum tantillo aceti f. liniment. ad anum exulceratam.

\mathcal{R} . Litharg. ceruss. sacch. Hni ana q. v. affund. acet. c. ∇ solani & tantillo rosar. f. lavamentum, applica inflammationibus, adde his pulveribus aliquid therebinthinæ cum vitello ovi subactæ, inde vulneribus.

In officinis habetur emplastrum tetrapharmacum, quod ulceribus manantibus, & tumoribus maturandis imponitur.

LITHARGYRIUM, λιθαργύριον, Silberglett / Goldglett / LITHARGE d'OR ou d'ARGENT.

Lithargyrium humores falsos imbibit, refrigerat & adstringit. Sunt qui pro usu interno commendant, pro calore hectico temperando, item pro scopo antaphrodisiaco sed sicuti omnia saturnina intus adhibita ita & Lithargyrium noxas insignes, colicas, pareses, post se trahit, teste tristi experientia, quæ superiori seculo sub finem in Ducatu Würtembergico cum vinis acidioribus, sed Lithargyrio dulcificatis, accidit.

IN OFFICINIS INVENIUNTUR

Emplastrum Divinum, Emplatre Divin ou Manus Dei. Nomen à virtutibus obtinet. Detergit, mundificat, emollit, resolvit & simul roborat atque ad cicatricem perducit. Adhibetur fere in omnibus vulneribus & ulceribus, tumoribus atque contusionibus.

Emplastrum Tripharmacum, Emplastrum de Lithargyrio, brauner Zug / Emplatre de trois ingrediens ou Tripharmacum. Siccatur potentissime ulcera difficilia & fistulas, quæ nondum callum contraxerunt, curat, detergit præterea, sanguinem sistit, & vulnera glutinat.

Unguentum de Lithargyrio, Silberglett-Salbel / Onguent de Litharge. Prodest scabiei & cutis vulneribus, pruritus & desquamata juvat, & siccatur sine morfu, sarcoticum est & epuloticum difficiliaque ulcera persanatur, & cruenta glutinat.

CERUSSA.

Est substantia alba condensata, friabilis, ponderosa, ex plumbi lamellis supra acetum suspensis & erosis, in glebas coacta.

Convenit cum Lithargyrio & usui externo tantum dicitur.

℞ Ceruss ʒij. ʒo rosac. q. s. f. unguent. applica hæmorrhoidibus inflammatis.

Nota de omnibus Herniis, quod specifica sint in omnibus herniis & rupturis, maxime à peritonæo relaxato, ubi coquantur in ∇ simplici vel \circ therebinthinæ.

Κεράσσα, Bleyweiß / CERUSSE.

Convenit etiam in cancro, gangræna incipiente & imprimis combustionibus. Pro cosmetico quoque usurpatur, ast cutim rugosam nigricantemque reddit, aliaque inducit symptomata.

IN OFFICINIS PROSTANT

Emplastrum album coctum, Emplastrum de Cerussa, Bleyweiß Plaster / Emplatre de Ceruse. In intertriginibus quacunque ex causa succurrit, & leves cutis exulcerationes sanat, ulceribus quoque sordidis dicatum est, quia valide exsiccat & refrigerat, cicatricem inducit, conducit quoque ad vulnera recentia leviora facile consolidanda.

Unguentum album coctum simplex, sive Unguentum de Cerussa, Bleyweiß Salbel / Onguent blanc simple, commendatur ad ambusta, erysipelata scabiem & cutis vitia, à farsedine enata, ad pruriginis & pustularum eruptiones, acrem serpiginem & intemperiem ulcerum, ut loquuntur, calidam.

Unguentum album Camphoratum, de quo jam sub Camphora.

MINIUM.

Est pulvis rubicundus ponderosus, factus ex Hno igne reverberatorio & continua agitatione in rubicundum calcem ustulatus, cujus pondus augetur, si perite tractetur; ex libris enim xi Hni obtinentur Minii libræ xij.

Cerussæ respondet & ad ulcera gallica & ambusta it. lentigines & lichenes usurpatur.

\mathcal{R} . Minii, \mathcal{q} præcipitat. ana ziii . \circ commun. zj . Cerussæ ana ss . M. f. emplastrum in tumoribus & ulceribus gallicis.

\mathcal{R} . Empl.

℞ Empl. d. min. ʒj. sacch. ʒni ʒj. ʒo fosac. q. s. f. em-
plastr. refrigerans in ardore & aliis malis.

MINIUM à Mina, quoniam è plumbo ex minis extracto pa-
ratur, SANDIX, Menning/ MINE DE PLOMB.

PROSTAT

Emplastrum de Minio, Menning-Pflaster / Emplatre de Minio.
Vulnera & ulcera etiam antiqua atque maligna curat, desiccant & ad
cicatricem perducit.

*Emplastrum Norimbergense, Nuremberger Pflaster / Emplatre de
Nuremberg,* resolvit & siccant & ad cicatricem perducit, roborat
quoque nervos.

*Unguentum de Minio camphoratum, Menning Salb mit Campf-
fer / Onguent de Minium Camphré.* Refrigerat & siccant potentissime,
ideoque ad ulcera, quæ humorum acrimonia serpunt, conducit.
Inflammationem quoque tollit & præcavet.

SACCHARUM SATURNI.

Nihil aliud est quam Θ aceti in naturam subdulcem
conversum, fit ex omnibus præparatis ʒninis, destillatum
fundit spiritum ardentem, non acidum, caput mortuum
fusum redit in ʒnum, cum quo eadem principia habet.
Interne datur à ʒj ad ʒʒ.

℞. Sacch. ʒni ʒj. Ocul. ʒ ʒʒ, ʒo d. caryoph. g. j. M. f.
pulv. optimus in febribus.

In ardore urinæ. ℞. Sacch. ʒni ʒʒ. Nuc. Mosch. gr.
xv. Ocul. ʒ. mandib. luc. pisc. ʒj. M.

FER-

SAL SATURNI, Bley-Zucker/ SUCRE OU SEL DE SA-
TURNI.

Est substantia salina, albicans, dulcis cum aliquali austeritate conjuncti saporis; interne, licet inter remedia splenetica antihypochondriaca & antaphrodisiaca &c. referatur, caute tamen sub dosi granorum duorum, sex, &c. & rarissime debet exhiberi. Externe laudatur ad libidinem arcendam, imprimis vero in ulceribus corrosivis, malignis, cancris, impetiginibus, ambustis atque inflammationibus; ut & in doloribus hæmorrhoidum. Confert quoque in inflammationibus & rubedine oculorum.

IN PHARMACOPOLIS EXTAT

Tinctura Antiphthisica, Tinctur für die Schwindfüchtigen / Teinture contre la Phthisie. Vires ejus sunt serum refrænare, & leni adstrictione distillationem ejusdem, quæ fit per sudores, inhibere, hinc laudatur in hectica & phthisi ut & in gonorrhœa, commendatur in hæmoptysi, ad pulmones consolidandos, nimium mensium fluxum, pollutionem nocturnam, ulcera renum &c. Dosis guttæ decem ad triginta & ultra, caute tamen propinetur, præsertim si ventriculus jam sit debilis.

Ex solutione plumbi, qua mediante literæ invisibiles pinguntur, quæ ad calorem aut mediante liquore ex calce viva & Lithargyrio parato conspicuæ redduntur, præcipitatur quoque

Magisterium Saturni, Magistere de Saturne, quod cosmeticum est, sed noxium.

FERRUM ET CHALYBS.

Chalybs est ferro compactior & solidior factus ex ferro sæpius candefacto & in ∇ extincto. Ferrum ob substantiam minus solidam frequentius datur. Gaudet terra metallica, acida propterea absorbente & sale alcalico acida destruyente, hincque utroque nomine obstructions referat, & inde ortos morbos præcipue chronicos curat.

Datur pro scopo aperiente tum in substantia, tum in infuso. Crudum & in subtilissimum pollinem redactum, præfertur omnibus cæteris præparatis, nam cum aceto si præ-

præparatur, eo tam copiose saturatur, ut tantum adstri-
ctoriam habeat virtutem.

℞. Ferr. candefact. extingue aliquoties in vino Malva-
tico vel alio generoso f. vinum chalybeatum.

℞. Limat. ferri recenter facti ʒj. Zedoar. ʒvj. Vin. Hi-
span. q. s. f. infusum in morbis chronicis, præcipue in hy-
drope imminente.

℞. Limat. ferri ʒj. caryoph. arom. gr. v. conf. flor.
anth. syr. d. cinam. f. electuarium deobstruens in morbis
chronicis.

℞. Limat. ferri ʒj. resin. jalap gr. x. ☉ ☿ ʒss. ʒo d. ca-
ryoph. gr. ij. troch. alhand. gr. iij. f. pulv. purgans acida.

Si excrementa non tingantur ex ferri usu nigredine,
non facile continuandum, remanet enim in Ventri-
culo.

C R O.

FERRUM, vel quasi ferum, vel a feriendo; σιδηρον, Chymicis
MARS, Eisen/ FER.

Est Metallum durissimum, ignibile, difficulter tamen liquabile,
malleabile, sonorum quodammodo, colorem diversum præ se fe-
rens, livida enim albedinis est in aperto, in obscuro rubet, facillime
rubiginem contrahens, Magneti singulari familiaritate junctum, &
mediante hoc ad alterum terræ polum converti aptum.

Invenitur ferrum in terræ fodinis quandoque purum, granorum
vel massæ instar, gediegen Eisen/ alias plerumque excoquitur aut ex
lapidibus ferreis, aut ex terra rubra ferrugine quasi læsa aut impræ-
gnata, aut ex aliis ferri mineris. Reperitur fere ubique locorum
maxima ubertate ita, ut vix in orbe regio inveniatur, ubi id non pro-
stet. Convenit cum ferro CHALYBS der Stahl/ ACIER, nul-
lum enim essentielle inter utrumque sed accidentale tantum est dis-
crimen. Hodie maximam partem est artificialis, a ferro variis mo-
dis indurato paratus, Ad usum Medicum præfertur ferrum, de cu-
jus

ius vi acida absorbente non dubitant authores, sed plures tamen desiderarent demonstrationem salis alcalini. Potest corpus aliquod esse summe alcalinum, sed propterea tamen non est salinum. Martem per se adstringere, per accidens autem aperire dicunt. Optimum Melancholiæ & mali Hypochondriaci est alexipharmacum, In mensium negotio Cachexia, Chlorosi, multum valet. In usu medicamentorum Martialium notandum, corpus post assumptionem bene esse movendum, & omnia vitanda esse acida. Non tantum autem secedunt faeces nigricantes, sed & ructus nidorosi assurgunt. Nimius Martialium usus nocet, id quod in proprio corpore docuisse fertur DRAWITZIUS, in quo ob abusum venæ & arteriæ omnes rubigine quasi obsitæ repertæ fuerunt. Fides sit penes auctores.

IN OFFICINIS EX MARTE PROSTANT

Extractum Martis cum succo pomorum, Eisen-Extract mit Aepffel-Cafft/ Extrait de Mars avec le jus de Pommes. Datur ad grana quindecim triginta &c. pro scopo aperiendi, & obstructions reserandi; inservit præprimis in passionibus hystericis & hypochondriacis.

Electuarium Chalybeatum, Stahl-Sattweg/ Electuaire ou Opiate Chalybé. Laudatur in hepatis obstructione & albo virginum ictero mensibusque suppressis. Dosis ad ʒj. ad ʒij. &c.

Pilulæ Martiales Sydenhamii, Stahl-Pillen/ Pilules Martiales de Sydenham. In cachexia & mensium præprimis suppressione dantur ad grana duodecim, viginti & ultra, superbibendo vehiculum & motum instituendo.

Vitriolum Martis, Crystallisirtes Vitriol von Eisen/ Vitriol de Mars. Famosum est ad obstructions viscerum reserandas vermesque necandos remedium; in humorum effervescentiis & calidioribus viscerum & sanguinis dyscrasiis corrigendis, fibris laxis reserandis, & constringendis egregie prodest. Dosis ad grana quatuor, decem &c.

Tinctura Martis aperitiva Tartarifata, Stahl-Tinctur mit Wein-Stein/ Teinture de Mars Tartarifée. Vires ex nomine patent, datur ad drachmam & ultra.

Tinctura Martis cum succo pomorum, Stahl-Tinctur mit Aepffel-Cafft/ Teinture de Mars avec le jus des pommes, celebratur aperiens, crassos

crassos & fœculentos humores massæ sanguineæ admistos, serosos etiam & acres humores scorbuticos resolvens. Dosis ad ʒj. ʒij.

Tinctura Martis helleborata Wedelii, de qua sub Helleboro.

Tinctura Vitrioli Martis Ludovici, *Stahl-Tinctur von Eisen-Vitriol* / *Teinture de Vitriol de Mars aperitive de Ludovici*. In quibusvis morbis ab obstructione oriundis, in cachexia, mensium suppressione, in ictero, Hydrope &c. commendatur, ipsis quoque infantibus non absque successu abhibenda. Dosis ad ʒj. ad ʒj.

Tinctura Vitrioli Martis Zwelfferi, *Zwelffers Stahl-Tinctur von Vitriol* / *Teinture de Vitriol de Mars aperitive de Zwelffer*. Efficax est in obstructionibus hypochondriorum, Mesenterii, pancreatis, mensibusque reserandis, confortat hepar & reliqua viscera, morbo virgineo & cachexiæ medetur. Dosis ad guttas decem ad ʒj. ʒij. &c. in vehiculo, quamvis observatum fuerit, quod ultra drachmam semis exhibita quandoque vomitum moveat.

CROCUS MARTIS.

Est pulvis ex flavo nigricans, factus ex ferro vel per calcinationem vel solutionem per acida, saporis adstringentis. Est vel aperiens vel adstringens. Aperiens fit quando lamina aut limatura ferri madefacta exponitur aëri vel rori, aut aqua conspergitur, ut rodatur in calcem. Adstringens fit affuso in acido, uterque constat terra metallica purissima & proprio alcalico aperiente, quod tamen potentius in aperiente, uterque in recessu relinquit vim adstrictoriam.

LAPIS

CROCUS MARTIS APERITIVUS, eröffnendes Stahl-Pulver / SAFFRAN DE MARS APERITIF, quo simplicius & absque acido est paratus, eo melior.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS, anhaltendes Stahl-Pulver / SAFFRAN DE MARS ADSTRINGENT. Datur ad grana quindecim ad drachmam. Præterea prostat.

CROCUS MARTIS CUM SULPHURE ET NITRO PRÆPARATUS sive PULVIS CACHECTICUS, Stahl Pulver mit Salpeter und Salpêtre

præparirt / SAFFRAN DE MARS CALCINE' avec du SOUFFRE ET DU SALPETRE. Datur ad ℥ij. 3j. infunditur quoque cum vino, quod in hydropē laudatur.

LAPIS HÆMATITES.

Est substantia metallica mediæ consistentiæ inter lapidem & terram, ponderosa, rubicunda ex striis vel lamellis sibi invicem incumbētib; compacta, eruta ex terræ fodinis ferro gravidis, saporis adstringentis.

Differt à superioribus quod substantia sit magis porosa, subtilior & magis convincibilis in ventriculo. In specie contra hæmorrhagias laudatur tam interne quam externe.

℞. Lap. hæmat. 3℔. Corall. 3ij. sacch. ʒni 3ij. L. O. ʒ℔. f. pulvis ad 9 vel 0. doses in hæmorrhagiis.

℞. Lap. hæmat. sacch. ʒni liq. terr. sigillatæ M. applica hæmorrhagiis externis.

Optimum Hermanni remedium in hæmorrhagiis fuit sequens: ℞. Lap. hæmat. 3j. ʒl. alb. ʒ℔. phlegm. ʒli q. s. excipe stuppis & formetur turunda: In narium hæmorrhagia sufficit ʒl. ad gr. ij. sumtum.

HÆMATITES dictus à colore, aut a virtute, Blut-Stein / PIERRE SANGUINE OU HÆMATITE; pro usu interno *præparatus*, *præparirt* Blutstein / PIERRE HEMATITE PRÆPARÉE, datur ad ℥j ℥jv.

Externe potius ob frigus quam ob vim magneticam hæmorrhagiam sistit.

MAGNES.

Est substantia lapidea ad metallicam accedens, ferruginea, polos mundi ostendens, effossa ex variis terræ minis ferro gravidis.

Ferrum virtute æmulatur & in substantia ad 3℔ in omnibus

bus morbis chronicis ab obstructione pendentibus exhibetur.

℞. Magn. 3j. ꝯr. Olat. gr. vij. ꝰ cinam. gt. j. sacch. cand. q. v. f. pulv. deobstruens in morbis chronicis.

℞. Crem. ꝯri. ʒβ. Magn. 3j. ꝰ fraxin gr xv. sacch. cand. 3j. f. pulv. aperitivus & diureticus in omnibus morbis chronicis & incipiente hydrope.

MAGNES à Magnesia Lybiæ provincia, ubi olim copiose reperiēbatur. LAPIS SIDERITIS, LAPIS NAUTICUS, Magnet-Stein/ AYMANT, PIERRE d'AIMANT. Reperitur in Germania, Suecia, Norwegia. De virtutibus ejus ad polos se convertendi & ferrum attrahendi agunt Physici. Risum merentur, quia magnete etiam pulverisato talem vim attractricem in Medicina expectant. Vix ab ullo Medicorum in usum trahitur.



SYLLABUS REMEDIORUM, JUXTA PARTES CONSTI- TUTIVAS.

EX REGNO VEGETABILI.

SALE VOLATILI OLEOSO constant. Radices acori vulgaris: Aco-
ri indici. Calamus aromaticus. Zedoaria. Galanga major & minor.
Zinziber. p. 8. ad 19. Cortices aurantiorum. Citri, Cinamomi.
Cassia lignæ & caryophyllatæ. Cortex Winteranus. Guajaci. Cor-
tex Peruvianus spurius. p. 183. ad 203.

SALE VOLATILI DULCEDINE JUNCTA constant. Radices
Imperatoria seu Ostrutii. Angelicæ. Mei. Levistici. Ninzin. p. 20.
ad 33.

SALE VOLATILI OLEOSO AROMATICO, MIXTIS PARTI-
CULIS TERREIS ET SALINIS FIXIS. Radices Valerianæ. Ser-

pentariæ Virginianæ. Costi. Cyperi longi & rotundi. Spicæ nardi. Vincetoxici. Helenii. Iridis Florentinæ. Curcumæ. Petasitidis. Carlinæ. p. 33. ad 56.

SALE AROMATICO BLANDO SEU MITIORE, CUM VIRTUTE DIURETICA APERIENTE ET BLANDE SUDORIFERA. Radices fœniculi. Apii palustris. Petroselini. p. 56. ad 61.

SALE VOLATILI AROMATICO SPIRITUOSO PENETRANTE ET PAUCO ACIDO VOLATILI. Radices armoraciæ seu raphani rustici. Ari. quæ constat sale volatili acerrimo absque oleo. Scillæ. p. 61. ad 69.

SALE VOLATILI ACRI FIXO ABSQUE OLEO. Radix Pyrethri. p. 69. sq.

SALE ACRI ABSQUE OLEO TAM FIXO QUAM VOLATILI. Radices pimpinellæ. Saxifragæ. Graminis. p. 70. ad 75.

SALE BLANDO BALSAMICO. Radices Salsæparillæ. Chinæ. p. 75. ad 77.

SALE VOLATILI BLANDO CUM TENUI VISCOSITATE TEMPERATA. Orchis seu Satyrium. p. 77. ad 80. Boletus cervi. p. 241. ad 243.

SALE BLANDO FIXO, TENUI VISCOSITATI INCLUSO. Radices Scorzonæ. Eryngii. Bardanæ. Cichorii. p. 80. ad 88.

SALE BLANDO DIURETICO. Radices Asparagi Rusci. Ononidis. Rubiæ tinctorum. p. 88. ad 94. Lignum Nephriticum. p. 232. ad 234.

SALE AMARO FIXO. Radices Gentianæ. p. 94. ad 97. Sale fixo amarissimo cortex Chinæ chinæ. p. 203. ad 210.

SALE FIXO CUM PAUCO VOLATILI RESINÆ INCLUSO. Radices Peucedani. Fraxinellæ. Aristolochiæ longæ, rotundæ, fabacæ. Filicis. Osmundæ. p. 97. ad 108.

Radices purgantes SALE VOLATILI GAUDENTES. Asarum. Cyclamen. Hermodactyli. Rhabarbarum. Rhaponticum. p. 108. ad 123.

Radices purgantes SALE FIXO RESINÆ INCLUSO constantes. Giapappa. Mechoacanna. Turbith. p. 123. ad 131. Agaricus. p. 244. ad 246.

Radices SALE FIXO ACRI CONSTANTES & vehementissime purgantes. Cucumis asininus. Esula major & minor. Helleborus niger & albus. Bryonia. p. 131. ad 143.

Radices SALE PURGANTE BLANDO constantes & vulgo laxantes. Ebulus. Polypodium. p. 144. ad 147.

PARTICULIS BLANDE VISCOSIS CUM DULCEDINE constant.

Radices Glycyrrhizæ. Doronici. p. 147. ad 152.

AQUOSIS CRASSIS SEU MUCHILAGINOSIS constant. Radices Althææ. Liliorum alborum. Symphiti seu consolidæ majoris. p. 152. ad 160.

MUCAGINE TENUIORE PAUCIS FIXIS SALINIS. Radices

Tuffilaginis. p. 161. fq.

PARTICULIS TERREIS constant. Radices Alcanæ. Bistortæ. Tormentillæ. Contrayervæ. Caryophyllatæ. Pimpinellæ sanguisorbæ. Pentaphylli. Nymphææ. p. 162. ad 175. Cortices Castaneorum. Granatorum. Quercus. p. 215. ad 221. Santalum rubrum. Viscus quernus.

p. 236. ad 239. Fungus orbicularis seu bovista. p. 246. fq.

TERREIS ET SIMUL MUCAGINOSIS VOLATILIBUS constant. Radices præoniæ. Cynoglossæ. Mandragoræ. p. 176. ad 183.

SALE FIXO DIURETICO. Cortex fraxini. Tamarisci. Capparis. p. 210. ad 215.

SALE OLEOSO AROMATICO. Lignum sassafras. Guajacum & sanctum. Aloës. Agallochum. Santalum citrinum & album. Rhodium. p. 222. ad 232.

SALIBUS FIXIS AMARISSIMIS. Lignum colubrinum. p. 234. ad 236.

SALE PURGANTE TAM FIXO QUAM VOLATILI. Pavana seu lignum Moluccense. p. 239. ad 241.

TERREIS SUBAUSTERIS constat. Auricula judæ seu fungus sambuci. p. 243. fq.

SALE VOLATILI OLEOSO AROMATICO. Cariophylli. Anthophylli. Amomum. Macis. Nux Moschata. Cubebæ. Cardamomum. Piper album, nigrum, longum. Grana Paradisi. Semen Ammios. Anisi, & Anisi Chinenfis. Fœniculi. Levistici. p. 248. ad 277.

SALE VOLATILI AROMATICO CUM BLANDA VISCOSITATE. Semen Anethi. Cumini. Carvi. Baccæ Juniperi. Lauri. Carpobalsamum. Semen Dauci. Sefelios. Sileris. Petroelinii. Apii. Rutæ. Tanaceti. p. 277. ad 297.

SALE AROMATICO BLANDO CONFORTANTE. Grana Kermes. Vainiglia. Semen Coriandri. Nigellæ. p. 297. ad 303.

SALIBUS ACRIBUS FIXIS. Semen Sophiæ Chirurgorum. Thlaspi. Nasturtii. Saxifragiæ. p. 303. ad 306.

SALE VOLATILI ACRI CUM OLEO CRASSO. Semen Sinapi. Napi. Oleris atri. Raphani. p. 306. ad 310.

SALE FIXO AMARO. Semen Fumariæ. Cinæ. Cardui Benedicti. Cardui Mariæ. Bardanæ. Urticæ. p. 311. ad 318.

SALE BLANDO DIURETICO. Semen Alkekengi seu Halicacabi. Genistæ. Milii Solis. Rusci. Asparagi. Coffée. p. 318. ad 327.

SALE PURGANTE ACERRIMO. Semen Mezerei seu Laureolæ. Staphisagriæ. Psyllium habet salem blandum purgantem. p. 327. ad 332.

SALE ACRI PURGANTE TAM VOLATILI QUAM FIXO. Colocynthis seu alhandal. Nux vomica. p. 333. ad 338.

SALE PURGANTE TAM FIXO QUAM VOLATILI OLEO CRASSO INCLUSO. Grana tilli. Ricinus Medius. Ricinus Americanus. Cataputia minor. Semen Cnici seu Carthami. Balanus mirepica seu nuxbeen. Myrobalanorum quinque species. Cassiæ fructus. Tamarindi. Semen Atriplicis. Semen Sambuci. à p. 338. ad 360.

BLANDA VISCOSITATE constant. Semen Gossypii seu bombacis. Hordeum. Semen Cannabis. p. 361. ad 369.

SUBDULCIBUS OLEOSIS ET TEMPERATIS constant. Amygdalæ dulces & amaræ. Pistacia. Nuclei Pini, Cerasorum, Persicorum, Anacardium. Cacao. p. 369. ad 386.

DULCIBUS VISCOSIS constant. Dactyli. Ficus seu Caricæ. Jujubæ seu Ziziphi. Sebesten. Pruna Damascena. Passulæ majores & minores seu Corinthiacæ. Siliqua dulcis seu Ceratonia. p. 387. ad 406.

PARTICULIS AQUOSIS & CRASSIS CUM OLEO PAUCO. Semina quatuor frigida majora & minora. p. 406. ad 417.

PARTICULIS CRASSIS AQUOSIS SEU MUCAGINOSIS ABSQUE OLEO SE TAM SUBITO MANIFESTANTE constant. Semen Althææ; Malvæ. Aquilegiæ. Fœnum Græcum; semen Orobi. Ciceris. Lupini. Fabarum. Lini; Hyperici; (est resinosum.) p. 417. ad 433.

MUCAGINE VOLATILI prædita sunt semen Hyosciami, Pœoniæ, Papaveris. p. 433. ad 438.

TERREIS constant. Gallæ. Glandes. Semen Sumach. Mespilum. Nux Cupressi. Baccæ Myrti. Semen Cydoniorum. (terreas in mucaginosi obtinet) p. 438. ad 448.

PLANTÆ SALE VOLATILI OLEOSO SEU AROMATICO constant. Herbæ Origanum. Majorana. Serpillum. Thymus. Satureja. Melissa. Horminum sclarea dictum. p. 449. ad 461.

PLANTÆ SALE AROMATICO VOLATILI CUM QUIBUSDAM FIXIS CONSTANTES. Rosmarinus. Salvia. Mentha Crispa & Aquatica.

tica. Menthastrum. Nepetha. Calamintha. Pulegium. Eupatorium. Hyssopus. Polium. Dictamnus Creticus. Matricaria seu Parthenium. Artemisia. p. 461. ad 482.

PLANTÆ SALE AROMATICO VOLATILI OLEOSO CUM MULTO FIXO CONSTANTES. Schoenanthus seu Juncus odoratus. Abrotanum mas. Ruta. Sabina. Marrubium seu Prassium. Tanacetum. Absynthium vulgare & Ponticum. p. 482. ad 495.

PLANTÆ SALE AROMATICO CUM PAUCA RESINA constantes. Chamaethys. Botrys. Lauri folia. p. 496. ad 498.

PLANTÆ SALE BLANDO CUM PAUCO VOLATILI CONSTANTES. Agrimonia. Thea. Betonica. Chamædrys. Ribesium. p. 498. ad 512.

PLANTÆ SALE FIXO BLANDO CUM QUIBUSDAM TERREIS CONSTANTES. Veronica. Hedera Terrestris. Pimpinella. Euphrasia. Hypericum. p. 512. ad 518.

PLANTÆ SALE AROMATICO OLEOSO PENETRANTISSIMO CUM ACIDO VOLATILI CONSTANTES. Cochlearia. Nasturtium. p. 518. ad 521.

PLANTÆ SALE VOLATILI ACRI CONSTANTES ABSQUE OLEO VOLATILI. Erythimum. Perlicaria. Cuscuta. Epithymum. p. 521. ad 526.

PLANTÆ SALIBUS FIXIS SEU AMARIS CONSTANTES CUM PAUCO VOLATILI SALE. Centaurium minus. Carduus Benedictus. Fumaria. Scordium. Lupulus. p. 526. ad 534.

PLANTÆ PURGANTES. Senna. Soldanella. Gratiola. Nicotiana. p. 534. ad 545.

PLANTÆ CONSTANTES SALE NITROSO LAXANTE. Mercurialis. Parietaria. Violaria. p. 545. ad 548.

PLANTÆ CONSTANTES PARTICULIS OLEOSIS AQUOSIS CRASSIS. Althæa. Malva. Tussilago. Verbascum. p. 548. ad 552.

PLANTÆ TERREIS CONSTANTES. Equisetum seu Cauda Equina. Mulcus quernus. Pulmonaria. Solidago. Saracenica. seu Virga aurea. Bursa Pastoris. Verbena. Folia quercus. Pyrola. Sanicula. Alchymilla. Pilosella. Polygonum. p. 553. ad 565.

PLANTÆ PARTICULIS TERREIS TEMPERATIS ET BLANDIS VOLATILIBUS CONSTANTES. Herba capillares. Phyllitis seu Lingua Cervina. p. 566. ad 570.

FLORES SALIBUS VOLATILIBUS OLEOSIS AROMATICIS CONSTANTES. Flores Anthos. Lavendulæ. Salviæ. Chamæmeli. Crocus Orientalis. Flores Stœchados. Schœnanthos. Tunicæ. Violarum. Rosarum pallidarum. Tiliæ. Liliū convallium. Primula veris, p. 570. ad 596.

Flores **MUCAGINE TENUI** pollentes. Meliloti. Sambuci. p. 596. ad 599.

Flores **SALE FIXO CUM PAUCIS VOLATILIBUS CONSTANTES.** Cheiri. Calendulæ. p. 599. ad 602.

Flores **AQUEIS CONSTANTES.** Borrago. Buglossa. Cyanus. (aliis terreis, sed toti in mucilaginem abeunt.) p. 602. ad 606.

Flores **MUCAGINE CRASSA CONSTANTES.** Malvæ rosæ seu hortensis. Verbascum. Pæonia. Papaver erraticum. p. 606. ad 610.

Flores **TERREIS CONSTANTES.** Balauſtiorum. Nymphææ. Rosarum rubrarum. p. 610. ad 616.

SALINIS VOLATILIBUS OLEOSIS CUM MUCILAGINOSIS TENUISSIMIS SUBTILIBUS constant. Camphora. Opium. p. 617. ad 630.

Particulis SALINIS VOLATILIBUS OLEOSIS CUM VIRTUTE LAXANDI constant. Ammoniacum. Galbanum. Bdellium. Aſa ſœtida. Sagapenum. p. 630. ad 640.

Refinæ SPISSIORES ET SOLIDIORES ARIDIORES SALE OLEOSO CONSTANTES. Gummi anime & Cancamum. Sandaracha. Mastiche. Thus seu Olibanum. Lacca. Succinum. Elemi. Caranna & Tacamahaca. Benzoe seu Aſa Dulcis. Pix. Styrax Calamita. p. 640. ad 664.

Refinæ LIQUIDÆ SALE VOLATILI OLEOSO - CONSTANTES. Therebintina. Balsamum Peruvianum & Tolutanum nigrum. Balsamum Peruvianum album. Balsamum de Copaiva. Ambra liquida. Opobalsamum. Ladanum. Styrax liquida. p. 664. ad 677.

Refina SALE TAM VOLATILI QUAM FIXO CUM INTENSISSIMA AMARITIE CONSTANS. Myrrha. p. 677. ad 680.

Refinæ GUMMOSÆ ET SUCCI PURGANTES FORTIORES ET MITIORES. Euphorbium. Elaterium. Gutta Gamba. Scammonium. Aloe. Manna. Sarcocolla. Opopanax. p. 680. ad 703.

Succi CONCRETI MUCAGINOSI DULCES. Saccharum. Succus Glycyrrhizæ. Mel. p. 703. ad 713. ad 716.

GUMMOSA AQUOSA CRASSA. Gummi Arabicum. p. 713. Tragacantha. p. 714. ad 716.

Refinæ OLEO CRASSO constantes. Bitumen Judaicum. Colophonium. Cera. p. 716. ad 719.

Resinæ & succi TERREIS constantes. Sanguis Draconis. Terra Japonica seu Catechu. Succus acaciæ. Hypocistidis succus, p. 719. ad 726. Succus SALE SALSO constans, nonnihil laxante. Tartarus albus & ruber p. 726. sqq.

EX REGNO ANIMALI.

Partes Animales SALE VOLATILI OLEOSO MULTIS TERREIS CONSTANTES. Cornu Cervi. Cranium humanum, Ebur, Unicornu verum, Ungula Alcis, Blatta Byzantina, Mandibulæ Lucii piscis, Dens Apri, Os Sepiæ, Oculi Cancri. Sanguis Hirci. Mumia, Margaritæ. Bezoar orientalis & occidentalis. Dentali. Entali. Umbilicus marinus, p. 1. ad 39.

Partes animales SALE VOLATILI OLEOSO CUM ODORE FRAGRANTISSIMO constantes. Moschus. Zibethum. Castoreum, p. 39. ad 48.

Pars animalis SALE VOLATILI CUM MULTA PINGUEDINE constans. Sperma. Ceti p. 49. ad 52.

Animalia SALE VOLATILI BLANDO constantia. Scincus. Lumbrici terrestres p. 52. ad 54.

Animal CAUSTICUM ET ACERRIMUM. Cantharides, p. 55. ad 58.

Partes Animales OLEOSIS CRASSIS constantes. Ichthyocolla, p. 58. sq.

Animal SANGUISUGUM. Hirudines p. 59. sq.

Pars Animalis TERREIS CUM PAUCO SALE VOLATILI constans. Folliculi serici, p. 61.

EX REGNO MINERALI.

Mineralia SALE VOLATILI SALSO constantia. Sal Ammoniacum. Borax. Chrysocolia Crystallina, p. 62. ad 68.

Mineralia SALE FIXO SALSO constantia. Sal commune, Sal. gemmæ, Nitrum, Alumen rupeum & romanum. Alumen plumosum, p. 68. ad 79.

Mineralia SALE SALSO VOLATILI ET CORROSIVO constantia. Calx, viva, Arsenicum album & rubrum. Auripigmentum. Cinabaris factitia & nativa. (nullam habet corrosivitatem) Mercurius sublimatus. Mercurius præcipitatus ruber. Mercurius dulcis. Mercurius viridis. Turbith Minerale, p. 79. ad 92.

Minerale SALE VOLATILI ALCALICIS AFFINI ABSQUE TERRA constans. Mercurius vivus, p. 91. ad 97.

Minerale SALE VOLATILI SULPHUREO CUM TERRA constans. Antimonium crudum, p. 98. ad 103.

Mineralia SALE VOLATILI PURGANTE CUM TERRA ADSTRINGENTE constantia. Lapis Lazuli & Armenus, Vitrum Antimonii, Crocus Metallorum, p. 103. ad 107.

Mineralia SALE ACIDO CUM PAUCO ALCALI constantia. Vitriolum album, Hungaricum & Romanum, Chalcitis. Viride æris, p. 108. ad 113.

INDEX MATERIÆ MEDICÆ.

Antimonium crudum	a 98	vulgaris	a 134
vitrum	a 105	Bombacis semen	361
Apium palustre	58	Borrago	602
semen	295	Botrys	497
Apri dens	a 16	Borax	a 65
Aquilegiæ semen	418	Bovista	246
Arabicum gummi	713	Bryonia	141
Aristolochia & species	100	Buglossa	602
Armenus lapis	a 103	Bursa pastoris	557
Armoracia	62	Cacao fructus	384
Arsenicum album, rubrum	a 82	Calaminaris lapis	a 119
Artemisia	480	Calamintha	471
Arum	63	Calamus aromaticus	12
Asa dulcis	658	Calendula	600
foetida	636	Calx viva	a 79
Asarum	109	Camphora	617
Asparagus radix	88	Cancamum	640
semen	324	Cancrorum oculi	a 19
Asplenium	566	Cannabis semen	367
Atriplex semen	356	Cantharides	a 55
Aurantiorum cortex	183	Capillares herbæ	566
Auricula Judæ	243	Capparis cortex	213
Auripigmentum	a 83	Caranna	656
Aurum foliatum	a 117	Cardamomum	260
Alanus Myrepica	346	Carduus Benedictus herba	528
Balaustiorum flores	610	semen	312
Balsamum de Copaiva	671	Carduus Mariæ	313
Peruvianum	670	Caricæ	393
Tolutanum nigr.	668	Carlina	53
Bardana, radix	84	Carpobalsamum	290
semen	314.419	Carthamus semen	345
Bdellium	635	Carvi semen	279
Been fructus	346	Caryophyllata	169
Benzoë	658	Caryophylli aromatici	248
Betonica	507	Cassia fistula	350
Bezoar Occidentalis, Orientalis	a 33	caryophyllata	197
Bistorta	164	lignea	196
Bitumen Judaicum	716	Castanearum cortex	215
Blatta Byzantina	a 13	Castoreum	a 45
Boletus cervi	241	Catechu	721
Bolus alba		Cataputiæ species	343
armena			Caud

INDEX MATERIE MEDICÆ

Cauda equina	553	Crocus Martis	145
Centaurium minus	526	Metallorum	a 106
Cera	717	Orientalis	577
Ceraforum nuclei	377	Crystallus	a 120
Ceratonia	404	Cubebæ	258
Cerussa	a 139	Cucumis asininus	131
Ceterach	566	Cucumeris semen	406
Chalcitis	a 112	Cucurbitæ semen	406
Chalybs	a 142	Cuminum	279
Chamædrys	509	Cupressi nux	443
Chamæpithys	496	Curcuma	49
Chamæmeli flores	573	Cuscuta	524
Cheiri flores	599	Cyani flores	605
Chermes grana	297	Cyclamen	111
China Chinæ utraque	201.203	Cydoniorum semen	446
radix	75	Cynoglossa	178
Chocolata	384	Cyperus longus	40
Chrysocollo	a 67	rotundus	40
Cicer. semen	422	Dactyli	387
Cichorium	86	Daucus Creticus & vulgaris	292
Cinæ semen	311	Dens apri	a 16
Cinamomum	191	Dentali	a 37
Cinnabaris factitia	a 84	Diagrydium	686
Citri cortex	187	Dictamnus albus	99
Citrulli semen	406	Creticus	477
Cnicus semen	345	Doronicum	150
Cochlearia	518	Ebulus	144
Coffee	324	Ebur	a 9
Colchicum	113	Elaterium	132.683
Colocynthis	333	Elemi gummi	654
Colophonium	717	Entali	a 37
Colubrinum lignum	234	Epithymum	524
Consolida major	158	Equisetum	553
Saracenica	555	Eryngium	82
Contrayerva	167	Erysimum	521
Corallia alba		Esula	132
rubra	a 129	Eupatorium	473
Coriandrum	300	Euphorbium	680
Cornu cervi	a 1	Euphrasia	516
Cortex Winteranus	198	Fabarum semen	425
Costus	38	Ferrum	a 142
Cranium, humanum	a 7	Ficus	393
			Filix

INDEX MATERIE MEDICÆ.

Filix	105	Hordei semen	363
Fœniculum radix	56	Horminum	460
semen	274	Hyacinthus lapis	a 122
Fœnum græcum	419	Hyosciami semen	433
Fraxinella	99	Hypericum herba	518
Fraxini cortex	210	semen	430
Fumaria herba	529	Hypocistidis succus	725
semen	311	Hyssopus	475
Fungi	241	Alappa	123
Sambuci	243	Ichthyocolla	a 58
G Alanga major	14	Imperatoria	20
minor	14	Iris florentina	48
Galbanum	633	Jujubæ	396
Gallæ	438	Juncus odoratus	482
Geniste semen	320	Juniperi baccæ	281
Genfingh	30	K Ermes grana	297
Gentiana	95	Kinkina utraque	201
Gialappa	123	L Acca gummi	647
Glandes	438	Lactucæ semen	410
Glans unguentaria	346	Ladanum	675
Glycyrrhiza radix	148	Lavendulæ flores	571
succus	709	Laureolæ baccæ	327
Gossypii semen	361	Lauri baccæ	286
Graminis radix	73	folia	498
Grana paradisi	267	Lazuli lapis	a 103
Granatorum cortex	217	Leucojum luteum	599
Granatus lapis	a 122	Levisticum radix	28
Grana tilli	138	semen	277
Gratiola	540	Lignum Moluccense	239
Guajaci cortex	200	sanctum	224
lignum	224	vulnerarium	210
Gummi Arabicum	713	Lilium album	155
Gutta gamba	684	convallium	593
H Æmatites lapis	146	Lingua cervina	569
Halicacabi baccæ	318	Linum semen	427
Hedera terrestris	514	Liquiritia radix	148
Helenium	45	succus	709
Helleborus albus	138	Liquor stipticus	a 110
niger	135	Lithargyrium auri, argenti	a 138
Hermodactyli	113	Lucii pilcis mandibulæ	a 14
Hirci sanguis	a 29	Lumbrici terrestres	a 53
Hirudines	a 59		Lu-

INDEX MATERIAE MEDICAE

Lupini semen	424	Napi semen	308
Lupulus	532	Nasturtium	520
M Acis	253	semen	305
Magnes	a 146	Nepeta	470
Majorana	451	Nephriticum lignum	232
Malicorium	217	Nicotiana	541
Malva herba	549	Nigella	302
semen	418	Ninzin	30
rosea seu hortensis	606	Nitrum	a 72
Mandibulae lucii piscis	a 14	Nux cupressi	443
Mandragora	180	moschata	255
Manna	697	vomica	235.336
Margaritæ	a 30	Nymphaea flores	611
Marrubium	489	radix	174
Mastiche	642	O Culi cancri	a 19
Matricaria	478	Olea odorata parandi modus	348
Mechoacanna	128	Oleris atri semen	309
Mel	710	Olibanum	645
Meliloti flores	596	Ononis	92
Melissa	457	Opium	624
Melonum semen	406	Opobalsamum	672
Mentha aquatica	469	Opopanax	702
crispa	467	Orchis	77
Menthastrum	470	Origanum	449
Mercurialis	545	Orobi semen	421
Mercurius vivus	a 92	Osmunda	107
dulcis	a 89	Os sepia	a 17
præcipitatus ruber	a 88	Osteocolla	a 125
sublimatus	a 86	P Apaver erraticum	609
viridis	a 91	Papaveris semen	436
Mespilum	442	Parietaria	546
Meum	27	Parthenium	478
Mezereum	327	Passulae majoris, minores	400
Milium solis	322	Panava	239
Minium	a 140	Pentaphyllum	172
Moschus	a 39	Perficaria	522
Mumia	a 29	Perficorum nuclei	381
Musculus quernus	554	Petasites	52
Myrobalanorum quinque species	348	Petroselinum radix	60
Myrrha	677	semen	295
Myrti bacca	444	Peucedanum	97
		Phylli-	

INDEX MATERIAE MEDICAE.

Phyllitis	569	Rosmarinus flores	570
Pilosella	563	herba	461
Pimpinella sanguisorba	170.516	Rubia tinctorum	93
faxifraga	70.306	Rubinus	a 123
Pini nuclei	375	Ruscus radix	90
Piper album	261	femen	323
longum	266	Ruta herba	485
nigrum	261	femen	296
Pistacia	374	Ruta muraria	566
Pix	660	Abina	487
Plantago	410	Saccharum	703
Plumbum	a 137	5ni	a 141
Pœonia flos	608	Sagapenum	639
radix	176	Sal commune	a 68
femen	435	gemmæ	a 71
Polytrichum aureum	566	Salsa parilla	75
Polium	477	Salvia herba	464
Polygonum	564	flos	573
Polypodium	146	Sambucus flores	598
Pompholyx	a 127	femen	357
Portulacæ semen	410	Sandaracha	641
Prassium	489	Sanguis draconis	719
Primula veris	595	hirci	a 29
Pruna damascena	398	Sanicula	561
Psyllium	330	Sandalum album, citrinum	228
Pulegium	472	rubrum	236
Pulmonaria	554	Sapphirus	a 123
Pumex	a 128	Sarcocolla	701
Pyretrum	69	Sardius	a 124
Pyrola	560	Sassafras	222
Q Uercus cortex	219	Satureja	454
folia	560	Satyrium	77
Quinquefolium	172	Scammonium	686
R Aphanus semen	309	Scariola	410
rusticanus	62	Schœnanthus	482.583
Rhabarbarum	115	Scordium	531
Rhaponticum	121	Scilla	67
Rhodium lignum	231	Scincus	a 52
Ribesium	511	Sclarea	460
Ricini species	341	Scolopendrium	566
Rosarum flores	588	Scorzonera	80
Rosæ rubræ	613		Se-

INDEX MATÉRIÆ MEDICÆ.

Sebesten	397	Thus	645
Senna	534	Tiliæ flores	592
Sepiæ os	a 17	Tinctura Corallorum	130
Seseli semen	294	Topasius	a 125
Serici folliculi	a 61	Tormentilla	166
Serpentaria Virginiana	36	Tragacantha	714
Serpillum	452	Tunicæ flores	583
Siler semen	294	Turbith	129
Siliqua dulcis	404	minerale	a 92
Sinapi	306	Tussilago flores	161
Smaragdus	a 124	herba	551
Soldanella	539	Tutia	a 126
Sophia chirurgorum	303	V Ainiglia	300
Solidago Saracenicæ	555	Valeriana	34
Sperma ceti	a 49	Verbascom flores	607
Spicæ flores	571	herba	551
Spica nardi	42	Verbena	558
Staphis agria	329	Veronica	512
Stœchatos flores	581	Vincetoxicum	43
Styrax Calamita	662	Violaria	548
Succinum	649	flores	585
Sulphur	a 114	Virga aurea	555
Sumach semen	441	Viride æris	a 112
Symphitum	158	Vitriolum	a 108
T Acamahaca	656	Viscus quernus	237
Tamarindi	353	Vitrum antimonii	a 105
Tamariscus	212	Umbilicus marinus	a 37
Tanacetum	296.490	Ungula alcis	a 12
Tartarus albus		Unicornu fossile	a 133
ruber	726	verum	a 10
Terebinthina	664	Urticæ semen	315
Terra Japonica	721	Winteranus cortex	198
Lemnia &		Z Edoaria	12
Sigillata	a 136	Zibethum	a 41
Thea	500	Zinziber	17
Thlaspi semen	304	Ziziphi	396
Thymus	453		

Irrepere præter spem plura Errata Typographica. Sic. p. 45. lin. 6 & 7. legendum campaniformi & multifido, p. 80. linea prima postponenda secunda, hinc inde porro scribendum exolevit, pendat pro pendeat, quæ & similia Ben. Lector haud gravatim, cum ob temporis penuriam eorum enumeratio addi non potuerit, corrigat.

